

[Zum 1. Teil \(S. 424\)](#)

[Zum Inhaltsverzeichnis](#)

## 26. DE DUCTIBUS

[Sommer 1673]


**Überlieferung:** L überarbeitetes Konzept: LH 35 II 1 Bl. 229–232. 2 Bog. 2°. 8 S. — Figuren 1–3 nicht vorhanden (Vorlage die entsprechenden Figuren aus N. 21 u. N. 23). Im Laufe der Überarbeitung umfangreiche Änderungen des ursprünglichen Textes vor allem auf dem 1. Bogen (bis S. 448 Z. 11); Hinzufügung von Verweisen auf andere Sätze; substanzelle Ergänzungen (Sätze 42, 52–3, 62–6, 15, 16; der größte Teil der Abschnitte S. 437 Z. 11 bis S. 439 Z. 16; Fig. 5 nebst den zugehörigen Abschnitten S. 442 Z. 9 – S. 443 Z. 12).  
Cc 2, Nr. 697

5

Datierungsgründe: Das vorliegende sowie das nächstfolgende Stück stützen sich insbesondere auf die Figuren 1–3 von N. 21 und N. 23; sie sind unmittelbare Folgestücke. Beide Studien nehmen wechselseitig aufeinander Bezug.

10

Catalogus propositionum, quibus ductus  
curvilineorum ex circulo natorum, comparantur:



[Fig. 1]

15

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } BDA \text{ et } DCA. \quad \frac{AB}{AD} = \frac{AD}{AC} = \frac{DB}{DC}. \\ \text{sinus versus} \\ \text{diam.} \wedge \text{ abscissa a vertice} \quad \text{chorda arcus} \\ AB \qquad AC \qquad = \qquad AD \square.$$

15 Fig. 1 erg. Hrsg. nach Text u. N. 21.

P r o p. 1. Semicubus [diametri] aequatur summae quadratorum semiparabolae, seu duplo momento semiparabolae ex axe libratae.

diam. sin. chord. chorda complementi

$$\frac{AB}{AD} = \frac{AC}{DC}. \quad \text{Ergo } AB \hat{\wedge} DC = AD \hat{\wedge} DB. \quad \text{seu}$$

5 P r o p. 2. Parabola eiusdem altitudinis ac basi, ducta in se ipsam inverse, aequatur cylindro semicirculi sub diametro. Idem est de portionibus abscissis, quae aequantur cylindrī semisegmentorum sub diametro.

chord. sin. chorda complem. sinus versus

$$\frac{AD}{DB} = \frac{AC}{DC}. \quad \text{Ergo } AD \hat{\wedge} DC = DB \hat{\wedge} AC. \quad \text{ergo}$$

10 P r o p. 3. Ductus semicirculi rectus in parabolam aequatur ductui trianguli inverso in eandem, seu momento parabolae ex vertice.

Sed si ductus sit semisegmenti in parabolam, aberit momentum ex vertice abscissae portionis parabolae, per rectam basi parallelam, a basi ipsa  $AC$  distantem. Ecce rem admirabilem: semisegmentorum ductus in parabolam quoadrabilis posse, parabolae in parabolam non posse.

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } DCA \text{ et } BCD. \quad \frac{DB}{AD} = \frac{BC}{DC} = \frac{DC}{AC}.$$

chord. sinus vers. complem. chorda complem. sin.

$$AD \hat{\wedge} CB = DB \hat{\wedge} DC. \quad \text{est quo-}$$

dammodo inversa prioris.

20 P r o p. 4. Momentum parabolae vel a vertice abscissae portionis ex basi aequari portioni parabolae eiusdem a vertice abscissae inverse, ductae in semisegmentum circuli eiusdem altitudinis.

Praecedens ductus semisegmenti in parabolam erat rectus, posterior est inversus, itemque ductus est quoadrabilis.

25 P r o p. 4. n u m. 2.  $BC \hat{\wedge} AC = DC \square$ . quadrata sinuum momentis ex vertice portionum diametri.

$$[\nabla^{\text{la}} \text{ similia } FBA \text{ et } ABD.] \quad \frac{FB}{AB} = \frac{AB}{DB} = \frac{FA}{AD}. \quad FB = \text{secans falsa.}$$

1 radii  $L$  ändert Hrsg. 10 Ductus (1) circuli vel semisegmenti | circularis nicht gestr. | inverso (2) semicirculi  $L$  25 (1) P r o p. 4. n u m. 2:  $DB \hat{\wedge} AC = AD \hat{\wedge} BC$ . seu momentum chordarum supplementi ex basi (2) P r o p. 4.  $L$  27  $\nabla^{\text{la}}$  ... ABD. erg. Hrsg. 27 FB = (1) chorda compl. aucta tangente arcus dimidii (2) secans  $L$

$$\text{chord. compl.} \quad \text{diam.}$$

Ergo  $FB^{\wedge} DB = AB \square$ . ergo

P r o p. 5. Parabola vel portio, seu summa chordarum complem. ducta in se ipsam, seu summa quadratorum parabolae portionis (quae quadrari potest), aucta eadem parabola, seu summa chordarum arcuum complementalium, in summam  $FD$  ducta, aequatur cubo diametri.

5

C o r o l l. Cumque quadrata applicatarum parabolae summarri possint, si a cubo diametri subtrahantur, residuum erit ductus parabolae inversus in figuram omnium  $FD$ . Is ergo ductus poterit quoadrari.

P r o p. 5. n u m 2.  $FB^{\wedge} AD = AB^{\wedge} FA$ . seu secantes falsae in chordas aequantur diametro in tangentes falsas seu cylindro conchoeidis falsae.

10

P r o p. 5. num 3.  $AB^{\wedge} AD = DB^{\wedge} FA$ . diameter in chordas, chordis supplementi in tangentes falsas, seu cylinder parabolicus aequatur ductui inverso parabolico in conchoeidem falsam.

$$\nabla^{la} \text{ similia } FDR \text{ et } DCB. \frac{FR}{DC} = \frac{FD}{DB} = \frac{AC = RD}{CB}. \text{ Ergo}$$

dist. a basi  $B$  chord. complem. dist. a basi  $A$

$$FD^{\wedge} CB = DB^{\wedge} AC. \text{ seu}$$

15

P r o p. 6. Momenta  $FD$  ex basi (eiusve portionis a vertice abscissae), aequantur momentis figurae chordarum seu parabolae eiusve portionis a basi abscissae, itidem ex basi.

20

At haec quadrari possunt. Ergo illa quoque.

C o r o l l. 1. Habetur ergo momentum figurae omnium  $FD$  ex basi, quadrabile. Adde inf. prop. 8. coroll.

C o r o l l. 2. Ergo et solidum revolutione reductum ad cylindrum.

P r o p. 6. n u m. 2.  $FR^{\wedge} DB = DC^{\wedge} FD$ . seu [chorda supplementi in differentiam

25

5 summag (1) tangentium arcuum dimidiorum (2)  $FD$  L 8 in (1) figuram tangentium dimidiorum (2) figuram  $L$  17 Über  $FD$  gestr.: tang. dim. L 22 figurae (1) tangentium dimidiorum tam ex vertice quam ex basi, quadratus (2) omnium  $L$  24 revolutione (1) conchoeidis falsae | contractae erg. |, sic enim appellare placet (2) | eius gestr. | reductum ad cylindrum. | Et | esse erg. | aequale (a) cylindro sec (b) conoeidi parabolico homogeneumque (c) conoeidi circulari. gestr. |  $L$  — Dazu interlinear, gestr.: Conchoeidem autem falsam voco, cum secans exit non ex centro, sed ex altera diametri extremitate, tangens autem ex una A. ut AH est[,] dat conchoeidem falsam contractam.  
25–428,1 sinus in chordam semisupplementi, demto sinu in differentiam sui  $L$  ändert Hrsg.

sinus] a tangentे falsa = sin.  $\wedge$  FD.

Prop. 6. n u m. 3.  $FR \wedge CB = DC \wedge AC$ . seu momenta ex vertice differentiarum inter sinus et tangentes falsas = momentis sinuum ex una diametri extremitate seu vertice circuli, si quadrans non excedatur, seu momenta tangentium falsarum ex basi aequaluntur momentis sinuum, ex utraque extremitate, id est sinuum cylindro. Add. prop. 2. et coroll. prop. 7. ubi quae huic aequaluntur.

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } FDR \text{ et } FAB. \text{ Ergo } \frac{BF}{DF} = \frac{AB}{RD} = \frac{AF}{FR}.$$

Prop. 6. n u m 4.  $BF \wedge RD = DF \wedge AB$  secantis falsae momenta a vertice circuli, seu suo quoque aequaluntur diametro in earum differentias a chordis supplementi, seu cylindro omnium FD.

Secans autem falsa BF componitur ex chorda supplementi BD et ipsa DF seu FD. Ergo cum momentum chordarum supplementi detur, ad quadraturam omnium FD opus erit eorum momento ex circuli vertice.

Prop. 6. n u m 5.  $BF \wedge FR = DF \wedge AF$ . secans falsa in differentiam tangentis falsae a sinu = FD in tangentes falsas.

Prop. 6. n u m 6.  $AB \wedge FR = RD \wedge AF$ . differentia inter tangentem falsam et sinum in diametrum, seu cylinder conchoeidis falsae, demto cylindro portionis circularis, aequaluntur momento tangentium falsarum ex vertice.

Hoc ergo momentum supponit tetragonismum. Adde prop. 7. et prop. 6. num. 2. nimurum cylinder portionis circularis est momentum tangentium falsarum ex basi.

Semper autem NB. duo momenta, alterum ex vertice, alterum ex basi constituunt cylindrum.

25 Dictum paulo ante, quod chord.  $\wedge$  sin. = chord. complem.  $\wedge$  sin. versus. Ergo  
 $\sin = \frac{\text{chord. complem.} \wedge \text{sin. vers.}}{\text{chord.}}$ .

Ergo si applicatae semiparabolae basis altitudini aequalis, ex basi sumtae ducantur in rationes sinuum versorum ad applicatas eiusdem parabolae respondentes ex vertice sumtas

3 falsas = (1) cylindro sinuum, sub radio. Prop. 6. (2) momentis L 4 circuli, | quadrabilibus gestr. si quadrans non excedatur, erg. | seu L 27 basis ... sumtae erg. L

(seu aequae distantes a vertice, ut illae a basi) producentur applicatae quadrantis circuli.  
Et summa illorum, dabit semisegmenta circularia ex radio abscissa per applicatam.

Aliter: si rationes applicatarum diverse sumtarum, ita tamen ut ex basi sumta sit antecedens, ex vertice sumta consequens, inter se ducantur in sinus versos applicatarum parabolae ex basi sumtarum, a vertice, producentur sinus seu applicatae quadrantis, et ex summa semisegmentum ex radio abscissum vel etiam quadrans. 5

Sunt autem applicatae parabolae[:]

$$\frac{Rq \cdot a^2 - \beta a}{Rq \cdot \beta a} \quad \frac{Rq \cdot a^2 - 2\beta a}{Rq \cdot 2\beta a} \quad \frac{Rq \cdot a^2 - 3\beta a}{Rq \cdot 3\beta a} \quad \frac{Rq \cdot a^2 - 4\beta a}{Rq \cdot 4\beta a}$$

fiet

$$Rq \cdot \frac{a^2}{\beta a} - 1, \quad Rq \cdot \frac{a^2}{2\beta a} - 1, \quad Rq \cdot \frac{a^2}{3\beta a} - 1, \quad 10$$

seu

$$Rq \cdot \frac{a}{\beta} - 1, \quad Rq \cdot \frac{a}{2\beta} - 1, \quad Rq \cdot \frac{a}{3\beta} - 1, \quad \text{etc.}$$

quae si ducantur in

$$a - \beta \quad a - 2\beta \quad a - 3\beta$$

vel

$$Rq \cdot a^2 + \beta^2 - 2a\beta, \quad Rq \cdot a^2 + 4\beta^2 - 4a\beta, \quad Rq \cdot a^2 + 9\beta^2 - 6a\beta, \quad 15$$

fient

$$Rq \cdot \frac{a^3}{\beta} + 3a\beta - 3a^2 - \beta^2, \quad \text{etc.}$$

sinus.

$$\nabla^{la} \text{ similia: } BAF \text{ et } BCD. \quad \frac{AB}{CB} = \frac{AF}{CD} = \frac{FB}{DB}. \quad \text{Ergo} \quad 20$$

P r o p. 7.  $AB \cap CD = CB \cap AF$ . seu cylinder portionis circuli sub AC

$$18 \quad \frac{a^2 + \beta^2 - 2a\beta}{1} - \frac{a}{\beta} = \frac{a^3}{\beta} + a\beta - 2a^2.$$

$$Rq \cdot \frac{a^3}{\beta} + a\beta - 2a^2 - a^2 - \beta^2 + 2a\beta, \quad \text{sinus.}$$

$$\frac{a^3}{\beta} + 3a\beta - 3a^2 - \beta^2, Rq.$$

3 f. ita ... consequens erg. L 21 CB  $\cap$  AF. (1) | seu nicht gestr. | semicubus radii, vel etiam (a) cylinder semiquadrati portionis regulae vel sinus versi (b) prisma sinus versi sub radio (2) seu cylinder portionis (a) quadrantis | sub nicht gestr. | radio (b) circuli (aa) altitudine AC (bb) sub L

a vertice abscissa, aequatur momentum tangentium duplorum arcuum dimidiatorum seu distantiis earum a basi.

Intelligendum est enim  $AF$  applicatam esse ubi est  $CD$ . basis eius seu maxima applicabitur in  $B$ . ergo  $CB$ . est applicatae distantia a basi; est autem  $AF$  tangentis arcus dimidii,  $AH$  duplum. Cylinder ergo portionis  $ACD$  sub  $AC$  aequatur momentis omnium  $AF$  applicatarum ad  $AC$ .

C o r o l l. Hinc momentum chonchoeidis falsae ex basi, et ductus parabolico-parabolicus inversus aequantur per prop. hanc iuncta prop. 2. adde prop. 6 num. 3. et prop. 19.

Pergendum in his aequationibus:  $\frac{AB}{CB} = \frac{AF}{CD} = \frac{FB}{DB}$ . Ergo


$$\begin{array}{ccccccc} \text{diam.} & \text{chord. complem.} & \text{sin. vers.} & \text{chord. compl.} & + [FD] \\ AB & \hat{\sim} & DB & = & CB & \hat{\sim} & FB. \end{array} \quad \text{Ergo}$$

P r o p. 8. Cylinder cuius basis portio semiparabolae a basi per applicatam abscissae, altitudo diameter, aequatur summae momentorum ex basi, tam chordarum, seu portionis parabolicae a basi per applicatam abscissae, quam omnium  $FD$ , seu portionis figurae omnium  $FD$  a vertice abscissae.

C o r o l l. Hinc rursus quadratura momentumi figurae omnium  $FD$ . ut et supra prop. 6. coroll.

### 1 seu momento conchoeidis falsae

6f. ad AC. | At cum AF sit duplum FD. (1) et momen (2) vel AH. tangentium dimidiorum, seu applicatarum conchoeidis falsae contractae, et ostenderimus tangentium dimidiorum momentum aequari momento portionis parabolae a vertice abscissae, ex basi. Ergo cylinder portionis circularis, momentum parabolico aequalaretur. Quod si verum esset haberetur non tantum (a) qua (b) tetragonismus sed et goniometria |. Et certe nondum invenio errorem. gestr. | modo haberi possit centrum gravitatis portionis semiparabolae a basi per applicatam abscissae.



Sin minus habetur saltem tetragonismus arithmeticus, (aa) isque non per approximations, sed exactus, (bb) nimirum per infinitam seriem numerorum rationalium quod hactenus in circulo potuit nemo. Et quod est admirabilius, datur sectio angularum universalis, seu inventio quotunque proportionalium methodo eadem. gestr. |

C o r o l l. L

8 inversus (1) quadrari possunt (2) aequantur  $L$  11 tang. arcus dimid.  $L$  ändert Hrsg. 15 quam (1) tangentium arcum dimidiorum, seu conchoeidis falsae contractae (2) omnium  $L$  17 momentum (1) conchoeidis falsae contractae. (2) figurae  $L$  19 falsae | (protractae) gestr. |  $L$

$$\text{dupl. tang. arcus dimid. chord. compl. } \sin \text{ chord. compl.} + FD \\ AF \quad \hat{\quad} \quad DB = CD \quad \hat{\quad} \quad FB. \quad \text{Ergo}$$

P r o p. 9. Portio conchoeidis falsae a vertice abscissae, ducta in portionem semiparabolae a basi abscissae, aequatur portionis semicirculi a vertice abscissae, ductui in semiparabolicam a basi abscissae, demto ductu eiusdem portionis semicirculi in figurae omnium  $FD$  portionem a vertice abscissam. Eadem omnium portionum altitudine ( $AC$ ) supposita.

5

Iam ductus parabolico-circularis quadrari potest, prop. 3. Ergo ductus parabolicus in conchoeidem falsam demto ductu circulari in fig.  $FD$  quadrari potest.

Antequam autem ad novas aequationes procedamus operaे premium est resumere  
atque examinare alibi iam explicatas, ac uno velut obtutu oculis sistere.

10

chord. compl.

Diximus supra  $FD \hat{\quad} DB$  quadrari posse.

At quia etiam  $\frac{FD}{DB} = \frac{DR = AC}{CB}$  portio regulae a vertice port. circ.  
altera portio seu supplementum regulae.

Ergo  $FD \hat{\quad} CB = DB \hat{\quad} AC$ . ut iam habuimus. Ergo  $FD = \frac{AC \hat{\quad} DB}{CB}$ . Ergo  $\frac{AC \hat{\quad} DB}{CB}$

15

$\hat{\quad} DB = FD \hat{\quad} DB$ . Ergo

P r o p. 10.  $\frac{AC \hat{\quad} \square DB}{CB} = FD \hat{\quad} DB$ . seu [solido] dato quia  $FD \hat{\quad} DB$  quadrabile  
est, sup. prop. 5. coroll.

---

3 NB. cum c o n c h o e i d e m dico, intelligo exenta circuli generatoris portione.  
Cum de ductibus loquor, intelligo iisdem regulae portionibus seu altitudinibus assumtis;  
et quod de totis, idem de partibus per applicatas abscissis intelligo.

1 chord. compl. + (1) tang. dimid. (2)  $FD L$       5 f. in (1) conchoeidis falsae contractae (2)  
figurae  $L$       13 supra (1)  $FD \quad \hat{\quad} DB$       =  $AB \square$ . (2)  $FD L$       16  $FD \hat{\quad} DB$  (1) =  
tang. dimid. chord. compl. diam  
(a)  $AB \square$ . Ergo P r o p. 10.  $\frac{AC \hat{\quad} \square DB}{CB} = AB \square$ . (b) plano (aa) assignabili (bb) dato (2). Ergo  $L$   
17 plano  $L$  ändert Hrsg.

At  $\square^{\text{ta}}$   $DB$  seu chordarum a maxima, seu ab  $AB$  ita procedunt:

$$a^2 \quad a^2 - \beta a \quad a^2 - 2\beta a \quad a^2 - 3\beta a$$

eae ducantur in suas distantias ab  $A$ . seu in  $AC$ .

$$0 \quad \beta \quad 2\beta \quad 3\beta$$

5 fient

$$0 \quad a^2\beta - \beta^2 a \quad 2a^2\beta - 4\beta^2 a \quad 3a^2\beta - 9\beta^2 a \quad \text{etc.}$$

Quae si dividantur per  $CB$ . seu distantias a  $B$ .

$$a \quad a - \beta \quad a - 2\beta \quad a - 3\beta$$

[fiet]

$$\frac{0}{a} \quad \frac{a^2\beta - \beta^2 a}{a - \beta} \quad \frac{2a^2\beta - 4\beta^2 a}{a - 2\beta} \quad \frac{3a^2\beta - 9\beta^2 a}{a - 3\beta} \quad \text{etc.} = \text{solido dato.}$$

Coroll. 1. Manifestum est, hoc solidum esse progressionis cuiusdam ad harmonicam accendentis, seu hyperboliformis, et tamen quadrari posse. Quod nulli hactenus quod sciam hyperboleidi contigit.

Idem ex solidi transferri potest in planum, divisis omnibus per  $a$ , unde apparet ipsum 15 solidum esse spatii cuiusdam hyperboleidis cylindrum, fiet enim basis:

$$\frac{a\beta - \beta^2}{a - \beta} + \frac{2a\beta - 4\beta^2}{a - 2\beta} + \frac{3a\beta - 9\beta^2}{a - 3\beta} \quad \text{etc.} = \text{solido dato per } a \text{ diviso.}$$

Hoc spatium habet asymptotam, sed in eo differt ab hyperbolico quod incipit a puncto, nam  $\frac{a\beta - \beta^2}{a - \beta} = [\beta] = \text{puncto}$ ,  $\beta$  enim est infinitesima ipsius  $a$ . Ipsae autem rectae  $a$ .  $a - \beta$ .  $a - 2\beta$  etc. sunt distantiae applicatarum ab asymptota continue decrescentes 20 uniformiter, ut in spatio hyperbolico asymptoto. Habemus ergo

Coroll. 2. quadraturam plani hyperboleidis asymptoti infiniti.

Quod hactenus quantum sciam nemo praestitit. Nam solidum hyperbolicum, seu ungulam spatii asymptoti, ideo quadrare facillimum fuit quia elementa eius non


9 fiet *gestr. L, erg. Hrsg.* 10 = (1)  $a^3$ . (2) solidi  $L$  15 cylindrum | sub a *gestr.* |, fiet  $L$

16 = (1)  $a^2$  (2) solidi  $L$  18  $\frac{a}{a} L$  ändert *Hrsg.*

11 Coroll. 1. : Leibniz übersieht, dass  $\frac{na^2\beta - n^2\beta^2 a}{a - n\beta} = na\beta$  ist, so dass sich keine Hyperbel sondern eine Parabelquadratur bzw. eine Identität ergibt.

hyperbolice sed cylindrice, ut elementa rectanguli, progrediuntur, ex nota hyperbolae proprietate.

Figura II.



[Fig. 2]

$\nabla^{\text{la}}$  *ADC* et *EDF* similia. Ergo  $\frac{AD}{DF} = \frac{DC}{DE} = \frac{AC}{EF}$ .

Prop. 11.  $AD \cap DE = DF \cap DC$ . secans in seipsum radio demto = tangenti in seipsum, demto tangente arcus dimidii, adde inf. prop. 43. coroll. 1.

$d^2 - ad = c^2 - ad + a^2$ . seu quadrata applicatarum spatii hyperbolici ad altitudinem, demto cylindro hyperbolico, aequantur quadratis tangentium, seu applicatarum conchoeidis, demto rectangulo tangentium in tangentes arcuum dimidiorum, seu ductu conchoeidis in conchoeide falsam contractam, seu demto cylindro hyp. add. cub. rad. prop. 13. Ergo quadr. sec. = quad. tang. + quad. rad.

Caeterum quadrata ista applicatarum, credo summari non posse; quia ipsae applicatae sunt infinitae, nec refert, quod applicatae summarri possunt. Nam omnia quadrata sunt momentum utique figurae seu omnium applicatarum ex altitudine, at momentum hoc est figura ducta in distantiam centri gravitatis, ab axe librationis. Quam distantiam

4 Fig. 2 erg. Hrsg. nach Text u. N. 21. 8 d<sup>2</sup>—...+a<sup>2</sup>. erg. L 11–13 seu demto ... quad.  
rad. erg. L

necesse est esse assignabili qualibet maiorem. Semper enim quamcunque ducas rectam ex asymptota altitudini parallelam, patet ab uno eius latere finitas, ab altero infinitas longitudines esse. Pro longitudinibus autem seu distantias continue pondera crescunt. Quare non est dubitandum haec spatia quibusdam quadrato-quadratis aequari, quemadmodum 5 lineas infinitas aequari quadratis, alibi ostendi hyperbolae ipsius exemplo, in qua asymptota, quadrato illi, numeratori communi, aequalis est.

Unde praeclera consequentia dicitur, scilicet figuras quadratoquadratas, aliasque quascunque altiores non esse imaginarias, sed reapse posse exhiberi. Quod alioquin multis modis in partibus inassignabilibus ostendi potest, quemadmodum aliud paradoxum longe 10 maius dari dimensiones medias inter puncta, lineas, superficies, corpora etc.

Ductus autem tangentium in tangentes arcuum dimidiorum, finitus est ut mox ostenderimus. Nam maximus tangentium arcus dimidii est ipse radius, unde patet conchoeidem falsam, eiusque contractam esse finitae longitudinis, nec habere asymptotam.

P r o p. 12.  $AD \cap EF = DF \cap AC$ . secans in tangentem arcus dimidii aequatur differentiae tangentium, arcus dati et dimidii, in radium, seu spatium hyperbolicum in conchoeidem falsam contractam, aequatur cylindro conchoeidis verae, demto cylindro conchoeidis falsae contractae, adde prop. 38.

P r o p. 13  $DC \cap EF = DE \cap AC$ . seu tangens arcus dati in tangentem arcus dimidii 20 aequatur radio in differentiam secantis et radii.

Ergo ductus conchoeidis verae in falsam contractam, cylindro hyperbolicō demto cubo radii, add. prop. 37.

Ergo cubus radii aequatur cylindro hyperbolico demto ductu conchoeidis verae in falsam contractam. Quare si ductus iste quadrari posset, haberetur quadra-

---

13 Nota quod dixi conchoeidem falsam eiusve contractam esse finitam intellige, si intra quadrantem sistatur, quod fit quotiescumque secantibus, scilicet ex radio ductis utimur, at quoties chordas ex adversa diametri extremitate venientes ipsamque diametrum adhibemus, tunc ultra quadrantem ad ipsum usque semicirculum progredimur, quod in conchoeidis falsae eiusve contractae dimensione notandum est.

8–10 Quod alioquin ... corpora etc. erg. L

t u r a h y p e r b o l a e , unde apparent, quanti sit momenti haec ductuum doctrina.

Cylinder hyperbolicus demto ductu conchoeidis verae in falsam contractam quadraturam potest, semper autem aequatur cubo radii, quaecunque sit altitudo portionis regulae, quod notabile est. 5

$$\nabla^{la} DEF \text{ et } DGE \text{ similia sunt. Ergo } \frac{DF}{DE} = \frac{DE}{DG} = \frac{EF}{EG}.$$

Prop. 14.  $DF \wedge DG = DE \square$ . quadratum differentiae inter secantem et radium aequatur differentiae inter tangentem et tangentem arcus dimidii ductae in differentiam sinus et tangentis.

$$\sec. \wedge \sec. + \text{rad.} \wedge \text{rad.} - 2 \text{rad.} \wedge \sec. =$$

$$\begin{array}{c} \text{tang.} - \text{tang. dim.} \\ \text{tang.} - \sin. \end{array} \quad \begin{array}{c} [\sec. \wedge \text{rad.} - \text{quad. rad.}] \\ \backslash / \end{array}$$

$$\text{tang.} \wedge \text{tang.} - \overline{\sin. \wedge \text{tang.} + \sin. \wedge \text{tang. dim.}} - \text{tang.} \wedge \text{tang. dim.}$$

$$\text{seu } \cancel{2} \text{rad.} \wedge \text{rad.} - \cancel{2} \text{rad.} \wedge \sec. = - \sin. \wedge \text{tang.} + \sin. \wedge \text{tang. dim.}$$

$$- \cancel{\text{rad.}} \wedge \cancel{\sec.} + \cancel{\text{rad.}} \wedge \cancel{\text{rad.}}$$

10

15

7 quadratum (1) complementi sinus | altitudinis seu portionis a vertice abscissae erg. | (2) differentiae  $L - 9$  et (1) secantis.

$$\text{tang.} - \text{tang. dim.}$$

$$\sec. - \sin.$$

$\sec. \wedge \sec. + \text{rad.} \wedge \text{rad.} - 2 \text{rad.} \wedge \sec. = \sec. \wedge \text{tang.} - \overline{\sin. \wedge \text{tang.} + \sin. \wedge \text{tang. dim.}} - \sec. \wedge \text{tang. dim.}$  Ergo semicubus portionis a vertice abscissae = ductui conchoeidis in spatium hyperbolicum addito ductu portionis circularis in conchoeidem falsam contractam, demto ductu portionis circularis in conchoeidem | darüber nicht gestr.: prop. 46. 20., demtoque ductu spatii hyperbolici in conchoeidem falsam contractam | darüber erg. u. gestr.: Coroll. seu demto cylindro conchoeidis verae, addito cylindro conchoeidis falsae contractae per prop. 14|. Idem sic enuntiari potest: semicubus aequatur ductui hyperbolae in conchoeidem veram falsa contracta minutam, addito ductu portionis circularis in (a) eandem (b) falsam contractam, demto ductu eiusdem in veram | darüber nicht gestr.: (qui quadrari potest posita hyperb. quadr. prop. 20.)|. Mirabilis est ista figurarum usque adeo heterogenearum atque extraordiniarum quadraturae. Absatz. Coroll. Eadem est quadratura si per prop. 14. pro ductu spatii hyperbolici in conchoeidem falsam contractam substituas cylindrum conchoeidis verae, demto cylindro conchoeidis falsae contractae. (2) tangentis  $L - 11$  cyl. hyp. – (1) quad. rad. nicht gestr. (2) cub. rad. L ändert Hrsg.

7 Prop. 14.: Die fehlerhafte 1. Fassung des Satzes hat Leibniz, wie die Verweise auf spätere Aussagen zeigen, bis zu Satz 48 beibehalten; erst dann hat er den Irrtum bemerkt und korrigiert.

Iam  $\sin \wedge \tan = [\sec \wedge \text{rad.}] - \text{rad. in } \sin \text{. compl.}$

Ergo:  $\text{rad.} \wedge \text{rad.} = \text{rad. in } \sin \text{. compl.} + \sin \wedge \tan \text{. dimid.}$

Vide infra post prop. 48.

Prop. 15.  $DF \wedge EG = DE \wedge EF$ . seu differentiae tangentium a tangentibus arcum

5 dimidiorum ductae in distantias suas a vertice, seu eorum momenta aequantur  
differentiis inter radium et secantem in tangentem arcus dimidii ductis, seu ductui  
hyperbolae in tangentes arcus dimidii, demto cylindro tangentium arcus  
dimidii.

Prop. 16.  $DE \wedge EG = DG \wedge EF$ . seu momentum ex vertice differentiarum inter

10 secantem et radium (quod datur data hyperbolae quadratura) aequatur ductui  
differentiae inter sinum et tangentem, in tangentem arcus dimidii; seu cylindro  
hyperbolico demto cubo radii (id est tangenti in tangentem arcus dimidii) et  
demto ductu sinuum in tangentes arcum dimidiorum.

Ergo is ductus habetur dato hyperbolae tetragonismo.

$$\begin{array}{c} \cancel{a} - df - a^2 + af = \cancel{a}d - \cancel{a}^2 - bi. \\ \diagup \\ \cancel{a}^2 \end{array}$$

Ergo sinus in tang. arc. dimid.  $bi = a^2 - af$ . seu sinus in tang. arc. dimid. = rad.  
in dist. a vertice. Ergo quadrabile.

20 Regula artis combinatoriae in geometria:

Post lineas fundamentales, nulla facile recta ducenda est, quae non sit a puncto aliquo  
iam dato, ad aliud iam datum, aut quae non sit alteri cuiusdam parallela, aut aequalis,  
aut rationis ad eam datae, aut anguli aequalis, aut perpendicularis. Sed hoc in primis  
observandum, ut linea ex puncto dato duxa sit alteri parallela aut perpendicularis, aut  
25 aequalis, aut angulum faciens aequalem.


1 cyl. hyp.  $L$  ändert Hrsg. 10 (quod (1) quadrari potest (2) datur  $L$ ) 13 f. dimidiorum.  
(1) Hoc ergo ductu habito haberetur hyperbolae tetragonismus. (2) Ergo  $L$

20 Regula: Beispiele dafür finden sich vor allem in Leibniz' Handexemplar des *Horologium oscillatorium*, 1673, insbesondere S. 66 u. 89; s. dazu N. 2.

In primis autem magni momenti est, triangula similia, in primis rectangula constituere, quoad eius fieri potest. In rectangulis enim triangulis inter se comparatis, sufficit unius anguli obliquorum aequalitas, ad perfectam similitudinem.

Porro ope similium triangulorum, habentur lineae proportionales. At harum ope omnis generis rectangula aequalia.

Sed et alius modus est inveniendi rectangula aequalia citra similitudinem diversorum  $\nabla$ lorum, si scilicet in eodem  $\nabla$ lo diversis modis assumtae altitudines in bases ducantur. Quod in primis utile est, in triangulis quae rectilinea non sunt, nam in rectilineis res ad considerationem triangulorum similium reddit.



[Fig. 3]

Fig. 3.  $\nabla IDZ$ . ubi  $IZ \cap XD = ID \cap \alpha D$ . at  $\alpha D = EA$ . distantia a vertice.

NB. radius ductus in sinum demto tangente arcus dimidii aequatur momento tangentium arcus dimidii ex vertice.

10 Fig. 3 erg. Hrsg. nach Text u. N. 23. 13–438,1 ex (1) circuli centro (2) vertice. | Dato hoc momento| et (a) conchoide (b) figura ipsa erg. | datur ... alibi. erg. (aa) Nota datur autem hoc momentum (bb) Dato momento tangentium fig. sufficit momentum tangentium verarum ad tetragonismum. erg. u. gestr. | L

10 [Fig. 3]: Es ist zu beachten, dass Leibniz die ursprüngliche spezielle Fassung der fig. 3. (s. N. 23) heranzieht und mit ihrer Hilfe die folgenden Beziehungen ableitet, die daher nicht immer allgemein gültig sind, so dass die darauf basierenden Integrationen falsch werden.

Dato hoc momento et figura ipsa datur tetragonismus ut alibi.

$\nabla IDB$ . tang. dimid.  $ID$  in radium  $DB =$  secanti dimidii  $BI$  in [sinum dimidii  $DN$ ].

$NI$  differentia inter  $NB$  regulae portionem ex centro, et  $BI$  secantem, ducta in

- 5 sinum duplicatum  $AD$  aequatur  $ID$  in  $AK$  non tamen momento tangentium arcus ex vertice.

$NB$  est dimidia  $CD$ . et  $BI$  dimidia  $CG$ .

Dato autem momento ex basi, datur momentum ex vertice et contra, saltem cylindris datis.

- 10 Hinc sequitur quadrabilem esse differentiam inter circularem portionem, et conchoeidis falsae contractae.

$\nabla BDC$ .  $DE$  sinus in radium  $BC =$  chordae complementi  $DC$  in semisinum arcus.

Fig. 3. in  $\nabla^{lo} ZDB$ . rad.  $BD$ . in  $Z\alpha = AZ (= BI) - A\alpha (= DE)$  aequatur  $ZB \wedge BE$ .

- 15 Radius in differentiam secantis arcus dimidii a sinu dati, aequatur  $ZB \wedge BE$  tangentis arcus dimidii in distantiam a basi, seu momento horum tangentium ex basi, ac denique aequatur differentiae  $DZ$  inter  $CD$  et  $CZ (= BI)$ , seu inter chordam supplementi, et secantem arcus dimidii in sinum arcus dimidii  $DN$ .

Horum ergo omnium per prop. 19. coroll. 6. qu ad r a t u r a haberi potest.

19 Daneben (bezogen auf die Grundstufe) großes  $\mathfrak{A}$

2 dimidium semi  $L$  ändert Hrsg. 4 inter (1) radium et secantem, ducta in sinum duplicatum (quadrabilis) aequatur momento tangentium arcus | dimidii gestr. | ex vertice, | sed eorum duplo gestr. | (2) NB | semicordam (!) complementi erg. u. gestr. | regulae  $L$  8 saltem (1) in totis (2) cylindris  $L$  17 aequatur (1) illi toties dicto TD | = GD. male, tota ZD non est = DG. erg. | (2) differentiae  $L$  19 per prop. 19. coroll. 6. erg.  $L$

4 NI: s. dazu auch S. 439 Z. 11. 12  $\nabla BDC$ : s. dazu auch S. 439 Z. 3.

Et quia habetur ductus sinuum in chordas supplementi, habebitur ductus sinuum in secantes arcus dimidii.

NB. fig. 3.  $\nabla BDC$ :  $BC$  rad. in  $DE$  sin. = chorda compl. in sagittam complementi.  
NB. sagitta est distantia a centro, non tamen ideo cylinder quadrantis aequatur momento semicirculi, quia intellegi debent applicari chordae ubi sunt sinus et tunc sunt parabolae,  
sed sagittae non sunt amplius earum distantiae a centro. 5

Fig. 3.  $\nabla FBD$ . radius  $FB$  in sinum complementi arcus dimidii  $BN$  = duplo sinui arcus dati  $FD$  in  $BE$  sinum complementi.

Ergo summa sinuum complementi arcus dimidii quadrati potest. Ergo et summa sinuum versorum arcus dimidii. 10

Esto in fig. 3.  $\nabla^{\text{lum}} AID$ . chorda arcus in diff. secantis et sinus complementi aequatur  $ID$  tangentis dimidii, in sinum versum  $AK = AE$ . seu momento tangentis dimidii ex vertice.

Hoc vero momentum quadrabile est, forte et sinus complementi in chordam, ergo tunc foret quoque quadrabilis ductus hyperbolicus in parabolicum. 15

In  $\nabla BAD$ .  $AB$  rad. in  $ED$  sinum = sinus complementi arcus dimidii, in chordam.

Portiones conchoeidis falsae, ademtis portionibus cissoeidis, faciunt portiones cy-

14 NB. hoc momentum ex vertice est quadrabile, quia figura (segmento) detracta ex portione circulari, residua manet rectilinea.

16 NB.


438,19–439,1 potest. (1) Quare differentia inter portionem circularem (2) At secans (3) Hinc data quadratura circuli datur quadratura hyperbolae, et vicissim. Imo data dimensione partium hyperbolae, datur sectio angulorum universalis. | Imo forte error quia in prop. 19. coroll. 6. ponderant ex basi per centrum non per extremum diametri transeunte. Sed quicquid huius sit, si unum momentum datur, dabitur etiam alterum, modo et figurae dimensio detur, data enim distantia centri figurae, a basi per centrum circuli transeunte, dabitur et a transeunte per diametri extremum. Ergo data quadratura circuli datur quadratura hyperbolae (a) non (b) et contra. Quia figurae dimensio pendet a circuli quadratura igitur et ex data circuli quadratura, dabitur curva elliptica et parabolica. erg. | (4) Et  $L$  11 (1)  
NB. videtur etiam ductus hyperbolico-parabolicus quadrari posse (2) Esto  $L$  14 forte erg.  $L$   
15 parabolicum. | Imo non est, nam *gestr.* |  $L$

cloeidis; modo scilicet a cycloide portiones circulorum generantium ademtae intelligantur.

Lineae figuraeque epicycliae dimensio.

Arnaldus, Bullialdus, Carcavius, Dalancius, Galloisius, Huetius, Hugenius, Oldenburgius,  
5 Thevenotus, Thomasius.

Conchoeis falsa contracta est momentum arcus circuli ex tangente, seu duplum eius segmentum.



[Fig. 4]

Si sit ellipsis  $AIH$ . foci  $C$  et  $G$ . punctum quodlibet in curva sumtum  $I$ . ex quo

10 perpendicolaris in distantiam focorum  $CG$  demissa  $ID$ . erit  $\frac{CG}{AH} = \frac{DG}{IG}$ . ut ostendit  
P. Fabri, *Synop. Opt.* prop. 51.

Ergo  $CG \wedge IG = AH \wedge DG$ . seu summa omnium rectarum ex uno foco ad curvam  
ducibilium, ducta in distantiam focorum, aequatur abscissis a perpendiculari ex distantia  
focorum, ductis in diametrum transversam maiorem. Ergo bases horum cylindrorum  
15 erunt ut altitudines reciproce, seu summa ductarum ex foco ad curvam, erit ad summam  
abscissarum, ut est diameter transversa ad distantiam focorum.

1 scilicet a | conchoeide et *gestr.* | cycloide *L*

10 ostendit: *a. a. O.* S. 155. Auf dieser Seite hat Leibniz in seinem Handexemplar die fehlende Figurenangabe (fig. 127) ergänzt.

Et hoc verum est, quomodocunque unitas in constructione assumatur, seu quaecunque intelligatur regula, sive ea sit curva, sive  $CD$ . sive ipsa  $IG$ . continue crescens uniformiter.

In omni figura perpendicularis ex curva ad altitudinem, seu applicata, ut  $IK \nabla^{\text{lum}}$  rectangulum  $EIK$  in similia secat. Hinc similia  $\nabla^{\text{la}} EID$ . et  $EIK$ . et  $IKD$ .

Ergo  $\frac{ED}{EI} = \frac{EI}{EK} = \frac{ID}{IK}$ . Ergo  $ED \wedge EK = \underline{\square} EI$ . item:  $ED \wedge IK = EI \wedge ID$ . item: 5  
 $EI \wedge IK = EK \wedge ID$ .

Porro  $\frac{EI}{ID} = \frac{EK}{IK} = \frac{IK}{KD}$ . ergo:  $EI \wedge IK = EK \wedge ID$ . habuimus.  $EI \wedge KD = ID \wedge IK$ . denique  $EK \wedge KD = \underline{IK \square}$ . seu applicata est media proportionalis inter portiones quas facit in parte altitudinis inter tangentem et perpendiculararem interiecta.

Tandem:  $\frac{ED}{ID} = \frac{EI}{IK} = \frac{ID}{KD}$ . Ergo  $ED \wedge IK = ID \wedge EI$ . habuimus  $ED \wedge KD = \underline{ID \square}$ . 10 seu perpendicularis est media proportionalis inter totum intervallum perpendicularis et tangentis in altitudine sumtum, eiusque portionem minorem.

Demissa recta  $KF$  constat angulos  $KID$  et  $FKI$  esse aequales ergo  $\nabla^{\text{la}} KFI$  et  $IKD$  similia ergo  $\frac{ID}{IK} = \frac{IK}{KF} = \frac{KD}{FI}$ . Ergo  $ID \wedge KF = IK \square$ .

Si tangens  $EI$  continuetur dum perpendiculari  $HL$  occurrat in  $L$ . et ex applicata ducatur parallela ipsi  $EH$ . nempe  $MN$ . patet  $\nabla^{\text{la}} MIN$  et  $MLO$  esse similia ergo 15

$$\frac{LI}{IM} = \frac{LO}{IN} = \frac{KH = NO}{MN}.$$

Ergo  $LI \wedge IN = IM \wedge LO$ . seu tangentes  $IL$  applicatae arcubus  $IM$  aequantur summae partium basis  $LH$ . demitis applicatis  $OH = NK$ .


Item  $LI \wedge MN = IM \wedge KH$ . Ergo momenta chordarum seu exiguum arcuum ex basi aequantur summae portionum tangentium inter basin et punctum contactus interceptae altitudini applicatarum, nam ipsae  $MN$  sunt altitudinis partes, eamque exacte implet. Quibus si ipsae tangentes imponantur, posita divisione  $AH$ . si ponatur esse diameter 20

18f. seu (1) secantes (2) tangentes ... summae (a) tangentium (b) partium ... = NK. erg. L

17–442,7 Die Ähnlichkeitsbeziehung ist unrichtig. Dadurch wird die folgende Textaussage falsch; die beiden anderen sind im Ansatz richtig.

circuli in infinitas  $MN$  inter se aequales, orietur figura tangentium, seu conchoeis circulo generatore deminuta, ea ergo aequalis est momento arcus.

Idem universaliter verum est, quaecunque portio conchoeidis assumatur. Conchoeis ergo et quaevis eius portio abscissa quadrari potest, si curva illa sit circularis, quia curvae 5 circularis momentum ex basi radio quadrari potest. Imo error, non tangentium summa sed tangentium arcus supplementi. Nec obest, quod tandem  $LI$  fit infinita  $MO$  semper manet finita, nam et  $MN$  fit infinites minor  $IM$  puncto.



[Fig. 5]

$EID \nabla$  tangens in radium = secanti in sinum.

10 Secans in secantem complementi = radio in tang. + tang, compl. ob  $\nabla ELD$ .

$$\frac{LM}{IM} = \frac{OM}{NM} = \frac{LO}{IN} \text{ ergo}$$

$$LM \cap NM = IM \cap OM. \text{ item } LM \cap IN = IM \cap LO. \quad OM \cap IN = NM \cap LO.$$

$$\frac{LE}{IM} = \frac{LH}{IN} = \frac{EH}{MN}.$$

$$LE \cap IN = IM \cap LH. \quad LE \cap MN = IM \cap EH. \quad LH \cap MN = EH \cap IN.$$

15  $\nabla^{\text{la}}$  similia  $EIK$  et  $MIN$ . Ergo  $\frac{EI}{IM} = \frac{EK}{MN} = \frac{IK}{IN}$ .

8 [Fig. 5]: H L ändert Hrsg. 9 |EID  $\nabla$  erg.| (1) secans in radium = tangenti in sinum. Quo posito dabitur absoluta conchoeidis quadratura (2) tangens L

$EI \cap MN = IM \cap EK.$        $EI \cap IN = IM \cap IK.$        $EK \cap IN = MN \cap IK.$   
sum. tang.

Item  $\nabla^{\text{la}}$  similia  $EIH$  et  $IMN$ . Ergo  $\frac{EH}{IM} = \frac{IH}{IN} = \frac{IE}{MN}$ . Ergo  
 $EH \cap IN = IM \cap IH$ . seu in circulo secans in basin = radio in chordam seu arcum.

$IH \cap MN = IN \cap IE$ . ergo quadrari possunt omnia  $IN \cap IE = IM \cap IK$ . 5

$EH \cap MN = IM \cap IE$ . seu tangentes applicatae arcibus aequantur hyperbolae.

Tandem similia  $\nabla^{\text{la}}$   $EBA$  et  $IMN$ . nam  $\vee BEA = IMN$ . Ergo  $\frac{EA}{IM} = \frac{AB}{IN} = \frac{BE}{MN}$ .  
Ergo

$EA \cap IN = AB \cap IM$ . Ergo  $EA$  applicatae basi aequantur segmento figurae duplicato  
(utile hoc in cycloide, ubi quadratura cuiusdam segmenti). 10

$AB \cap MN = IN \cap BE$ . in circulo  $AB = AK$ .

$EA \cap MN = IM \cap BE$ .

$\nabla^{\text{la}}$   $AHE$  et  $AEN$  similia sunt. Ergo:  $\frac{AH}{AE} = \frac{AE}{EN} = \frac{HE}{AN}$ .

P r o p. 17.  $AH \cap EN = AE \square$ . seu secans in sinum complementi aequatur quadrato  
radii. Quod aliunde constat, quia quadratum radii divisum per portionem regulae  
seu distantiam a basi seu sinum complementi, dat secantem. Hoc ergo idem est  
cum momento hyperbolae ex basi. 15

P r o p. 18.  $AH \cap AN = AE \cap HE$ . secans in sinum = radio in tangentem. Ergo  
c y l i n d e r c o n c h o e i d a l i s aequatur ductui portionis circularis in hyper-  
bolicam. Adde prop. 56. 20

#### 4 Hinter der Formel größeres NB.

9 segmento (1) circuli (2) figurae  $L$     15 per (1) distantiam a basi *nicht gestr.* (2) portionem  $L$

13  $\nabla^{\text{la}}$   $AHE$  et  $AEN$ : Von hier an greift Leibniz auf fig. 2. zurück. Die Figur gilt für die Sätze  
17–76 sowie 79 u. 80.

Prop. 19.  $AE \wedge AN = EN \wedge HE$ . seu cylinder circularis aequatur  
modo mento tangentium ex basi.

Hoc theorema conferendum cum prop. 7. Ibi diameter ductus in sinum, aequatur  
tangenti falso ducto in distantiam a basi, id est in distantiam ab altera diametri extre-  
5 mitate, seu si arcus minor quadrante, in distantiam a centro + rad. Hoc loco (ubi arcus  
quadrantem nunquam excedit) radius ductus in sinum, aequatur tangentis vero, ducto in  
distantiam suam a centro.

Esto radius  $a$ . sinus  $b$ . tangens verus  $c$ . falsus  $d$ . distantia a centro seu tangentis  
veri a basi  $e$ . tangentis falsi a basi  $e + a$ . Iam  $ab = ce$ . item  $2ab = de + da$ .

10 Coroll. 1: Ergo  $2ce = de + da$ .

Coroll. 2: Ergo  $\frac{2ce}{d} = e + a$ . Et quia  $2ce - de = da$ .

Coroll. 3: Ergo  $2c - d = \frac{da}{e}$ . Item quia  $2ab - da = de$ . erit

Coroll. 4:  $2b - d = \frac{de}{a}$ .

1f. Zu Prop. 19. am Rande ergänzt:

cyl. circ. =  $ab$ . momentum tangentium ex basi =  $ec$ . Iam vid. 15. et 12. add. prop. 6.  
num 6. mom. tang. ex vertice, scilicet id = (prop. 15 + 12) cyl. conchoeid. ver. – cyl.  
quadrupli segmenti arcus (seu minus cyl. conchoeid. fals.) + (per duct. prop. 6. num. 6.)  
+ cyl. conchoeid. fals. seu cyl. quadrupl. segm. sub rad. – cyl. port. circ.

Ergo, iungendo utrumque momentum: cyl. conch. = cyl. circ. + cyl. conch. – cyl. circ.  
Calculi comprobatio. Add. prop. 24.

5f. loco (1) diameter (2) | (ubi ... excedit) erg. | radius  $L$       8f. seu (1) sinus (2) tangentis veri  
a basi erg.  $L = 13-445,1 \frac{de}{a}$ . | Coroll. 5. Ergo omnes  $2b - d$ . seu ductae in  $a = de$ . Seu | dupla  
erg. | summa sinuum | omnium erg. | id est quadrans | duplicatus seu semicirculus erg. |, demis tangentibus falsis omnibus in quadrante, aequatur tangentis falso | maximo erg. | quadrantis, id est diametro,  
ducto in veri tangentis quadrantis radio scilicet applicati, distantiam a basi. Quae nulla est, tangentibus cum falsis continuo applicatis radio, maximus cadit in ipsum centrum. Hinc sequitur summam a  
t a n g e n t i u m f a l s o r u m quadrantis, aequari | semi gestr. | circulo. Ecce modum probandi, (1)  
ubi de toto (2) dimensionem totius, sine partium dimensione. Sed partes alias metimur, generaliterque  
definiemus summam tangentium falsorum aequari duplo | semi gestr. | segmento arcus |, seu segmento  
arcus duplicati gestr. |. Porro  $L$

Porro

Coroll. 1. etiam sic enuntiari potest: duplum momentum tangentium verorum ex basi per centrum transeunte aequari momento tangentium falsorum, addito cylindro eorum sub radio.

Coroll. 4<sup>tum</sup> ita enuntiari potest: summa sinuum duplicatorum demta summa tangentium falsorum, aequatur dicto momento tangentium falsorum, per radium diviso. Idque non tantum in quadrante, sed et in alia quaque parte circulari minore.

Coroll. 6. Hinc dimensio momenti tangentium falsorum ex basi.

Nam summa sinuum duplicata est duplum semisegmentum arcus dati, seu segmentum arcus  $BE$  dupli. Summa tangentium falsorum est quater segmentum arcus  $BE$  [dimidiati]. Ergo differentia, seu  $\nabla^{lum} BKE$  [duplicatum] ductum in radium, dabit momentum tangentium falsorum.

$$\nabla^{la} AEN \text{ (vel } KEA) \text{ et } HKE \text{ similia sunt. Ergo: } \frac{AE}{HE} = \frac{AK}{HE} = \frac{KE}{KH}.$$

$$AE \wedge KE = HE \wedge AK. \text{ coincidit cum prop. 19.}$$

Prop. 20.  $AE \wedge KH = HE \wedge KE$ . seu radius in differentiam secantis et distantiam a basi per centrum transeunte aequatur tangentis in sinum. Seu cylinder hyperbolicus demto prismate, cuius basis distantiae a basi (quadrabiles) aequatur ductui portionis conchoidalis in circularem.

Ergo ductus portionis conchoidalis in circularem, prop. 14. 46, demto cylindro hyperbolico, quod a d r a r i potest. Add. prop. 27. et repetita prop. 14. post prop. 48.

4f. radio. | Coroll. 2. ita enuntiatur. gestr. | (1) Ex corollario 4<sup>to</sup> praeter 5<sup>tum</sup> duco sextum. Coroll. 6<sup>tum</sup> (2) Coroll. 4<sup>tum</sup> L 13 dimidiati erg. Hrsg. 13 duplicatum gestr. L, erg. Hrsg. 14f. falsorum. | Coroll. 7. ideo coneides tangentium falsorum reduci potest ad verum cylindrum, etsi area ad segmentum. gestr. |  $\nabla^{la} L = 17 HE \wedge KE$ . (1) seu differentia secantis a radio, (a) in momentum (b) in distantia a basi (2) seu  $L = 18f$ . Seu (1) momentum (a) hyp (b) differentiarum (c) applicatarum (aa) hyperbolae (bb) spatii hyperbolici radio cui libet earum ademto (quod quod a d r a r i potest) (2) cylinder hyperbolicus demto (a) semiquadrato cui (b) prismate  $L$

---

9 Coroll. 6.: In diesem Korollar setzt Leibniz entgegen der Ausgangsformel  $d = a - tg \frac{\varphi}{2}$ .

Prop. 21.  $AK \cap KH = KE \square$ . seu quadratum sinus aequatur differentiae secantis a distantia a basi momento ex basi.

Utrumque autem quoadrari dudum constat.

$$\nabla^{la} similia: AEH \text{ et } BPH. \text{ Ergo: } \frac{AH}{HB} = \frac{AE}{BP} = \frac{EH}{HP}.$$

5 Prop. 22.  $AH \cap BP = AE \cap HB$ . secans in distantiam a circuli vertice = radio in differentiam radii a secante. Seu momentum spatii hyperbolici ex vertice, aequatur cylindro hyperbolico sub radio, demta summa radiorum, quae quadrabilis est in radium.

Ergo cylinder hyperbolicus demto momento spatii ex vertice, quoadrari potest est enim momentum ex basi. Hoc per se patet.

Prop. 23.  $AH \cap HP = HB \cap EH$ . secans in differentiam inter sinum et tangentem aequatur differentiae inter secantem et radium, in tangentem.

Radius  $a$ . sinus  $b$ . tangens  $c$ . secans  $d$ . ita  $dc - db = dc - ac$ .

Coroll. Ergo  $db = ac$ . seu secans in sinum = radio in tangentem.

15 Ergo ductus hyperbolicus in circularem, aequalis cylindro conchoeidi ali.

Prop. 24.  $AE \cap HP = BP \cap EH$ . radius in differentiam tangentis et sinus aequatur distantiae a vertice in tangentem, seu cylinder conchoeidalis, demto circulari, uterque sub radio, aequatur momento portionis conchoeidalis ex vertice.

$\nabla^{la}$  similia:  $HPB$  et  $EGF$ . quia  $\vee^{li} BHP$  et  $EGF$ . aequales. Ergo:

$$\frac{FE}{HB} = \frac{GF}{HP} = \frac{EG}{BP}.$$

Prop. 25.  $FE \cap HP = HB \cap GF$ . seu [tangentes] arcus supplementi dimidiati in differentiam tangentis et sinus, aequantur differentiae inter radium et secantem in differentiam inter distantiam a basi et tangentem arcus supplementi dimidii. Seu posito radio  $a$ . secante  $d$ . distantia a basi  $f$ . tangente arcus suppl. dimid.  $e$ .

7f. summa (1) distantiarum a vertice (2) radiorum ... est (a) (semiquadratum distantiae a vertice) (b) in L 23 seu (1) momenta tangentium arcus supplementi dimidiati, ex vertice circuli (2) | tangentium ändert Hrsg. | arcus L 25 inter (1) sinum (2) distantiam L 26 secante d. (1) sinu b. (2) distantia L

21  $\nabla^{la}$  similia: Bei der Behandlung der aus dieser Beziehung abgeleiteten Aussagen unterlaufen Leibniz verschiedene Versehen, welche trotz nachfolgender Korrekturen nicht alle behoben werden. Die Sätze 25–27 sind daher nur eingeschränkt gültig.

fiet  $d - a, \hat{f} - e$ . seu  $df - de - af + ae = ec - eb$ . seu momentum hyperbolicum ex basi demto ductu hyperbolico in tang. dim. suppl. demto momento sinuum ex basi addito denique cylindro tang. arc. suppl. dim. Si hic quadrari potest, ut alibi ostensum ergo m o m e n t a tang. arc. suppl. dim. addito ductu hyp. in tang. dim. suppl. q u a d r a r i possunt. Prop. 46. coroll. 2.

5

P r o p. 26.  $FE \hat{B}P = HB \hat{E}G$ . tang. dim. suppl. momentum ex vertice circuli = diff. inter distantiam a basi et radium in diff. rad. et sec. [;] seu ductus tang. suppl. dimid. in conchoeid. – tang. dimid. suppl. ductus in port. circ. =  $a - f, \hat{d} - a$ .  $= ad - a^2 - fd + fa$ . seu cylindro hyperbolico sub radio demtis radiis in radios, demto momento hyperbolico addito prisme distantiarum a basi.

10

P r o p. 27.  $GF \hat{B}P = HP \hat{E}G$ . differentia tangentis dimid. arcus supp. a distantia a basi, ducta in differentiam radii et distantiae a basi, aequatur differentiae inter tangentem et sinum in differentiam inter sinum et radium, seu  $[e] - f \hat{a} - f = c - b \hat{a} - b$ .

$$[e] - f \hat{a} - f = ea - ef - fa + f^2 = c - b \hat{a} - b = ca - cb - ba - b^2. \quad \text{seu } 15 \\ ca - da + af - ba - b^2.$$

Seu cylinder tangentium arcus dimidii supplementi  $ea$ , additis distantiarum a

6 Zur Formel: prop. 46. coroll. 2.

17 Zur Streichung: (quadrabilis) mit gültigem non überschrieben.

1 fiet (1)  $d - a, \hat{b} - e$ . seu  $db - de - ab + ae = |ec - eb. erg.|$  seu ductus hyperbolicus in circularem (cylinder conchoidalis) (2)  $d - a, \hat{f} - e. L$  2 suppl. (1) addito cylindro circulari (2) demto  $L$  5 suppl. (1) et cyl. circ. | darüber: mom. arc. | demto cyl. conchoeid. (2) q u a d r a r i  $L$  8 circ. (1) | b iam posito sinu erg. u. nicht gestr. | =  $a - b, \hat{d} - a = ad - a^2 - bd + ba$ . (2) =  $a - f, \hat{d} - a. L$  10 demto (1) cylindro conchoeidis (=bd) (2) momento  $L$  10 addito (1) cylindro circulari (2) momen (3) prisme  $L$  11 dimid. arcus supp. erg.  $L$  13 seu (1)  $c - f \hat{a} - f = c - b \hat{a} - b. c - f \hat{a} - f = \cancel{cf} - cf - fa + f^2 = c - b \hat{a} - b = \cancel{cf} - cb - ba - b^2$ . Ergo  $f^2 - cf - fa = b^2 - cb - ba$ . Ergo  $f^2 - cf - fa - b^2 + cb + ba = 0$ . Ergo  $f^2 + cb + ba = cf + fa + b^2$ . Seu quadrato distantiarum a basi aucta ductu conchoedo-circulari (qui demto c y l i n d r o quodam hyperbolico quadrari potest prop. 20.) et c y l i n d r o circulari, aequantur momento tangentium, radio in distantias a basi, sinuum quadratis. Hinc dari potest m o m e n t u m t a n g e n t i u m , dato tetragonismo circuli et hyperbolae. Vicissim data quadratura hyperbolae eiusve partium, et momento conchoeidis (a) eiusve (b) eiusque partium datur t e t r a g o n i s m u s c i r c u l i eiusque partium seu sectio angulorum universalis et quotunque medianarum proportionalium inventio. (2) | c ändert Hrsg. | - f  $L$  15 c  $L$  ändert Hrsg. 17  $ea$  | (quadrabilis) gestr. |, additis  $L$

basi quadratis  $\underline{\underline{f}}^2$  (quadrabilibus) et quadratis sinuum  $\underline{\underline{b}}^2$  (itidem quadrabilibus), demis  $\underline{\underline{fa}}$  distantiis a basi in radium (itidem quadrabilibus), iisdem rursus additis (et ideo plane omissis), aequatur cylindro conchoeidali  $\underline{\underline{ca}}$  addito momento tangentium arcus dimid. suppl.  $\underline{\underline{ef}}$ , demis cylindris hyperbolico et circulare.

Cylindri autem isti omnes sunt sub radio, etsi altitudo partium abscissarum a vertice radio minor sit. Quodsi momenta tangentium arcus dimid. suppl. redigi possunt vel ad figuram rectilineam vel saltem ad cylindrum circularem, ut credo, et verum est conchoeidis et hyperbolae et partium quadraturas a se invicem dependere, necesse est dari quadraturam circuli et partium eius, data quadratura hyperbolae; si etiam cylinder tang. semicomplementi quoadrabilis queat, sed ille non potest.

$$\nabla^{la} \text{ similia: } AEK \text{ et } ADC. \text{ Ergo } \frac{AD}{AE} = \frac{DC}{AK} = \frac{AC = AE}{KE}.$$

Prop. 28.  $AD \wedge AK = AE \wedge DC$ . secans complementi in distantiam a basi per centrum transeunte seu sinum complementi, aequatur radio in tangentem complementi, seu cylinder tangentium complementi (quadrabilis de quo infra) aequatur momento secantium complementi ex basi quadrantis seu ipsius figurae secantium complementi ex vertice.

Ergo hoc momentum quadrabile est.

Adde prop. 40. Et adde prop. 23. coroll. *Trigonometriae inassignabilium.*

Prop. 29.  $AD \wedge KE = AE \square$ . sinus in secantem complementi, aequatur quadrato radii, seu radius est media proportionalis inter sinum arcus dati, et secantem arcus complementi.

20 Zu  $AD \wedge KE$ : add. prop. 41.

7 vel ... vel erg. L      14 seu sinum complementi erg. L      16 f. seu ... vertice erg. L

19 Et adde: s. N. 27 S. 472 Z. 6f., weitere Hinweise auf dieses Stück finden sich in den Sätzen 43, 45, 47 (Korollar 2), 51 und 72.

Quare ductus circularis in figuram secantium complementi inversus, aequatur prius a t i , cuius basis quadratum radii, altitudo distantia sinus in vertice quadrantis. Ergo quoad r a t u r .

His adde prop. 33. corollar.

P r o p. 30.  $DC \wedge KE = AK \wedge AE$ . sinus in tangentem complementi aequatur radio in distantiam a basi quadrantis. 5

Quare ductus portionis circularis in portionem figurae tangentium complementi inversus, aequatur radio in summam distantiarum a basi seu abscissam trianguli a basi, ergo ductus iste est quoad r a b i l i s .

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } AEH \text{ et } ADC. \text{ Ergo } \frac{AD}{AH} = \frac{DC}{AE} = \frac{AC = AE}{HE}.$$

10

P r o p. 31.  $AD \wedge AE = AH \wedge DC$ . radius in secantem complementi, aequatur secanti in tangentem complementi, atque ideo cylinder secantium comple- m e n t i sub radio aequatur ductui inverso secantium, seu portionis hyperbolicae in portionem figurae tangentium complementi.

P r o p. 32.  $AD \wedge HE = AH \wedge AE$ . radius in secantem, aequatur secanti complementi in tangentem, atque ideo cylinder hyperbolicus aequatur ductui inverso portionis conchoeidalis in portionem figurae secantium complementi. Vide post prop. 44. et 67. 15

P r o p. 33.  $DC \wedge HE = AE \square$ . tangens in tangentem complementi, aequatur quadro radii. Adde prop. 43. 20

Atque ideo prisma, cuius basis quadratum radii, altitudo distantia sinus a vertice quadrantis, aequatur ductui inverso portionis conchoeidalis eiusdem altitudinis a vertice abscissae, in portionem figurae tangentium complementi a basi abscissam.

1 secantium (1) falsarum (2) complementi  $L$  14f. complementi. | C o r o l l. id est, iuncta p r o p. 35., cylinder secantium complementi, aequatur cylindro erg. u. gestr. | P r o p. 32.  $L$  15f. secantem |(complementi) erg., streicht Hrsg., aequatur secanti complementi |(secanti) erg. u. gestr. | in tangentem |(complementi) erg. u. gestr. |, atque  $L$  21 sinus erg.  $L$  22 eiusdem altitudinis erg.  $L$

15 P r o p. 32.: Bei der Ausformulierung erkennt Leibniz die Dualität von Satz 32 zu Satz 31. Er versucht dies mittels beigefügter Klammereinschüben auszudrücken, hat den Versuch aber schließlich doch abgebrochen; s. aber unten die Sätze 48 und 52.

Coroll. atque ideo per prop. 29. sinus in secantem complementi, aequatur tangenti in tangentem complementi ductusque circularis inversus in figuram secantium complementi, ductui conchoeidali inverso in figuram tangentium complementi. Adde prop. seq. 34. et 37.

5       $\nabla^{la}$  similia:  $HEK$  et  $ADC$ . ergo  $\frac{DA}{HE} = \frac{DC}{EK} = \frac{AC}{HK}$ .

Prop. 34.  $DA \wedge EK = HE \wedge DC$ . secans complementi in sinum = tangenti in tangentem complementi, habuimus prop. 33. corollar., quod ratiabile.

Prop. 35.  $DA \wedge HK = HE \wedge AC$ . differentia inter secantem et sinum complementi in secantem complementi, aequatur tangenti in radium, atque ideo cylindr conchoeidalis aequatur ductui inverso figurae hyperbolae in figuram secantium complementi, add. prop. 38, demto momento (quadrabili prop. 28) secantium complementi ex basi quadrantis seu vertice suo. Adde prop. 44. et prop. 45.

Prop. 36.  $DC \wedge HK = EK \wedge AC$ . radius in sinum = tangenti complementi in differentiam secantis et sinus complementi. Atque ideo cylindr portionis circularis aequatur ductui inverso hyperbolae in figuram tangentium complementi (= cylindr secantium complementi, prop. 31.) demto momento tangentium complementi ex vertice suo seu basi quadrantis.

20       $\nabla^{la}$  similia:  $ADC$  et  $HQF$ . Est autem  $QF =$  radio,  $HF =$  tangenti arcus dati + tangenti arcus dimidii complementi, et  $HQ$  est differentia inter secantem et tangentem compl. dimid. vel est summa ex differentiis duabus, altera inter secantem et sinum complementi, altera inter sinum complementi et tangentem complementi dimidii. Hinc iam:

$$\frac{AD}{HF} = \frac{DC}{QF = AC} = \frac{AC}{QH}.$$

25      Prop. 37.  $AD \wedge AC = HF \wedge DC$ . secans complementi in radium = tangenti complementi in summam ex tangentie et tangentie complementi dimidii vel in secantem. Atque ideo cylindr secantium complementi sub radio, aequatur tangentibus complementi in tangentes (quod ratiabile, per prop. 33. coroll. et prop. 34.) additis tangentibus complementi in tangentes complementi dimidii.

26 vel in secantem erg. L

Atqui tangentes complementi in tangentes complementi dimidii, aequantur radio in secantes complementi, demto radio in radios; seu cylindro secantium complementi dimidiis, demto quadrato radii in distantiam a vertice circuli, per prop. 13.

Utraque ergo proposito, 13. et 37. eodem redit, argumento veritatis calculi. Adde 5  
prop. 45.

Prop. 38.  $AD \cap QH = HF \cap AC$ . secans complementi in differentiam secantis et tangentis complementi dimidii, aequatur radio in summam ex tangentे et tangentе complementi dimidii, atque ideo:

Cylinder conchoeidalis, addito cylindro tangentis complementi dimidiis, aequatur ductui hyperbolico inverso in figuram secantium complementi (qui per prop. 35. = cylindro conchoeidali momento secantium complementi, ex basi quadrantis, quadrabili, quod et cylindro tangentium complementi aequatur, prop. 28., aucto), demto secante complementi in tangentem complementi dimidii. 10

Atqui secans complementi, in tangentem complementi dimidii aequatur  $DF$  differentiae inter tangentem complementi, et tangentem complementi dimidii, in radium, supra prop. 12. 15

Hinc talis aequatio orietur. Esto radius  $a$ . tangens  $c$ . secans  $d$ . secans complementi  $g$ . tangens complementi  $h$ . tangens dimidii complementi  $e$ . literis superioribus retentis. Ergo: 20

$$gd - ge = ac + ae.$$

Sed quia pro  $gd$  substitui potest per prop. 35.  $ac + ah$ . et per prop. 12. pro  $ge$  substitui potest  $ah - ae$ . fiet aequatio talis:  $ac + ah - ah + ae = ac + ae$ . seu 25

Prop. 39.  $DC \cap QH = AC \square$ . tangens complementi; in differentiam secantis, et tangentis semicomplementi, aequatur quadrato radii.

18 Zu supra zusätzlich: 46.

10 cylindro (1) conchoeidis falsae dimidiatae arcus (2) tangentis  $L$  13f. quod et  
... prop. 28. erg.  $L$  23  $ac + (1) \frac{a^2}{\alpha}$  ( $\frac{a^2}{\alpha}$  significat quantitatem quadrabilem) (2)  $ah$   $L$

Atque ideo figura tangentium complementi inverse ducta in hyperbolicam, seu per prop. 31. cylinder secantium complementi, demto suo ductu in figuram tangentium semisupplementi, seu per prop. 13. 37. demto cylindro secantium complementi, addito quadrato radii in distantiam a vertice circuli, seu sagittam, aequatur quadrato radii in sagittam; rursus omnia eodem redeunt certissimo argumento veritatis.

$$\nabla^{la} \text{ similia: } ADC \text{ et } DEG. \text{ Ergo } \frac{AD}{ED} = \frac{DC}{DG} = \frac{AC}{EG}.$$

Prop. 40.  $AD \wedge DG = ED \wedge DC$ . secans complementi in differentiam inter tangentem complementi et sinum complementi, aequatur differentiae inter secantem complementi et radium in tangentem complementi, seu

$$gh - gf = hg - ha.$$

Ergo  $gf = ha$ . quod iam supra, prop. 28.

Prop. 41.  $AD \wedge EG = ED \wedge AC$ . secans complementi in differentiam radii a sinu, aequatur radio in differentiam secantis complementi et radii. Seu  $ga - gb = ag - a^2$ . adde prop. 29.

Prop. 42.  $DC \wedge EG = DG \wedge AC$ . tangens compl. in differentiam sinus a radio, aequatur radio in differentiam tangentis complementi a sinu complementi.

Cumque posterior terminus aequationis det summam quadrabilem, erit quadrabilis prior quoque. Ergo

Coroll. 1. Ductus tangentium complementi in differentias sinuum a radio quadrari potest.

Coroll. 2. Ergo ductus tangentium complementi in sinus quadrari potest.

$$\nabla^{la} \text{ similia: } AHR \text{ et } AEH. \text{ ergo } \frac{HR}{AH} = \frac{AR}{AE} = \frac{AH}{HE}. \text{ Est autem}$$

$$ER = CD. \text{ et } AR = AD. \text{ et } \nabla^{lum} EAR = ^{le} \text{ et simile } \nabla^{lo} ADC.$$

1f. seu ... complementi erg. L 14 Seu | momentum radiorum, demto momento sinuum gestr. | ga L 22f. potest. | Nam ductus tangentium complementi in differentias secantium complementi a radio qui quadrari potest, aequatur ductui tangentium complementi in secantes complementi, demto radio in tangentes complementi, qui radii ductus seu cylinder, etiam quadrari potest. Ergo et residuum seu ductus tangentium complementi in (1) secantes (2) sinus complementi. gestr. | L  
24f. Est ...  $\nabla^{lo}$  ADC. erg. L

P r o p. 43.  $HR \cap HE = AH \square$ . seu secans est media proportionalis inter tangentem arcus dati, et tangentem arcus dati auctum tangentem arcus complementi.

Atque ideo quadrata secantium aequantur quadratis tangentium, ductu tangentium in tangentes complementi auctos. Confer cum prop. 45.

At sup. prop. 11. ostensum est quadrata secantium, demto cylindro hyperbolico sub radio aequari quadratis tangentium, demto ductu tangentium in tangentes arcus dimidii, prop. 46. coroll. 2., seu demto cylindro hyperbolico addito quadrato radii in altitudinem. Ergo

C o r o l l. 1. quadrata secantium = quadratis tangentium quadrato radii in altitudinem, seu a vertice circuli abscissam, auctis.

Hoc ita posito patet tangentem arcus dati in tangentem arcus complementi, aequari quadrato radii, quod iam habuimus prop. 33.

P r o p. 44.  $HR \cap AE = AH \cap AR$ . compositum ex tangentete et tangentete arcus complementi in radium, aequatur secanti in secantem complementi.

Hoc facile conciliabis cum prop. 36. et 28.

$AR \cap HE = AE \cap AH$ . habuimus, vide prop. 32.

$$\nabla^{la} \text{ similia: } AHR \text{ et } ADC. \text{ ergo } \frac{HR}{AD} = \frac{AR}{DC} = \frac{AH}{AC}.$$

P r o p. 45.  $HR \cap DC = AD \cap AR = AD \square$ . tangens tangentem complementi auctus in

tangentem complementi, prop. 33. 37., aequatur quadrato secantis complementi.

Seu secans complementi est media proportionalis inter tangentem complementi, et tangentem complementi, tangentem auctum, confer cum prop. 43.

5

10

15

20

1 Zu media proportionalis: adde *Inass.* prop. 41.

19 Zu aequatur: quadrato radii in arcum, *In assigna b.* p r o p. 19.

7 addito (1) cubo (2) quadrato  $L$  12f. prop. 33. | *Absatz:*  $\nabla^{la}$  similia: AER et AEH. ergo  $\frac{AR}{AH} = \frac{ER = CD}{AE} = \frac{AE}{HE}$ . Triangulum AER aequale et simile  $\nabla^{lo}$  ADC. *Absatz:* P r o p. 44.  $CD \cap HE = AE \square$ . sed hoc iam habuimus, prop. 33. et passim. *gestr.* | P r o p. 44.  $L$

19 aequatur: Der Bezug der zugehörigen Anmerkung auf N. 27 enthält einen Irrtum.

Ergo quadrata secantium complementi, excedunt quadrata tangentium complementi, ductu tangentium complementi in tangentes.

C o r o l l. Ergo differentia inter quadratum tangentis et secantis, aequatur differentiae inter quadratum tangentis complementi, et quadratum secantis complementi. Eaque differentia est *qua drabilis* per prop. 43. coroll. 1.

$$HR \cap AC = AD \cap AH. \text{ haec iam ex prop. 28. et 35.}$$

$$AR \cap AC = DC \cap AH. \text{ habuimus prop. 31.}$$

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia } HKE \text{ et } EFG. \frac{HE}{EF} = \frac{KE}{EG} = \frac{KH}{GF}.$$

P r o p. 46.  $HE \cap EG = KE \cap EF.$  tangens in differentiam inter sinum et radium, aequatur tangenti arcus semicomplementi in sinum arcus dati  $= AE \cap GF$ , adde prop. 63.

Seu cylinder conchoeidalis sub radio, demto, prop. 14. 20. 27., ductu spatiis conchoeidalis in circulare (qui demto cylindro hyperbolico quadrabilis est, p r o p. 20.) aequatur ductui tangentium semicomplementi in sinus seu portionem circularem.

Porro ductus secantium complementi (qui sunt  $\frac{a^2}{b}$ . posito  $a$  radio,  $b$  sinu) in tangentes semicomplementi ( $e$ ) aequatur cylindro tangentium complementi, demto cylindro tangentium semicomplementi per prop. 38. et 12. Quod esto  $x^2a$ . erit  $\frac{a^2e}{b} = x^2$ .

---

### 3 Zum Korollar am Rande. NB.

2 f. tangentes. | At ductus tangentium comp. *gestr.* | C o r o l l. L

---

14 seu: Dieser Schluss ist unzulässig. 18 erit: Auch dieser Schluss ist unzulässig; dennoch bleibt das Folgende im Wesentlichen richtig.

Quaeramus rationem  $\frac{a^2 e}{b}$  ad  $\frac{be}{1}$ . ea erit  $\frac{a^2}{b^2}$ . ergo si ductus secantium complementi in tangentes semicomplementi sit ut  $a^2$ . ductus circularis erit ut  $b^2$ . Et vicissim  
 ductus  $\frac{\text{secant. compl. in tang. semicompl.}}{\sin. \text{in tang. semicompl.}} = \frac{a^2}{b^2}$ .

Ergo

$$\frac{\sin. \text{in tang. semicompl.}}{b^2} = \frac{\text{secant. compl.} \frac{a^2}{b} \text{ in tang. semicompl.}}{a^2}.$$

atque ideo

$$\sin. \text{in tang. semicompl.} = \frac{\text{secant. compl. in tang. semicompl.} \wedge b^2}{a^2}.$$

Ergo

$$[\text{ductus}] \frac{\text{tang. complementi} - \text{tang. semicomplementi}}{a} \text{ in } b^2 \\ = \text{cylind. conchoeid.} + \text{cyl. hyp.} - \text{aliquid quadrabile}. \quad 10$$

Coroll. Dimensio ductus circularis in figuram tangentium semicomplementi supponit dimensionem conchoeidis et hyperbolae.

Prop. 46. num. 2:  $HE \wedge GF = KH \wedge EF$ . tangens  $c$  in differentiam sinus complementi  $f$  et tangentis semicomplementi  $e$ , aequatur tangentis semicomplementi  $e$  in differentiam secantis  $d$  et sinus complementi  $f$ . Ergo  $cf - ce = ed - ef$ . ergo  $\frac{cf}{e} - c = d - f$ . 15

Coroll. 1. Ergo summa quartarum proportionalium, ad has tres, tangentem semicomplementi, tangentem, sinum complementi, aequatur spatio hyperbolico demto aliquo quadrabili. 20

Coroll. 2. Alter  $cf + ef = ed + ce$ . Seu momenta tangentium ex basi (ex q. circ. 19.), addita momentis, prop. 26., tangentium semicomplementi (quadrab.),

1 Unter ad: ×

1  $\frac{a^2}{b^2}$ . seu si ergo si  $L$  ändert Hrsg.      8f. Ergo | cylinder gestr., ändert Hrsg. |  $L$

aequantur, prop. 25., secantibus in tangentes semicomplementi, additis, prop. 43., tangentibus in tangentes semicomplementi. Prop. 25. supra.

Prop. 47.  $HF \wedge EN = AC (= AE) \wedge AE$  seu  $AE \square$ . sive momenta tangentium et tangentium semicomplementi simul ex basi quadrantis, aequantur quadratis radii. Ergo sunt quoadrabilia.

Coroll. 1. Hinc sequitur summam ex tangentie et tangentie dimidio complementi, aequari secanti, seu  $HF = AH$ . quia  $AH = \frac{AE \square}{EN}$ . et  $HF = \frac{AE \square}{EN}$ .

Coroll. 2. Hinc differentiae inter conchoeidem et hyperbolam, aequatur tangentibus semicomplementi, de quibus 35. *In ass.*

Coroll. 3. Item tangens arcus dimidii, auctus tangentie complementi, aequalis secanti complementi. Item  $HQ = HE$ .

Coroll. 4. Momenta tangentium semicomplementi ex basi quoadrabilia, adde prop. 61.

Coroll. 5. Ergo iunct. prop. 25 *Duct.* hyperb. in tang. semicompl. quoadrabilia.

Prop. 48.  $AD \wedge EF = DF \wedge FQ$  ( $FQ = AE$ ) ob  $\nabla^{\text{lum}} ADF$ . ergo secans (complementi) in tangentem arcus dimidii (complementi) aequalis radio in differentiam tangentis (compl.), et tangentis arcus dimidii (compl.).

Coroll. Hinc haberi possunt et tangentes arcus dimidii in tang. arcus dimid. compl. si a tang. arc. dimid. in sec. auferatur tang. arc. dimid. in tang. quia sec. = tang. + tang. compl. arc. dimid.

Repetitio prop. 14:

$DE \square = DF \wedge DG$ . seu quadratum differentiae secantis et radii, est aequale dif-

6 Coroll. 1. ita brevius demonstres: in  $\nabla^{\text{lo}} AHF$  altitudo  $AE$  = altitudini  $FQ$ . ergo basis  $HF$  = basi  $AH$ .

12 Über quoadrabilia: male, ex q. circ.

14 Zu Coroll. 5.: Error

8 hyperbolam, | quoadrari potest gestr. | aequatur  $L$       16 |  $\nabla^{\text{la}}$  similia: AEF et EST gestr. | Prop. 48.  $L$

ferentiae inter tangentem et tangentem arcus dimidii, ductae in differentiam inter tangentem et sinum.

Esto secans  $d$ . radius  $a$ . tangens  $c$ . tangens arcus dimidii  $i$ . sinus  $b$ . fiet:

$$\begin{array}{rcl} d^2 + a^2 - 2da = c - i, & \wedge & c - b = \cancel{d} + bi - ci - bc. \\ \wedge & \text{///} & \wedge \quad \wedge \\ \text{prop. 11.} & & \text{prop. 16. prop. 13.} \\ \cancel{d} + a^2 & & \cancel{d} - af - \cancel{d}i + \cancel{d} \\ \cancel{2d} & & // \quad \text{///} \quad \text{///} \\ \text{///} & & \\ da & = & bc + af. \end{array}$$

10

Adde prop. 20. ubi idem aliter demonstratum, insigni calculi confirmatione.

Redibimus ad  $\nabla^{1a}$  similia intermissa, de quibus ante prop. 46.

$$\frac{HE}{EF} = \frac{KE}{EG} = \frac{KH}{GF}. \text{ habuimus } HE \cap EG = KE \cap EF, \text{ restant:}$$

P r o p. 49.  $HE \cap GF = KH \cap EF$ . tangens in differentiam tangentis semicomplementi et sinus complementi, aequatur differentiae secantis et sinus complementi in tangentem semicomplementi. 15

$$\begin{array}{ccccc} cf & - & ce & = & de & - & fe. \\ \wedge & & & & \wedge & & \wedge \\ \text{ex. q. circ.} & & & & \text{quadrabil.} & & \text{quadrabil.} \\ \text{duct. 19. } ab & & & & \text{Prop. 47. coroll. 4.} & & \text{Prop. 47. coroll. 3.} \end{array}$$

20

C o r o l l. 1. Ergo  $ce$ . seu tangentes semicomplementi in tangentes, vel tangentes complementi in tangentes arcus dimidii pendent ex quadratura circuli, conchoeid. et hyp.

C o r o l l. 2. Cumque sit  $c + e = d$ . erit  $d^2 = c^2 + \underbrace{e^2}_{a^2} + 2ce$ .

$a^2$  per prop. 11. 25

Ideoque  $e^2$  seu summa quadratorum tangentium semicomplementi, vel quadrata

17 Zu  $de$ : Error

4 – bc. | Iam  $d^2 = c^2 + a^2$ . p r o p. 11. streicht Hrsg. | L 22 ex (1) da seu cylindro hyperbolico, vel quadratura hyperbolae (2) quadratura  $L$

tangentium arcus dimidii ad basin pendent ex quadratura circuli, conchoeid. et hyp.

Prop. 50.  $KE \cap GF = KH \cap EG$ . seu sinus in differentiam sinus complementi, et tangentis semicomplementi, aequantur differentiae inter secantem et sinum complementi in differentiam sinus et radii.

$$\begin{array}{ccccccc} b\cancel{f} & - & be & = d - f \wedge a - b = da + \cancel{f}b & - db & - fa. \\ \cancel{\wedge} & & \cancel{\wedge} & & \cancel{\wedge} & & \cancel{\wedge} \\ \text{quadrab.} & \text{ex q. circ. et hyp.} & & & \text{q. circ. et hyp.} & \text{quadrab.} \\ & 46. & & & & \text{vel q. conchoeid.} & \end{array}$$

10 Prop. 51.  $NI \cap EF = ZF(EG) \cap EN$ . ob  $\nabla^{\text{lum}} ENF$  in quo posita basi  $EN$   
altitudo est  $ZF$ , posita basi  $EF$  altitudo est  $NI$ .

Investiganda iam quantitas ipsius  $NI$ . Patet  $NI$  parallelam  $AE$ . Ergo  $\frac{NI}{AE \text{ rad.}} = \frac{AR \sec. \text{ compl.} - AN \sinus}{AR = AD \secans \text{ compl.}}$ .

Literas ut ante substituamus:  $\frac{NI}{a} = \frac{g - b}{g}$ . seu  $NI = \frac{ga - ba}{g}$ . vel  $a - \frac{ba}{g}$ . Atqui

$$g = \frac{a^2}{b}. \text{ Ergo } NI = a - \frac{ba}{\frac{a^2}{b}} = a - \frac{b^2a}{a^2} = a - \frac{b^2}{a}.$$

Ergo cylinder tangentium semicomplementi, demtis rectangulis ex tangentibus semicomplementi, et applicatis semiparabolae circularis axi parallelis, aequatur momentis ex basi differentiarum inter sinum et radium, utique quadrabilibus.

Nam posito sinu  $b$ . et radio  $a$ . erit  $\frac{b^2}{a}$  applicata parabolae circularis axi parallela,  
quia sinus est media proportionalis inter applicatam axi parallelam semiparabolae  
circularis, et radium. Semiparabola autem circularis est, cuius altitudo et basis  
aequales, adde *Inassign.* 41.

Recta  $EI$  ex his facile haberi potest est enim  $Rq f^2 - a^2 - \frac{b^4}{a^2} + 2b^2$ . adde prop.

In pass. 42, 43.

1 f. quadratura (1) hyperbolae (2) circuli |, conchoeid. et hyp. erg. | L

P r o p. 52.  $AC \wedge DF = AD \wedge EF$ . cylinder tangentium [seu] conchoeid. (complementi), demto cylindro tang. semiarcus seu conchoeid. fals. dimidiatae (complementi) = secans (compl.) in tang. semiarcus (compl.), seu tangens + tangens semiarcus in tang. semiarcus, seu tangens in tang. semiarcus + quadrat. tang. semiarcus.

5

C o r o l l. 1. Ergo quadrata tangentium semiarcus pendent ex quadratura conchoeidis et hyperbolae.

C o r o l l. 2. Cylinder tangentium complementi (quadrabilis) demto cylindro tangentium semicomplementi aequatur tangentibus complementi in tangentes semi-complementi (id est cylindro secantium complementi, demto cylindro radii) additis quadratis tangentium semicomplementi (quae pendent ex q. circ. prop. 49.).

10

P r o p. 53.  $C\alpha = EN$ . quia in  $\nabla^{\text{lo}} AEC$ .  $AC \wedge EN = AE (= AC) \wedge C\alpha$ .

P r o p. 54.  $A\alpha = AN$ . Nam  $\nabla^{\text{lo}} ENA$  simile  $\nabla^{\text{lo}} A\alpha C$ . quia ang.  $AEN = \text{angulo } A\alpha C$ . duo autem latera aequalia sunt  $EN = C\alpha$ . et  $AC = AE$ . ergo et tertia seu  $A\alpha = AN$ . ergo  $E\alpha = NC$  vel  $EG$ .

15

P r o p. 55.  $AM \wedge EC = AC \wedge EN$ . Chorda arcus in sinum complementi arcus dimidii, aequatur cylindro portionis circularis sinuum arcus dati. Vel:

Chorda arcus complementi ad quadrantem (non ad semicirculum) in sinum arcus dati = cylindro sinuum complementi (qua ad r a b i l i).

P r o p. 56.  $AD \wedge C\alpha = AC \wedge CD$ . Momentum secantium complementi = cylindro tangentium complementi quadrabili, adde prop. 18.

20

11 Zu pendent: *Darüber*: Error

*Dahinter*: (imo ex q. circ. et dimens. cyl. tang. semicompl.)

1 seu erg. Hrsg. 17 portionis circularis erg. *L*

3f. Anstelle von tangens + tangens semiarcus müsste es tangens + tangens semicomplementi heißen. Das Versehen wirkt sich bis zum Ende von Satz 52 aus. 17 Vel: Anstelle des Sinus des gegebenen Bogens hätte Leibniz den Kosinus des halben Komplementärbogens verwenden müssen.

Prop. 57.  $EC \cap MF = EF \cap E\alpha$ , vel  $FC \cap EG$ . Chorda arcus in differentiam secantis arcus dimidii a sinu complementi arcus dimidii = tangenti arcus dimidii in sinum versum arcus dati.

Prop. 60.  $EF \cap EK = KQ \cap AE$ . Tangens semiarcus in sinum complementi, seu momentum tangentium semiarcus = radio in differentiam sinus, et tang. semiarcus.

Coroll. Tangens semicomplementi in sinum = radio in sinus complementi, demto cylindro tang. semicompl.

At per prop. 46. iunct 20. cylinder conchoeid. – cyl. hyp. + rad. in sinus compl. = tang. [semicompl.] in sin. Ergo res eodem redit.

Prop. 61.  $EF \cap EN = NC$  (vel  $EG$ )  $\cap AE$ . Momentum tang. [semicompl.] = radio in diff. rad. et sinus, adde prop. 47. coroll. 4. Hinc et tang. [semicompl.] in sinus quoadrabilis.

$\nabla^{la}$  similia:  $AKE$  et  $EZF$ . Nam ang.  $KAE =$  angulo  $EFZ$ .

$$\frac{AE}{EF} = \frac{AK = EN}{ZF = EG} = \frac{KE}{EZ = GF}.$$

Prop. 62.  $AE \cap EG = EN \cap EF$ . momenta tangentium semicomplementi = cylindro trilinei concavi circularis, seu radii demto sinu.

Coroll. Tangentes arcus dimidii seu conchoeidis falsae dimidiatae applicatae, in sinus = radio in sinus versos arcus dati seu quadrabiles.

Prop. 63.  $AE \cap GF = KE \cap EF$ . cylinder radii in sinus complementi (quoadrabilis) demto cylindro radii in tang. semicompl. (quoadrabilis) = ductui sinuum in tangentes semicomplementi.

Is ergo ductus quadrabilis. Hoc prorsus coincidit prop. 46.

Coroll. Hinc radius in sinus, demto radio in tang. fals. dimid. (cyl. segm. dupl.) = momento tang. fals. dimid. ex basi.

Prop. 64.  $EN \cap GF = KE \cap EG$ . seu quadrata sinuum complementi (portiones pyramidis a basi abscissae), demtis momentis tangentium semicomplementi (quae pendent ex q. circ.) = ductui sinuum in sinus versos arcuum complementi, seu in differentias suas a radio seu cylindro sinuum, demtis sinuum quadratis.

Coroll. vel sinus in seipsum (quadrab.), demto sinu in tang. arcus dimid. (qua-

4 Zählung springt L 10–12 compl. L ändert Hrsg. dreimal

drab.) = sinibus versis (seu differentiis sinuum complementi et radiorum) in sinus complementi, seu momento sinuum versorum.

$$\nabla^{1a} \text{ similia } C\alpha D \text{ et } AEH. \quad \frac{CD}{AH} = \frac{\alpha D}{AE} = \frac{C\alpha = EN}{HE}.$$

Prop. 65.  $CD \wedge AE = AH \wedge [\alpha D]$ . cylinder tangentium complementi (quadrabilium) = ductui secantium in secantes complementi (cyl. tang. compl. + cyl. tang.) demitis secantibus in sinus (cyl. conch.).

Prop. 66.  $CD \wedge HE = AH \wedge EN$ . seu tangentes in tangentes complementi = momento secantium ex basi, quadrabili, adde. 33. 43.

Prop. 67.  $\alpha D \wedge HE = EN \wedge AE$ . secantes complementi in tangentes, demitis sinibus in tangentes = quadrabiles, seu aequales sinibus complementi in radium, adde 10 *Duct. 20.*

Porro per prop. 32. sec. compl. in tang. = rad. in sec. et per prop. 20. sin. in tang. = rad. in sec. – rad. in  $EN$ .

$$\nabla^{1a} \text{ similia } C\alpha D \text{ et } AKE. \quad \frac{CD}{AE} = \frac{\alpha D}{AK = EN} = \frac{C\alpha = EN}{KE}.$$

Prop. 68.  $CD \wedge EN = \alpha D \wedge AE$ . Momenta ex basi tangentium complementi = 15 cylindro secantium complementi (dupl. sect.) – cyl. sin., adde prop. 73.

Prop. 69.  $CD \wedge KE = AE \wedge EN$ . Tangentes complementi in sinus (momenta ex basi sua, si basi quadr. applicentur), adde 42. 61., quadrabiles = quadrilinei cylindro.

Prop. 70.  $\alpha D \wedge KE = EN \square$ . Sinus complementi est media proportionalis inter sinum et differentiam secantis complementi a sinu. 20

Sive secans compl. in sin., demitis quadratis sinuum = quadratis sinuum compl.  
Ergo  $[\alpha D] \wedge KE$  quadrabiles, adde *Duct. 29.*

$$\nabla^{1a} \text{ similia: } ACD \text{ et } C\alpha D. \quad \frac{AD}{DC} = \frac{DC}{D\alpha} = \frac{AC}{C\alpha = EN}.$$

4 AD L ändert Hrsg. 5 ductui (1) tangentium complementi in secantes complementi | quadrabilis erg. |. Ergo (2) secantium L 22 AD L ändert Hrsg.

22 adde: Der Verweis bezieht sich auf die Verschreibung  $AD$  anstelle von  $\alpha D$ .

P r o p. 71.  $AD \wedge D\alpha = DC \square$  (45.) quadrata secantium complementi, demtis secantibus complementi in sinus (quadrabilibus) = quadratis tang. compl., adde *Duct.* 11. 74.

P r o p. 72.  $AD \wedge EN = AC \wedge DC$ . seu momentum ex basi secantium complementi (quadrabile, *Inassign.* 43. coroll. 1. *Duct.* 28.) = cylindro tangentium compl., adde *Duct.* 18. 23. 50.

P r o p. 73.  $DC \wedge EN = \alpha D \wedge AC$ . ( $AC = AE$ ) habuimus prop. 68.

$$\nabla^{1a} \text{ similia: } C\alpha D \text{ et } EGD. \quad \frac{CD}{DE} = \frac{D\alpha}{DG} = \frac{C\alpha = EN}{EG}.$$

P r o p. 74.  $CD \wedge DG = DE \wedge D\alpha$ . Tangens compl. in seipsum demto tang. compl. *l*

moment. ex basi = differentiae secantis complementi *g* et radii *a* in differentiam secantis complementi et sinus *b*, seu  $g - a, g - b = g^2 + ab - ga - gb$ . seu quadrata secantium complementi aucta cylindro sinuum, minutaque sec. compl. [et sec. compl.] in sin.

Iam  $g^2 - gb = l^2$  (per prop. 71. si *l* = tang. compl.). ideo  $l^2 + ab - ga = l^2 - lf$ .  
Ergo  $ga - ab = lf$ . concordat 68.

P r o p. 75.  $CD \wedge EG = C\alpha \wedge DE$ .  $la - lb = gf - af$ . Et quia per prop. 72.  $la = gf$ .  
ideo  $lb = af$ . tangens compl. in sinum = radio in sin. compl.

P r o p. 76.  $D\alpha \wedge EG = DG \wedge EN$ . secans compl. demto sinu, in radium demto sinu  
= tang. compl. in sin. compl., demto sin. compl. in sin. compl.  $g - b \wedge a - b$ . seu

$$\begin{aligned} & g\alpha + b^2 - gb - ba = \cancel{\wedge} \quad lf - f^2. \text{ Ergo } gb - b^2 = f^2. \\ & \quad // \quad g\alpha - \cancel{ab} \\ & \quad // \end{aligned}$$

13 et sec. compl. erg. Hrsg.

---

<sup>5</sup> *Inassign.* 43.: Der Verweis bezieht sich auf die gestrichene Fassung des Satzes, s. N. 27 S. 479 Z. 32–36.

Prop. 77. Ex fig. 3.  $HG \wedge DS (= AC) = DH \wedge D\lambda.$  ob  $\nabla^{\text{lum}} HGD.$

id est: differentiae inter tangentem veram et falsam momentum ex vertice, aequatur differentiae inter secantem et radium, in tangentem semiarcus minutum differentia inter sinum et tangentem semiarcus, seu

$$c - 2i, \wedge a - f = d - a, \wedge \underbrace{i-, b-i}_{2i-b} \quad \text{seu}$$

5

$$\begin{array}{ccccccc} \cancel{ca} & - & cf & + & 2if & - & 2ia \\ \diagup & & \diagup & & \diagup & & \diagup \\ \cancel{ab} & & 2\cancel{ab}-2ai & & 2ca-2ai & & \cancel{aa} \\ \diagup & \diagup & \diagup & \diagup & \diagup & \diagup & \diagup \\ // & // & // & // & // & // & // \end{array}$$

10

prop. 19. prop. 7. [prop. 12] [prop. 18.23.50.72. Duct.]

Manifestum est omnia exacte convenire.

In eadem fig. 3.  $\nabla^{1a}$  similia, quanquam non orthogonia:  $HGD$  et  $DBZ.$

Nam ang.  $GDH =$  ang.  $BDZ.$  et ang.  $GHD =$  angulo  $DBZ.$  etc. Ergo

$$\frac{DB = \text{rad. } AB}{HD} = \frac{BZ = AI}{[GH]} = \frac{GD}{DZ}.$$

15

$AB \wedge [GH] = AI \wedge HD.$  Radius in differentiam tangentis et tangentis falsae, = tangenti falsae dimidia in differentiam secantis et radii.

$$\begin{array}{ccccccc} 5+7 \text{ seu (1)} & ca & + & 2if & - cf & - 2ia & = & 2di & + \cancel{ab} & - db & - 2ia \\ \diagup & & & \diagup \\ \cancel{ab} & & & & & & | 2, \cancel{aa} - ai \text{ gestr.} | & \cancel{aa} & & & & & \cancel{aa} \\ \diagup & \diagup & & \diagup & \diagup & \diagup & & \diagup & & \diagup & & \diagup \\ // & // & & // & // & // & & // & & // & & // \end{array}$$

prop. 7. Duct.

prop. 12

| prop. 18.23.50.72. Duct |

$$\begin{array}{c} \cancel{aa} - cf \\ \cancel{aa} - ab \\ \diagup & \diagup \\ // & // \end{array}$$

$\cancel{aa} - 2ai$

nicht gestr.

$\cancel{aa} - 2ai$

prop. 19. et 24. Duct.

Ergo  $cf = 2ia.$  |  $cf = ab.$  prop. 19. nicht gestr. | Ergo  $ab = 2ai,$  quod absurdum, error ergo in calculo.

(2) sa L 11 prop. 12 und prop. 18.23.50.72. Duct. erg. Hrsg. 15 GN L ändert Hrsg. 16 GN

L ändert Hrsg.

---

15  $\frac{GD}{DZ}:$  Es müsste umgekehrt  $\frac{DZ}{GD}$  heißen. Dies wirkt sich auf Prop. 78 aus, welche Leibniz konsequent mit dem falschen Ansatz durchrechnet.

$$\begin{array}{lll} ac - 2ai = & id & - ai. \text{ Patet ex calculo.} \\ & \diagup \\ & ac - ai. \text{ prop. 12.} \end{array}$$

P r o p. 78.  $AB \cap DZ = GD \cap HD$ . seu applicata parabolae inversa (chorda suppl.)

5 demto secante arcus dimidii, in radium (haec quadrabilia)

$= 2 \text{ sec. fals.} - \text{chord. suppl.} \cap \text{sec.} - \text{rad.}$

$= 2 \text{ sec. fals.} \cap \text{sec.} + \text{chord. suppl.} \cap \text{rad.}$

$- 2 \text{ sec. fals.} \cap \text{rad.} - \text{chord. suppl.} \cap \text{sec.}$

Et quia chord. suppl.  $\cap$  rad., et 2 sec. fals.  $\cap$  rad. quadrabilia, ideo

10 2 sec. fals.  $\cap$  sec. – chord. suppl.  $\cap$  sec., quadrabile.

In fig. 2. ex punto  $O$ . termino sinus complementi  $AO$ . ducatur in radium  $AB$  perpendicularis  $O\omega$ . manifestum est:

$$\frac{O\omega}{KE \sinus} = \frac{AO \sin \text{compl.} = AK}{AE \text{ rad.}}. \text{ Ergo } O\omega = \frac{\sin. \cap \sin. \text{ compl.}}{\text{rad.}}$$

P r o p. 79.  $O\omega \cap AE = AO \cap KE$ . cylinder omnium  $O\omega$  = momento sinuum, ideoque

15 quadrabilis est summa omnium  $O\omega$ .

P r o p. 80. Porro  $\frac{O\omega}{BY = HE \text{ tang.}} = \frac{AO = AK}{AY = AH \text{ sec.}}$ . Ergo  $O\omega \cap AH = HE \cap AK$ .

seu ductus hyperbolicus in  $O\omega$  = momento tangentium, pendet ergo ex q. circ.

## 27. TRIGONOMETRIA INASSIGNABILIU M

[Sommer 1673]

**Überlieferung:** L überarbeitetes Konzept: LH 35 II 1 Bl. 242–245. 2 Bog. 2°. 8 S. — Titel fehlt, Zwischentitel mit Bogenzählung: (II) In assignabili a am Beginn des 2. Bogens (über S. 481 Z. 23). Figura secunda nicht vorhanden (Vorlage die entsprechende Figur aus N. 21).  
Cc 2, Nr. 696

5

Datierungsgründe: s. N. 26.

[Trigonometria inassignabilium]

[Teil 1]

10

Fig. 2.

ST pars regulae, seu altitudinis, ES pars basis, ET pars arcus.

[Altitudinem autem voco latus orthogonii divisum in partes aequales infinitas, per ordinatim applicatas, basis latus alterum.

Porro quoties summam linearum nomino, eas altitudini ordinatim applicatas intelligi debet. Hinc sinus, tangentes, secantes etc. complemunt in circulo sunt, qui scilicet sinus, tangentes etc. appellari deberent, si id quod nunc basis est, altitudo esset, seu cum non altitudini, sed basi applicantur.

15


$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } EST \text{ et } AEH. \text{ Ergo } \frac{AH}{ET} = \frac{AE}{ES} = \frac{HE}{ST}.$$

Prop. 1.  $AH \cap ES = AE \cap ET$ . secans in portionem basis = radio in portionem arcus. Seu figura secantium basi applicatarum, aequatur superficie cylindricae sub arcu et radio, adde prop. 9.

20

9 Trigonometria inassignabilium erg. Hrsg. nach N. 26 S. 448 Z. 19. 11–19 Fig.2. | ST ...

arcus. erg. |  $\nabla^{\text{la}} \dots \frac{HE}{ST}$ . (1)  $AH \cap ES = ET \cap AE$ . secans in portionem (a) altitudinis = tangentis in partem basis. (b) basis = radio in partem altitudinis. Ideo summa secantium complementi, scilicet in (aa) sagittam (bb) sinum arcus altitudini parallelum, seu altitudinem trilinei orthogonii aequatur radio in basin. (2) Altitudinem ... esset (a). Habemus ergo iam quadraturam figurae secantium complementi. (b), seu ... applicantur. L, Reihenfolge ändert Hrsg.



[Fig. 1]

1 Figur erg. Hrsg. nach Text u. N. 21.

Coroll. 1. Ergo summa secantium complementi, aequatur radio in arcum, seu superficie cylindrica sub arcu et radio.

Coroll. 2. Ergo figura secantium basi applicatarum aequatur summae secantium complementi.

Prop. 2.  $AH \wedge ST = ET \wedge HE$ . secans in portionem altitudinis = tangentis in portionem arcus. Ideoque superficies cylindrica truncata tangentium arcui inconsistentium, aequatur spatium hyperbolico, adde prop. 11. 5

Prop. 3.  $AE \wedge ST = HE \wedge ES$ . rectangulum sub radio et basi aequatur summae tangentium complementi, prop. 23. Huius ergo figurae datur quadratura. 10

Coroll. 1. Vel rectangulum sub radio et altitudine, aequatur tangentibus basi applicatis.

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } EST \text{ et } AKE. \text{ Ergo: } \frac{AE}{ET} = \frac{AK}{ES} = \frac{KE}{ST}.$$

Prop. 4.  $AE \wedge ES = AK \wedge ET$ . rectangulum sub radio et basi (altitudine) = momento arcus ex radio basi (altitudini) parallelo. 15

Coroll. 1. Ergo momentum ex radio basi parallelo arcus aequale summae tangentium complementi.

Coroll. 2. Momentum arcus ex radio altitudini parallelo = summae tangentium ad basin.

Prop. 5.  $AE \wedge ST = KE \wedge ET$ . Radius in altitudinem = summae sinuum in arcum, seu momento arcus ex altitudine, seu superficie cylindrica truncatae sinuum arcui impositorum, add. prop. 7. et prop. 3 coroll. 1. 20

Prop. 6.  $AK \wedge ST = KE \wedge ES$ . Momentum altitudinis ex basi aequatur momento basis ex altitudine, in trilineo orthogonio circulari, cuius altitudo pars radii, basis radio parallela. 25

Nihil autem hic refert, quod eius latus pro radio sumas quod pro basi[;] aliter enunties: sinus ad basin aequantur sinibus complementi ad altitudinem[;] adde

15 f. parallelo. (1) Coroll. 1. Hinc datur quadratura momenti trilinei orthogonii circularis, tam ex altitudine quam ex basi. (2) Coroll. 1.  $L$

8 Prop. 3.: Leibniz dualisiert die Formel zunächst; die direkte Umsetzung erfolgt im Korollar.

prop. 12. 36[a]. prop. 36[b]. coroll. 4.

$$\nabla^{\text{la}} \text{similia: } EST \text{ et } EKH. \quad \frac{HE}{ET} = \frac{KE}{ES} = \frac{HK}{ST}.$$

Prop. 7.  $HE \cap ES = KE \cap ET$ . figura tangentium basi applicatarum, aequatur momento arcus ex altitudine, adde prop. 3. coroll. 1. + prop. 5.

5 Prop. 8.  $HE \cap ST = HK \cap ET$ . Summa tangentium (seu spatium concho-eidale, exenta quod postea semper intelligi volo portione circuli generantis) aequatur secantibus in arcum, demto momento arcus ex basi, adde prop. 14. et 24.

10 Prop. 9.  $KE \cap ST = HK \cap ES$ . Summa sinuum, seu portio circularis, aequatur secantibus in basin, demtis sinibus complementi in basin.

At sinus complementi in basin aequantur toti figurae  $ABEN$ , vid. prop. 16., radio  $AB$ . arcu  $BE$ . sinu complementi  $EN$ . portione basis  $AN$ . comprehensae. Hinc iuncta prop. 1. duplex calculi fundamentum, alterum examini alterius.

$$\nabla^{\text{la}} \text{similia: } EST \text{ et } BPH. \quad \frac{HB}{ET} = \frac{BP = BK}{ES} = \frac{HP}{ST}.$$

15 Prop. 10.  $HB \cap ES = BK \cap ET$ . sinus versi  $BK$  in arcum (id est segmentum arcus duplum) aequantur secantibus in basin (id est, prop. 1., arcui in radium [=] sectori duplo) demto radio in sinum (quadrabili).

20 Prop. 11.  $HB \cap ST = HP \cap ET$ . spatium hyperbolicum, demto rectangulo radii in altitudinem (quadrabili), aequatur tangentis in arcum (spatio ipsi hyperbolico prop. 2.) demto momento arcus ex basi (= rectangulo radii in altitudinem prop. 4.)

Prop. 12.  $BK \cap ST = HP \cap ES$ . [summa sinuum versorum in altitudinem (quadrabilis)] aequatur tangentibus in basin (quadrabilibus prop. 7.) demtis sinibus in basin. Seu sinus compl. in altitud. = sinibus in basin, vid. prop. 43. et 45.

25 Coroll. Ergo habetur quadratura summae sinuum in basin, add. prop. 6. [21]. 23. 36[a,b].

15 BK | seu altitudines gestr. | in  $L$  17 |= erg. Hrsg. | sectori duplo erg.  $L$  17 radio in (1) basin (2) sinum  $L$  22f.  $HP \cap ES$ . (1) summa sinuum versorum (quadrabilis) demt (2) Radius in altitudinem demta summa sinuum versorum (quadrabili)  $L$  ändert Hrsg. 24 Seu ... et 45. erg.  $L$  26 prop. 6. 20. 23. 36.  $L$  ändert Hrsg.

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } EST \text{ et } FQH. \text{ Ergo } \frac{FH}{ET} = \frac{FQ}{ES} = \frac{HQ}{ST}.$$

P r o p. 13.  $FH \wedge ES = FQ \wedge ET$ . Tangentes in basin, et tangentes semicomplementi in basin, adde prop. 27 = radio in arcum,  
quod idem est ac si diceres,

C o r o l l. 1. summam tangentium arcus dimidii, addita summa tangentium complementi (quae quadrabilis est), aequari arcui in radium, seu sectori cuidam circulari. 5

C o r o l l. 2. Ergo summa tangentium arcuum dimidiorum segmento circulari duplicito comparari potest, adde prop. 15.

P r o p. 14.  $FH \wedge ST = HQ \wedge ET$ . spatium conchoeidale, addita summa tangentium semicomplementi, seu spatium hyperbolicum, aequatur secantibus in arcum (= prop. 8. spatio conchoeidali, addito momento arcus ex basi, adde prop. 24.) demitis tangentibus semicomplementi in arcum, seu aequatur tangentibus in arcum. 10

C o r o l l. Ergo summa tangentium semicomplementi, additis tangentibus semicomplementi in arcum, aequatur momento arcus ex basi, ac proinde quadrari possunt, adde prop. 28. et 42. 15

P r o p. 15.  $FQ \wedge ST = HQ \wedge ES$ . Radius in altitudinem = summae secantium in basin (= radio in arcum), demto tangente semicomplementi in basin, add. prop. 13. et 29. 20

$TS$  producatur usque ad basin in  $U$ . et iungatur  $EU$ . et ex  $U$ . ducatur perpendicularis in  $TE$  productam si opus est, quae erit  $UW$ . Manifestum est in triangulo  $TEU$ . posita basi  $TU$ . altitudinem esse  $ES$ , et posita basi  $ET$ . altitudinem esse  $UW$ . Basin autem  $UE$  poni nil necesse est, cum  $UE$  non differat, nisi parte inassignabili a  $TU$ .

Porro  $UW$  autem sic investigabimus: cum  $\nabla^{\text{la}} AER$  et  $UWR$  sint similia erit 25

$$\frac{WU}{AE} = \frac{UR = AR - AU. (AU = KE \text{ sinus})}{AR (= AD. \text{ secans compl.})}. \text{ ergo } WU = \frac{AD - KE, \wedge AE}{AD}.$$

Surget aequatio haec, posita etiam  $TU = KA = EN$ . sinu complementi.

11 seu spatium hyperbolicum erg.  $L$  19 (= radio in arcum) erg.  $L$

17 adde prop. 28. et 42.: Leibniz bezieht sich auf die gestrichene Fassung der prop. 42.

$$(WU) \quad \frac{AD - KE \wedge AE}{AD} \wedge TE = ES \wedge EN.$$

Iam sinus complementi in basin aequantur areae quadrilinei  $ABEN$ . vid. prop. 9.

Et  $AD - KE \wedge AE \wedge TE = AD \wedge ES \wedge EN$ . ergo

- 5 Prop. 16. ductus figurae secantium in basin, in figuram ipsam  $ABEN$ . aequatur cylindro secantium in arcum demto cylindro sinuum in arcum (quadrabili). Radio posito altitudine cylindrorum.

Sed si  $AD$  ponatur esse non secans complementi, sed ipse secans,  $ES$  portio altitudinis,  $KE$  sinus complementi,  $EN$  sinus, utilior erit aequatio, quia dividi poterit per  $AD$ .

- 10 Quia enim omnes  $AD$ , sunt  $\frac{a^2}{1} \frac{a^2}{2} \frac{a^2}{3}$  etc. seu quadratum radii divisum per sinus complementi, ideo dividi per  $AD$  idem est quod dividi per quadratum radii, multiplicari per sinum complementi. Ergo pro  $AD$  substitue  $\frac{AE\square}{KE}$ . fiet aequatio talis:

$$\frac{\frac{AE\square}{KE} - KE, \wedge AE}{\frac{AE\square}{KE}} \wedge TE = EN \wedge ES. \text{ seu } \frac{AE\square - KE\square}{AE} \wedge TE = EN \wedge ES.$$

Hanc aequationem dupliciter interpretari potes, ut dixi, vel enim  $KE$  est sinus,  $EN$  sinus complementi, vel contra. Alterutro modo, haec inde ducetur enuntiatio:

- 15 Prop. 17. superficies cylindrica sub arcu et radio, seu duplex sector arcus, demtis quadratis sinuum (sinuum complementi) ad arcum, per radium divisis, aequatur sinibus complementi (sinibus) in basin (altitudinem) id est areae figurae arcu, basi (altitudine), radio et sinu complementi (sinu) minimo (radius enim maximus est, vel etiam si usque ad maximum seu radium non pertingatur, duabus maximis), comprehenso.

Hinc quadrata sinuum, item sinuum complementi ad arcum, necesse est non esse quadribilia pure, adde prop. 22.

$$\nabla^{la} \text{ similia } EST \text{ et } ADC. \quad \frac{AD}{ET} = \frac{DC}{ES} = \frac{AC}{ST}.$$

16 seu duplex sector arcus erg.  $L$       22 non erg.  $L$

Prop. 18.  $AD \cap ES = DC \cap ET$ . secantes complementi in basin id est spatium hyperbolicum (adde prop. 21), aequantur tangentibus complementi in arcum.

Prop. 19.  $AD \cap ST = AC \cap ET$ . summa secantium complementi aequatur radio in arcum, adde prop. 26.

Prop. 20.  $DC \cap ST = AC \cap ES$ . summa tangentium complementi aequatur radio in sinum, adde prop. 25.

5

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } EST \text{ et } UWR. \text{ Ergo } \frac{UR}{ET} = \frac{WR}{ES} = \frac{UW}{ST}.$$

Iam ( $UW$ ) est  $\frac{AE \square - KE \square}{AE}$ .  $WR$  autem sic inveniemus  $\frac{WR}{UR} = \frac{AE}{AH}$ . Ergo ( $WR$ ) =  $\frac{AE \cap UR}{AH}$ . At ( $UR$ ) est  $AD - KE$ .  $AH$  est  $\frac{AE \square}{EN}$ . ergo  $WR = \frac{AE \cap UR \cap EN}{AE \square}$ . seu 10

$$\frac{UR \cap EN}{AE}. UR \text{ seu } NR = AD - KE.$$

Prop. 21.  $UR \cap ES = WR \cap ET$ . seu secantes complementi in basin (tangentes complementi in arcum, prop. 18.) spatium hyperbolicum demtis sinibus in basin (quadrabilibus, prop. 12.), aequantur, rectangulis secantium (spatio hyperbolico) complementi in sinus complementi, ad arcum, divisis per radium, demtis, rectangulis sinuum in sinus complementi, in arcum. adde prop. 36[b]; divisis per radium.

15

Prop. 22.  $UR \cap ST = UW \cap ET$ . summa secantium complementi (sector duplicatus  $ABE$ ), demta summa sinuum (seu portioni circulari  $KBE$ ) aequatur  $UW$  in arcum, vel sectori duplicato, demtis  $\frac{KE \square}{AE}$  in arcum.

20

Coroll. Ergo  $\frac{KE \square}{AE}$  in arcum seu quadrata sinuum per radium divisa, in arcum, aequantur summae sinuum, seu portioni circulari, adde prop. 17. et 36[a].  
23.

1f. id est spatium hyperbolicum erg. L 13+14 spatium hyperbolicum und (spatio hyperbolico) erg. L 15 radium |(quadrabilibus) gestr.|, demtis L 19 sinuum (1) (residuum quadrabile esse necesse est) (2) (seu L

P r o p. 23.  $WR \wedge ST = UW \wedge ES$ . seu momentum secantium complementi ex radio basi parallelo, demto momento (quadrabili) sinuum complementi, ex eodem radio, aequatur summae  $UW$  in basin, seu radio in basin, demtis sinibus in basin, per radium divisitis.

5 At sinus in basin sunt quadrabiles prop. 12., adde prop. 32. 36[a]. Ideo  
C o r o l l. 1. ergo m o m e n t u m s e c a n t i u m c o m p l e m e n t i ex radio,  
basi parallelo, q u a d r a r i potest.

C o r o l l. 2. Ergo habetur cylinder aequalis conoeidi secantium complementi.

$$\nabla^{la} similia EST et ENR. \frac{ER}{ET} = \frac{NR}{ES} = \frac{EN}{ST}.$$

10 P r o p. 24.  $ER \wedge ES = NR \wedge ET$ . tangentes complementi in basin (spatium conchoeidale), aequantur secantibus complementi in arcum demtis sinibus in arcum seu momento arcus ex [radio altitudini parallelo] (quadrabili).

Conf. prop. 8. et 14. ubi dicitur: secantes in arcum aequari spatio conchoeidali addito momento arcus ex radio basi parallelo.

15 C o r o l l. Ergo differentia inter secantes in arcum, et secantes complementi in arcum, seu differentia inter secantem et secantem complementi in arcum q u a - dr a r i potest.

P r o p. 25.  $ER \wedge ST = EN \wedge ET$ . summa tangentium complementi aequatur momento arcus ex radio basi parallelo, quadrabilis ergo, adde prop. 20. et alias passim.

20 P r o p. 26.  $NR \wedge ST = EN \wedge ES$ . summa secantium complementi, demta summa si- num, aequatur sinibus complementi in basin, seu duplex sector arcus (prop. 19.),

---

6f. Zu Coroll. 1: adde prop. 28. *De ductibus*.

8 complementi. | Coroll. 3. Ergo sinus streicht Hrsg. | L 11 f. arcum (1) (quadrabilibus) (2) seu momento arcus ex | altitudine, radio ändert Hrsg. | (quadrabili) L 16 seu ... arcum erg. L

---

1 P r o p. 23.: In der Ausformulierung des Satzes müsste es statt momento sinuum complementi und demtis sinibus vielmehr momento sinuum und demtis quadratis sinuum heißen. — Die Aussagen bezüglich der Quadrierbarkeit bleiben davon unberührt. 15 C o r o l l.: Diese Aussage ist unzutref- fend.

demta summa sinuum; aequatur quadrilineo arcu, basi, radio et sinu complementi comprehenso.

Quod facile comprobatu, calculi nostri confirmatio est.

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia } EST \text{ et } DEF. \frac{DF}{ET} = \frac{DE}{ES} = \frac{EF}{ST}.$$

P r o p. 27.  $DF \wedge ES = DE \wedge ET$ . Tangentes complementi in basin (spatium conchoeidale), demtis tangentibus semicomplementi in basin (id est per prop. 13. duplex sector, demtis tangentibus in basin, p r o p. 7., quadrabilibus, adde prop. 33.) aequantur secantibus complementi in arcum (prop. 24. spatio conchoeidali addito momento arcus ex radio [altitudini parallelo]) demto radio in arcum (seu dupli sectore).

Manifesta horum omnium aequatio est, documentum calculi veri.

P r o p. 28.  $DF \wedge ST = EF \wedge ET$ . summa tangentium complementi (quadrabilis) demta summa tangentium semicomplimenti aequatur tangentibus semicomplementi in arcum, adde prop. 14. et 34. 42.

P r o p. 29.  $DE \wedge ST = EF \wedge ES$ . summa secantium complementi (duplex sector), demto radio in altitudinem, aequatur tangentibus semicomplementi in basin, adde prop. 15. adde prop. 31.

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } EST \text{ et } DEG. \frac{DE}{ET} = \frac{DG}{ES} = \frac{EG}{ST}.$$

P r o p. 30.  $DE \wedge ES = DG \wedge ET$ . secantes complementi in basin (spatium hyperbolicum, intellige scilicet i n v e r s u m , id enim semper intelligendum est, ita tangentes complementi in basin sunt spatium conchoeidale inversum, sinus complementi in basin sunt spatium circulare inversum) demto radio in sinum, ae-

---

20 Über inversum: NB.

9 radio (1) basi parallelo (2) altitudine  $L$  ändert Hrsg. 15 complementi (1) quadrabilis, demta summa sinuum (2) (duplex sector)  $L$

---

14 adde prop. 14. et 34. 42.: Leibniz bezieht sich auf die gestrichene Version der prop. 42.

quantur tangentibus complementi ad arcum demtis sinibus complementi in arcum seu momento arcus ex radio basi parallelo.

Sed cum per prop. 18. aequentur secantes complementi in basin et tangentes complementi in arcum, rursusque radius in sinum, et momentum arcus ex radio basi parallelo, prop. 4. Hinc rursus calculi veritas comprobatur.

Prop. 31.  $DE \cap ST = EG \cap ET$ . summa secantium complementi (duplex sector) demto radio in altitudinem aequatur radio in arcum, demtis sinibus ad arcum, seu aequatur segmento arcus complementi duplicato.

Rursus comprobatio eorum, quae prop. 29.

Prop. 32.  $DG \cap ST = EG \cap ES$ . summa tangentium complementi demta summa sinuum complementi, aequatur radio in sinum, demtis sinibus ad basin.  
Hinc confirmatur quadratura sinuum ad basin, de qua prop. 12. et 23.

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } EST \text{ et } EGF. \frac{EF}{ET} = \frac{EG}{ES} = \frac{FG}{ST}.$$

Prop. 33.  $EF \cap ES = EG \cap ET$ . Figura tangentium semicomplementi ad basin (seu portio conchoeidis contractae dimidiatae, seu figurae tangentium arcus dimidii, inversa) aequatur radio in arcum, demto momento arcus ex altitudine seu radio in altitudinem seu sinum (versum), adde prop. 13. 27. 35.

Prop. 34.  $EF \cap ST = FG \cap ET$ . summa tangentium semicomplementi (seu figura inversa tangentium arcus dimidii) ad basin, aequatur momento arcus ex radio basi parallelo (seu momento arcus ex altitudine), demta figura tangentium semicomplementi (figura inversa tangentium arcus dimidii) ad arcum.

At per prop. 28. tangentes semicomplementi in arcum, aequantur summae tangentium complementi (quadrabili) demta summa tangentium semicomplementi. Ergo summa tangentium semicomplementi, aequatur momento arcus ex radio

14 (Segmentum quoddam circulare, vid. prop. 27.)

6 f. (duplex sector) (1) demta summa sinuum | complementi *gestr.* | (portione circulari) (2) demto *L*  
8 seu ... duplicato. erg. *L* 16 f. arcum, (1) demtis sinibus in arcum (2) demto momento arcus ex (a)  
radio basi parallelo (b) altitudine seu radio in altitudinem seu sinum | versum *Papierverlust* erg. *Hrsg.* |,  
adde *L* 20 (seu ... altitudine) erg. *L*

basi parallelo addita summa tangentium semicomplementi, demta summa tangentium complementi.

Ergo momentum arcus ex radio basi parallelo, aequatur summae tangentium complementi, quod iam toties habuimus.

*P r o p. 35.  $EG \wedge ST = FG \wedge ES$ .* radius in altitudinem, demta summa sinuum, seu quadrilineum circulare concavum  $BXGE$ , aequatur sinibus complementi ad basin, id est quadrilineo supra dicto  $ABEN$ . demtis tangentibus semicomplementi ad basin.

Iam vero figura tangentium semicomplementi ad basin per prop. 33. aequatur duplo sectori  $ABE$ , demto radio in altitudinem. Ergo [quadrilineum] circulare concavum  $BXGE$ , aequatur quadrilineo  $ABEN$ , demto dupl. sectore  $ABE$ , addito [rectangulo  $BKXG$ ]. Seu mixtilineum  $BXGE = \nabla^{lo} AKE$ , demto sectore  $ABE$ , addito rectangulo  $BKXG$ . Cumque sector constet ex portione circulari  $BKE$  et triangulo  $AKE$ . fiet mixtilineum  $BXGE = \nabla^{lo} AKE - \nabla AKE -$  portio circular.  $BKE +$  rectang.  $BKXG$ . Ergo mixtilineum  $BXGE +$  portio circularis  $BKE =$  rectang.  $BKXG$ . Quod cum per se pateat, apparent calculum recte positum fuisse.

### NIE

$\nabla^{la}$  similia  $EST$  et  $(TUW)$ . sed pro hoc triangulo, substituendum est istud *NIE*. ita ut  $N$  sit loco  $U$ .  $I$  loco  $W$ . Sic ergo:

$$\nabla^{la} \text{ similia } EST \text{ et } NIR. NR = AD - KE. \text{ et } AD = \frac{AE \square}{KE}. \text{ et } IE = ER - IR.$$

6 seu (1) trilineum circulare concavum BXE (2) quadrilineum  $L$  10–12 sectori ABE, (1) demta portione circulari  $|KBE$ . id est sectori ABE  $(a) - (b) + \nabla^{lo} AKE \text{ gestr.}$ . Ergo trilineum circulare concavum BXE, aequatur quadrilineo ABEN, demto sectore ABE, (aa) addito (bb) demto  $\nabla^{lo} AKE$ . ad (!) his ablatis a quadrilineo residuum erit nihil. Errorem ergo hoc loco in calculo esse necesse est. (2) demto radio in sinum. Ergo trilineum circulare concavum BXGE, aequatur quadrilineo ABEN, demto dupl. sectore ABE, addito radio in sinum seu rectangulo BAN. Iam si quadrilineum abiciatur, restabit ex dupl. sectore nil nisi portio circularis KBE. Ergo haec prodibit aequatio: BXGE = rectang. BAN – KBE. Ergo rectang. BXGK = rectang. BAN. Sed hoc absurdum, nondum ergo sublatus omnis error. (3) demto radio in altitudinem. Ergo | trilineum ändert Hrsg. | circulare . . . addito | seu rectangulo BAN ändert Hrsg. |. Seu  $L$

19–476,3 Leibniz verwendet die Benennung  $Y$ . Diese ist aufgrund der später erfolgten Umbenennung (vgl. unten prop. 41) vom Hrsg. in  $I$  abgeändert worden.

$$\text{et } IR = WR = \frac{NR \cap EN}{AE}. \text{ et } NI = UW = AE - \frac{KE \square}{AE}.$$

Iam haec laterum comparatio erit:

$$\frac{EN}{ET} = \frac{NI = AE - \frac{KE \square}{AE}}{ES} = \frac{EI = ER - \frac{NR \cap EN}{AE}}{ST}.$$

P r o p. 36[a].  $EN \cap ES = AE \cap ET, - \frac{KE \square}{AE}, \cap ET$ . sinus complementi ad basin

(quadrilineum  $ABEN$ ) = radio in arcum (duplici sectori  $ABE$ ), demtis sinibus quadratis ad arcum per radium divisis.

Atqui sector duplex est quadrilineum  $ABEN$  portione circulari  $KBE$  auctum. Ergo sinuum quadrata ad arcum aequantur, portioni circulari  $KBE$ . quod iam ostensum, prop. 22.

10 P r o p. 36[b].  $EN \cap ST = ER \cap ET - NR(AD - KE) \cap \frac{EN}{AE} \cap ET =$   
 $ER \cap ET + \frac{KE \cap EN}{AE} \cap ET - \frac{AD - EN}{AE} \cap ET$ . sive:

Summa sinuum complementi (quadrabilis), aequatur tangentibus complementi in arcum (spatio hyperbolico) additis sinibus in sinus complementi ad arcum per radium divisis (vid. sup. prop. 21.), demtis secantibus complementi in sinus complementi per radium divisis, ad arcum.

Iam secantes complementi in sinus complementi, aequantur tangentibus complementi in radium, vid. *D e d u c t i b u s p r o p. 28.* Ergo secantes complementi in sinus complementi, per radium divisi, ad arcum, aequantur tangentibus complementi in radium ductis, per radium divisis, ad arcum.

20 C o r o l l. 1. Ergo tangentes complementi ad arcum, spatium hyperbolicum, aequantur secantibus complementi in sinus complementi per radium divisis ad arcum.

C o r o l l. 2. Ergo summa sinuum complementi (quadrabilis) = sinibus in sinus complementi ad arcum per radium divisis, seu ductui figurae sinuum, in figuram sinuum complementorum, inverso.

25 C o r o l l. 3. sinus in sinus complementi in arcum per radium divisi, aequantur sinibus in basin (adde prop. 21.).

4+10 P r o p. 36. *Zählung doppelt*, L ändert Hrsg. 20 spatium hyperbolicum erg. L

C o r o l l . 4. summa sinuum complementi aequatur sinibus ad basin.

P r o p . 37.  $AE \cap ST - \frac{KE \square}{AE} \cap ST = ER \cap ES$  ( $= CD \cap ES - \frac{NR \cap EN}{AE} \cap ES$ .

Iam pro  $NR = AD - KE$ . pro  $AD \frac{AE \square}{KE}$  fiet:

$$CD \cap ES - \frac{\frac{AE \square \cap EN}{KE} \cap ES}{AE} + \frac{KE \cap EN}{AE} \cap ES. \text{ Iam per prop. 36[b] hic et}$$

$$\text{p r o p . 28. } D e \text{ d u c t i b u s , } \frac{AD \cap EN}{AE} \left( = \frac{\frac{AE \square \cap EN}{KE}}{AE} \right) = \frac{DC \cap AE}{AE}.$$

$$\text{ergo ( C o r o l l . 1 ) } \frac{AE \cap EN}{KE} = DC.$$

$$(\text{quemadmodum [ C o r o l l . 2 . ] } \frac{AE \cap KE}{EN} = HE.)$$

Hinc propositio tandem eiusmodi oritur:

Radius in altitudinem, demtis quadratis sinuum per radium divisis (quae omnia quadrabilia sunt) = tangentibus complementi in basin (spatio hyperbolico inverso), demtis tangentibus complementi in basin (quae se destruunt), additis sinibus in sinus complementi per radium divisis ad basin.

Ergo

C o r o l l . 3. Radius in altitudinem demtis quadratis sinuum per radium divisis, aequatur sinibus in sinus complementi per radium divisis ad basin. Haec ergo quadrabilia.

$\nabla^{\text{la}}$  similia  $YXD$  et  $TSE$ . quia  $\vee D Y X = \vee B Y A$ . Ergo  $YDX$  ang. =  $BAE$  ang.

Ergo  $\nabla^{\text{la}}$   $A E H$  et  $Y X D$  ergo et  $T S E$  et  $Y X D$  similia, quia  $\vee S E T = \vee B A E$ . ergo =  $\vee^{\text{lo}} Y D X$ . Ideo  $\frac{D Y}{E T} = \frac{D X}{E S} = \frac{Y X}{S T}$ .

$D Y$  est differentia inter secantem arcus complementi, et dati;  $Y X$  est differentia inter tangentem et radium;  $D X$  est differentia inter tangentem complementi et radium.

---

2 Über  $AE \cap ST$ : adde prop. 6.

7 Eckige Klammern L

P r o p. 38.  $DY \cap ES = DX \cap ET$ . secantes complementi in basin, demtis secantibus in basin (spatium hyperbolicum demto circulari) aequantur tangentibus complementi in arcum (spat. hyp.), demto radio in arcum (spat. circ.), vid. 2. hic et 18.

5 P r o p. 39.  $DY \cap ST = YX \cap ET$ . res eodem redit cum prop. praeced.

P r o p. 40.  $DX \cap ST = YX \cap ES$ . Tangentes complementi demto radio in altitudinem = tangentibus demto radio in basin.

7–479,1 basin.

$$|\nabla^{\text{la}} \text{similia: } \text{EDG et EST. } \frac{DE}{ET} = \frac{DG}{ES} = \frac{EG}{ST}. \text{ gestr.}|$$

$$|\nabla^{\text{la}} \text{similia: } \text{EFN et EST. quia angulus ENF (vel HAE) = ang. SET. } \frac{EN}{ET} = \frac{FN}{ES} = \frac{EF}{ST}.|$$

(1) | Porro FN sunt ad radium ut differentiae secantium complementi et sinuum, ad secantes complementi.

Si radius a. secans complementi g. sinus b. erit  $\frac{FN}{a} = \frac{g-b}{g}$ . seu  $FN = \frac{g-b}{g} \cdot a$ . at  $\frac{g-b}{g} = \frac{a^2}{b^2} - 1$ .

Ergo  $FN = \frac{a^3}{b^2} - a$ . et  $FN \cap a$ . seu cylinder  $FN = \frac{a^4}{b^2} - a^2$ . aequalis quadratis segmentorum complementi demtis quadratis radii. erg. |

P r o p. 41.  $EN \cap ES = FN \cap ET$ . sinus complementi in basin (quadrilineum) = FN. in arcum. Ergo

C o r o l l. 1. Cylinder quadrilinei, aequatur quadratis secantium complementi in arcum | quadrato radii in arcum minutis erg. |.

Atqui per Duct. prop. 43. secans complementi est media proportionalis inter tangentem complementi arcus dati, et compositam ex tangente arcus dati, et arcus complementi. Ergo

C o r o l l. 2. quadrata tangentium complementi in arcum, aucta rectangulis ex tangentibus et tangentibus complementi in arcum, aequantur cylindro quadrilinei sub radio quadratis radii in arcum, seu cylindro sectoris duplicitis aucto.

(2) Porro FN sunt ad radium ut differentiae complementi et sinuum, ad secantes complementi. Si radius

a. secans complementi g. sinus b. erit  $\frac{FN}{a} = \frac{g-b}{g}$ . seu  $FN = \frac{g-b}{g} \cdot a$ .

$$\text{,, Duxi } FN \text{ inquam } = \frac{ag - ba}{g}. \text{ vel } a - \frac{ba}{g}. \text{ Sed } g = \frac{a^2}{b}.$$

$$\text{,, Ergo } \frac{ba}{\frac{a^2}{b}} = \frac{ba}{a^2} = \frac{b^2a}{a^2} = \frac{b^2}{a}. \text{ Ergo } FN = a - \frac{b^2}{a}.$$

P r o p. 41.  $EN \cap ES = FN \cap ET$ . Sinus complementi, in basin (quadrilineum) = FN. in arcum, seu radio in arcum, demtis quadratis sinuum per radium divisum, in arcum.

Constat autem aliunde quadrata sinuum cylindro cuidam circulari sub radio aequari. Haec ergo concordant. Sed si alibi non extarent hic demonstrarentur. Nam si quadrilineum ABEN detrahatur a duplice sectore ABE, restat portio circularis KEB. quae proinde quadratis sinuum per radi-

P r o p. 41. Summa omnium  $IN$  quadrari potest.

Nam  $IN$  est radius demta applicata parabolae axi parallela, p e r D u c t.  
p r o p. 51. Est ergo summa omnium  $IN$  radius in altitudinem  $BK$ . demta  
portione semiparabolae per axi parallelam abscissae, cuius altitudo  $BK$ . id est,  
summa omnium  $NI$ , dabit trilineum parabolicum.

5

$$\nabla^{la} IEN \text{ et } EST \text{ similia sunt. Ang. } SET = \text{angulo } ENI. \text{ Ideo } \frac{EN}{ET} = \frac{IN}{ES} = \frac{EI}{ST}.$$

um divisis aequalis, atque ideo

C o r o l l. cylinder portionis circularis sub radio aequalis quadratis sinuum, adde supra 17. 22.

23.

P r o p. 42.  $EN \wedge ST = EF \wedge ET$ . Sinus complementi in altitudinem, seu summa sinuum comple-  
menti = tangentibus semicomplementi in arcum.

C o r o l l. 1. Ergo tangentes semicomplementi in arcum, sunt quadrabiles.

C o r o l l. 2. Ergo quia per prop. 14. et 28. 34. tangentes semicomplementi in arcum, iunctis tan-  
gentibus semicomplementi in altitudinem, seu iuncta eorum summa sunt quadrabiles. Ideo sum-  
ma tangentium semicomplementi quadrabilis.

Inter omnia figurarum circularium elementa, nulla sunt tangentibus semicomplementi, et per  
consequens tangentibus arcus dimidii feliciora, quae in arcum, altitudinem, basin habentur. Nisi  
quod tang. semicompl. in basin, et tang. arcus dimid. in alt. habentur. Sed supposita quadra-  
tura.

C o r o l l. 3. Figura tang. arc. dimid. in arcum quadrabilis, est enim non nisi figura inversa tan-  
gentium arcus semicomplementi in arcum.

C o r o l l. 4. Figura tangentium arcus dimidii in basin quadrabilis, est enim inversa tangentium  
arcus semicomplementi in altitudinem.

C o r o l l. 5. Quadratura figurae tangentium seu conchoeidis ex data quadratura hyperbolae, seu  
quadratura differentiae inter conchoeidem et hyperbolam. Nam per D u c t. p r o p. 47. co-  
roll. 1. differentia inter secantem et tangentem (applicata hyperbolae et conchoeidis), aequatur  
tangenti semicomplementi.

C o r o l l. 5. (!) Cum figura tang. semicompl. ad arc. + sum. tang. semicompl. = prop. 14. mom.  
arcus ex basi = prop. 4. rad. in basin, seu sinum. Ergo summa tangentium semicompl. seu diff.  
hyp. et conch. est radius in basin, demis sinibus complementi in altitudinem.

| C o r o l l. 6. Differentia inter erg., bricht ab |

P r o p. 43.  $FN \wedge ST = EF \wedge ES$ . Summa omnium  $FN$  = tangentibus semicomplementi in basin.

At tangentes semicomplementi in basin aequantur tangentibus arcus dimidii (inversis) in altitu-  
dinem seu conchoeidi falsae dimidiatae. Et conchoeis falsa dimidiata aequatur portioni inversae  
seu a basi abscissae. Ergo

C o r o l l. 1. Portio quelibet conchoeidis falsae gestr. |

P r o p. 41 L

Prop. 42.  $EN \cap ES = IN \cap ET$ . sinus complementi ad basin, seu quadrilineum  $ABEN$  = applicatis trilinei parabolici ad arcum, adde prop. 46.

Coroll. Ergo trilineum parabolicum ad arcum, pendet a quadratura circuli.

Prop. 43.  $EN \cap ST = EI \cap ET$ . sinus complementi ad altitudinem, aequantur ipsis 5  
5  $EI$  ad arcum.

Ergo  $EI$  ad arcum quadrabilia sunt. Qualis autem sit recta  $EI$ , vid. *Duct.* 51., vid. prop. 45.

Prop. 44.  $IN \cap ST = EI \cap ES$ . seu  $EI$  ad basin, aequantur applicatis trilinei parabolici ad altitudinem, seu quadrabiles sunt.

His ita positis istud  $EI$  accuratius determinemus. Nimirum  $EI$  est ad tangentem, ut  $NI$  ad radium vel ut  $EN$  ad secantem: Ideo  $\frac{EI}{c} = \frac{f}{d}$ . Iam  $d = \frac{a^2}{f}$ . Ergo

$$\frac{EI}{c} = \frac{f}{\frac{a^2}{f}} = \frac{f^2}{a^2}. \text{ Ergo } EI = \frac{f^2 \cap c}{a^2} = Rq f^2 - a^2 - \frac{b^4}{a^2} + 2b^2. \text{ Ergo } EI \square =$$

$$\frac{f^4 \cap c^2}{a^4} = f^2 - a^2 - \frac{b^4}{a^2} + 2b^2. \text{ Ergo } f^4 c^2 = f^2 a^4 - a^6 - b^4 a^2 + 2b^2 a^4.$$

$$\text{Item } \frac{EI}{c} = \frac{NI}{a}. \text{ Iam: } NI = a - \frac{b^2}{a}. \text{ Ergo } \frac{EI}{c} = \frac{a - \frac{b^2}{a}}{a} = 1 - \frac{b^2}{a^2}. \text{ Ergo } EI =$$

$$c - \frac{b^2 c}{a^2} = \frac{a^2 c - b^2 c}{a^2}. \text{ Ergo } f^2 c = a^2 c - b^2 c. \text{ Ergo } f^2 = a^2 - b^2. \text{ quod verissimum, notaque calculi recte positi.}$$

$$\nabla^{\text{la}} NIR \text{ et } EST \text{ similia sunt et ang. } NRI = \text{angulo } SET. \text{ ideo: } \frac{NR}{ET} = \frac{IR}{ES} = \frac{NI}{ST}.$$

$IR$  est tangens compl.  $-EI$ .  $NR$  est secans compl. demto sinu.

Prop. 45.  $NR \cap ES = IR \cap ET$ . secantes complementi ad basin (spatium hyperbolicum inversum), demtis sinibus ad basin (quadrabilibus) = tangentibus

11 Ideo (1)  $\frac{EI}{c = \text{tang.}} = \frac{d = \text{sec.}}{f \sin. \text{ compl.}}$ . Iam  $d = \frac{a^2}{f}$ . Ergo  $\frac{EI}{c} = \frac{a^2}{f^2}$ .

Coroll.: Ergo  $EI \cap f = \frac{a^2}{f} \cap c$ . seu momenta omnium  $EI$  ex basi = se (2)  $\frac{EI}{c} L$

11 Ideo: im Folgenden verwendet Leibniz die Bezeichnungen von N. 26.

complementi ad arcum (spatio hyperbolico inverso), demtis  $EI$  ad arcum. Ergo  
Coroll.  $EI$  ad arcum = sinibus ad basin, seu sinibus compl. ad altit. prop. 43.  
et 12.

Prop. 46.  $NR \wedge ST = NI \wedge ET$ . Ergo summa secantium complementi (sect. circ. du-  
plex), demta summa sinuum, seu quadrilineum =  $NI \wedge ET$ . concordat prop. 42. 5

Prop. 47.  $IR \wedge ST = NI \wedge ES$ . Summa tangentium complementi (quadrabilis)

demta summa ipsorum  $EI$ . seu summa horum:  $\frac{b^2 c}{a^2}$  aequatur, applicatis trilinei  
parabolici circularis axi parallelis, ad basin.

$$\nabla^{la} similia C\alpha D \text{ et } EST. \quad \frac{DC}{ET} = \frac{D\alpha}{ES} = \frac{C\alpha}{ST}.$$

Prop. 48.  $DC \wedge ES = D\alpha \wedge ET$ . Tang. complementi ad basin (spat. conchoeid.  
inversum) = secantibus complementi ad arcum (spat. hyp. inverso) demtis sinibus  
ad arcum, quoad rabilibus. 10

Coroll. 1. Quadratura conchoeidis ex data hyperbolae quadratura.

Coroll. 2. Tang. semicompl. inversi (seu diff. hyp. et conch. invers.) = sinibus  
ad arcum, et ideo quoad rabb. 15

Coroll. 3. Tang. ad alt. (spat. conch.) = sec. ad arc. (spat. hyp.) – sin. compl.  
ad arc., quadrabiles prop. 4. hic. Et ideo summa tang. semicompl. = sin.  
compl. ad arc. seu momento arcus ex basi, sive radio in sinum.

Prop. 49.  $DC \wedge ST = C\alpha \wedge ET$ . Summa tangentium complementi (quadrabilis) =  
sinibus complementi ad arcum seu momento arcus ex basi, ut supra toties. 20

Prop. 50.  $D\alpha \wedge ST = C\alpha \wedge ES$ . Summa differentiarum inter secantes complementi  
et sinus = quadrilineo  $ABEN$ .

$\nabla^{la} \gamma EF$  et  $EST$  similia: Nam ang.  $EF\gamma$  ang.  $TES$ . Porro  $E\gamma$  ita investigabimus:  
 $A\gamma = \frac{AQ(EF)}{AE} = \frac{EF}{EN}$ . Ergo  $A\gamma = \frac{EF}{EN} \wedge AE$ . Ergo ut obiter dicam momenta  $A\gamma$  =  
cylindro tangentium semicompl. (quadrabili). Ergo et quoad rabilia momenta  $E\gamma$ . 25  
Ergo  $\gamma E = AE - \frac{EF}{EN} \wedge AE$ . Eodem modo  $\frac{Q\gamma}{KE} = \frac{EF}{EN}$ . Ideo  $Q\gamma \wedge EN = EF \wedge KE$ .

7  $\frac{b^2 c}{a^2}$ : mit den Bezeichnungen von N. 26 müsste es genauer  $\frac{f^2 l}{a^2}$  heißen. 14–18 Die Korollare 2 und 3 sind fehlerhaft.

seu momenta omnium  $Q\gamma = \sinibus$  in tang. [semi]compl. quae pendent a q. hyp. ergo et momenta omnium  $\gamma F$ . Ergo  $\gamma F = AE - \frac{EF \wedge KE}{EN}$ . Iam  $EF \wedge KE = AE \wedge KQ$

$[=] \frac{AE \wedge EN}{EN} - \frac{AE \wedge EF}{EN} [=] AE - \frac{AE \wedge EF}{EN}$ . Et quia  $\gamma F = AE - \frac{EF \wedge KE}{EN}$  { vel  $-AE + \frac{AE \wedge EF}{EN}$  } . ideo  $\gamma F = \frac{AE \wedge EF}{EN}$ . ideo momenta omnium  $\gamma F$  = cylindro  $EF$ .

5 et quia tam  $A\gamma$  quam  $\gamma F = \frac{AE \wedge EF}{EN}$ . ergo  $=^{\text{lia}}$  inter se. Ergo  $Q\gamma = E\gamma$ . Ergo  $\nabla^{\text{la}}$   $\gamma EF$  et  $AQ\gamma$  similia et aequalia inter se.

Iam  $\frac{\gamma F}{TE} = \frac{EF}{ES} = \frac{\gamma E}{ST}$ .

P r o p. 51.  $\gamma F \wedge ES = EF \wedge TE$ . Tang. semicomplementi in arcum (quadrab.) =  $\gamma F$  in basin (quadrab.).

10 Ergo  $\gamma E$  in basin quadrab. quia rad. in basin (quad.) –  $\gamma F$  in basin =  $\gamma E$  in bas.

P r o p. 52.  $\gamma F \wedge ST = \gamma E \wedge TE$ . Summa omnium  $\gamma F$  = summae omnium  $\gamma E$  in arcum, quadrab. prop. 55. coroll. 4. [=] radio in arcum demto  $\gamma F$  in arcum.

C o r o l l. Ergo momenta omnium  $\gamma F$  arcui impositorum ex basi quadrabilis, seu  $\gamma F \wedge EN$  ad arcum =  $AE \wedge EF$ .

15 P r o p. 53.  $EF \wedge ST = \gamma E \wedge ES$ . Summa tang. semicompl. (quadrab.) =  $\gamma E$  ad basin.

$\nabla^{\text{la}}$  similia:  $DF\gamma$  et  $EST$ .  $\frac{D\gamma}{ET} = \frac{DF}{ES} = \frac{F\gamma}{ST}$ .

2 Unter  $AE - \frac{EF \wedge KE}{EN}$ , gestr.: subsunt errores

1 semi erg. Hrsg. 2  $EF \wedge KE = (1) \underbrace{ca - cb}_{ca + af - da}$ . Et  $cb = da - af$ . An error forte in calculo,

nam hoc videtur aliquo casu impossibile, quando f. exigua (2)  $AE \wedge KQ L 3 =$  erg. Hrsg. zweimal 12 arcum, (1) pendet ex q. circ. v. prop. 55. (2) quadrab.  $L 12 =$  erg. Hrsg.

8–16 Die Aussagen der Sätze 51–53 bezüglich der Quadrierbarkeit der einzelnen Größen sind nur teilweise zutreffend. Dies wirkt sich negativ auf die entsprechenden Aussagen von Satz 54 sowie auf Teil 2 S. 489 Z. 10 aus.

Prop. 54.  $D\gamma \wedge ES = DF \wedge ET$ . secantes complementi ad basin (secantes in altitudinem inversi, spatium hyp. a basi abscissum) demtis  $A\gamma$  vel  $\gamma F$  ad basin (quadrabilibus prop. 51.) aequantur tangentibus compl. ad arcum (spat. hyp.) (tang. ad arc.) demtis tangentibus semicomplementi ad arcum (tang. arcus dimidii ad arcum) quadrabilibus.

5

Prop. 55.  $D\gamma \wedge ST = F\gamma \wedge ET$ . secans complementi ad altitudinem (radius in arcum), demtis omnibus  $F\gamma$  in altitudinem = omnibus  $F\gamma$  ad arcum.

Coroll. 1. Secans ad basin demtis omnibus  $F\gamma$  ad basin (quadrabilibus) = omnibus  $F\gamma$  ad arcum.

Coroll. 2. Ergo omnes  $F\gamma$  ad arcum = radio in arcum, demtis tang. arc. dimid. in arc. (quadrab.).

Coroll. 3. Ergo summa omnium  $\gamma F$  (scil. ad altitudinem) = tang. arc. dimid. ad arcum =  $\gamma F$  ad basin inversis.

Coroll. 4. Ergo summa omnium  $\gamma E$  in arcum quadrabilis.

Prop. 56.  $DF \wedge ST = F\gamma \wedge ES$ . Summa tangentium complementi (quadrab.), 15 demta summa tangentium semicomplementi (quadrab.) =  $F\gamma$  in basin seu tang. semicompl. in arcum (quadrabilibus).

Coroll. Figura tangentium in basin (quadrabilis) demta tang. arcus dimidii in basin (seu summa tang. semicompl. inversa, quadrabilis) =  $F\gamma$  ad altitudinem (quadrabilibus).

20

$\nabla^{la}$  similia  $X\lambda D$  et  $EST$ . Porro  $XD$  habemus. Quaerenda sunt  $X\lambda$  et  $\lambda D$ .

Iam  $X\lambda$  est  $C\alpha (= EN) - X\delta$ . Sed  $X\delta = KE$ . quia  $\nabla^{la} X\delta C$  et  $AKE$  similia, unumque latus  $AE$  et  $CX$  aequale, uni alterius, ergo et reliqua. Ergo  $X\lambda = EN - KE$ .

Similiter  $\lambda D$  est  $AD - A\alpha (= AN = KE) - C\delta (= EN)$ . Ergo  $\lambda D = AD - EN - KE$ .

Denique  $DX = CD - AE$ .

25

7f. arcum |, quadrabilibus *gestr.* | (1) Coroll. 1. Summa omnium  $F\gamma$  pendet ex q. circ. iunct. prop. 52. Coroll. 2. Omnes  $\gamma E$  ad arcum pendent ex q. circ. dict. prop. 52. iunct Coroll. 1. hic. (2)

Coroll. 1. L 13 basin | absurdum *gestr.* | inversis. L 20 f. (quadrabilibus). (1)  $\nabla^{la}$  similia:  $C\delta R$

et  $EST$ . (a) Ang.  $FCD = \text{ang.}$  (b)  $\xrightarrow{\text{CR}}$  (2)  $\nabla^{la}$  similia  $L$

---

6 Prop. 55.: Richtig sind die Hauptaussage, Korollar 3 und (trotz mangelhafter Begründung) Korollar 4; falsch hingegen die Korollare 2 und 3. 15 Prop. 56.: Der Satz selbst ist korrekt, das Korollar nicht; die Quadrierbarkeitsaussagen treffen nur zum Teil zu.

Iam:  $\frac{DX}{ET} = \frac{\lambda D}{ES} = \frac{X\lambda}{ST}$ .

P r o p. 57.  $DX \wedge ES = \lambda D \wedge ET$ . Tangentes complementi ad basin (ex conchoeid.)

demto radio in sinum = secantibus complementi ad arcum, demis pariter sinibus complementi ad arcum, et sinibus ad arcum (ex conchoeid.), adde prop. 24.

5 P r o p. 58.  $DX \wedge ST = ET \wedge X\lambda$ . Summa tangentium complementi, demto radio in altitudinem = momento arcus ex basi demto mom. arcus ex alt.

P r o p. 59.  $\lambda D \wedge ST = X\lambda \wedge ES$ . Summa secantium complementi, demta summa sinuum pariter et sinuum complementi = quadrilineo  $ABEN$ , demta summa sinuum ad basin quadrabili.

10 Sive figura secantium ad basin, demta summa sinuum, quadrab., pariter et sinuum complementi ad basin = sinibus ad alt. demt. sin compl. ad alt.

$\nabla^{la}$  s i m i l i a  $Y\lambda X$  et  $EST$ . nam ang.  $\lambda XY$  = angulo  $TES$ .

Porro  $X\lambda$  habemus.  $YX$  est radius demto tangente  $BX - BY$ . et denique  $Y\lambda$  est  $A\alpha (= KE) + \alpha\lambda (= C\delta = EN) - AY (= AH)$ .

15  $\frac{YX}{ET} = \frac{X\lambda}{ES} = \frac{Y\lambda}{ST}$ .

P r o p. 60.  $YX \wedge ES = X\lambda \wedge ET$ . Radius in basin (sinum) demto tangente in basin ([tangente complementi] in altitudinem) (quadrabili) = momento arcus ex basi, demto momento arcus ex altitudine.

P r o p. 61.  $YX \wedge ST = Y\lambda \wedge ET$ . Radius in altitudinem, demta summa tangentium (vel contra) =  $Y\lambda$  ad arcum, seu momento arcus ex altitudine, addito momento arcus ex basi, demis secantibus ad arcum (vel contra).

P r o p. 62.  $X\lambda \wedge ST = Y\lambda \wedge ES$ . Summa sinuum complementi demta summa sinuum (intellige in talibus semper: vel contra) = sinibus ad basin + sin. compl. ad basin – secant. ad basin.

23 Über der Klammer: NB.

17 radio  $L$  ändert Hrsg. 24–485,1 basin. |  $\nabla^{la}$  s i m i l i a  $E\mu Y$  et  $EST$ . Nam ang.  $MEY$  = angulo  $TES$ . Lineae ita habentur:  $\underline{ME} = AE - EN$ .  $\underline{EY} = AY(AH) - AE$ .  $\underline{MY}$  est differentia tangentis et sinus. Ideo iam habuimus in  $\nabla$ HPB. gestr. |  $\frac{\xi Y}{AR = AD} L$

$$\frac{\xi Y}{AR = AD} = \frac{\mu N(AE) - EN}{EN}. \text{ seu } \xi Y = \frac{AE \wedge AD}{EN} - \frac{EN \wedge AD}{EN}. \text{ seu } \xi Y = \frac{AE \wedge AD}{EN} - AD.$$

aliter:  $\frac{\xi Y}{AE - HE(YX)} = \frac{EY(HA - AE)}{Y\lambda(KE + EN - AH)}.$

$$\frac{\xi E}{EF} = \frac{XG(AC - EN)}{GF(EN - EF)}. \text{ Ergo } \xi E = \frac{AC - EN, \wedge EF}{EN - EF}.$$

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } \xi EY \text{ et } EST. \quad \frac{\xi Y}{TE} = \frac{\xi E}{ES} = \frac{EY}{ST}.$$

Prop. 63.  $\xi Y \wedge ES = \xi E \wedge TE$ .

Prop. 64.  $\xi Y \wedge ST = EY \wedge TE$ . seu summa omnium  $AD$  per radium multiplicata aequatur momentis omnium secantium radiis minutorum, arcubus impositorum.

Prop. 65.  $\xi E \wedge ST = EY \wedge ES$ . Summa omnium  $\xi E$  aequatur secantibus radio minutis in basin, seu pendet ex q. circ., add. prop. 67.

5

10

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia } \xi \mu E \text{ et } EST. \quad \frac{\xi E}{ET} = \frac{\xi \mu}{ES} = \frac{E\mu}{ST}.$$

Prop. 66.  $\xi E \wedge ES$  ad basin. =  $\xi \mu \wedge ET$  ad arcum.

Prop. 67.  $\xi E \wedge ST = E\mu \wedge ET$ .  $\xi E$  summa, aequatur radio sinibus complementi minuto in arcum.

Prop. 68.  $\xi \mu \wedge ST = E\mu \wedge ES$ . Summa omnium  $\xi \mu$  = radio in basin, demtis sinibus complementi ad basin, seu quadrilineo.

15

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } \xi XF \text{ et } EST. \quad \frac{\xi F}{ET} = \frac{\xi X}{ES} = \frac{FX(AB - EF)}{ST}.$$

16 basin (1). Summa ergo horum  $\xi M$  aequatur trilineo concavo BMC. Quod per se patet. (2), seu  $L$

<sup>1</sup>  $\xi, \mu$ : In seiner Handzeichnung hat Leibniz den Punkt  $\xi$  rechts neben den Punkt  $T$  gezeichnet;  $T$  und  $\xi$  müssen aber zusammenfallen. — In seiner Zeichnung verwendet Leibniz die Bezeichnung  $\mu$ , ebenso in der Variante zu Beginn des Textes; im laufenden Text ist er zur Bezeichnung  $M$  gewechselt. Da  $M$  bereits in anderer Funktion vorkommt (s. N. 26, prop. 55 und 57), ist vom Herausgeber das ursprüngliche  $\mu$  beibehalten worden. Die Änderung betrifft Z. 1 sowie Z. 11–16. <sup>7</sup> Prop. 64.: Die Formel ist korrekt, die Ausführungen sind misslungen.

Prop. 69.  $\xi F \wedge ES = \xi X \wedge ET$ . Tang. semicompl. ad basin. (segm. circ.) addito  $\xi E$  ad basin =  $\xi X$  ad arcum.

Prop. 70.  $\xi F \wedge ST = FX \wedge ET$ . Summa tang. semicompl. (quadrab.) +  $\xi E$  summa (ex q. circ.) = radio in arcum, demis tang. semicompl. ad arcum.

5 Prop. 71.  $\xi X \wedge ST = FX \wedge ES$ . seu summa omnium  $\xi X$  = radio in basin – tang. semicompl. in basin.

$\nabla^{la}$  similia:  $\theta\varpi E$  et  $EST$ . Nam ang.  $\varpi\theta E$  = angulo  $BAE$ . quia eius dupli ad centrum est angulus ad circumf.

$\theta E$  autem est parabolica seu chorda supplementi ad semicirculum.

10  $\varpi E$  ita inveniemus:  $2b \wedge a + f$  seu  $2bf + 2ba = \theta E$ . quam vocemus  $k, \wedge \varpi E$ . Ergo  $\frac{2ba + 2bf}{k} = \varpi E$ .

$$\frac{\theta E}{ET} = \frac{\theta\varpi}{ES} = \frac{\varpi E}{ST}.$$

Prop. 72.  $\theta E \wedge ES = \theta\varpi \wedge ET$ . Applicatae parabolicae inversae, ad basin, aequantur ipsis  $\theta\varpi$  ad arcum.

15 Prop. 73.  $\theta E \wedge ST = \varpi E \wedge ET$ . Summa applicatarum parabolicarum inverse sumtorum, aequantur ipsis  $\varpi E$  ad arcum.

Ergo  $\varpi E$  ad arcum quadrabilia.

Prop. 74.  $\theta\varpi \wedge ST = \varpi E \wedge ES$ . summa omnium  $\theta\varpi$  aequalis omnibus  $\varpi E$  ad basin.

20  $\nabla^{la}$  similia  $\psi\varphi\pi$  et  $EST$ .  $\psi\varphi = CE$ . Punctum  $\pi$  cadit in rectam  $AB$ , et si duceretur recta  $C\pi\varphi$  ea aequalis rectae  $C\pi E$ . Ideo  $\pi E = \pi\varphi$ . et  $\psi\pi + \pi\varphi = \psi E$ .

Nota si basin  $AC$  pro altitudine sumamus, seu aequadivisam intelligamus,  $\psi\varphi$  et  $\psi\pi + \pi\varphi$  erunt applicatae parabolicae.

$$\frac{\psi\pi}{ET} = \frac{\psi\varphi}{ES} = \frac{\varphi\pi}{ST}.$$

20 similia (1)  $\psi\varphi Q$  et  $EST$ .  $\psi\varphi = CE$ . Punctum  $Q$  cadit in rectam  $AB$  sed non est necesse idem esse cum illo  $Q$ , quod alias adhibuimus ut  $AQ = EF$ . sed ne (2)  $\psi\varphi\pi L$

---

3 Prop. 70.: Die Aussagen zur Quadrierbarkeit sind nur teilweise richtig. 20 Punctum  $\pi$ : Leibniz' ursprüngliche Intention (s. die zugehörige Variante) war richtig.  $\pi$  und  $Q$  fallen in der Tat zusammen.

P r o p. 75.  $\psi\pi \wedge ES = \psi\varphi \wedge ET$ . seu  $\psi\pi$  ad basin =  $\psi\varphi$  chordis ad arcum.

Iam per prop. 42. chordae in arcum pendent ex q. circ. Ergo et  $\varphi\pi$  ad basin.

P r o p. 76.  $\psi\pi \wedge ST = \varphi\pi \wedge ET$ . seu summa omnium  $\psi\pi$  = omnibus  $\varphi\pi$  ad arcum.

P r o p. 77.  $\psi\varphi \wedge ST = \varphi\pi \wedge ES$ . Chordae ad altitudinem =  $\varphi\pi$  ad basin.

[Teil 2]

5

Memorabiles sunt consequentiae quae ex his duci possunt ad arithmeticam infinitorum, reperientur enim summae, quae alias omnem opinor artem humanam eludent. Et certe vulgo non extant summae linearum seu quadraturae figurarum nisi parboleidum. Sed consideremus exempli causa: summam tangentium complementi.

Esto radius  $a$ . tangens complementi  $l$ . secans complementi  $g$ . sinus  $b$ . sinus compl.  $f$ . Con-

stat:  $g = \frac{a^2}{b}$ . Constat item  $\frac{g}{a} = \frac{l}{f}$ . Ergo  $l = \frac{gf}{a} = \frac{a^2 f}{ba} = \frac{af}{b}$ . Et quia  $b = Rq a^2 - f^2$ .

ideo secans complementi  $g = \frac{a^2}{Rq a^2 - f^2}$ . et tangens complementi  $l = \frac{af}{Rq a^2 - f^2}$ . Ponantur autem  $f$  continue crescere proportione arithmeticā, primum seu minimum esse  $\beta$ . post  $2\beta$ . post  $3\beta$ . etc.

Summa ista  $\frac{a\beta}{Rq a^2 - \beta^2} \quad \frac{2a\beta}{Rq a^2 - 4\beta^2} \quad \frac{3a\beta}{Rq a^2 - 9\beta^2}$  etc. iniri potest. Demonstravi 15  
enim quadrari posse summam tangentium complementi.

Et ista tamen summa  $\frac{a^2}{Rq a^2 - \beta^2} \quad \frac{a^2}{Rq a^2 - 4\beta^2} \quad \frac{a^2}{Rq a^2 - 9\beta^2}$  quae est secantium  
complementi, habere non potest, est enim eadem cum tetragonismo sectoris duplicati.

---

15 Zu summa ista:

Imo NB. error, summa ista non habetur, quia tangentes [bricht ab]

---

2  $\varphi\pi$  ad basin: Im Gegensatz zu Leibniz' Aussage ist das Integral von der Kreisquadratur unabhängig. Der Hinweis auf die prop. 42 irreführend.

Porro si summam tangentium complementi a linea maxima incipias, primum erit

$$\frac{a - \beta}{Rq, a^2 - a^2 - \beta^2 + 2a\beta} \text{ seu } Rq 2a\beta - \beta^2, \text{ secundum } \frac{a^2 - 2\beta a}{Rq 4\beta a - 4\beta^2}, \text{ tertium } \frac{a^2 - 3\beta a}{Rq 6\beta a - 9\beta^2}, \text{ etc. quadrabilis.}$$

Ergo si quadrabilis esset haec quoque series  $\frac{\beta a}{Rq 2\beta a - \beta^2} \quad \frac{2\beta a}{Rq 4\beta a - 4\beta^2}$  etc. habe-

5 retur quadratura huius  $\frac{a^2}{Rq 2\beta a - \beta^2} \quad \frac{a^2}{Rq 4\beta a - 4\beta^2}$  etc.

Differentia inter duas series:  $\frac{a^2 - a\beta}{Rq a^2 - \beta^2}$  etc.

$\alpha^2 - a\beta \neq a$	$\alpha^2 - 2\alpha\beta \neq a - \frac{a\beta}{a - \beta}$	$\alpha^2 - 3\alpha\beta \neq a - \frac{2a\beta}{a - \beta}$
$\phi - \beta$	$\phi - \beta$	$\phi - \beta$
$\frac{1}{Rq a^2 - \beta^2}$	$\frac{1}{Rq a^2 - 4\beta^2}$	$\frac{1}{Rq a^2 - 9\beta^2}$

Ratio primi ad primum est  $\frac{a}{\beta}$ , 2<sup>di</sup> ad 2<sup>dum</sup>  $\frac{a}{2\beta}$ , tertii ad tertium  $\frac{a}{3\beta}$  etc.

vel  $\frac{\beta}{a} \quad \frac{2\beta}{a} \quad \frac{3\beta}{a}$

summa harum rationum est  $\frac{a^2}{a} = a$ .

Tota inquisitio in posterum arithmeticae infinitorum in eo verti debet, ut inveniantur regulae, quarum ope, datis rationibus partium singularium unius totius ad singulas partes totius alterius, ratio inveniri possit, totorum inter se. Manifestum enim est, rem esse determinatam, ac datis istis partium rationibus, necessario emergere per synthesin

14–16 Vid. ubi de voluto centro gravitatis.

1–5 Porro ... etc. erg. L

13 summa: Leibniz summiert die untere Folge; genauer müsste es  $\frac{1}{2}a$  heißen. 18 Vid.: vgl. dazu

N. 16<sub>2</sub> Teil 2.

certas ac determinatas totorum rationes, etsi hactenus regrediendo per analysin non deprehendamus.

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} \propto \frac{a+c}{b+d} \times \frac{ad+cb}{bd} = \frac{abd+cbd}{b^2d+d^2b} = \frac{adb+ad^2+cb^2+cbd}{b^2d+d^2b}$$

Ergo differentia inter  $\frac{a+c}{b+d}$  et  $\frac{a}{b} + \frac{c}{d}$  qua hoc excedit illud, est  $\frac{ad^2+cb^2}{b^2d+db^2}$ .

Si iam addenda:  $\frac{a+c}{b+d} - \frac{e}{f}$ , fiet  $\frac{a+c+e}{b+d+f} = \frac{af^2+cf^2+[eb^2+ed^2+2bed]}{b^2f+d^2f+2bdf+f^2b+f^2d}$ . 5

[Iam  $EN = a - x$ . et  $KE = y$ . et  $AC = a$ .]

$$\text{Tang. compl. } \frac{CD}{EN} = \frac{AC}{AN}. \quad CD = \frac{AC \cap EN}{AN} = \frac{a^2 - ax}{y}.$$

$$\text{At tang. semicompl. ita. } \frac{2CF}{EN} = \frac{\psi C = 2a}{\psi N = a+y}. \text{ Ergo } 2CF = \frac{a \cap EN = a^2 - ax}{a+y}.$$

$$\text{Denique secans complementi } AD = \frac{a^2}{y}.$$

$$\text{Habemus summam omnium tang. compl. } \frac{a^2 - ax}{y}. \text{ tang. semicompl. } \frac{a^2 - ax}{a+y}. \quad 10$$

$$\text{Desideratur summa omnium secant. compl. } \frac{a^2}{y} \text{ vel summa tangentium semiarcus seu}$$

5 eb + ed L ändert Hrsg.      6f. (1) NB. Tang. semicompl.  $| = \frac{a^2 - ax}{2y}$ . erg., nicht gestr. | (a)

Imo potius tan (b) Tang. compl. = (c) Nam  $\frac{CF}{EN} = \frac{AC}{KE}$ . ergo  $CF = \frac{AC \cap \frac{EN}{2}}{KE}$ . (aa) Iam  $\frac{EN}{2}$  (bb)

et  $\frac{AC \cap EN}{2KE}$ . Iam  $EN = a - x$ . et  $KE = y$ . et  $AC = a$ . ergo  $CF = \frac{a^2 - ax}{2y}$ . Sed  $\frac{CD}{EN} = \frac{CA}{AN}$ . Ergo

$CD = \frac{CA \cap EN}{AN = EK}$ . ergo  $CD = \frac{a^2 - ax}{y}$ . (2) | Iam  $EN \dots = a$ . erg. Hrsg. | Tang. compl. L 11-490,1 seu figura semicissoeidis und applicata asymptoto parallela erg. L

3  $\propto$ : Das Zeichen bedeutet hier fiet, s. Z. 5.      10 Habemus: Die erste Aussage ist richtig (s.o. Prop. 20 u. 25.), die zweite hingegen falsch (s.o. Prop. 53.).

figura semicissoeidis:  $\frac{ax}{y} = z$ . applicata asymptoto parallela.

Quadrata secantium complementi sunt:  $\frac{a^4}{y^2} = \frac{a^4}{ax - x^2}$ .

Momenta ex vertice:  $\sqrt{\frac{a^2}{x} - 1}$ .

$z = \frac{ax}{\sqrt{ax - x^2}}$ .  $z^2 = \frac{a^2 x^2}{2ax - x^2}$ .  $\cancel{2}z^2 ax - x^2 z^2 = a^2 x^2$ . Ergo  $\cancel{2}z^2 a - xz^2 = a^2 x$ . Ergo

5  $\cancel{2}z^2 a = a^2 x + xz^2$ . Ergo  $\frac{\cancel{2}z^2 a}{a^2 + x^2} = x$ . vel si Cartesii notis pro  $z$  substituas  $x$ . pro  $x, y$  fiet

aequatio figurae segmentorum circuli:  $\frac{\cancel{2}x^2 a}{a^2 + x^2} = y$ .

Ita habemus applicatas figurae segmento circuli symmetrae, ab irrationalitate liberatas et ad modum cuiusdam quasi hyperboloeidis expressas. Quod hactenus potuit nemo, dimensionem circuli dare infinita serie numerorum rationalium.

10 Hactenus nihil erratum est.

Est autem magni momenti haec circuli reductio ad rationalitatem, qua nemo quicquam maius ad circuli dimensionem praestitit.

Porro momentum quoque figurae eiusdem, ex altitudine, seu summa quadratorum  $z$  vel applicatarum cissoeidis dimidiatae, asymptoto parallelarum ad hyperbolam reduci

15 potest. Nam  $z$  asymptoto parallela aequalis est:  $\frac{ax}{\sqrt{2ax - x^2}}$ . Ergo  $z^2 = \frac{a^2 x^2}{2ax - x^2} =$

$$2 \quad y^2 = ax - x^2.$$

5–7 = x. | vel si ... = y. erg.; applicatae semicissoeidis, basi, seu diametro circuli generatoris parallelae et (1) parallelae (2) perpendicularares et asymptotae parallelae (3) perpendicularares asymptoto erg. u. gestr.; darüber, nicht gestr.:  $\mathfrak{A}$  | Ita L 14 f. dimidiatae, (1) basi parallelarum, seu ad asymptotam perpendiculararium, eiusdem pene aequationis est, cuius sunt (a) axi | seu asymptoto erg. | (b) basi parallelae (2) asymptoto ... potest (a), nimirum mutato tantum + in -. Nam z basi parallela, aequalis (b). Nam L

---

16  $ax - x^2$ : statdessen müsste es genauer  $2ax - x^2$  heißen. Die folgende Rechnung führt Leibniz mit diesem Fehler konsequent durch, verbessert dann, streicht aber schließlich sämtliche hinzugefügten Zweien in Z. 4–6 wieder aus.

$\frac{a^2x}{2a-x}$ . Ideoque respondet momento figurae secantium ex vertice, seu opposita asymptotae.

Nam si  $x$  crescere incipiat ab opposita asymptotae, erit hyperbola  $\frac{a^2}{a-x}$ . Eius-

que momentum ex illa opposita:  $\frac{a^2x}{a-x}$ . Hinc dubitandum non est momentum istud ex

quadratura hyperbolae pendere. (Hyperbola est,  $\frac{a^2}{a-x} = y$ . Ergo  $a^2 = ay - xy$ . Ergo

$a^2 + xy = ay$ . Ergo  $xy = ay - a^2$ . Ergo  $x = \frac{ay - a^2}{y}$ . vel  $x = a - \frac{a^2}{y}$ . Ergo  $y$  abscissa

ex asymptota semper maior  $a$ . Hinc apparent aequationem ipsius  $x = \frac{2z^2a}{a^2 + z^2}$ . aequationi

ipsius  $z^2 = \frac{a^2x^2}{2ax - x^2}$ . valde affinem esse, sed illam tamen non aequabilem.[]])

Nota autem summa quadratorum parallelarum asymptotae seu  $z^2$  inventa, inventum utique momentum cissoeidis ex basi seu circuli diametro, cui applicata intelligitur, ac per consequens haberi summam ipsarum  $x$ . seu basi parallelarum, ductarum in distantias a basi, quae scilicet his semiquadratis aequatur.

Notandum ante omnia cum dicitur  $z = \frac{ax}{\sqrt{ax - x^2}}$ . Tunc posito quod  $x$  sit initio minimum, ipsam  $z$  fore minimam applicatarum asymptotae parallelarum, nam posito  $x$  esse infinite parvum, ac proinde negligi velut non ascriptum erit  $z = \frac{a}{\sqrt{a}}$ . ac proinde linea qualibet

assignabili minus. Nam sic  $z^2 = \frac{a^2}{a}$ . seu  $z^2 = a$ .

Ergo inspecta figura quam de cissoide descripsi[:]  $x$  erit  $AD$ . et  $z$  erit  $DI$ . At applicatae inversae  $IK$ , non sunt  $x$ . sed  $a - x$ . verum  $x$  sunt applicatae spatii complementalis. Ergo omnia momenta ipsorum  $a - x$  ad altitudinem sunt aequalia semiquadratis omnium  $z$  ad basin. Ergo  $xz$  ad asymptotam reducta sunt ad quadraturam hyperbolae.

1 Ideoque (1) aequatur (2) respondet (3) aequatur (4) respondet momento (a) hyperbolae ex (b) figurae  $L = 3 \frac{a^2x}{a - x}$ . (1) Ergo cissoeidis ex asymptota aequiponderat hyperbolae ex opposita asymptotae. Modo idem (2) Hinc  $L$

16 inspecta figura: s. N. 34, S. 575, Fig. 4.

At semiquadrata omnium  $x$ . vel momenta omnium  $z$ . ex asymptota aequantur si-  
num cylindro, atque ideo  $zx$  vel (quia  $z = \frac{ax}{\sqrt{ax - x^2}}$ )  $\frac{ax^2}{\sqrt{ax - x^2}} = a \sqrt{ax - x^2}$ . Ergo  
 $\frac{x^2}{\sqrt{ax - x^2}} = \sqrt{ax - x^2}$ . Ergo  $x^2 = ax - x^2$ . Ergo  $2x^2 = ax$ . Ergo  $2x = a$ . absurdum. Error  
ergo alicubi.

- 5 Eius ratio haec est[:] primum sumsi semiapplicatam cissoeidis asymptotae parallelam  
esse hanc  $z = \frac{ax}{y}$ . posito  $y$  esse sinum, quoniam scilicet secans compl. erat  $\frac{az}{y}$ . et tang.  
compl. erat  $\frac{a^2 - ax}{y}$ . at horum differentia est tangens semiarcus. Ergo tangens semiarcus  
est  $\frac{ax}{y}$ . ducantur in  $2a - x$ . distantias a basi, fiet:  $\frac{2a^2x - ax^2}{y} = \frac{2a^2x - ax^2}{\sqrt{ax - x^2}} = [bricht  
ab]$
- 10 Sed de his alias exquisitius, sufficit interea certam exquisitamque detexisse rationem ex-  
primendi progressionem elementorum circuli, aut figurae circularibus symmetrae, infinita  
serie numerorum rationalium. Quod hactenus in hyperbola ac hyperboloidibus, parabo-  
laque aliisque id genus figuris, in circulo nunquam fieri potuit, novaque methodus detecta  
arcus, sinus, segmenta supputandi.

15 Si  $\frac{z^2a}{a^2 + z^2} = x$ . series numerorum rationalium ipsis  $x$  respondentium ita exhiberi  
potest: posito  $a = 10$ . nam assumi potest quantumcumque, et in continuo, infinitum:

$$\begin{aligned} & \frac{10}{100+1} + \frac{40}{100+4} + \frac{90}{100+9} + \frac{160}{100+16} + \frac{250}{100+25} + \frac{360}{100+36} + \frac{490}{100+49} + \\ & \frac{101}{104} \quad \frac{109}{104} \quad \frac{116}{109} \quad \frac{125}{116} \quad \frac{136}{125} \quad \frac{149}{136} \\ & \frac{640}{100+64} + \frac{810}{100+81} + \frac{1000}{100+100} \\ & \frac{164}{181} \quad \frac{181}{200} \end{aligned}$$

---

17–20 Imo hoc est complementum rectanguli isoparalleli ad segmentum dupli-  
tum, potest  $a$  assumi  $\frac{1}{10}$ . et  $z = \frac{1}{100} \frac{2}{100} \frac{3}{100}$ .

Asymptota conchoeidis asymptotae hyperbolae aequalis est, differentiis, cum ipsarum utriusque applicatarum incremento decrescentibus.

Spatium hyperbolae asymptoton esse magnitudine infinitum facile demonstrari potest quoniam cylinder eius infinitae magnitudinis. Quod rursus sic probo: Quoniam residuum eius, demto momento ex asymptota vel basi, est momentum ex opposita asymptotae seu ex vertice spatii asymptoti, at hoc momentum necesse est ad alterum illo esse ut infinitum ad finitum, adeo ut si momentum ex basi est finitum, alterum sit infinitum, et si momentum ex basi est infinitum, momentum ex vertice futurum sit plus quam infinitum. Cuius rei manifesta ratio est, quoniam in asymptotam aliasque ei parallelas numero infinitesimarum finito distantes quippe infinitas ducta puncta faciunt plana  $a^2$ . Ergo lineae in ea ductae facient solida.

Imo  $\mathfrak{A}$ , videndum. Ista enim facient solida, facient tantum finita, quoniam et plana fuerant finita. Sed de hoc porro videndum.

Credo Collinium summam inire terminorum progressionis harmonicae divisione illa per partes adhibita, qua et Mercator usus est.

$$\frac{z^2}{z^2 + a^2}.$$

Iam  $\frac{1}{1+a} = 1 - a + a^2 - a^3 + a^4 - a^5 \text{ etc.}$  Ergo  $\frac{z^2}{z^2 + a^2} =$

$$\left\{ \begin{array}{c} z^2 - a^2 + a^4 - a^6 + a^8 - a^{10} \text{ etc.} \\ 4z^2 \\ 9z^2 \\ 16z^2 \\ 25z^2 \end{array} \right\}$$

5

10

15

20

17 NB. si  $a$  fractio est, necesse est etiam  $z$  esse fractionem fractionis, cum sit portio ipsius  $a$ .

18–22 *Links neben dem Schema:* Summa horum omnium linea est.

*Darunter, gestrichen:* Male non  $z^2$  sed 1.

14 Collinium: vgl. Oldenburg an Leibniz, Sendung vom 20. IV. 1673 (*LSB III*, 1 S. 60).

seu  $z^2 + 4z^2 + 9z^2$  etc. |  $+a^4 + a^8 + a^{12}$  etc.  $-a^2 - a^6 - a^{10}$  etc. ducta in  $a$ . id est infinites sumta.

Seu:  $z^2 + 4z^2 + 9z^2$  etc.  $+a^5 + a^9 + a^{13}$  etc.  $-a^3 - a^7 - a^{11}$  etc.

Et quia  $z^2 + 4z^2 + 9z^2$  etc.  $= \frac{a^3}{3}$ . habebimus:  $\frac{a^3}{3} + a^5 + a^9 + a^{13}$  etc.  $-a^3 - a^7 - a^{11}$  etc.

5 vel  $+a^5 + a^9 + a^{13}$  etc.  $-\frac{2a^3}{3} - a^7 - a^{11}$  etc.

Unde posita  $a$  minore quam 1. v. g.  $\frac{1}{2}$ . posteriores potestates erunt fractiones tam parvae ut tuto negligi possunt, habebiturque approximatio facillima, quantam volemus. Haec pro quadratura totius, si partis tantum quaeratur multiplicationis per  $a$ . multiplicandum per  $z$ . seu altitudinem abscissamve ex vertice.

- 10 Si  $a$  v. g. ponatur 10. posteriores potestates continue crescent, si ponatur esse  $\frac{1}{10}$ . nec hoc satisfacit. Ergo quemadmodum si 1. sit infinitesima lineae seu punctum,  $a$  foret infinitum. Ita si  $a$  volumus facere fractionem quantumlibet, et si opus infinite, parvam, ipsum 1. intelligamus  $= a^2$ . seu quadratum radii. Cuius infinitesima est  $a$ . et loco infinitesimae, intelligatur esse  $\frac{1}{100,000}$ . Imo nec opus est postrema, negligi potest summa eorum enim 15 in infinitum, quia sunt progressionis geometricae. Denique omnia multiplicanda per  $a$ . id est 100,000, quaeritur enim non summa omnium  $\frac{z^2}{z^2 + a^2}$ . sed omnium  $\frac{z^2 a}{z^2 + a^2}$ . Ille demum maximus usus est, quod idem fit, etiamsi series sit finita, seu altitudo divisa in partes finitas, eodem modo enim hac tangentium methodo summa eius inveniri potest, ut credo. Videndum tamen, an scilicet sinus in suas ipsorum differentias ducti, producant 20 eorum semiquadrata, in summa. Forte utilius infinitis summa potius omnium  $DK$  uti, quia ea non ad basin sed simpliciter. Nam infinitis summa omnium  $DE$  ad basin difficilis, quia basis non potest dividi in partes aequales.


17–22 Ille demum . . . partes aequales. erg. L

---

8 per  $a$ : von hier geht ein Verbindungsstrich zu ducta in  $a$  Z. 1 aus.

## [Teil 3]

Theorema est in omni figura: secantes ad basin aequant rectangulum abscissae in applicatam, segmento duplicato auctum. Et hoc quidem in circulo facit quadrilineum duplicatum, seu sectorem duplicatum.



[Fig. 2]

5

Esto figura quaelibet  $ABC$ . cuius applicata quaelibet  $DE$ . tangens  $[EF]$ . abscissa trans verticem  $BF$ . eius dimidia  $BG$ .

2–4 Male fit regula generalis.

2 est | generale *gestr.* | in  $L$       2 basin (1) aequantur quadrilineo figurae duplicato, sciendum est autem in circulo, quadrilineum (2) aequant  $L$       6 EF erg. Hrsg.

2 Theorema: für eine eingehende Analyse des Theorems vgl. D. MAHNKE, *Neue Einblicke*, 1926, S. 41 f.

Aio summam omnium  $[DG]$  ad basin semper esse quadrabilem, aequarique triangulo  $BIE$ . quod ita demonstro:

Summa omnium  $BD$  ad basin complet trilineum concavum  $BIEHB$ . Summa autem omnium  $BG$  ad basin aequatur segmento  $BHE$  (quoniam ut alibi demonstratum est summa omnium  $BF = 2BG$ , ad basin, aequatur duplicito segmento  $BHE$ ). Ergo summa omnium  $DB + BG = DG$ . ad basin = trilineo concavo  $BIEHB$  + segm.  $BHE$  = triang.  $BIE$ .

Hinc habetur methodus geometrica universalis, incomparabilis, admiranda, divina, quadrandi figuram quamlibet datam, quod sic ostendo.

10 Ducatur recta  $GK$  parallela  $FE$ . Aio summam omnium  $DK$  simpliciter sive ad altitudinem, id est uti iacent, id est figuram altitudine  $BD$ . basi  $DK$ . et curva per omnia puncta  $K$  inter  $B$  et  $K$  praesens rectae  $DE$ , ducta, comprehensam aequari triangulo  $BIE$ . Nam ut demonstratu facile est, omnes  $DK$  in altitudinem aequantur omnibus  $DG$  in basin, id est, ut demonstravimus paulo ante, triangulo  $BIE$ .

15 Quare data quadam figura, quaeramus per analysin aliam figuram, in qua omnes  $DE$  seu applicatae figurae datae, faciant officium rectarum  $DK$ . Triangulum  $BIE$  figurae inventae aequabitur figurae datae  $BKKD$ .

Oportet autem figuram datam  $BKKD$  esse convexam, seu cuius applicatae sint applicatis trianguli aequae alti  $BDL$  maiores, uti patet. Quare si figura concava quadranda offeratur, 20 sumenda est convexa, seu complementum eius ad rectangulum.

Sed quid circuitionibus opus est, quid ex figuris datis novas per analysin quaerimus, cum nunc tandem praeter opinionem inciderimus in methodum non tantum generalem, sed et ita expeditam, ut ad figurae cuiuslibet datae quadraturam absolutam, non nisi tangente eius ducto opus sit.

---

1 DB L ändert Hrsg.

4 alibi: s. o. Satz 10.

Data ergo figura quadranda quacunque  $DBHE$ . ductoque tangente  $EF$ . ducatur ei parallela  $BL$ . aio triangulum  $BDL$  aequari trilineo concavo (si figura data convexa est) seu complemento ( $BIEHB$ ) figurae datae ( $DBHE$ ) ad rectangulum ( $DI$ ) vel quod idem est triangulum  $BLE =$  segmento  $BHE$ .

Demonstratio haec est: intelligatur triangulum figurae characteristicum esse  $MNE$ . cuius scilicet altitudo  $MN$  est infinitesima altitudinis figurae, triangulum hoc simile est trian-

5

496,15–17 *Nebenbetrachtung:*

NB. Data figura geometrica quadratrice figurae angulorum et omnium eius partium, datur sectio angulorum universalis. Ponatur figura ista quadratrix esse decimi gradus v. g. sursolido-surdesolido cubica etc. Ea semel in plano descripta, poterunt problemata omnia geometrica effici etiam quae sunt centesimi et millesimi, et cuiuscunque gradus altioris, et inveniri centum, et ultra si velis, mediae proportionales, cum sectio angulorum inventioni mediarum proportionalium respondeat.

Sed iam videndum si semel fieri possit, ut aequatio quae per analysin centesimi gradus esse ostenditur, reduci potest ad decimum gradum. Videtur eodem pure, quae decimi gradus reduci posse, ad primum ac secundum, et in plano exhiberi. Quo posito absolutum foret mesolabum.

$$\sqrt{10} a^{10} + b^{10} \quad \sqrt{20} a^{20} + b^{20} + 2[a^{10}b^{10}]$$

Reducatur[:] quasi extractione radicis reduci non posset, et ideo quasi esset gradus decimi. Deprimetur ergo, et reducti radix quadrata, cubica. etc. tandem deprimetur infra decimum.

NB. Si v. g. omnes altiores dimensiones reduci possunt ad aliquam certam minorem omnes radices extrahi possunt. Nam si certa illa est sexta, ergo ex aequatione sextae dimensionis extrahi potest radix quadrata. Ex aequatione octavae (!) radix cubica etc. Ergo extrahi potest radix cubica, si ex altiore, ergo et ex inferiore exaltando inferius, et postea rursus dividendo, v. g. pro valore  $\sqrt[c]{a^3 + b^3}$ . dici potest  $a$  valere  $c^4$ . et  $b$  valere  $d^4$  etc. fiet  $\sqrt[c]{c^{12} + d^{12}}$ . vel sic:  $a^3d^4 + b^3d^4, \sqrt[c]{\cdot}$ .

2 Falsa pars eorum quae sequuntur falsum[,] inquam summam omnium  $DL$  esse triangulum. Sed haec nihil derogant methodo praecedenti utique infallibili.

14 analysin | non nisi *gestr.* | centesimi  $L$       18  $a^{20}b^{20}$   $L$  ändert Hrsg.

gulo  $FDE$  per constructionem, ergo et triangulo  $BDL$ . Ergo

$$\frac{BD}{MN} = \frac{DL}{NE} = \frac{BL}{ME}.$$

Ideo primum  $BD \hat{\wedge} NE = DL \hat{\wedge} MN$ . id est  $BD$  ad basin aequantur summae omnium  $DL$ . nempe ad altitudinem, seu triangulo  $BDL$ . Nam quia omnes  $BD$  faciunt triangulum,

- 5 seu arithmeticice proportionales sunt, ideo etiam omnes  $DL$  sunt arithmeticice proportionales, ac proinde triangulo  $BDL$  continentur. At omnes  $BD$  ad basin vel  $NE$  implent complementum figurae ad rectangulum  $BIEHB$ . idem enim est, sive basi  $DE$ , sive oppositae  $BI$  applicentur. Hinc sequitur triangulum  $BLE$  aequari segmento  $BHE$ . Nam  $\nabla^{\text{lum}} BDE = \nabla BIE$ . item  $\nabla BDL = \text{compl. fig. } BIEHB$ . Ergo  $\nabla^{\text{lum}} BDE - \nabla BDL$ ,

10 seu  $\nabla BLE$  erit  $= \nabla^{\text{lo}} BIE - \text{compl. fig. } BIEHB$ , sive segmento  $BHE$ .

Figurae illae, quae hac methodo describentur, erunt vere quadratrices, cum quadratrices veterum non sint geometricae, seu describi geometricae non possint.

Experiemur rem in figura cognitae dimensionis, qualis est parabola, ubi  $BD = BF$ . Ergo et  $DL = LE$ . ergo  $\nabla^{\text{lum}} BDL$  quarta pars figurae, cum debeat esse tertia. Hinc 15 patet errorem aliquem subesse debere. Is vero in eo est, quod summam omnium  $DL$  triangulum  $BDL$  constituerem re non satis examinata.

Verissimum est summam omnium  $DL$  aequari triangulo  $BIE$ . sed haec summa non est semper triangulum, etsi summa omnium  $DB$ . sed ad altitudinem, non ad basin, triangulum sit.

---

2  $BD \hat{\wedge} ME$  (segmentum, in circulo, duplicatum) = summae omnium  $BL \hat{\wedge} MN$  (ea ergo in circulo pendet ab eius quadratura).

$$DL \hat{\wedge} ME = BL \hat{\wedge} NE.$$

11 f. Figurae . . . possint. erg. L

$DL$  autem sic investigabimus:  $\frac{DL}{DE} = \frac{BD}{DF}$ . ergo  $DL = \frac{BD \cap DE}{DF}$ . Et si curva  $BHE$  sit circulus erit

$$DL = \frac{\frac{xy}{a^2 - a + x}}{x} = \frac{x^2 y}{a^2 - ax + x^2} = z.$$

seu  $\frac{x \cap \sqrt{2ax - x^2}}{a^2 - ax + x^2} = z$ . seu  $\frac{2x^5 a - x^6}{\square, a^2 - ax + x^2} = z^2$  etc.

Inde facile haberi potest etiam  $x$ . sed quia parum credibile est liberatam iri ab irrationalitate, id linquamus. Et ad praeclarum illam methodum superiore revertamur, eique novam non absimilem, nec minus facilem universalemque adiciemus.

Ducatur recta  $DO$  perpendicularis ad  $BL$ , aio cuiuscunq; tandem generis sit curva  $BH$  summam omnium  $BK$  ad arcum semper iniri posse. Quia enim triangulum  $BOD$  simile  $\nabla^{lo} BDL$  vel  $\nabla^{lo} MNE$ , et angulus  $BDO =$  angulo  $DLB$  vel  $NEM$ , ideo

$$\frac{BD}{ME} = \frac{BO}{MN} = \frac{DO}{EN}.$$

Ergo  $BD \cap MN$ . semi quadratum maxima  $BD = BO \cap ME$ . seu  $BO$  in arcum.

$BD \cap EN$  (trilineum concavum) =  $DO \cap ME$ . semper ergo summa  $DO$  in arcum pendet a quadratura figurae et vicissim.

$BO \cap EN = DO \cap MN$ .

Recta  $DO$  producatur, dum occurrat rectae  $BI$  in  $P$ . Aio summam omnium  $BP$  ad basin semper quadrari posse. Est enim  $\nabla^{lum} PBD$  simile  $\nabla^{lo} MNE$ . et angulus  $BDP$  aequalis angulo  $NEM$ . Ergo

$$\frac{DP}{ME} = \frac{PB}{MN} = \frac{BD}{EN}.$$

---

1 f. Anderer Ansatz:

$$\frac{\frac{a^2}{x} - \frac{a^2}{2x}}{x} = \frac{\frac{a^2}{x}}{z}. \text{ Ergo } z = \frac{a^2}{x} \cap \frac{x^2}{\frac{a^2}{x} - \frac{a^2}{2x}}. z = \frac{a^2}{x} \cap \frac{2x^2}{a^2}. z = 2x.$$

14 f. vicissim. | Innumerar. dare possumus figuras quadrabiles, datis ipsis *gestr.* |  $BO \cap EN$  L  
15 f.  $DO \cap MN$ . | Sed hoc obiter, nunc ad methodum novam universalemque | aliam a priore *erg.* | quadrandi omnes figuras accedemus: *gestr.* Recta ... occurrat *gestr.* u. wieder gültig gemacht | rectae L

Ergo  $DP \wedge EN$  seu ad basin =  $BD \wedge ME$  ad arcum seu momento arcus ex vertice.  
 $DP \wedge MN = PB \wedge ME$ . seu summa omnium  $DP$  simpliciter = summae omnium  $PB$   
ad arcum.

$PB \wedge EN = BD \wedge MN$ . seu summa  $PB$  ad basin = semiquadrato  $BD$ .

5 Sed quia  $PB$  ad basin quadrabilis, ergo summa omnium  $PQ$  absolute erit quadrabilis,  
nam  $PQ \wedge MN = PB \wedge EN$ .

Ecce ergo aliam methodum universalissimam quadrandi figuram quamlibet datam, si  
quaeratur alia figura, in qua applicatae omnes figurae datae, faciant functionem rectarum  
 $QP$ .

10 Intelligi ex hoc exemplo potest, plerumque si quae lineae ad arcum basinve semper  
quadrentur, alias eius ope reperiri posse, quarum summa simpliciter semper quadretur.  
Ac totidem habebuntur methodi universales quarum singulis quadrari possunt figurae  
in universum omnes. Sed ex his tres illae methodi principales, quarum duas hoc loco,  
primam alibi dedi, ubi ostendi summam omnium  $DR$  semper quadrari posse; videntur  
15 suffecturae, saltem ut se mutuo examinent vitandi erroris calculi causa. Cum alioquin  
vel unica earum sit suffectura ad problemata in universum omnia resolvenda.

3 f. arcum. | Sed haec obiter, nunc tandem *gestr.* |  $PB \wedge EN$  L 10–16 Intelligi ... resolvenda.  
erg. L

---

6 nam  $PQ \wedge MN = PB \wedge EN$ : Diese Begründung ist falsch, anstelle davon müsste es vielmehr  
 $\frac{PQ}{ME} = \frac{PB}{EN}$  heißen. 14 alibi dedi: s. o. Prop. 6,12; die allgemeine Aussage steht N. 28 S. 503 Z. 24 f.

## 28. TRIANGULUM CHARACTERISTICUM ELLIPSIS

[Sommer 1673]

**Überlieferung:** L überarbeitetes Konzept: LH 35 XIII 1 Bl. 359–360. 1 Bog. 2°. ca 3. S.

— Von Bl. 359 ist die obere äußere Ecke abgerissen, hinzu kommen drei kleinere Ausrisse am oberen Rand, dadurch geringfügiger Textverlust. Von Bl. 360 fehlt außen ein Streifen von ca 9 cm Breite, zudem ist ein trapezförmiger Teil von ca 11 x 18 cm herausgerissen. (Möglicherweise sind die zwei Stücke beieinandergeblieben.) — Überschrift ergänzt, verschiedene spätere Zusätze, unter Fig. 1 Fragment einer Bleistiftzeichnung, weitere isolierte Betrachtungen. Textfolge: Bl. 359 r°, Bl. 359 v° oben. Bl. 360 v°, interlineare Zusätze = Teil 1; separate Zusätze in der Mitte der Doppelseite 360 v°/360 r° = Teil 2; Bl. 359 v° Rest und Bl. 360 r° = Teil 3; isolierte Betrachtungen auf Bl. 360v° sowie Bl. 359 v° und 360 r° = Teil 4.)

Cc 2, Nr. 548

5


10

15

Datierungsgründe: In dem vorliegenden Stück wird das ursprünglich am Kreis gefundene charakteristische Dreieck auf die Ellipse angewandt. Die Studie ist demnach etwas später als N. 21 und N. 23 verfasst; sie setzt die Betrachtungen von N. 26 und N. 27 fort. Die beiden nächsten Nummern, N. 29 und N. 30, sind jeweils unmittelbare Folgestücke.

[Teil 1]

Triang. characteristicum ellipsis



[Fig. 1]

20

Character ellipsis: Si quae⟨libet contin⟩gens product⟨ae ellipseos dia⟩me⟨tro cuicumque occurrat,⟩ atque a puncto contactus  $B$  ad eandem diametrum recta  $B\langle E$  ordinatim ap⟩plicetur, er⟨it rectangulum sub⟩ diametri portionibus  $AE$ .  $EF$  a centro  $F$  per contingentem  $AB$  applicatamque  $BE$  abscissis, semidia⟨metri quadrato aequale.⟩

5  $CF = a$ .  $EF = b$ . Iam  $EB = \sqrt{R^2 a^2 - b^2}$   $\wedge \beta$ . Omnis enim ⟨— —⟩ habet rationem quandam certam ad sinum cuiusdam circuli, quae ratio sit  $\beta$ . et radius illius ⟨— —⟩

P r o p. 1. Iam ⟨— —⟩ ergo  $\frac{CF \square}{EF} = AF$ . ergo summa  $AE$ . seu  $AF - EF$ . pendet a spatio hyperbolico quia summa  $EF$  quadra⟨— —⟩

Ducatur ⟨trian⟩gulum characteristicum inassignabile  $BGH$ . simile ipsi  $ABE$ . ita 10 ut  $HB$  sit portio inassignabilis curvae,  $HG$  portio infinite parva altitudinis,  $BG$  portio infinite parva basis. Comparatio haec erit:  $\frac{AE}{GH} = \frac{AB}{BH} = \frac{BE}{BG}$ . Hinc propositiones transformatoriae.

P r o p. 2.  $AE \wedge BH = AB \wedge GH$ . applicatae spatii hyperbolici translatae ad curvam, aequaliter summae tangentium ellipseos.

15 P r o p. 3.  $AE \wedge BG = BE \wedge GH$ . seu applicatae hyperbolicae ad basin, quadrantis elliptici (quarum summa aliunde facile haberi potest, cum haberetur si basis  $FI$  esset =  $CF$ . seu si ellipsis esset circulus, ut alibi ostendimus summam secantium circuli in basin aequari radio in arcum; et ideo sufficit hoc productum

7 Zu summa  $AE$ : Male. Summa omnium  $AF$  est spat⟨— —⟩

1–4 Bezeichnungen erg. L; Textverlust erg. Hrsg. nach de Witt. 6 et radius illius ⟨— —⟩ erg. L  
 7  $\frac{CF \square}{EF} = (1) AE. (2) AF. L$  7 summa AE. | seu  $AF - EF$ . erg. | (1) est (a) hyperbola (b) spatium hyperbolicum (2) pendet L 8 quia summa  $EF$  quadra⟨— —⟩ erg. L 10 sit portio (1) minima (2) inassignabilis L 18 circuli erg. L

1–4 S. J. de WITT, *Elementa curvarum linearum*, 1659, Buch I Satz 18, DGS II, S. 224.  
 3 portionibus  $AE$ .  $EF$ : Anstelle von  $AE$  müsste es  $AF$  heißen. Leibniz hat das Versehen in Z. 7 korrigiert. Er hat die Verbesserung allerdings nur dort vorgenommen. Dadurch werden alle Betrachtungen, in welche diese Beziehung eingeht, falsch. 17 alibi ostendimus: N. 27, prop. 1. 18 sufficit: Diese Aussage ist unzutreffend.

multiplicari per  $\beta$ . rationem applicatae ellipticae ad circularem, idemque haud dubie hic provenit), aequantur portioni ellipticae  $CBE$ .

P r o p. 4.  $AB \cap BG = BE \cap BH$ . seu tangentes ellipticae ad basin, aequantur momento arcus ex altitudine. Si ergo summa inveniri potest tangentium ellipticarum, ad basin, haberi potest superficies sphaeroeidis circa altitudinem, adde 5 prop. 5. (pendet ex q. circ.)

$$\nabla^{\text{la}} \text{ similia: } BGH \text{ et } BEK. \text{ Ergo: } \frac{BK}{BH} = \frac{BE}{GH} = \frac{EK}{BG}.$$

P r o p. 5.  $BK \cap GH = BE \cap BH$ . Summa perpendicularium ad altitudinem scilicet, aequatur momento arcus ex altitudine.

C o r o l l. Ergo summa perpendicularium ad altitudinem aequatur summae tangentium ad basin, adde prop. 4. et 10. (pendet ex q. circ.). 10

P r o p. 6.  $BK \cap BG = EK \cap BH$ . Perpendiculares ad basin aequantur intervallis perpendicularium et applicatarum in altitudine, ad arcum (proportionalibus  $EF$  ad arcum seu momento arcus ex basi). Ergo  $CE$  ad curvam pendent ex momento arcus ex basi (pendet ex q. hyp.). 15

P r o p. 7.  $BE \cap BG = EK \cap GH$ . Sinus seu applicatae ellipticae ad basin (quae figura quaadrarri potest, ut in sinibus circuli ad basin ostendi), aequantur intervallis applicatarum et perpendicularium in altitudine ad altitudinem.

C o r o l l. 1. Ergo summa intervallorum applicatarum et perpendicularium in altitudine, quaadrarri potest. 20

C o r o l l. 2. Ergo etiam quaadrarri potest summa omnium  $KF$  seu intervallum perpendicularis a basi, in altitudine sumtorum.

C o r o l l. 3. Et summa omnium  $CK$ .

NB. Sinus ad basin in omni figura sunt quadrabiles. Ergo et semper summa omnium  $EK$ . Hinc sequeretur ad quadrandam figuram datam, nihil aliud opus esse, quam aliam 25

6 (pendet ex q. circ.) erg. L 8f. ad altitudinem scilicet erg. L 11 (pendet ex q. circ.) erg. L  
 13–15 (proportionalibus ... q. hyp.) erg. L 17 ad basin erg. L 18 in altitudine erg. L  
 22f. sumtorum. (1) C o r o l l. 3. Ergo et summa omnium BM (2) C o r o l l. 3. L 24–504,2 NB.  
 Sinus ...  $\frac{BE^2}{2}$ . erg. L

17 ostendi: N. 27, prop. 12.

quaerere, in qua applicatae figurae datae faciant functionem  $EK$ . Summa omnium  $EK$ ,  
a  $C$  usque ad  $E = \frac{BE^2}{2}$ .

$$\nabla^{la} \text{ similia: } ABK \text{ et } BGH. \quad \frac{AK}{BH} = \frac{AB}{GH} = \frac{BK}{BG}.$$

P r o p. 8.  $AK \wedge GH = AB \wedge BH$ . Iam  $AK = AE + EK$ . Et summa omnium  
5  $AE$  est spatium hyperbolicum per prop. 1. Summa omnium  $EK$  est quadrabilis  
prop. 7. coroll. 1. Ergo

C o r o l l. Figura omnium tangentium ad arcum, pendet a quadratura hyperbolae.

Restat quaerenda summa omnium  $EK$  ad basin. Ea autem pendet a q. ellipseos quia  
10 proportionalis summae omnium  $EF$  ad basin, ut alibi ostendam ex iis quae Schoten. ad  
Cart. p 245. Ergo summa omnium  $CE$  ad basin pendet ab eadem.

P r o p. 9.  $AK \wedge BG = BK \wedge BH$ . Ergo secantes ex perpendiculari ad basin,  
aequantur perpendicularibus ad arcum, adde prop. 14.

P r o p. 10.  $AB \wedge BG = BK \wedge GH$ . habuimus prop. 5. coroll.

$$15 \quad \nabla^{la} \text{ similia: } BLM \text{ et } BGH. \quad \frac{BL}{BH} = \frac{BM}{GH} = \frac{LM}{BG}.$$

P r o p. 11.  $BL \wedge GH = BM \wedge BH$ . Summa tangentium complementi elliptici ad  
altitudinem, aequatur figurae sinuum complementi ellipticorum ad arcum, seu  
momento arcus elliptici ex basi.

C o r o l l. Hac ergo summa opus est, ad inveniendam superficiem sphaeroeidis  
20 circa basin voluti.

10 *Unter ostendam: NB.*

6 prop. 7. coroll. 1. erg.  $L$  9–11 Restat quaerenda ... ab eadem. erg.  $L$  13 arcum (1).  
C o r o l l. 1. Ergo aequantur momento arcus ex altitudine, per prop. 5. (2). C o r o l l. 1. Ergo aequantur  
summae tangentium ad basin, prop. 5. coroll. 1. (3) Corollarium (4), adde prop. 14.  $L$  16f. ad  
altitudinem erg.  $L$

10f. Schoten.: *Commentarii*, DGS I S. 245.

P r o p. 1 2.  $BL \cap BG = LM \cap BH$ . Tangentes complementi elliptici ad basin, aequaliter quantur intervallis applicatarum basis, et tangentis in basi assumtis, ad arcum.

P r o p. 1 3.  $BM \cap BG = LM \cap GH$ . Seu sinus complementi ad basin (= quadrilineo figurae  $FCBM$ ) aequaliter quantur summae intervallorum applicatarum basis et tangentis in basi assumtorum, ad altitudinem.

5

C o r o l l. Horum ergo summa pendet a dimensione figurae.

P r o p. 1 4. Figura perpendicularium ad arcum, aequatur trilineo  $CBK$  portione altitudinis  $CK$ , maxima perpendiculari  $BK$ , et curva  $CB$  comprehenso, duplicito, ablata portione  $CHB$ , aequatur ergo quadrilineo  $KCBN$ .

C o r o l l. Ergo figura perpendicularium ad arcum pendet a figurae quadratura.

10

C o r o l l. Quemadmodum et figura secantium ex perpendiculari, ad basin per prop. 9.

P r o p. 1 5. Si curva in partes notae progressionis (ut aequales, continue crescentes uniformiter etc.) secta, fieri potest, per naturam figurae datae, ut series perpendicularium in ea quoque ratione crescat, quae in progressionem chordarum curvae ducta, sit capax summationis; tunc data dimensione arcus datur area figurae et vicissim.

15

$\langle \dots \rangle$ s recta quaedam  $\langle \dots \rangle$   $\langle \dots \rangle$  am  $\langle$ perpendi $\rangle$ culariter cuius omnia puncta iacent in eodem plano; et recta quoque in eodem semper plano cum curva maneat, aream zonae productae, ex data curvae area invenire. Problema satis difficile.

20

7 Zu P r o p. 1 4. §. adhuc ab interiecta  $\nabla^{la}$ , videndum an illa nullius considerationis.

9 ablata portione ...  $KCBN$ . erg.  $L$  12 f. prop. 9. (1) Prop. 15. Si (a) series (b) progressionis perpendicularium ad eam speciem redigi potest, in qua ducta basis | seu terminus maximus erg. | in certam partem altitudinis | producit summam *gestr.* | seu numeri terminorum, producit summam ut sit in applicatis (aa) hyperboloei (bb) paraboloidum, poterit haberi dimensio curvae, data dimensione figurae, et vicissim. C o r o l l. Ergo si qua sit figura eius naturae, ut perpendicularis (aaa) ex curva (bbb) ad curvam, inde ductae ad altitudinem sint progressionis (aaaa) hyper (bbbb) paraboloidum. (2) P r o p. 1 5.  $L$  13 partes (1) aequales secta, perpendicularares sunt in (2) notae  $L$  16 datur (1) di (2) series (3) area  $L$  20–506,1 difficile. (1) P r o p. 1 5. [sic!] Quotiescunque in figura quadam contingit, ut quoconque assumto curvae punto E. (a) ea sem (b) eadem semper ratio sit (2) Nota perpendicularis  $BK = (3)$  Perpendicularis  $L$

Perpendicularis  $BK \square = [CF \square - EF \square, \beta^2 + EK \square.]$

$\nabla^{la}$  similia:  $ABE$  et  $BLM$ .

$$\frac{AB}{BL} = \frac{AE}{BM} = \frac{BE}{LM}.$$

$$AB \hat{=} BM = AE \hat{=} BL.$$

$$\frac{AB}{BK} = \frac{AE}{BE} = \frac{BE}{EK}.$$

$$AB \hat{=} BE = AE \hat{=} BK.$$

5       $AB \hat{=} LM = BE \hat{=} BL.$

$$AB \hat{=} EK = BE \hat{=} BK.$$

$$AE \hat{=} LM = BE \hat{=} BM, \text{ quadrabilia.} \quad AE \hat{=} EK = BE \square, \text{ quadrabilia.}$$

Iam  $CF \square = AE \hat{=} EF$ . Ergo  $\frac{CF}{AE} = \frac{EF}{CF}$ . vel  $\frac{CF}{EF} = \frac{AE}{CF}$ .

Ex hoc dato iam quaeratur ratio alia triangula similia construendi, quae non ex generali natura omnium figurarum, sed ex speciali ellipseos pendeant. Quod fit inveniendo

10     aliam rationem quae sit  $\frac{CF}{EF}$  vel  $\frac{AE}{CF}$ .

Ducatur linea  $CP$  parallela  $AL$ . manifestum est  $\frac{AE}{CF} = \frac{AB}{CP} = \frac{BE}{[PF]}$ . duo triangula rectilinea. Hinc iam  $\frac{CF}{EF} = \frac{AB}{CP} = \frac{BE}{[PF]}$ . item  $\frac{CF}{EF} = \frac{AE}{CF} = \frac{AB}{CP}$ . item  $\frac{CF}{EF} = \frac{AE}{CF} =$   
 $\frac{AB}{[PF]}$ .

Totidemque construi possunt triangula similia quanquam non sint omnia futura rectilinea. Erunt tamen quaedam rectilinea et videndum quaenam ex illis futura sint similia  
15      $\nabla^{lo}$  characteristico.

Quaerendum est quoddam triangulum characteristico simile cuius unum latus sit perpetuum, sive id sit latus rectum, sive transversum etc., sive distantia focorum.

1  $CF \square + CE \square, \beta^2 + CK$ . L ändert Hrsg.

7f.  $\frac{AE}{CF}$ .

(1) Ergo si super recta  $CF$  erigatur  $\nabla^{lum}$

cuius altitudo  $CF$  quadratum (2) Ex L 11–13 PM L ändert Hrsg. dreimal 11f. duo triangula rectilinea erg. L 14f. sint | omnia erg. | futura (1) rectangula (2) rectilinea L 15 sint (1) aequalia (2) similia L 17 characteristico simile erg. L

---

11 Ducatur: Die Linie  $CP$  hat Leibniz in der Figur nicht ausgeführt. Die Punktbezeichnung  $P$  tritt in der Figur in anderer Funktion auf.

[Teil 2]

$\langle \dots \rangle \langle m \rangle$ edia proportionalis inter  $EK$  et  $KA$ . id est inter  $EK$  et  $E \langle \dots \rangle$

$\langle \dots \rangle Rq EK \square + AE \wedge EK$ .

$\langle \dots \rangle \langle \dots \rangle EK \square + BE \square$ .

Investigandus est locus omnium  $BK$ . altitudini applicatorum, seu locus  $Rq EK \square + BE \square$ . Videndum ad non  $BP$  fieri debeat radius. Pro  $BE \square = \frac{a^2 - EL \square}{\gamma}$  fiet  $BK = Rq EK \square + \frac{a^2 - EL \square}{\gamma}$ . ratio autem  $EK \square$  ad  $\frac{EL \square}{\gamma}$  semper eadem  $\delta$ . et ideo  $EK \square = \frac{EL \square}{\delta \gamma}$ . fiet:  $\frac{a^2}{\gamma} - \frac{EL \square}{\delta \gamma - \gamma}$  [sic!].

$$\frac{AK}{AB} = \frac{AB}{AE} = \frac{BK}{BE}.$$

$$AK = \frac{AB \square}{AE} = \frac{AE \square + BE \square, \wedge EF}{CF \square}. \quad EK = \frac{AE \square + BE \square, \wedge EF}{CF \square} - \frac{CF \square}{EF}.$$

$$\frac{CF \square \square}{EF \square} + \beta CF \square - AF \beta \square = AB \square = AK \wedge AE.$$

$$AK \square - AB \square = BK \square. \quad AB \wedge BK = AK \wedge BE. \quad BK = \frac{AK \wedge BE}{AB}.$$

NB. Haberi potest summa quadratorum omnium  $EK$  (quippe pyramis) et omnium  $EB$ . ergo et omnium  $KB$ .

$$3 \ AE \wedge EK. | = \frac{CF \square}{\beta}. \text{ Erit ergo } \langle \dots \rangle \text{ gestr.} | L \quad 4 \ BE \square. | \langle \dots \rangle \frac{CF \square}{EK \beta}. | \text{ Ergo nicht gestr.} | \langle \dots \rangle \frac{\langle \dots \rangle F}{Rq \beta}. \text{ absurdum } \langle \dots \rangle \text{ enim omnes } BE =^{\text{les}} \text{ gestr.} | L \quad 5 \ | \text{ Latus transversum q. rectum r. Ergo } \frac{EK}{EF} = \frac{r}{q}. \text{ Ergo } EK = \frac{r \wedge EF}{q}. \quad \frac{EK \wedge q}{r} = EF. \text{ gestr.} | \text{ Investigandus } L$$

2–4 Trotz des Textverlustes ist die Rechnung klar: Leibniz berechnet die Größe  $BK$  auf zweierlei Weise. Aufgrund der (irrigen) Beziehung  $CF \square = AE \wedge EF$ . folgt dann ein absurdes Ergebnis, worauf Leibniz streicht und nur die (richtigen) Ausgangsformeln stehen lässt. 5 Die folgende Betrachtung leidet unter Rechenfehlern und unklarer Bezeichnungsweise; sie wird von Leibniz ergebnislos abgebrochen. 11 Leibniz verwendet hier bei der Quadratbildung keine Klammern;  $AF$  ist eine Verschreibung für  $EF$ .

NB.  $BK$  ad  $BP = EK$  ad  $EF$ . Ideo porro  $EK$  semper ad  $EF$  eandem habet rationem, quae est lateris recti ad transversum. Ergo tum summa omnium  $EK$  ad summam omnium  $EF$  erit ut latus rectum ad transversum, verum etiam momentum curvae ex altitudine ad momentum curvae ex basi, ergo dato uno dabitur alterum, seu data quadratura circuli dabitur q. hyp. et vicissim, imo et sectio angulorum universalis. Imo error habeo tantum perpendicularium ad basin summam ad altitudinem. Non summam eorum ad basin.

Haberi possunt et omnia  $AE$  in  $EK$  id est quadrata  $\frac{CF\square}{EF} \hat{\sim} EK$ . id est  $CF\square$  multiplicata per rationem lateris recti ad transversum. Ergo habemus et  $\square^{\text{ta}}$  omnium  $AB$ .

Ex prop. 6 hanc consequiam duco: cum perpendicularis super altitudinem ad basin, sit =  $EK$  ad arcum, et  $EK$  ad arcum sit ad  $EF$  ad arcum, ut latus rectum ad transversum, et  $EF$  ad arcum = perp. super basin, ad axem, ergo perpendicularis super axem ad basin, ad perpendiculararem super basin ad basin, seu  $BK$  ad  $BP$  ut latus rectum ad transversum: confirmatio priorum.

Summa omnium  $BP$  ad altit. = omnibus  $MP$  ad arcum (ob  $\nabla BMP$ ).

Ad p r o p. 8. Cum autem sit  $\frac{AE}{BM = EF} = \frac{AB}{BL} = \frac{BE}{LM} = \frac{CF\square}{EF\square}$ . quia  $AE = \frac{CF\square}{EF}$ . hinc multae possunt consequiae duci. Primum  $EF\square$  ad arcum quadrari pot-

1f. *Zusätzlich daneben in größerer Schrift:* NB.

4f. *Daneben:* Error

18–509,1 *Darüber:* Dubito; *zusätzlich daneben:*  $\mathfrak{A}$ .

6 perpendicularium | hyp. *gestr.* | (1) relationem (2) ad basin  $L$       11 cum (1) perpendicularium super altitudinem summa (2) perpendicularis  $L$       14 super (1) axem ad altitudinem, ut (2) basin  $L$   
18–509,1 Primum |  $EF\square$  ... spatium hyp. *gestr.* und wieder gültig gemacht | Quod  $L$

17 Ad p r o p. 8.: Die folgende Betrachtung ist nur teilweise richtig.

est, nam  $EF$  ad arcum est, spatium hyp. Quod si ducantur in  $EF$  triangularia, quadratur, cum habeatur eius momentum, modo per rationem  $CF$  ad  $FL$  multiplicetur.  $CF \square$  autem ad arcum est superficies cylindrica elliptica ducta in  $CF$ . Hoc verum constet, si momentum applicatarum spatii hyperbolici sit ex diametro coniugata, quod probabile puto, cum decrescat momentum cum applicata. Sin minus  $EF$  in arcum saltem pendebit ex q. hyp. sed credibilior quadrabilitas, quia Hug. pag. 78. iunct. pag. 77. satis explicare videtur  $EF$  in arcum pendere ex hyperbola pag. 78. descripta. Eius autem momentum cum applicata decrescens est ex summitate eius  $E$ . id est ex diametro coniungata.

$CF \square$  ad altitudinem, ut et  $EF \square$  ad altit. quadrabilia.  $CF \square$  ad basin quadrabilia,  $EF \square$  ad basin non sunt quadrabilia, sed pendent ex q. circ.


NB. Cavendum, neque enim ratiocinandum est ad rationum summas.


[Teil 3]

Ex prop. 4. et 5. habemus duas methodos universales: cuicunque superficie curvae ex revolutione genitae, exhibere planam aequalem. Et nunc utilius est tangentes ad basin, nunc perpendiculares ad rectam exhibere, prout scilicet figura quae oritur simplicior aut tractabilior est, appareat autem figurae illas quanquam heterogeneas esse inter se aequales. Hinc cuilibet opinor figurae dari potest heterogenea aequalis. Et vicissim ut arbitror cuilibet planae aequalis superficies curva, investigando scilicet locum eiusmodi applicatarum ad altitudinem transformatarum in perpendicularares, et applicatarum ad basin transformandarum, in tangentes.

7 videtur (1) spatium (2) momentum (3)  $EF L$  10 f. circ. (1) Hinc summa omnium (2) NB.  $L$  11 summas. |  $EK$  sic exprimi debet, vide Schoten. p. 245 ad Cartes.: EK (1) =  $LMC$  (2)  $LM = PM$  ex fig. Schoten.) gestr. |  $L$  13 (1) Notandum est cum duos invenerim modos (2) Ex  $L$  18 cuilibet (1) rectae (2) curvae ae (3) planae  $L$

6 Hug.: Chr. HUYGENS, *Horologium oscillatorium*, 1673, S. 77 f. (HO XVIII S. 215–221).  
10  $EF \square$  ad basin: Auch diese Beziehung ist im Sinne von Leibniz quadrierbar. 22 vide: s. Fr. v. SCHOOTEN, *Commentarii*, DGS I S. 245, s. a. oben S. 504 Z. 10 f. Leibniz bezieht sich auf folgende Figur:





[Fig. 2]

Vicissim cum infiniti assumi possint axes, circa quos aliqua curva data agi intelligatur non est dubitandum, quin ab una qualibet linea curva describi possint, et fortasse complures superficies, in circulos commutabiles, ut curva [ac] agi potest circa axem ab et bc, et ad et cd. Imo et ae et ec, et af et cf.

Nota autem si duo axes paralleli sibi oppositi sint, ita, ut circa unum ut ab describatur superficies curva concava, circa alterum ut ec superficies curva convexa; momenta sibi mutuo complemento esse ad superficiem curvam cylindricam cuius basis curva ac, altitudo, ipsa ae distantia parallelorum axium [ab et ce. Nota.

Cuius rei haec demonstratio est. Quoniam enim cuiuslibet arcus infinite parvi ut i, momentum ex ab est ipsa recta ig seu distantia ab axe librationis, in arcum cuius momentum quaeritur, ducta, vel quod idem est, ei perpendiculariter imposta; et vicissim

3 qualibet | linea erg. | curva (1) | inf gestr. | occurrere (2) describi L      4 ad L ändert Hrsg.  
6 paralleli erg. L      9 ab, et N. L ändert Hrsg.      10 cuiuslibet (1) exigui (2) arcus L

1 [Fig. 2]: Zu dieser Figur hat Leibniz eine Vorform gezeichnet. Diese ist gänzlich in der endgültigen Figur enthalten; sie wird deshalb nicht gesondert wiedergegeben.

momentum arcus  $\underline{i}$ , ex axe librationis  $\underline{ec}$  est recta  $\underline{ih}$ . arcui imposita. Apparet autem ubique punctum  $\underline{i}$  sumatur semper  $\underline{gi} + \underline{ih} = \underline{ae}$ . Ergo summa omnium  $\underline{gi} + \underline{ih}$  arcui impositorum seu summa utriusque momenti eiusdem arcus tam ex recta  $\underline{ab}$  quam ex opposita  $\underline{ec}$ . erit summa omnium  $\underline{ae}$ , arcui eidem impositorum, seu superficies cylindrica cuius basis curva  $\underline{ac}$ . altitudo recta  $\underline{ae}$ .

5


Hinc sequitur dato momento curvae ex recta  $\underline{ab}$ . et data recta curvae aequali, haberi etiam ex recta  $\underline{ec}$ . Item patet, si summa momentorum ex  $\underline{ab}$  et ex  $\underline{ec}$  habeatur, habitum iri, quicunque alii axes v. g.  $\underline{ad}$ .  $\underline{df}$  assumantur, semper enim erunt istae summae, ut axes. Ideo innumeritas figurarum heterogenearum aequales hac methodo rursus habebimus. Hinc etiam methodi innumeratae investigandi quantitatatem ipsius curvae, sive possunt infinita exhiberi spatia a quorum quadratura curvae ipsius extensio pendeat.

10

Nec proinde desperandum, ex infinitis methodis occurrere posse unam pluresve in unaquaque curva, quibus incidatur in spatium quadrabile, quo proinde rectae aequalis curva exhibeat.

Hinc illud quoque apparet summam omnium perpendicularium  $\underline{kl}$  ad altitudinem seu axem  $\underline{ab}$ , aequari ipsi  $\underline{ae}$  in totam curvam. Quod aliter quoque ac simplicius sic demonstratur:

15



[Fig. 3]

2 f.  $\underline{ih}$  | arcui impositorum erg. | (1) erit summa omnium  $\underline{ae}$ , seu (2) seu  $L$       8 f. ut (1) axis  $\underline{ab}$  ad axem (2) axes. Ideo (a) si quando haberi possit (b) innumeratas  $L$       15 f. altitudinem | seu axem  $\underline{ab}$  erg. | , aequari (1) omnibus  $\underline{hg}$  (2) ipsi  $\underline{ae}$  in | totam erg. | curvam.  $L$

Ducta ad curvam perpendiculari *kil* per punctum datum *i* inter duos axes parallelos *ab*, *ec* intercepta, et tangentis *mn* producta utcunque, rectangulum sub parte eius *mn* cadens in duas perpendicularares ad axem utrumque, *ep*, *eo*, et distantiam axium, *ea*, aequatur rectangulo sub distantia perpendicularium tangentis partem absconditum et 5 perpendiculari ad tangentem. Idem nulla facta curvae mentione lemmate pulcherrimo sic enuntiabitur: Si duea rectae (*mn* et *kl*) secent ad angulos rectos; et unaquaeque earum cadere intelligatur inter duas parallelas, (*mn* inter parallelas *ep*, *eo*, decussatim *kl* inter parallelas *ec*, *ab*), sintque parallelae unius perpendicularares ad parallelas alterius, ductis rectis in distantias parallelarum; altera in distantiam parallelarum alterius, rectangula 10 producta erunt aequalia inter se.

Ostendendum est  $EA \wedge MN = KL \wedge PO$ . quod fiet si ostendemus  $\frac{EA}{PO} = \frac{KL}{MN}$ .

Id vero ita ostendo[:]:  $\nabla^{la} NQM$  et  $KRL$  similia sunt, nam angulus  $LKR$   $\nabla^{li}$  orthogonii  $KRL$  idem angulo  $QKE$   $\nabla^{li}$  orthogonii  $KEQ$ , at idem angulus  $QKE$  aequalis angulo  $MNQ$  vel  $INQ$ , quia haec duo  $\nabla^{la}$  rectangula  $NIQ$  et  $KEQ$  habentia unum 15 angulum non rectum communem,  $KQE$ , habebunt alteros  $EKQ$  et  $INQ$  aequales. Ergo anguli  $INQ$  vel  $MNQ = QKE$  vel  $LKR$ . ac proinde in duobus triangulis orthogoniis  $MQN$ ,  $KRL$  duo anguli non recti  $LKR$  et  $MNQ$  aequales, triangula ergo similia sunt.

1 (1) Esto tangens curvae *mn*, perpendicularis (*a*) inter (*b*) ad tangentem (*aa*) per (*bb*) in ipso contactus punto, inter duos axes parallelos ducta *kl*. (2) Ducta | ad curvam *erg.* | perpendiculari *kil* (*a*) inter duos axes *ab* et *ec* intercepta, et ex punctis *kl* ductis | intra duos axes *erg.* | parallelis et aequalibus ipsi *ea*, nempe *ema* et *ena*. (*b*) per *L* 2 utcunque, (1) pars eius (*a*) incidet (*b*) incidens (2) rectangulum *L* 3 utrumque, | *ep*, *eo*, *erg.* | (1) ducta in (2) et *L* 6 *el* *L ändert Hrsg.* 7 *en*

*L ändert Hrsg.* 8 alterius, (1) rectangula sub recta una et distantia parallelarum alterius | rectae *gestr.* | (2) ducta recta (*a*) una in al (*b*) qualibet (3) ductis *L* 12 sunt (1), cum sint rectangula, et praeter angulum rectum, habeant alium quoque aequalem. (2). Nam |  $\nabla$  *erg.* | (a) *QSN* simile  $\nabla^{lo}$  (*b*) *QMN* simile  $\nabla^{lo}$  | et *gestr.* | *QSN* | simile *gestr.* | et hoc  $\nabla^{lo}$  (*aa*) *QKN*, cum sint  $\nabla$  rectangula, et habeant (*bb*) *QKE*. et hoc  $\nabla^{lo}$  *LKR*. Sunt enim omnia rectangula angulum (*aaa*) comm (*bbb*) *LKR* praeter rectum habentia communem. Igitur angulus *RLK* = angulo (3), nam | in  $\nabla^{lo}$  rectangulo *KEQ* *erg.* | angulus *KQE* = angulo | trianguli rectanguli *LKR* *erg.* | *KLR*. ergo angulus (*a*) *SNQ* (*b*) *QKE* eiusdem  $\nabla^{li}$  | *QKE* *erg.* |= angulo *RKL*. trianguli rectanguli *LKR*. (4), nam *L* 14 *MNQ* (1) trianguli orthogonii *NQM* (2) vel *L*

11 Ostendendum: Ab hier wechselt Leibniz die Bezeichnungsweise und geht zu Großbuchstaben über. Gelegentlich vorkommende Kleinbuchstaben werden vom Hrsg. normalisiert.

Ideo ut est  $KL$  ad  $MN$ , ita  $RL = EA$  ad  $MQ = PO$ . Ergo  $\frac{EA}{PO} = \frac{KL}{MN}$ . ac proinde  $EA \cap MN = KL \cap PO$ . Quod erat demonstrandum.

Est et alterum theorema longe facilius demonstratu[:] nempe tangentem  $MN$  productam  $ST$  dum duabus parallelis  $AE, BC$  occurrat in  $S$  et  $T$ . ductam in  $MQ$ , intervallum duarum parallelarum  $EP, EO$  aequari semper intervallo alterarum parallelarum  $EA, CB$ , nempe  $AB$  in  $MN$ . Quod si intervallum  $PO$  sit infinite parvum  $MN$ , erit portio arcus infinite parva. Ducta enim  $SU$ , patet  $\nabla^{la} SUT$  et  $MNQ$  esse similia. Hinc  $\frac{ST}{MN} = \frac{SU}{MQ} = \frac{UT}{NQ}$ . Ergo  $ST \cap MQ = SU \cap MN$ . ut habuimus. Item  $ST \cap NQ = UT \cap MN$ . item  $SU \cap NQ [= UT \cap MQ]$ .

NB. Omnia  $UT$  in arcum quadrari possunt, videndumque quodnam id sit figurae genus.

$\frac{KL}{MN} = \frac{KR}{NQ} = \frac{RL = EA}{MQ}$ . Ergo  $KL \cap NQ = KR \cap MN$ . perpendicularis in basin =  $KR$  in arcum. Item  $KL \cap MQ = EA \cap MN$ . habuimus, denique  $EA \cap NQ$  distansia basium in altitudinem =  $KR$  in basin. Haec ergo figura curva semper quadrabilis, quae orta ex omnibus  $KR$  ad basin. Ex hoc principio licet infinitas figurae curvilineas quadrabiles, quae tamen parboleides non sunt, comminisci, quemadmodum paulo ante

5

15

12–14 *Dazu auf der Gegenseite, mit dem Zusatz minime versehen und gestrichen:* Si in aliqua figura contingeret, ut perpendicularis ad basin, et ad altitudinem summar posset, posset et summar perpendicularis ad arcum, quia adiuncta recta quadam, summaretur perpendicularis in rectam illam ducta, ad basin + perpendicularis in rectam illam ducta, ad altitudinem. Ergo perpendicularis in rectam illam, in quadratum basis, item, in quadratum, altitudinis. Ergo in quadratum arcus. Productum dividatur per illam rectam. Erat quotiens perpendicularis in arcum. Hinc duco regulam generalem memorabilem. Si ex his tribus parte (inassignabili) basis, altitudinis, arcus summar possunt rectae quaedam assignabiles in duas horum, summar poterunt et in tertium.

4 ductam in (1)  $MN$ , portionem tangentis a duabus parallelis  $EP, EO$  abscissam (2)  $MQ$   $L$   
 5 alterarum erg.  $L$  6  $EA, CB$ , nempe erg.  $L$  8 Hinc (1) intervalla parallelarum (2) portio tangentis  
 inter parallelas in (3)  $\frac{ST}{MN} L$  9f.  $NQ$ . | Ergo NB. ändert Hrsg. | NB. Omnia  $L$  19 posset, (1)  
 daretur quadratura circuli (2) posset  $L$

infinitas superficies curvilineas truncatas quadrabiles. Ergo methodus ex qualibet figura curvilinea data exhibere aliam quadrabilem.

Ex his patet etiam semper quadrata omnium [KL] summari posse, quia semper summari possunt puto □<sup>ta</sup> omnium KR. et omnium RL. quae semper eadem. Ergo 5 eorum momenta habentur seu cylindri eorum revolutione circa CB facti. Quod satis memorabile. Imo puto esse falsum.

Nota si momenta summentur ex duobus diversis axibus in uno puncto concurrentibus haberi potest linea recta in quam cadat centrum gravitatis, si hoc adhuc alia vice, habebitur in linearum intersectione centrum gravitatis, quo reperto habebitur dato momento 10 curva quaesita.

Nota porro: lineam illam haberi posse etsi non quadratura, modo ratio tantum haberetur, v. g. si duae essent ellipses.

Quando quadratum arcus consideratur omnia redduntur facillima, quia illud quadratum, componitur ex quadratis basis et altitudinis minimae. Ideo quorum quadrata 15 applicantur ad arcum, idem est ac si eorum quadrata applicarentur ad quadrata basium minimarum separatim, et ad quadrata altitudinum minorum separatim. Idem est de omnibus ductibus, ad arcum applicatis, componuntur enim ex iisdem ductibus ad arcum, et iisdem ductibus ad basin. Ideo v. g. sinus ad arcum, ducti in radium ad arcum, aequantur radio in sinum ad altitudinem, auctam radio in sinum ad basin.

---

1f. *Daneben in größerer Schrift: NB. NB.*

18f. *Dazu am oberen Rande, gestrichen:* Dubito: nam sinus summantur in basin et in arcum, sed non in altitudinem nisi per tetragonismum. Eodem arguento, data dimensione hyperbolae et conchoeidis daretur dimensio circuli; quia secans ad altitudinem ex hyp. secans ad basin ex conchoide secans ad arcum ex circ. pendet. Eodem arguento modus haberetur reperiendi momentum ellipseos, seu eius perpendiculares ad altitudinem. Nam eius perpendiculares ad basin [*bricht ab*]

3 KR L ändert Hrsg. 7–12 Nota si . . . essent ellipses. erg. L 10 curva (1) parabolica (2)  
quaesita L 13 facillima | componitur streicht Hrsg. | , quia L

Generaliter inquirendum est in ductus in partes minimas, proportionales magnis.

Methodus data linea curva inveniendi figuram, a cuius quadratura quantitas curvae pendeat. Hoc facillimum est. Et calculi res est postea invenire figuram quadrabilis, et ideo curvas quoque in rectam reducibilis. Haberi potest iam curva v. g. cuius dimensio pendet a quadratura v. g. alterius cuiusdam hyperboloidis, etc., aut figurae alterius etc. Ita ut data figura haberi possit curva cuius dimensio pendet ab ista quadratura, contra data quacunque curva quadrabili in rectam dudum commutabili, invenire spatium quadrabile ex ista commutatione. Ideo quot nobis Hugenius dedit curvas in rectam commutabiles, tot ergo spatia quadrabilia dabo.

Habeo et aliam methodum determinandi spatia quae pendent a curvarum rectificatione, et contra; et videndum an non coincidat priori. Si non coincidit sic dici potest: Data qualibet curva geometrica rectificabili, dare duas figuram geometricas diversas unamquamque ex illis quadrabilem. Et dato quolibet spatio quadrabili exhibere duas curvas diversas quamlibet in rectam commutabilem.

[Teil 4]

5

10

15

In Höhe von S. 506 Z. 2 (Bl. 360 v<sup>o</sup>):

h	h	h	h	h	h	h	h	h
g	g	g	g	g	g	g	g	g
f	f	f	f	f	f	f	f	f
e	e	e	e	e	e	e	e	e
d	d	d	d	d	d	d	d	d
c	c	c						
b	b							
a								

20

1 est in (1) proportio (2) ductus (a) radiorum pro (b) pari (c) in partes  $L$  1 proportionales (1) maximis (2) magnis  $L$  2 data (1) figura curva inveniendi rectam (2) linea  $L$  3 est. (1) Sed difficile invenire figuram (2) Et  $L$  4 iam (1) figura cuius (2) curva  $L$  7 quadrabili erg.  $L$  7 dudum erg.  $L$  10 determinandi (1) curvas infinitas, q (2) spatia  $L$  12 curva |geometrica erg.| (1) quadrabili (2) rectificabili  $L$


---

8 Hugenius dedit: s. v. a. *Horologium oscillatorium*, 1673, Teil III Satz XI, S. 81–90 (HO XVIII S. 224–241) — s. a. N. 2.

Unter S. 506 Z. 18 (Bl. 360 v°):

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \cdot & & \cdot & & 1 \\
 & \cdot & & \cdot & & & \\
 & \cdot & & \cdot & & 3 & 4 \\
 5 & \cdot & & \cdot & & & \\
 & \cdot & & \cdot & & 6 & 10 \\
 & \cdot & & \cdot & & & \\
 & \cdot & & \cdot \cdot \cdot & & 10 & 20 \\
 & \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot & & \cdot & & & \\
 \\ 
 10 & \frac{a^2}{1} & \frac{a^2}{2} & \frac{a^2}{3} & \frac{a^2}{3 \wedge 3} & \frac{a^2}{9} & \text{Ergo } \frac{x}{3} \frac{\left\{ \frac{a^2}{3} \right\}}{3} = \frac{a^2}{9}.
 \end{array}$$


Neben S. 510 Z. 4 – S. 511 Z. 7 (Bl. 359 v°):



[Fig. 4]

$$\begin{array}{lll}
 10 \wedge 4 = 40 & 10 \wedge 5 \wedge 4 \wedge 4 = 800 & ab25 - ab16 = x. \\
 10 \wedge 5 = 50 & 10 \wedge 5 \wedge 5 \wedge 5 = 1250 & \text{Ergo } 25 - 16 = \frac{x}{ab}. \\
 15 & \underline{10 \wedge 3 = 30} & \text{Ergo } 25b - 16b = \frac{x}{a} \\
 & 10 \wedge 5 \wedge 3 \wedge 3 = 450 \not\vdash 30 & ab25 - ab16 = ab9. \\
 & \cancel{155} & \text{Ergo } [bricht ab]
 \end{array}$$

Über S. 514 Z. 13 (Bl. 360 r<sup>o</sup>):



[Fig. 5]

5

7 AB. | sed huius dimidium *gestr.* | L

29. TRIANGULUM CHARACTERISTICUM SPECIATIM DE TROCHOIDIBUS ET CYCLOIDE  
 [Sommer 1673]

Überlieferung: *L* überarbeitetes Konzept: LH 35 XIII 1 Bl. 353–354. 1 Bog. 2°. 4 S. Unterer Rand des Bogens bestoßen mit kleineren AusrisSEN, starke Abschabung bis hin zu Fehlstellen auf Bl. 353 r° links unten, dadurch geringfügiger Textverlust S. 522 Z. 3 f. und S. 527 Z. 7. Überschrift und Bezeichnung der Figuren ergänzt. Bl. 354 v° = Teil 4 insgesamt gestrichen.  
 Cc 2, Nr. 549

10 Datierungsgründe: s. N. 28.

T r i a n g u l u m c h a r a c t e r i s t i c u m ,  
 s p e c i a t i m d e t r o c h o i d i b u s e t c y c l o i d e .

[Teil 1]

Universalium de lineis curvis specimen, vide in iis quae de ellipsi dixi. — Regula generalis est, ut tot constituantur trianguli similes characteristico, quot fieri utiliter possunt. Utiliter inquam, id est ut latera facilius et alia quam hac trianguli similis via haberi possint.

Utile est etiam figuras quaerere, quarum eaedem sunt perpendicularares vel tangentes cum data, vel in quibus tangens datae est perpendicularis, vel perpendicularis datae est tangens; vel si non eaedem saltem parallelae sibi aut quod cum prioribus eodem reddit, perpendicularares.

In his figuris in quibus tangens unius est perpendicularis alterius, similia sunt quidem triangula characteristica sed ita ut altitudines et bases earum sint reciproce proportionales seu

$$\frac{\text{altitudo } A}{\text{basis } A} = \frac{\text{basis } B}{\text{altitudo } B}.$$

12 e t c y c l o i d e g e s t r . u . w i e d e r e r g . L

---

14 vide: s. N. 28.

Idque contingit quando curva unius, evolutione alterius describitur. Et quando curva evoluta rursus evolutione alterius describitur, haec ultima evoluta est directe proportionalis primae illi evolutione descriptae.

Omnis autem figurae directe proportionales sunt similes quodammodo, vel homogeneae. Hinc data qualibet curva, invenire possumus genus eius curvae quae evolutione ipsius describeretur, erit enim homogenea ei cuius evolutione descripta est data. 5

Hinc iam quaestio est, an non per analysis possimus ex infinitis curvis eiusdem speciei eligere eam, in qua tangens unius sit perpendicularis alterius, ita enim curvae datae aequalem invenissemus rectam.

Dato momento curvae ex axe quodam, et distantia centri gravitatis curvae ex eodem axe, datur ipsa curva. Datur et aliter centrum gravitatis curvae, ex pluribus momentis. Ergo ex pluribus momentis inter se collatis datur ipsa curva. 10

Sunt quaedam curvae in quibus rectae quaedam, quas cum Mydorgio parametros vocare possis, vel cum veteribus latera recta, intelligi queunt. Sunt et quae focos habent.

Danda opera est, ut regula detur generalis, inveniendi ordinatim applicatas ad basin, ex ordinatim applicatis ad axem. 15


Imo hoc facile est. Ex communi methodo geometriae locorum.

Regula generalis dimetiendi areas omnium trochoeidum, sive rota sit circularis, sive elliptica, sive etiam hyperbolica, aut parabolica. Regula autem generalis est: Summam triangularem arcuum aequari summae perpendicularium ad basin illam a qua incipitur. Ideo videndum an tota trochoeis parabolica possit quadrari, quia potest quadrari tum summa arcuum, tum ipsa parabola. Imo poterunt et omnes huius trochoeidis parabolicae portiones quadrari. Et videndum an non hoc pacto trochoeis ista tota sit figura ex genere parboleidum, quo posito haberetur eius basis, data altitudine et summa. Imo fortasse portiones abscissae trochoeidis parabolicae non poterunt quadrari. 20


Doctrina de intervallis tangentium, quibus curvae applicatis, segmenta figurae cuiuslibet metior, tum maxime usum habere potest, cum curva ipsa area tractabilior est, ut exempli causa in iis lineis curvis quarum conversionem in rectas Hugenius docuit. 25

13 quibus (1) lineae (2) rectae  $L$       15 generalis, (1) comparandi inter se (2) inveniendi  $L$   
20 triangularem erg.  $L$       23 pacto (1) veniatur ad prog (2) trochoeidis (3) trochoeis  $L$

13 cum Mydorgio: MYDORGE, C., *Prodromi catoptricorum et dioptricorum sive conicorum . . . libri*, 1631, S. 3.      28 Hugenius docuit: *Horologium oscillatorium*, 1673, Teil III Satz XI, S. 81–90 (HO XVIII S. 229–241).



[Fig. 1a]



[Fig. 1b]

In cycloide notabile est triangulum eius characteristicum simile non triangulo characteristico circuli, sed triangulo chordarum in circulo. Esto semicirculus, applicata eius  $BD$  producatur dum occurrat cycloidi in  $E$ . ex  $E$  demittatur perpendicularis  $EHG$ .  
 5 ea est parallela ipsi  $BC$ . ideo  $BA$  parallela ipsi  $EF$  tangentи cycloidis in  $E$ . ergo  $\nabla^{la}$   $ABD$  et  $FED$ : characteristicum cycloidis similia. Hinc materies multarum mirabiliumque propositionum. Porro patet  $EB = HC$ . uti  $EH = BC$ . Ergo  $EH = HG$ . Hinc statim habetur momentum curvae cycloidis  $AIC$  ex axe  $AC$ . perpendicularis enim  $EG$   
 10 ex puncto assumto  $E$  ducta in axem  $AG$  productum si opus est, est dupla chordae  $BC$ . Summa autem omnium chordarum est parabola, cuius basis et altitudo diameter, po-

1 Neben fig. 1b: Summa omnium  $FA$  ad basin semper aequatur duplo segmento  $EA$ .

7 Unter Ergo  $EH = HG$ : Male  $HG$  non est  $= EH$ .

8 f. EG ex puncto assumto E erg. L

sita  $AC$  secta in partes aequales infinitas, et eius parabolae dupla est momentum curvae  $AEI$  ex axe  $AC$ . Hac ergo quadrata habetur momentum curvae, et eo habito, statim superficies eius curva.

$$DB \text{ et } BE \text{ datae intelliguntur ut et } AB \cdot AD. \text{ hinc facile } FE. \text{ Nam: } \frac{FE}{AB} = \frac{ED}{BD}.$$

$$\text{Ergo } FE = \frac{ED \wedge AB}{BD}.$$

5

Triangulum characteristicum cycloidis est  $EML$ . Et  $EL$  arcus,  $EM$  altitudo,  $EM$  basis, huic simile  $\nabla ABC$ . et ang.  $LEM$  idem cum angulo  $BCA$ . Ergo:  $\frac{AC}{EL} = \frac{BC}{EM} = \frac{AB}{LM}$ .

(1) Ergo  $AC \wedge EM = BC \wedge EL$ . Applicatae parabolae inversae ad arcum cycloidis aequantur diametro in cycloidis basin. Ergo pendent ex q. circ. adde 15. et 17. Hinc earum quadrata ad arcum haberi possunt, si enim in arcus cycloidis ducantur, aut si in se ipsas per diametrum divisas idem est. Ergo si chordae istae in arcus cycloidis, multiplicentur per diametrum, fient earum quadrata ad arcum.

10

(2)  $AC \wedge LM = EL \wedge AB$ . Applicatae parabolae recta ad arcum cycloidis, aequantur diametro in altitudinem. Ergo quod ratiiles, adde prop. 7.

15

(3)  $BC \wedge LM = AB \wedge EM$ . Applicatae parabolicae ad altitudinem recta, ad basin cycloidis inverse sumtis aequantur. Ergo posteriores illae etiam quadrabiles. Quadrabiles ergo chordae ad arcum circuli, eae aequantur momento curvae cycloidis ex basi. Hinc dimensio curvae cycloidis nova methodo, sunt enim chordae eius indivisibles ut perpendicularares eius, seu ut chordae supplementales circuli. Ergo ut est

20

### 3 Hinter curva: Male

9 inversae erg. L 10–13 Ergo pendent ... ad arcum. erg. L 15 Ergo ... prop. 7. erg. L  
17–522,5 Quadrabiles ergo ... ad altitudinem. erg. L 19 f. enim (1) appli (2) chordae eius | indivisibles  
erg. | ut (a) chordae, (b) perpendicularares L

9–523,16 Im Folgenden wendet Leibniz das charakteristische Dreieck zugleich auf die Zykloide und ihren erzeugenden Kreis an. Seine Kernaussagen sind korrekt, lediglich einige Schlussfolgerungen sind — nicht zuletzt aufgrund einer noch unpräzisen Terminologie — unrichtig.

maxima chordarum supplementalium, seu diameter in arcum semicirculi, ad parabolam ad arcum quadrabiles, ita est arcus semicirculi seu basis cycloidis in chordam indivisibilem maximam ducta ad curvam cycloidis. Si dim⟨—⟩ curvae cycloidis datur ⟨qua—⟩ omnium  $OH$  ad arc. circ. et omnium  $FES$  ad arc. (circ.) aut omnium  $TG$ . seu omnium  $WU$  vel  $AQ$  ad altitudinem.

$\nabla^{\text{la}}$  similia  $CAN$  et  $EML$ .  $CN$  secans falsa,  $AN$  tangens falsa,  $AC$  diam.

$$\frac{CN}{EL} = \frac{AC}{EM} = \frac{AN}{LM}.$$

(4)  $CN \wedge EM = AC \wedge EL$ . Secantes falsae in basin cycloidis = diametro in arcum eius, et ideo quadrabiles.

(5)  $CN \wedge LM = AN \wedge EL$ . Secantes falsae in altitudinem cycloidis, seu earum summa = tangentibus falsis in eius arcum.

(6)  $AC \wedge LM = AN \wedge EM$ . Diameter in altitudinem cycloidis = tangentibus falsis in eius basin, quadrabile, adde 7.

$\nabla^{\text{la}}$  similia  $NBA$  et  $EML$ .  $\frac{AN}{EL} = \frac{AB}{EM} = \frac{NB}{LM}$ .

(7)  $AN \wedge EM = \text{tangentes falsae in basin (quadrabiles num. 6)} = AB \wedge EL$ . Ergo  $AB \wedge EL$  quadrabiles per p. 2.

(8)  $AN \wedge LM = NB \wedge EL$ . Summa omnium  $AN$  seu tang. fals. (= segm.) = istis  $NB$  (differentiis secantis falsae a chorda suppl.). Porro ista  $NB$  vel  $OE$  spatium concavum  $IPA$  compleat.

(9)  $AB \wedge LM = NB \wedge EM$ . Ergo  $NB$  ad  $EM$ . seu momentum arcus ex  $AP$  (ergo et momentum arcus ex  $IC$ ), quadrabile.

$\nabla^{\text{la}}$  similia:  $CDB$  et  $EML$ .  $\frac{BC}{EL} = \frac{CD}{EM} = \frac{BD}{LM}$ .

(10)  $BC \wedge EM = CD \wedge EL$ . Seu  $BC$  (chordae suppl. vel appl. invers. parabol.) ad basin cycloidis, aequantur momento arcus ex cycloidis basi. (Ergo quadrabiles).

(11)  $BC \wedge LM = BD \wedge EL$ . Ergo sinus ad arcum cycloidis (quadrabiles).

(12)  $CD \wedge LM = BD \wedge EM$ . Iam  $CD \wedge LM$  quadrabiles. Ergo et  $BD \wedge EM$ .

9 eius erg.  $L$  10 seu earum summa erg.  $L$  13 adde 7. erg.  $L$  15  $AB \wedge EL$ . (1) quadrabiles.  
NB: hinc datur quadratura | seu dimensio erg. | arcus cycloidalis, si aliunde non daretur, ex prop. 6. + 7. (2) Ergo  $L$

$\nabla^{\text{la similia}}: ACQ \text{ et } EML. \frac{AQ}{EL} = \frac{QC}{EM} = \frac{AC}{LM}$ .  $AQ$  secans supplementi,  
 $QC$  tangens supplementi.

(13)  $AQ \cap EM = QC \cap EL$ . [Secantes] supplementi in basin = tangentibus supplementi  
in arcum seu momento arcus cycl. ex altit.

(14)  $AQ \cap LM$  summa secantium supplementi =  $AC \cap EL$  diametro in arcum cycloidis. 5  
(Ergo quoadrabilis).

(15)  $QC \cap LM = AC \cap EM$ . (dimensio cycloidis). Summa tangentium supplementi,  
cycloidis portio NB. = diametro in basin cycloid. adde 1. et 17.

$\nabla^{\text{la similia}}: CBQ \text{ et } EML. \frac{CQ}{EL} = \frac{BQ}{EM} = \frac{CB}{LM}$ .  $QC = ED$ .

(16)  $CQ \cap EM = BQ \cap EL$ . Applicatae altitudinis in cycloid. translatae in basin = 10  
tangentibus usque ad basin productis in arcum.

(17)  $CQ \cap LM = CB \cap EL$ . Summa tangentium supplementi, adde 1. et 15.

$\nabla^{\text{la similia}}: BRQ \text{ et } LME. \frac{BQ}{EL} = \frac{QR}{EM} = \frac{BR}{LM}$ .

(18)  $BQ \cap EM = QR \cap EL$ .

(19)  $BQ \cap LM = BR \cap EL$ .

([20])  $QR \cap LM = BR \cap EM$ .

15

Sed hoc iam in nostra cycloide memorabilissimum est, quod omnia theorematum  
inversi possunt et pro basi substitui potest altitudo, pro altitudine basis, quandoquidem  
hoc peculiare habet cyclois ut a cycloide evoluta describatur. In genere utile est evolutas  
considerationi adicere, inversionis eiusmodi causa, etsi in plerisque lineae rectae nonnihil  
turbent. 20

Ex prop. 19. patet curvam cycloidis, pendere ex quadratura secantium falsarum,  
quarum dimidia sunt secantes semiarcuum ut  $BI$  dimid.  $CG$  in fig. 3. NB. ubi  $\gamma\delta =$

3  $QC \cap EL$ . (1) Secans (2) Secantium supplementi summa (3) Secantium ... in basin  $L$  ändert Hrsg. 4 in (1) basin ( | ideo erg. | quoadrabilis ) (2) arcum  $L$  5 supplementi | in basin gestr. | =  $L$  7 (dimensio cycloidis) erg.  $L$  8 cycloidis portio NB. erg.  $L$  8 adde 1. et 17. erg.  $L$  16 18  $L$  ändert Hrsg. 16  $BR \cap EM$ . | (19)  $\nabla^{\text{la similia}}$ : BAS (isosceles) gestr. |  $L$  17–21 Sed hoc ... nonnihil turbent erg.  $L$

9  $QC = ED$ . Dies gilt nur in einem speziellen Fall. Leibniz wurde zu der Annahme durch eine Ungenauigkeit in der Zeichnung veranlasst. 23 fig. 3.: s. N. 23.


- $B\gamma = BI$ . ubi patet ob  $\nabla^{\text{lum}} AZG$ , esse  $GZ$  (sec. fals. dimidiata) $\cap AD$ . chorda  $= AG \cap ZI$ . ergo quadrab. vel ob  $\nabla^{\text{lum}} AIB$ .  $AI \cap AB = BI \cap AN$ . Atqui  $AN = AK = AE$ . habemus ergo momentum  $BI$  secantis falsae ex vertice. Atqui prop. 6 *De ductibus* num. 4. ostensum est ex momento secantis falsae ex vertice, pendere eius quadraturam.
- 5 Habemus ergo quadraturam secantium falsarum. Habemus ergo quadraturam quoque omnium differentiarum inter chordas supplement. et secantes falsas.
- Falsum est quod  $AN = AK$  vel  $= AE$ . Ideo potius quadratura secantium falsarum ex dimensione curvae cycloeidis accersenda, quam contra.
- In cycloide, similibusque trochoeidibus ita iniri potest ratio dimensionis curvae,
- 10 si perpendicularibus ad curvam, productis [usque ad basin] ut  $EH$ , iisque infinitis, intelligantur infinita haberi triangula, quorum alia sursum alia deorsum apicem vertunt, quaeque sursum vertunt basin suam habeant in basi figurae, quae deorsum, in curva. Iam si summa habeatur primum totius figurae, uti datur certe dimensio areae cycloeidis, deinde triangulorum basin in basi habentium, residuum erit summa triangulorum ad
- 15 curvam, seu (per prop. 2. hic) si duplicitur, curva ad diametrum.

10 curvam, (1) ad basin usque productis (2) productis | basin usque productis ändert Hrsg. | ut L  
13 certe erg. L 14 deinde (1) curvarum basin habentium (2) triangulorum L

---

3 f. prop. 6 num. 4.: s. N. 26 S. 428.

[Teil 2]



[Fig. 2]

Ad fig. 1 et 7:

Iam ut data  $CI$ , investigemus  $CG$  sic agendum est: ducatur  $ON$  (dimidia  $DI$ ) perpendicularis ad  $CI$  erit  $CN$  dimidia  $CI$ . restat investigemus  $NG$  (nam  $NG + \frac{CI}{2} = CG$ ) quod facile est, nam  $Rq OG^2 - ON^2 = NG$ . Cumque summam  $CN$  ad curvam circularem dudum habeamus; summam  $NG$  separatim inire sufficit. Est autem  $OG^2 = \frac{a^2}{\beta^2}$ . erit ergo

$$NG = \sqrt{\frac{a^2}{\beta^2} - \frac{\gamma^2}{2}} \quad ; \quad \sqrt{\frac{a^2}{\beta^2} - \frac{2\gamma^2}{2}} \quad ; \quad \sqrt{\frac{a^2}{\beta^2} - \frac{3\gamma^2}{2}} \quad \text{etc.}$$

Ergo locus omnium  $NG$  terminationum est curva parabolica, summa autem omnium  $CG$  ad arcum circuli aequatur summae omnium  $GP$  ad altitudinem.


Sunt autem  $\frac{GP}{DI} = \frac{CG}{CI}$ . Ergo  $GP = \frac{CG \cdot DI}{CI}$ .

Iam  $DI \cap CI = \text{diam.} \cap \sin.$   $\frac{\text{diam.} \cap \sin.}{DI} = CI.$   $\frac{\text{diam.} \cap \sin.}{CI} = DI.$  Ergo

3-526,4 Die Betrachtungen dieses Abschnitts sind teilweise fehlerhaft; sie werden in N.**30** S.**541** Z. 2-11 wiederholt.

$$CG \cap \frac{DI}{CI} = CG \cap \frac{\text{diam. } \hat{\sin.}}{\frac{CI}{\text{diam. } \hat{\sin.}}} \cdot \text{vel } CG \cap \frac{DI}{\frac{\text{diam. } \hat{\sin.}}{DI}} = CG \cap \frac{DI^2}{\text{diam. } \hat{\sin.}}.$$

Vel aliter cum detur summa  $ON$ . investigetur differentia inter  $PG$  et  $ON$  sive  $RqGN^2 - PO^2$ . id est  $Rq$ . ex quadratis arithmeticis crescentibus demtis quadratis, quadratice crescentibus, ut faciunt sinus.




[Fig. 3, gestr.]

5 Zu [Fig. 3], gestrichen:

$AB$  nota est  $a$ .  $AC = CD = \frac{a}{2}$ .  $CE$  nota  $\frac{b}{2}$ .  $GF = b$ .  $AG = FB = \frac{a-b}{2}$ .

$AH = c$ .  $BD = d$ .  $AD = e$ .  $CI = f$ . parallela  $AD$ . Manifestum est  $\nabla^{la} CIB$  et  $ADB$  esse similia. Ideo  $CI = \frac{AD}{2}$ . et  $IB = \frac{DB}{2}$ . quia  $CB = \frac{AB}{2}$ .  $\nabla BFK$  simile  $\nabla^{lo}$

[bricht ab] In  $\nabla^{lo}$  orthogonio  $AMC$  cuius omnia latera dantur, quaerenda est altitudo. Sed falsum est omnia latera dari,  $AM$  non datur, quia nec punctum  $M$  datur calculo.



[Fig. 4, teilw. Blindzeichnung]

ang.  $bac + 2abc (= 2bca) = 180$ . Item ang.  $bca + dc b = 90$ .  $acg = bca$ .  $dc b = gch$ .  
 $dc b + bca + acg + gch = 180$ .

$$\overbrace{bca}^{2bca}$$

5

Ergo  $dc b + 2bca (= 2abc) + gch = bac + 2abc (= 2bca)$ . Ergo  $dc b + gch = 2dc b = [bac]$ .

$\leftarrow \rightarrow$   $cef = \text{ang. } [dcf] = \text{ang. } fbc$ .

Ex his patet  $ef$  nihil differe in indivisibilibus a  $[cb]$  vel  $fi$ . Ergo idem est basis semi-

cycloeidis in  $ef$ , vel basis semicycloeidis simpliciter, quia  $ef$  est unitas constructionis.

Ergo ut est diameter in arcum circuli, ad parabolas ad arcum (quadrabiles, ex toto vel  
parte semicirculi) ita est basis cycloeidis (ex toto vel parte), vel arcus circuli ad arcum

10

6 abc L ändert Hrsg. 7 dc b L ändert Hrsg. 8 cd L ändert Hrsg. 8 vel fi erg. L  
8 est (1) basis (2) chorda inassignabil (3) chorda (4) basis L 10 circuli erg. L

1 [Fig. 4]: Der Buchstabe  $h$  kommt in der Figur doppelt vor.

curvae cycloeidis. Ergo semper quae est ratio quadrupli sectoris ad portionem parabolae, ea est arcus circuli ad curvam cycloidalem. Id est portio parabolae divisa per diametrum dabit curvam cycloidalem.

Obicitur:  $ef$  non est  $= fi$ . Respondeo[:] sed est tamen  $\frac{ef}{if} = \frac{fc}{ch}$ . sive  $ec(fc) \wedge fi = ef \wedge ch$ . (fig. 2) et quia  $fi$  est unitas constructionis, ergo  $ch \wedge ef = fc \wedge fi$  seu  $= fc$ . item.  
 5 Ergo  $ef = \frac{fc \wedge if}{ch}$ . vel quia  $if$  unitas quae omitti potest, erit  $ef = \frac{fc}{ch} = \frac{fc}{fc} = 1$ . Porro omnes chordae inassignabiles, sunt ad suas perpendiculares ut  $\frac{ef}{fc}$  seu ut  $\frac{if \text{ unitas}}{ci}$ . Ergo semper ratio  $\frac{fc}{ef}$  est  $= \frac{ci}{1}$  vel  $\frac{fc}{1}$ . Ergo obiecto se ipsam solvit.

Ideo si summa quarundam linearum, ut f i g. p r a e c e d. omnium  $AB$ . in arcum cycloidis multiplicetur per diametrum, fiet summa omnium  $AB$  in omnes  $CI$ . Habetur ergo quadratura, rectangulorum parabolico-parabolicorum inversorum, ad arcum. At hoc iam aliunde habetur, est enim nil nisi sinus ad arcum, in diametrum ducti. Hinc ergo rursus alia methodus investigandi curvam cycloidis.

[Teil 3]

15 Porro ex his patet quadraturam eorum quos hic prop. 19. nominavi secantium haberi, at istos secantes  $BQ$  calculo ita indagabimus: Manifestum est  $\frac{BQ}{BR} = \frac{AC}{AB}$ . (quia  $\nabla^{la}$  similia  $QBC$  et  $ABC$ .) ideo  $BQ = \frac{AC \wedge BR}{AB}$ . ideo infinita series radiorum per distan-  
 tiam a basi aut potius extremitate diametri multiplicatorum, per applicatas parabolae basi parallelas divisorum quadrari potest

1 quadrupli erg.  $L$  3f. cycloidalem. (1) Imo id falsum, nam  $ef$  non est  $= fi$ . sed est  $\frac{ef}{if} = \frac{fc}{ch}$ .  
 (2) Obicitur  $L$  15 quos (1) alibi (2) hic  $L$  15f. secantium | quadraturam streicht Hrsg. | haberi  $L$   
 18 aut potius extremitate diametri erg.  $L$

$$\frac{a^2 - a\beta}{Rq_1 a^2 - \delta^2}, \quad \frac{a^2 - 2a\beta}{Rq_1 a^2 - 2\delta^2}, \quad \frac{a^2 - 3a\beta}{Rq_1 a^2 - 3\delta^2}, \quad \text{etc.}$$

Nam cum hyperbolam habeo

$$\frac{a^2}{a - \beta}, \quad \frac{a^2}{a - 2\beta}, \quad \frac{a^2}{a - 3\beta}, \quad \text{etc.}$$

quod spatium efficit, utique divisis omnibus per  $a$ . ipsum

$$\frac{a}{a - \beta} + \frac{a}{a - 2\beta} + \frac{a}{a - 3\beta} \quad \text{etc.}$$

5

linea erit, quae scilicet ex spatio hyperbolico per  $a$ . diviso oritur. Atque ideo summa curvae, cuius ita procedent tangentes seu chordae, ex quadratura hyperbolae patebit. Et talis est forsitan curva parabolica. Quaerenda autem est methodus istam curvam describendi:

$$\frac{a^2}{1}, \quad \frac{a^2}{3}, \quad \frac{a^2}{6}, \quad \frac{a^2}{10}, \quad \text{etc.}$$

Nescio an hoc faciat infinita  $a^2$ .


10

NB. Si eousque ars analyseos produci posset, ut data series si possibile est reducatur ad statum tractabilem, ingrediaturque aliquod triangulum characteristicum; optata eius perfectio haberetur.

1 *Daneben:* Quare et si omnia dividas per  $a$  loco superficie linea ex summa omnium fiet.

7 seu chordae *erg. L*

1 Vgl. dazu N. 27 S. 488 Z. 4–6.



[Fig. 5]

Supponam cognitas tantum lineas duas, altitudinem  $AB$  et applicatam  $BC$ , quas appellabo, altit. (a) applic. (b.) ergo habetur et  $AC = a^2 + b^2$ , Rq.  $\frac{(CB)}{AH} = \frac{EA + (AB)}{EA}$ .

Omnes curvae quarum trochoides sunt aliae curvae datae, possunt in rectas converti, quemadmodum Hugenius curvas, quarum volutae sunt curvae datae, in rectas extendit. Nimis nulla curva est (demta opinor circulari), quae non intelligi possit per modum cycloidis describi, atque ideo basis eius curvae generatrici aequalis est.

A n a l y s i s i n d i v i s i b i l i u m (quatenus ab arithmeticâ infinitorum separatur) in eo consistit maxime, ut data qualibet linea curva, aut superficie curva, eam ad 10 spatium quoddam unum plurave reducamus, a quorum quadratura eius mensura pendeat. Quod per varias methodos hic praescriptas facile fiet. Porro ut spatium datum quadremus, examinanda primum ratio progressionis, an sit summae capax ex arithme-

---

#### 4–7 Daneben großes $\mathfrak{A}$

---

1 [Fig. 5]: Der Schnittpunkt  $D$  der Normalen  $CD$  zur Tangente  $ECL$  mit der Achse wird von Leibniz kurzerhand mit dem Brennpunkt identifiziert, in Wirklichkeit liegen  $D$  und  $K$  weiter außen.

5 Hugenius: s. o. S. 519 Z. 28.

tica infinitorum. Si hanc methodum respuit, ad analysin indivisibilium veniendum est, id est constituendum triangulum characteristicum figurae, eique quotcunque fieri potest triangula similia, quod fieri potest tum ductibus rectarum in figura, tum calculo. Calculo quidem sic: sumamus pro triangulo characteristico *ECB* ut in ellipsi praecedente vel *ECD*. utrum scilicet simplicius videbitur, vel etiam *EIK*, vel *ELM* aliudve, nobis iam notum simplicissimum, et cuique linearum valores simplicissimos ex natura figurae assignemus. Inde quotcunque haberi possunt ex natura figurae aequationes comminiscamur, duarum rationum, quarum una sit duarum trianguli characteristici linearum, altitudinis *EB* et basis *BC*. vel altitudinis *EB* et tangentis *EC*. Semper enim hic altitudo ingredi debet, quoniam summam ordinatim applicatarum, seu dimensionem figurae quaerimus; altera ratio sit linea datae, et cuiusdam linea quae sitae, cuius quadratura ad basin vel arcum, dudum habetur.


$$\frac{\text{basis (arcus)}}{\text{altitudo}} \times \frac{\text{linea data}}{\text{quae sitae}}.$$

Ita duae habebuntur quae sitae, altera cuius quadratura ad arcum, altera cuius quadratura, vel saltem dimensio ad basin quaeritur. Et quidem si est ad basin, basi divisa in partes aequales, examinetur an calculus infinitorum iuvet. Caeterum in omni isto examine videndum, invenire possit triangulum simile vel aequatio eiusmodi rationum, quas ingrediatur linea quaedam permanens. Ea enim si basi comparari possit, vel arcui vel altitudini, habebitur earum dimensio, quae cum ipsa congrediuntur in eandem rationem, qualis ex natura rei esse potest. Sin minus videndum saltem, lineasne comminisci liceat, in constructione, quae quolibet demum modo assumtae sint quadrabiles, ut sint paraboleides non tantum, sed et aliae infinitae.


Sed ut ad priora redeamus si nulla lux affulget ex aequationibus rationum trianguli characteristici dati aliud triangulum characteristicum alterius figurae quaerendum est, quae sit tractabilior, cuius rationes linea datae summandae, ingredi possint.

6 f. assignemus. (1) Inde (a) data linea cuius summ (b) datis (c) sumtis lineis quibusdam, et quidem (aa) simplicissimis (bb) satis simplicibus, quaeramus an in illis (2) Inde *L* 16 iuvet (1), sin minus, rursus simili aequatione, persequenda est, (a) constituen (b) videndumque an nova aequatione cum a (2). Caeterum *L* 17 simile erg. *L*

[Teil 4, gestrichen]



[Fig. 6a]



[Fig. 6b]

Quod attinet dimensionem curvae trochoidis protractae vel contractae, inspice quae Schotenius habet ad lib. 2. *Geom. Cartes.* pag. 268. 269. ubi figuræ eius inspice,  
 5 quibus ego haec addo[:]. In fig. pag. 269 ducatur recta  $ND$ . et recta  $GN$  producatur usque ad arcum circuli maioris  $FG$ . cui occurrat in  $O$ . litera a me ascripta, ducaturque recta  $OF$ . Manifestum est  $\nabla^{la} GOF$  et  $GND$  esse similia, ideoque esse  $GN$  ad  $GO$ , ut  $GD$  ad  $GF$ . Cumque idem fiat, quocunque sit punctum  $N$  in circulo minore, vel punctum  $C$  in cycloide apparent perpendicularares descriptrices (quas in trochoidibus et  
 10 volutis radios appellare possis) trochoidis contractae ad perpendicularares descriptrices trochoidis ordinariae, habere eandem semper rationem. Nempe quae est diametri circuli minoris semidifferentia diametrorum aucti ad diametrum circuli maioris, seu quae est  $GD$  ad  $GF$ . Hinc summa omnium  $GF$  unitate posita arcu inassignabili circuli  $GF$  facile haberi

8 Nach GF. interlinear: (falsum)

13 inassignabili erg. L

2 [Fig. 6]: Im Folgenden behandelt Leibniz zwei Figuren aus Fr. v. SCHOOTEN, *Commentarii*, DGS I S. 268f. Die Figuren fehlen im Text; sie sind vom Hrsg. nach den Schooten'schen Originalen beigefügt worden. Die von Leibniz hinzugefügten Strecken sind mittels Strichelung gekennzeichnet. Punkt  $O$  ist ebenfalls durch Leibniz ergänzt. — Diese Eintragungen fehlen in dem hannoverschen Handexemplar der *Geometria*-Ausgabe!

potest, cum enim summa omnium  $GO$  habeatur per superiora (quadrabilis prop. 10. hic), multiplicetur illa per  $GD$ , dividatur per  $GF$ . Hinc iam ad dimensionem curvae trochoidis contractae struitur gradus. Est enim summa chordarum inassignabilium trochoidis contractae (seu quantitas curvae) ad summam chordarum illarum seu perpendicularium descriptricum ut est maxima chorda inassignabilis trochoidis contractae, ad maximam descriptricem  $DG$ . Sed ut est maxima descriptrix contractae  $GD$  ad suam chordam seu arcum inassignabilem, ita est  $GF$ . seu diameter circuli maioris vel maxima descriptrix trochoidis communis, ad maximam suam descriptricem. At  $GF$  diameter est ad arcum a se descriptum, ut descriptrix proxime minor (differentiae inassignabilis), in eadem trochoidi communi ad unitatem constructionis seu ut diameter circuli maioris ad unitatem constructionis. Ergo dimensio curvae trochoidis contractae ita habebitur. Summa omnium  $GF$ . seu descriptricum trochoidis contractae dividatur per diametrum circuli maioris [generatoris] trochoidis communis, quotiens erit curva trochoidis contractae.

Eadem prorsus methodo invenietur curva trochoidis protractae. Nam in figura paginae 268. duc rectam  $ND$ . et ex punto  $O$ . quo recta  $GD$  secat circumferentiam circuli minoris  $GF$ . rectam  $OF$  erunt  $ND$  et  $OF$  parallelae,  $\nabla^{\text{la}}$ que  $GOF$  et  $GND$  similia. Ideoque ut  $GF$ . diameter circuli minoris ad  $GD$ . diametrum circuli minoris semidifferentia diametrorum ( $DE$ , et  $GF$ ) auctum: ita  $GO$ . d e s c r i p t r i x trochoidis communis ad  $GN$ . d e s c r i p t r i c e m protractae. Cumque eadem semper ratio sit, summa descriptricum protractae ita habebitur, si summa descriptricum communis multiplicetur [per]  $GD$ . diametrum minoris differentia diametrorum auctum, dividaturque per diametrum minoris. Habita summa descriptricum trochoidis protractae (quae quadrabilis est) curvae trochoidis protractae eadem qua contractae metodo reperiatur. Nam cum semper sibi sint proportionales curvae descriptrices et chordae inassignabiles descriptae, ob eundem semper angulum descriptionis, erit ut maxima chorda inassignabilis trochoidis protractae, ad maximam descriptricem  $GD$ . ita summa chordarum inassignabilium seu curva trochoidis protractae, ad summam descriptricum inventam. Iam maxima

---

16 Nach parallelae und similia jeweils interlinear: (falsum)

1 f. (quadrabilis | prop. 10. hic erg. | ) multiplicetur  $L$     8 f. ad (1) chordam suam, (2) arcum ...  
 ut (a) chorda (b) descriptrix  $L$     10 maioris erg.  $L$     12 diametrum (1) seu maximam descriptricem  
 (2) circuli  $L$     13 generatorem  $L$  ändert Hrsg.    20 protractae erg.  $L$     21 per erg. Hrsg.  
 24 inassignabiles erg.  $L$

chorda inassignabilis trochoeidis protractae, est ad suam descriptricem, *GD*, ut est maxima chorda inassignabilis trochoeidis communis, ad maximam suam descriptricem, *GF*, seu ut unitas constructionis ad diametrum circuli minoris *GF*. quia idem angulus est descriptionis, nec nisi differentia radiorum, quare arcus radiis proportionales. Ergo si summa descriptricum trochoeidis protractae (quadrabilis), dividatur per diametrum circuli minoris, nempe generatoris trochoeidis communis, quotiens erit curva trochoeidis protractae.

At vero Pascalius ostendit in scripto sub Dettonvillae nomine publicato; trochoeidum protractarum contractarumque curvas esse curvis ellipticis aequales; habebuntur ergo curvis ellipticis aequales rectae geometrice demonstratae.

Imo gravissimus error in demonstratione mea, quam tamen facile emendo salva curvae dimensione. Operae pretium est figura propria rem complecti, vid. pag. praeced. fig. 1 et 7. Falsum enim in figura Schotenii *OF* et *ND*. vel in nostra fig. 1 *HD* et *GB* (quas ne inutilibus lineis figuram confunderem ducere nolui) esse parallelas, ut inter festinandum posueram. Aliter ergo re de integro assumta ratiocinandum est. Inspice fig. 7. Cum circuli *BGA*, *DIC* sint concentrici, erunt chordae *HG*, et *CI*, diametris proportionales, item *HC* erit aequale *IG*. Ergo summam *CG* inibimus, si summae omnium *HG* addemus summam omnium *CH* vel *GI*. seu semidifferentiam inter summam omnium *CI*, et summam omnium [*HG*]. Cumque summa omnium *CI*, detur per prop. 10. hic, restat tantum ad summam omnium *CG* habendam, invenire summam omnium *HG*. At haec facilis est, quia enim semper  $\frac{CI}{AG} = \frac{CD}{BA}$ . seu ut diametri circulorum, eadem quoque ratio summarum erit. Ideo si summa omnium *CI* inventa per prop. 10. (quadrabilis) multiplicetur per

20–22 Error rursus, quia *AG*. *AI* non sunt circulis proportionalia.

22–535,5 Daneben großes NB.

6 minoris, nempe erg. L 8 vero (1) Hugeni (2) Pascalius L 14 parallelas, (1) quod manifeste falsum est (2) ut L 18 vel GI erg. L 19 CI L ändert Hrsg.

8 Pascalius: *Lettre de A. Dettonville à Mr. Huguens de Zulichem*, 1659 (PO IX S. 187–201).

20–22 Leibniz verwechselt die Bezeichnungen. Die Proportion müsste nach seinem Ansatz  $\frac{CI}{HG} = \frac{CD}{BA}$  heißen. — Ebenso müsste in der Anmerkung *HG* bzw. *CI* stehen.

diametrum  $BA$  circuli minoris seu generatoris trochoidis contractae, ac productum dividatur per  $DC$  diametrum circuli maioris seu generatoris trochoidis communis, quotiens erit summa omnium  $GA$ , cui si addatur semidifferentia ipsiusmet summae  $GA$  a summa omnium  $CI$ . descriptricium trochoidis communis, habebitur summa omnium  $CG$  descriptricium trochoidis contractae. Eodem modo inveniemus summam omnium  $CG$  in fig. 1 trochoidis protractae. Si inventam summam omnium  $CI$  per prop. 10. fiat ut  $DC$  diameter circuli minoris, trochoidis communis generatoris, ad  $BA$  diametrum circuli maioris trochoidis protractae generatoris, ita, summa omnium  $CI$ , ad aliud, quod erit summa omnium  $G(H)$  cui si addatur summa omnium  $GI$ , semidifferentia inter summam omnium  $CI$ , et omnium  $G(H)$  habebitur summa omnium  $CH$  descriptricium trochoidis protractae. Posita autem summa omnium descriptricium trochoidis sive protractae sive contractae, facile habetur summa omnium chordarum assignabilium vel arcum minimorum ad ipsis descriptorum, vel curvae trochoidis protractae vel contractae. Cum enim idem semper sit angulus descriptionis, eadem semper ratio erit arcum vel chordarum, et descriptricium seu radiorum. Ergo quae est ratio descriptricis maxima ad chordam maximam, ea erit summa descriptricium  $CG$  ad arcum trochoidis descriptae. Est autem ob eundem rursus descriptionis angulum, eadem ratio  $CB$  descriptricis maxima trochoidis contractae vel protractae ad suam chordam maximam, quae est  $CD$ . diametri circuli generatoris trochoidis communis, ad suam chordam maximam, seu ad unitatem (ut ostensum est ad fig. 2 ubi quae est ratio  $CH$  descriptricis trochoidis communis maxima ad  $ef.$  chordam maximam descriptam, ea est ratio  $cf$  diametri a descriptrice maxima  $CH$  quantitate qualibet data minore differentis; seu ipsius descriptricis, ad  $fi.$  unitatem). Ergo ut est in trochoidide communi summa descriptricium ad curvam, ita et in trochoidide protracta vel contracta, ac proinde summa descriptricium trochoidis contractae vel protractae, vel communis, divisa per diametrum circuli generatoris trochoidis communis, dabit curvam trochoidis descriptae sive ea protracta sit, sive contracta, sive communis.


1 minoris seu erg.  $L$  1 trochoidis (1) exorbitantis (sive ea contracta sive protracta ut in fig. 1 exhibuit, sive ut in fig. 1 protracta sit). (2) contractae  $L$  2 maioris seu erg.  $L$  7 circuli (1) maioris (2) minoris  $L$  17–20 Est autem ... ad unitatem erg.  $L$  20 f. descriptricis | (1) a diametro circuli generatoris (2) trochoidis communis erg. | maxima L 25 f. circuli generatoris erg.  $L$

### 30. DIVERSA DE QUADRATURIS

[Sommer 1673]

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 XII 1 Bl. 266–267. 1 Bog. 2° 3 S. — Bl. 267 v° leer.  
Cc 2, Nr. 641

5 Datierungsgründe: s. N. 28.



[Fig. 1]

Esto semiparabola  $ABC$ . cuius latus rectum  $AD$ . abscissa  $AB$ . applicata  $CB$ . constat esse  $AD \cap AB = CB \square$ .

Producatur diameter vel altitudo  $BA$ , ultra verticem, in  $E$ . sumaturque  $AE = AB$ . et  
 recta ducta  $EC$ , tangent curvam parabolae in  $C$ .

Item in producta  $AB$ . ultra basin sumatur  $BF$ . dimidia lateris recti  $AD$ . recta  $FC$ . erit perpendicularis ad curvam, sive tangentem  $CE$ .

6 [Fig. 1]: In der Leibniz'schen Handzeichnung ist die Linie  $AC$  nicht eingezeichnet. Das infinitesimale Dreieck zum Punkt  $I$  ist etwas nach oben geschoben und mit  $INO$  bezeichnet. Da  $N$  doppelt vorkommt, hat Hrsg. in *IPO* abgeändert. Der Parabelbogen  $RH$  ( $R$  vom Hrsg. erg.) geht in der Handzeichnung irrtümlich von  $A$  aus.

Denique ducatur  $AG$ . perpendicularis ad  $CF$ . quae bisecabit  $CF$ . in  $G$ . quemadmodum ipsa  $AG$ . ipsius  $CE$ . dimidia est.

Manifestum est  $\nabla^{la} ECF$ . et  $EBC$ . et  $CBF$ . et  $AGF$ . et  $CBE$ . similia esse, ideo  $\frac{BF}{CF} = \frac{CF}{EF}$ . Ergo  $BF \wedge EF = CF^2$ . seu  $CF = \sqrt{BF \wedge EF}$ .

Est autem  $BF$ . semper eadem.  $EF$ . autem continuo crescit uniformiter, constat enim ex  $BF$ . quae perpetuo eadem est, et  $AB$ . uniformiter crescente, duplicata. Ergo rectangula  $BF \wedge EF$ , vel quadrata,  $CF^2$ . sunt arithmeticæ progressionis, ipsaque radices  $CF$ . sunt applicatae parabolæ ad axem seu basi parallelæ. Unde: si omnes  $CF$ . applicentur altitudini  $AB$ . in punctis  $B$ . donec evanescant in  $A$ . (ubi  $CF$ . ad nihilum recidit) figura ex iis conflata  $ABH$ . utique semiparabola erit, ac proinde quadrabilis =  $\frac{2CF \wedge AB}{3}$ .

Datur ergo momentum curvae  $AC$ . ex axe  $AB$ , =  $\frac{2CF \wedge AB}{3}$ . et circulus radio  $\frac{\sqrt{CF \wedge AB}}{3}$  descriptus erit superficie conoidis parabolici circa axem, aequalis.

Parabolæ  $ABH$ . latus rectum erit  $\frac{BF \wedge EF}{AB}$ . diameter idem qui prioris  $AB$ .

Nunc inquirere operæ pretium est, an eadem semper ratio sit  $\frac{CF}{CB}$ . cum sint applicatae correspondentes duarum parabolæ eiusdem altitudinis. Sunt autem omnes parabolæ figuræ homogeneæ inter se, ac proinde applicatae respondentes, erunt proportionales. Sed hoc accuratius excutiendum est, ne in re tanti momenti, ut mox dicemus, conjectura labamur.

Dictum est  $CB$  esse =  $Rq AD \wedge AB$ . et  $CF$  esse  $Rq BF \wedge EF$ .  $BF = \frac{AD}{2}$ .  $EF = 2AB + BF$ . ergo ratio  $\frac{CB}{CF}$  erit =  $Rq \frac{AD \wedge AB}{\frac{AD}{2} \wedge 2AB + \frac{AD^2}{4}} = Rq \frac{AB}{AB + \frac{AD}{4}}$ . Unde

3 et AGF. et CBE. erg.  $L = 4f. \sqrt{BF \wedge EF}$ . (1) Ergo (2) Unde manifeste intelligitur, si omnes rectæ erg. u. gestr. |  $CF$ . applicatae intelligantur ad axem in punctis  $B$ . figuram  $ABH$ . inde conflatam fore aliam semiparabolam cuius latus rectum est dimidium, at diameter | seu abscissa erg. | duplum parabolæ prioris (2) Est  $L = 8$  ad axem seu erg.  $L$

9 donec evanescant: dies ist unzutreffend. — Der Fehler beeinflusst alle davon abhängigen Aussagen.

apparet falsum esse, quod prima specie in mentem poterat venire, neque eandem semper rationem esse  $\frac{CB}{CF}$ .

Sumatur aliud punctum  $I$ . in curva  $AC$ . unde perpendicularis ad curvam  $IK$ . producatur usque ad basin  $CH$ . cui occurret in  $L$ . demittatur applicata ex punto assumto  $I$ .

5 axi perpendicularis  $IM$ . erit, per superiora, recta  $MK = BF$  vel  $\frac{AD}{2}$ .

Porro alibi demonstratum est summam ad basin omnium  $IK$ . perpendicularium curvae ad altitudinem productarum aequari  $MK$ . intervallo, perpendicularis et applicatae, in altitudine, hoc loco dimidio lateri recto, ad curvam. Quae si haberri posset summa omnium  $IK$ . ad basin, daretur curvae parabolicae aequalis recta. Ipsa autem  $IK$ . varie determinari

10 potest: est enim  $\sqrt{\frac{AD^2}{4} + 2AM \cdot \frac{AD}{2}}$ , est etiam  $IM^2 + MK^2$ . (nam  $MK^2 = \frac{AD^2}{4}$ . et  $IM^2 = AM \cdot AD$ .)

Manifestum est porro haberri summam omnium  $MB$ . ad basin, cum constitut figuram, quadrabilem, semiparabolam; et summam omnium  $MK$ . quia semper idem; ergo et omnium  $KB$ .

$$15 \quad \frac{BL}{IM} = \frac{MK = \frac{AD}{2}}{MB - \frac{AD}{2}}. \quad \text{Ergo } BL = \frac{\frac{AD}{2} \cdot IM}{MB - \frac{AD}{2}}.$$

$$\frac{IL}{IK} = \frac{MB}{MK}. \quad \text{Ergo } IL = \frac{MB \cdot IK}{MK}.$$

In omni figura curvilinea duo diversa haberri possunt triangula characteristica, ut pro  $ACB$ , habes  $CGA$ . idque aliter pro varie assumto puncto  $C$ . Idem non quidem in toto quadrante ellipseos, attamen in eius parte. Sed pro puncto  $C$ . eligendum est aliquod 20 omnium commodissimum.

6 ad basin *erg. L* 19 f. Sed ... commodissimum. *erg. L*

---

6 alibi demonstratum: s. N. 28 S. 503 Prop. 6. 15  $\frac{BL}{IM}$ : Es müsste umgekehrt  $\frac{IM}{BL}$  heißen. —

Leibniz rechnet konsequent weiter.

*IK.* etiam sic determinari potest:

$$\begin{aligned}
 Rq_1 & \xrightarrow{\substack{NK\Box \\ AD\Box}} \frac{AD^2}{4} + 4AM^2 + 2\frac{AD}{2} \wedge 2AM & - IM\Box & - NM\Box \\
 & & & 4AM^2 \\
 \text{fiet} \quad Rq_1 & \frac{AD^2}{4} + 2AD \wedge AM - IM^2 = Rq_1 \frac{AD^2}{4} + AD \wedge AM, \\
 & & \swarrow \quad \searrow \\
 & & AM \wedge AD
 \end{aligned}$$

sed res reddit eodem.

Summa omnium  $IK$ . ad basin est hyperbola, ideoque curva parabolica pendet a quadratura hyperbolae, quoniam summa omnium  $IK$ . ad basin = ipsi  $MK$ . perpetuo eidem ad arcum.

Sunt tamen NB. figurae curvilineae, in quibus non possunt duo  $\nabla^{\text{la}}$  characteristicæ haberi, qualia sunt figuræ finitæ, seu quadrantes, ut circularis, ellipticus, ovalis, in quibus duo latera, unumquodque perpendicularē est curvae.

Omnis curva alterius curvae trochoeis esse potest, ac nescio an non et cycloaeis. Hoc si analytice inveniri potest, habemus totidem curvis aequales rectas. Praeclarum est analyseos per indivisibilia specimen quod ab Hugenio datum est, in curvis evolutis indagandis.

Fingi possunt modis innumerabilibus descriptrices summabiles ad curvam, iisque casibus etiam curvae descriptae erunt rectificabiles. Nota diversa describetur curva, trichoeis ab ellipsi eadem revoluta, si scilicet aliud atque aliud punctum in ea signatum intelligatur. Idem est in aliis curvis. Videndum an eadem curva diversarum aliarum trichoeis esse possit, non puto.

10

2

### 17–21 Daneben Merkfigur:



6 sed ... eodem. *erg.* *L* 7 ad basin *erg.* *L* 13 et (1) circularis (2) cycloies *L* in anderer  
Tinte 17 descriptrices (1) assignabiles (2) summabiles *L*

15 ab Hugenio datum: s. v. a. *Horologium oscillatorium*, 1673, Teil III, Satz XI, S. 81–90 (*HO XVIII* S. 224–241). — s. a. N. 2.

$$\begin{array}{r}
 \frac{3a^2}{4} \\
 Rq \quad \underline{\frac{a^2 - b^2}{a}} \quad \underline{\cancel{a^2} - \cancel{b^2}} \\
 \frac{a}{2} \\
 \underline{\cancel{a}} \quad \underline{\frac{3a^2}{4} - b^2} \quad f \quad \frac{3a}{4} - \frac{b^2}{a}
 \end{array}$$


$$\begin{array}{cccccc}
 5 & \frac{2\emptyset - 4}{4} & Rq 9 - 0. & Rq 9 - 1. & Rq 9 - 4. & Rq 9 - 9. \\
 & \underline{16} & Rq 9 & Rq 8 & Rq 5 & 0 \\
 & \frac{2\emptyset - 9}{4} & Rq 16 - 0. & Rq 16 - 1. & Rq 16 - 4. & Rq 16 - 9. & Rq 16 - 16. \\
 & \underline{16} & Rq 16 & Rq 15 & Rq 12 & Rq 7 & 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 a - b \\
 \frac{a - b}{a^2 [bricht ab]} \\
 + a^2 + a Rq ba - ba
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 a + Rq ba - b \\
 \frac{a + Rq ba - b}{-ba - b Rq ba + b^2} \\
 + a Rq ba + ba - b Rq ba
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 15 & \text{Auferenda: } [-] 2b^2 - 2aRq ba - \cancel{b\emptyset} \\
 & \text{Adicienda: } + \cancel{2ba} - 2b Rq ba \\
 & \text{Comparanda iam: } + 2b^2 + 2a Rq ba \propto +ba + 2b Rq ba.
 \end{array}$$

Haec si sibi invicem deducantur fiet:  $2a - b \wedge Rq ba, -b \wedge a - b$ , sed hoc tamen multum  
 20 abest a 0. Ideo eligenda eiusmodi quae si iis auferas addasve expressa in quantitate data,  
 ut  $b^2$ , et deinde quae in ipsis auferri addive iubentur, quam proxime accedant ad 0. et  
 quidem regula universalis.

5 (1) Rq, 9 – 0. Rq, 9 – 1. | Rq, 9 – 4. 0. streicht Hrsg. | (2) Rq 9 – 0. L 16 Vorzeichen erg.  
 Hrsg.



[Fig. 2]

De cycloide contracta fig. 1 et 7. sed quia ibi pleraque peccata deletaque sunt, hic breviter corrigemus: Ut data  $CI$ . investigemus  $CG$ . sic agendum est: ducatur  $ON$ . (dimidia  $DI$ ) perpendicularis ad  $CI$ . erit  $CN$ . dimidia  $CI$ . restat [ut] investigemus  $NG$ .

(nam  $NG + \frac{CI}{2} = CG$ ) quod facile est, nam  $Rq OG^2 - ON^2 = NG$ . Cumque summam 5  
 $CN$ . vel  $\frac{CI}{2}$ . ad curvam circularem dudum habeamus, summam  $NG$ . separatim inire  
 sufficit. Est autem  $OG^2 = \frac{a^2}{\beta^2}$ . erit ergo

$$NG = \sqrt{\frac{a^2}{\beta^2} - \frac{\gamma a}{2}} \quad \sqrt{\frac{a^2}{\beta^2} - \frac{2\gamma a}{2}} \quad \sqrt{\frac{a^2}{\beta^2} - \frac{[3]\gamma a}{2}} \quad \text{etc.}$$

Ergo locus omnium  $NG$ . altitudini  $BC$ . applicatorum est curva parabolica. Debet autem inveniri summa omnium  $GN$ . ad arcum circuli, ut habeatur summa omnium arcuum curvae cycloidis contractae. Summa autem omnium  $GN$ . ad arcum circuli aequatur summae omnium  $PG$ . ad altitudinem<sup>3</sup> uti summa omnium  $DI$ . ad altitudinem, aequi-

10

1 [Fig. 2] erg. Hrsg. nach Text und N. 29. 4 ut erg. Hrsg. 8 2 L ändert Hrsg.

3 corrigemus: Leibniz greift hier die Gedanken von N. 29 S. 526 Z. 7–10 wieder auf. Auch dieser zweite Versuch ist nicht fehlerfrei und führt zu keinem befriedigenden Ergebnis.

valet summae omnium  $CI$ . ad arcum. Ut autem habeamus  $PG$ . ducatur  $OQ$ . aequalis et parallela  $NG$ . patet  $\nabla^{\text{lum}} OQP$ . esse simile  $\nabla^{\text{lo}} CNO$ . Ergo  $\frac{PQ}{ON} = \frac{QO}{CN}$ . Ergo  $PQ = \frac{QO \cdot ON}{CN}$  vel  $\frac{NG \cdot DI}{CI}$ . Videamus an constans sit ratio  $\frac{NG}{CI}$ . Dictum est qualis sit  $NG$ . nimirum  $Rq.$  differentiae inter  $OG^2$  et  $ON^2$ . At  $CI$  est  $Rq.$  differentiae inter  $5 \beta^2 OG^2$  et  $4ON^2$ . erit ergo ratio  $\frac{\sqrt{OG^2 - ON^2}}{\sqrt{\beta^2 OG^2 - 4ON^2}} = \sqrt{\frac{OG^2 - ON^2}{\beta^2 OG^2 - 4ON^2}}$ . Ergo  $PQ = \sqrt{4ON^2} \sim \sqrt{\frac{OG^2 - ON^2}{\beta^2 OG^2 - 4ON^2}}$ . Quando autem  $\beta^2 = 4$ . seu quando  $OG = OC$ . tunc summa omnium  $PQ$ . quadrabilis, sive curva cycloidis haberi potest, tunc enim non est protracta vel contracta.

Etiam atque etiam considerandum est, an non sint aliqui casus methodi per inscripta 10 et circumscripta, quia per communem methodum indivisibilium suppleri nequeant — qualis videtur esse quadratura lunulae Hippocraticae.

Nimirum non video quid prohibeat excogitari figuras, in quibus summa laterum inscriptorum crescat, circumscriptorum decrescat in tali ratione, ut concursus eorum definiri possit, vel per problema planum vel per solidum. Fingendo scilicet summam laterum semper extendi; hic locus erit utendi illis seriebus infinitis summabilibus, quarum summae finitae, seu cum summa infinitarum linearum non it in planum: aut potius hic locus est inveniendi terminum alicuius seriei eiusmodi dupliciter affectae, id est partim crescentis partim descendentis, donec incrementorum decrementorumque differentia evanescat. Ita non opus est serie convergente, sufficit simplex vel inscriptorum solum, vel 20 circumscriptorum solum.

Caeterum inscripta fiunt per chordas, circumscripta per tangentes, concurrentes. Hae autem incident in nostrum triangulum characteristicum, et ideo utiliores. Porro utile foret tentare possitne fieri, ut chordae laterave inscripta pariter ac circumscripta semper sint aequalia, quod fieri posset, faciendo ea semper aequalia, et residuo ultimi, quod 25 succedere non vult, seu iusto minus est, faciendo partes reliquorum subdividendorum aequales, etsi qua pars rursus superest, ita denuo procedendo, ita in infinitum semper habebuntur latera aequalia. Quodsi iam hac laterum in aequalia divisione aliae quae-dam lineae quoque aequales aut apte crescentes orientur, v. g. omnes perpendicularares ad illa latera, aut applicatae crescentes certa quadam progressione, eaque constanti, id

est apparitura, subdivisa licet figura in infinitum; tunc applicatae istae lineae ad curvam summari poterunt.

Si persequamur applicatae datae figurae ut hyperbolae, in quas figurae alia forma ingredi possint, v. g. ut intervalla perpendicularium, tangentium etc., tunc eo ipso nova de ipsa theoremata habebimus, eiusque applicata curvae altitudini, basi alterius applicabimus, easque hoc modo cum aliis figurae novae lineis comparabimus. 5

Loci distantiarum inter focos in ellipsi et hyperbola perpetuarum, possunt esse quasi ellipses et quasi hyperbolae in quibus distantiae illae decrescant crescentve certa ratione.

Non tantum inscripta et circumscripta latera, sed et polygona ipsa, quorum latera sunt eorumque quantitas continue crescens decrescensve considerari potest ad habendam 10  
figurae quantitatem, ut prius curvae.

Alia est methodus pro summis curvarum, ut scilicet dividatur altitudo eum in modum, in partes forsitan inaequales, ut latera quoque seu arcus trianguli characteristici, seu chordae inassignabiles certa proportione summabili crescent decrescantve.

$$\text{Ellipsis } 2ax - \frac{a}{t}x^2 = y^2, \text{ unde } \cancel{2ap} - \cancel{\frac{2a}{t}}xp = \cancel{2y^2}, \text{ seu } p = \frac{y^2}{a - \frac{a}{t}x} = \frac{2ax - \frac{a}{t}x^2}{a - \frac{a}{t}x}, \quad 15$$

$$\text{hoc dividatur } y, \text{ hoc inquam dividatur } y = \sqrt{2ax - \frac{a}{t}x}, \text{ seu } \frac{y}{\sqrt{y^2 - \frac{a}{t}x}} = \frac{y \wedge a - \frac{a}{t}x}{y^2 - \frac{a}{t}x},$$

$$\text{fiet } \frac{a - \frac{a}{t}x}{y} = \frac{a - \frac{a}{t}x}{\sqrt{2ax - \frac{a}{t}x^2}}, \text{ differentia ordinatae ellipsis, eius } \square^{\text{to}} \frac{a^2 + \frac{a^2}{t^2}x^2 - \frac{2a^2}{t}x}{2ax - \frac{a}{t}x^2},$$

3 ut hyperbolae *erg. L*

---

15–544,2 Dieser Abschnitt steht auf Bl. 267r° oben und ist zusammen mit der Zahlenrechnung durch einen Trennstrich von dem übrigen Text abgesetzt. Er dürfte zuerst auf den Bogen geschrieben worden sein.

additoque 1 =  $\frac{2ax - \frac{a}{t}x^2}{2ax - \frac{a}{t}x^2}$ , fiet:

$$\sqrt{\frac{a^2 + \frac{a^2}{t^2}x^2 - \frac{2a^2}{t}x - \frac{a}{t} - 2a}{2ax - \frac{a}{t}x^2}} \quad \text{latus curvae ellipticae.}$$

$$\sqrt{\frac{a^2 t^2 + a^2 x^2 - a^2 t x - 2a^2 t^2 x + 2a^2 t^2 x}{2a^2 t^2 x - a^2 t x^2}} = \sqrt{\frac{at^2 + ax^2 - tx^2 - 2atx + 2t^2 x}{2t^2 x - tx^2}}.$$

$$\frac{a^2}{a \neq \sqrt{ax}} = y, \quad a^2 = ay \mp y\sqrt{ax}, \quad \text{vel} \quad a^2 - ay = \pm y\sqrt{ax}, \quad \text{vel} \quad a^4 - 2a^3y + a^2y^2 = y^2ax. \quad \text{Ergo} \quad \frac{a^3}{y^2} - \frac{2a^2}{y} + a = x.$$

5       $\frac{a}{a + \sqrt{ax}} = \frac{a}{\sqrt{ax}} - \frac{a^2}{ax} + \frac{a^4}{a^2x^2}$     etc.    Iam  $\frac{a^2}{\sqrt{ax}} = y$ , dabit:  $\frac{a^4}{ax} = y^2 = \frac{a^3}{x} = y^2$ . Ergo  
 $x = \frac{a^3}{y^2}$ . Ergo reliqua  $-\frac{2a}{y} + a$ , aequant:  $-\frac{a}{x} + \frac{a^2}{x^2} - \frac{a^4}{x^4}$     etc.    Quo posito differentia  
 inter  $\frac{2a}{y}$  et  $\frac{a}{x}$  in illa hypothesi  $+a$ , summa erit horum  $\frac{a^2}{x^2} + \frac{a^4}{x^4}$     etc.    Videndum  
 an inde aliqua lux ad summam eiusmodi indagandam. Imo differentia ista nihil aliud  
 est quam spatium quoddam hyperbolicum. Inprimis consideratione dignum, quod eadem  
 10     oritur figuram quomodo cunque explicetur  $\neq$  sive per  $+$  sive per  $-$  unde etiam differentia

2    Darunter in anderem Duktus:

$$\begin{array}{r} 1673 \\ - 96 \\ \hline 10038 \\ - 15057 \\ \hline 160608 \end{array}$$

5     $\frac{a}{a + \sqrt{ax}}$ : in der Reihenentwicklung überspringt Leibniz das dritte Glied, dies wirkt sich bis zum Ende des Abschnitts aus.

inter haec duo  $\frac{a}{\sqrt{ax}} - \frac{a}{x} + \frac{a^2}{x^2}$  etc. alternantem, et simplicem  $\frac{a}{\sqrt{ax}} + \frac{a}{x} + \frac{a^2}{x^2}$  etc.  
deberet haberi.

Adhibeat  $\frac{\sqrt{ax}}{a \mp \sqrt{ax}}$ . Unde fiet:  $\frac{\sqrt{ax}}{a} - \frac{ax}{a^2} + \frac{\sqrt{a^3x^3}}{a^3}$  etc. vel etiam  $\frac{\sqrt{ax}}{a + \sqrt{ax}} = \frac{\sqrt{ax}}{a} - \frac{\phi x}{a^2 + \phi \sqrt{ax}}$ . Iam si  $\frac{xa}{a + \sqrt{ax}} = y$ . erit  $xa - ay = y\sqrt{ax}$ . et  $x^2a^2 - 2a^2xy + a^2y^2 = axy^2$ . Ergo  $a^2y^2 = -x^2a^2 + \frac{2a^2y}{ay^2}x \cdot \frac{a^2y^2}{a^2} - \frac{\square_{a^2y + \frac{ay^2}{2}}}{a^4} = -\frac{x^2a^2}{a^2} + \frac{ay^2}{a^2}x - \frac{\square_{a^2y + \frac{ay^2}{2}}}{a^4}$ . Ergo  $\left[ \sqrt{a^2y^2 - \frac{\square_{a^2y + \frac{ay^2}{2}}}{a^2}} = \pm ax \mp \frac{a^2y + \frac{ay^2}{2}}{a} \right]$

Alia figura  $\frac{a^2}{a + \sqrt{ax} + x} = y$ . Ergo  $a^2 = ay + y\sqrt{ax} + xy$ , vel  $a^2 - ay - xy = y\sqrt{ax}$ . vel  $a^4 - 2a^3y - 2a^2xy + a^2y^2 - \frac{3}{2}ay^2x + x^2y^2 = y^2\cancel{ax} = 0$ . vel  $a^4 - 2a^3y + a^2y^2 = 3ay^2x - x^2y$ .

Unde ad extractionem radicis a latere  $x$  veniri potest.

$$\begin{aligned} \text{Iam } \frac{a}{a + \sqrt{ax} + x} &= \frac{a}{\sqrt{ax} + x} - \frac{a^2}{ax + \sqrt{ax^3 + x^2}} \\ &\quad + \frac{a^3}{\sqrt{a^3x^3 - \sqrt{a^2x^4 + \sqrt{ax^5 + ax^2 + \sqrt{ax^5 + x^4}}}} \quad \text{etc. et summa} \\ &\quad (ax^2) \end{aligned} \quad 10$$

tamen horum omnium facilius ita iniri potest:

7 *Daneben:* Haec ergo figura licet tam implicata ex hyperbolae quadratura pendet.

3–6 Adhibeat ... Ergo  $\sqrt{a^2y^2 - \square_{a^2y + \frac{ay^2}{2}}} = \pm x \mp \frac{a^2y}{a}$  [bricht ab] am Rande erg. L, ändert  
Hrsg. 3 etc. (1) vel etiam  $\frac{\sqrt{ax}}{a} - \frac{ax}{a^3 \mp \sqrt{a^5x}}$ . (a) Unde (b) Hoc transformetur (2) vel L

7 Alia: In den Rechnungen der beiden folgenden Abschnitte unterlaufen Leibniz verschiedene Flüchtigkeiten, eine davon — S. 546 Z. 1, wo es  $a^2$  anstelle von  $xa$  heißen müsste — führt zu dem trügerischen Endergebnis.

$\frac{a}{x} - \frac{a\sqrt{ax+xa}}{x^2}$  + etc. ita ut iam haec summa, ubi numeratores tantum sunt compositi,  
priori licet implicatissimae ubi nominatores compositi erant aequetur. Iam  $\frac{a\sqrt{ax+xa}}{x^2}$  ita  
resolvi potest in partes[:]  $\frac{xa}{x^2} = \frac{a}{x}$ . unde priori  $\frac{a}{x}$  rursus  $\frac{a}{x}$  adimitur, et  $\frac{a^2\sqrt{ax}}{x^2} = y$ . unde  
 $\frac{a^3x}{x^4} = y^2 = \frac{a^3}{x^3}$ . cuius datur quadratura. Eodem modo si pergatur ad  
5  $\frac{a\sqrt{ax+xa}, \sqrt{ax+x}}{x^2}$  fiet  $\frac{a^2x + ax\sqrt{ax+xa}\sqrt{ax+x^2a}}{x^3}$  sive  $\frac{a^2}{x^2} + 2\frac{\sqrt{a^2x}}{x^3}$  (unde = y,  
et  $\frac{a^2x}{x^6} = y^2$ ,  $\square$ bile)  $\frac{a}{x}$ . Unde iterum  $\frac{a}{x}$ , quod rursus per sequens destruetur.

Si inveniri posset ars inveniendi figuram ex data tangentium proprietate, eadem  
opera credo arithmetic summarum perficeretur; possumus enim semper opinor ope di-  
visionum istarum excogitare figuram ex cuius quadratura pendeat seriei alicuius geo-  
10 metricae finitiae infinitaeve summa. Et quoniam credo ostendi posse omnium figurarum  
dari quadraturam ope logarithmorum iam superest rem illam maximam ostendere, quo-  
modo scilicet datae cuilibet seriei arithmeticæ adhiberi possit arithmeticō-sygnotos sal-  
tem quando aliter id fieri non potest per approximationem. Duo igitur maxima puto  
15 praestari posse[:] r e s o l u t i o n e m omnium aequationum, per tabulam sinuum, sive  
cyclicam, et c o m p o s i t i o n e m omnium aequationum per hyperbolicam.

T a b u l a Leibnitiana: ad quam opus instrumento meo. Grandis calculus  
maximorum calculorum cui libro apparatus tabulae Leibnitianae servabitur, unde ex-  
cerptetur exigua ad usum qualis sinuum et logarithmorum communis. Ab altero latere  
tabulae repraesentabitur eius sinus si ipse pro arcu sumatur; eius logarithmus si pro  
20 naturali; eius potestates si pro radice.

Tabula condenda inversa: in qua cuilibet numero naturali e regione ponatur arcus  
qui ei respondet si pro sinu sumatur, et numerus naturalis qui ei respondet si sumatur  
pro logarithmo; item radix quae ei respondet quadratica, cubica etc. Huic tabulae fun-  
damentum est sinuum et logarithmorum calculus ad summam vastitatem extensus. Ita

3 rursus (1) aliiquid additur (2)  $\frac{a}{x}$  adimitur  $L$  16–547,4 T a b u l a ... radicum. erg.  $L$

et logarithmus exhiberi possit, qui rationem habeat datam ad logarithmum denarii, et sinus qui ad eundem rationem habeat datam.

Ante omnia condenda tam vasta logarithmorum tabula, inde enim facile habentur sinus et extractiones radicum.

1 f. ad logarithmum denarii *und* ad eundem *erg. L*

## 31. NOTAE MAXIME AD CIRCULI QUADRATURAM RELATAE

[Sommer 1673]


**Überlieferung:** L Notiz: LH 35 II 1 Bl. 254–255. 1 Bog. 2°. 4/5 S. auf Bl. 254 v°. Bl. 254 r° leer. — Auf dem übrigen Bogen N. 32.  
Cc 2, Nr. 883 tlw.

5

Datierungsgründe: Das vorliegende Stück ist als erstes auf den Bogen geschrieben worden. Es ist daher zeitlich kurz vor N. 32 (vgl. dort) anzusetzen.

*Fortification nouvelle de Honoré Meusnier présentée au Roy.*

Modum proponit triangula ac quadrangula, ac pentagona aequa bene fortificandi, ac  
10 ea in quibus numerus laterum maior. Idque non *par bastions flanquez, mais par des autres especes d'ouvrages, qu'il appelle avantgardes*. Variasque alias adhibet formas non communes.



[Fig. 1]


Est in fol. 1626 circiter Parisiis editus.

15 P. Gregorius a S. Vincentio demonstravit ni fallor si ea sit ratio  $ab$  ad  $cd$ , quae est  $cd$  ad  $ef$ , spatia  $ad$  et  $cf$  esse aequalia[;] si inaequalia sint etc. ostendit, id unde deduxit P. Sarrasa usum ad logarithmos.

---

8 *Fortification*: HONORAT de MEYNIER, *Les nouvelles inventions de fortifier les places*, 1626.

15–17 Vgl. dazu: G. de SAINT-VINCENT, *Opus geometricum*, 1647, S. 586 (Satz 109) und S. 594–597 (Satz 125–130) sowie A. A. de SARASA, *Solutio*, 1649, S. 7 f.



[Fig. 2]

Georgius Aloysius de Löwenthurn defensionem problematis Austriaci suscepit.

Domin. de Nonantcourt *Euclides Logisticus*. Is primus compositionem rationum demonstravit, teste Fr. Ainscomb. in defensione quadraturae P. Gregorii.

Quadrasse ait Ainskom, P. Gregorium duarum hyperbolarum similiū et aequalium certo modo positarum lineis curvis comprehensum spatium. 5

P. Mersennum voluisse reducere problematum Gregorianorum solutionem ad solutionem huius problematis: exhibere lineas quae sunt ut logarithmi duorum terminorum rationem datam habentium. Eamque resolutionem esse ultimam solutionem P. Gregorii non obscure innuit, hanc esse sententiam Robervallii. 10

P. Ainskom refert epistolam Cartesii ex Svecia scriptam ad amicum, qui de Robervallio ita iudicat: *Si M. Roberval n'a pas l'esprit de refuter le P. Gregoire, et si le dit pere ne trouve point d'autre adversaire que celui cy il ne luy sera pas difficile de se defendre.*

2 suscepit: GOTTFRIED ALOYS KINNER von Löwenthurn, *Elucidatio geometrica*, 1653. 4 teste: FRANÇOIS XAVIER AYNSCOM, *Expositio ac deductio*, 1656, S. 72. Aynscorn bezieht sich auf FRANÇOIS de NONANCOURT, *Euclides logisticus*, 1652. — In HANNOVER, *Niedersächs. Landesbibl.* befindet sich ein Handexemplar des *Euclides logisticus* (Ms IV 380a) mit zahlreichen Eintragungen von Leibniz' Hand aus früh-hannoverscher Zeit. 5 Quadrasse: s. AYNSCOM, *a. a. O.*, S. 101 f. Aynscorn bezieht sich hier auf das *Opus geometricum* S. 603 (Satz 139). 7–10 Vgl. dazu M. MERSENNE, *Novarum observationum*, 1647, S. 71 f. bzw. A. A. de SARASA, *Solutio*, 1649, S. 4 sowie AYNSCOM, *a. a. O.*, S. 105. 11 refert: AYNSCOM, *a. a. O.*, S. 108; s. a. DO V, S. 464 f.

Video P. Gregorium invenisse primum, cylindrum aequalem esse parabolae in seipsum inverse ductae. Cum ego putarem me id invenisse.

Postea conatur hunc ductum cubare. Sed hoc ego successurum vix crediderim.

- Quadraturam quae ex mesolabo dependeret, ineptam fore ait P. Ainskom, ego id  
5 minime arbitror, haberemus enim certe exactam exhibendae rectae circulo aequalis rationem, etsi conicam.

$$\begin{array}{llll} Rq \beta a & Rq 2\beta a & Rq 3\beta a & Rq 4\beta a \\ Rq, a^2 - \beta a. & Rq, a^2 - 2\beta a. & Rq, a^2 - 3\beta a. & Rq, a^2 - 4\beta a. \\ \sqrt{\beta a^3 - \beta^2 a^2}. & \sqrt{2\beta a^3 - 4\beta^2 a^2}. & \sqrt{3\beta a^3 - 9\beta^2 a^2}. & \sqrt{4\beta a^3 - 16\beta^2 a^2}. \end{array} \quad \text{etc.}$$

10 solidum cui cylinder aequalis.

Dividantur omnia per  $a$ , vel  $Rq a^2$ . fiet:

$$\sqrt{\beta a - \beta^2}. \quad \sqrt{2\beta a - 4\beta^2}. \quad \sqrt{3\beta a - 9\beta^2}. \quad \sqrt{4\beta a - 16\beta^2}. \quad \text{etc.}$$

spatium aequale imo idem portioni circulari.

Et aequatio talis est huius figurae istae applicatae:  $y^2 = xa - x^2$ . Ergo  $\frac{y^2}{x} = a - x$ . vel

$$15 \quad \frac{y^2}{x} + x = a.$$

NB. non potest  $x$  exhiberi pure.

$y^2 + x^2 = xa$ . Ergo quad. sinus additum quad<sup>o</sup> altitudinis = quad. applicatae parabolicae, ergo locus omnium  $y$ , est ad circuli circumferentiam. Ergo nihil hinc lucis.

13 imo idem erg. L 16 f. pure. (1) Hinc nata figuras, quarum applicatae non possunt exhiberi pure geometrice. (2) Apparet autem manifeste locum ipsius  $y$ . esse (a) hyper (b) parabolam, (3)  $y^2 + x^2 = L$  18 circumferentiam. (1) Ergo  $y = \sqrt{xa - x^2}$ . idem  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ . Ergo  $xa - x^2 = a^2 - x^2$ . Ergo  $xa = a^2$ . (a) ut constat (b) quod absurdum. (2) Ergo  $L$

1 Video: *Opus geometricum*, S. 794 (Satz 136); das Ergebnis wird auch S. 840 angeführt. — Vgl. dazu J. WALLIS, *Arithmetica infinitorum*, 1656, S. 108 f. (Satz 136) = WO I, S. 426 f. 3 conatur: *Opus geometricum* S. 840; sein Vorhaben führt Saint-Vincent im 1. Teil des 9. Buches (S. 957–975) aus.

4 ait: AYNSCOM, a. a. O., S. 117.

## 32. MOMENTA SEGMENTI CIRCULARIS

[Sommer 1673]


**Überlieferung:** L (tlw. verworfenes) Konzept: LH 35 II 1 Bl. 254–255. 1 Bog. 2°. 2  $\frac{1}{5}$  S. auf Bl. 254 v° unten sowie Bl. 255 r° u. v°. Bl. 254 r° leer. — Auf dem übrigen Bogen N. 31.

Cc 2, Nr. 883 tlw.

5

Datierungsgründe: Das Stück ist offenbar unter dem Eindruck von Leibniz' ersten gründlichen mathematischen Studien in Frühjahr 1673 entstanden und stellt einen Versuch dar, der Kreisquadratur mittels Momentenbetrachtungen näherzukommen. Das Auftreten der 1. Form des Doppelvorzeichens sowie das Wasserzeichen des Papiers deuten auf eine Abfassung in zeitlicher Nähe zu N. 40 vom August 1673 hin.

10



[Fig. 1]

11 [Fig. 1]: Die Elemente  $I$ ,  $(H)$ ,  $DC$ ,  $QP$  fehlen in der Leibniz'schen Handzeichnung, kommen aber im Text vor; sie sind deshalb vom Hrsg. ergänzt worden.

[*Teil 1, gültig*]

Esto segmentum circuli,  $ABC$ . Habetur eius momentum ex axe  $AB$ . habetur enim summa quadratorum applicatarum basi  $BC$  parallelarum, cuius dimidium est momentum figurae ex  $AB$ . Sed si haberetur momentum ex basi  $BC$ . haberetur area figurae. Ponamus enim haberi momentum ex  $AB$  esto  $b^3$ . ex  $BC$  esto  $c^3$ . Ergo area figurae  $ABC$  esto  $x^2$ .

Distantia centri gravitatis ab  $AB$  erit  $\frac{b^3}{x^2}$ . et ab  $BC$  erit  $\frac{c^3}{x^2}$ . Datur ergo ratio harum distantiarum  $= \frac{b^3}{c^3}$ . ergo et recta, in quam cadit punctum seu centrum  $BF$ , si scilicet  $\frac{BG}{FG} = \frac{b^3}{c^3}$ .

Iam ex centro  $D$  ducatur rectae  $BF$  parallela  $DH$ . rectaeque ad eam perpendiculares:  $CI$  et  $BK$ . et  $ABC$  agatur circa axem  $HK$ . Patet momentum eius aequari cylindrico, cuius basis  $ABC$ . altitudo  $BK$ . quoniam distantia centri gravitatis, id est lineae  $BF$  ab axe  $HK$ . ducta in figuram dat eius momentum. Atqui totum momentum  $ABKICA$  ex axe  $IK$  quadrabile est, item momentum et  $CBKI$  trapezii, ergo et residui  $ABC$ . Posset ergo quadrari cylinder. Quod est absurdum.

2–14 *Dazu am Rande später ergänzt:*

Aliter[:] si habito momento ex  $AB$ . quaeras momentum ex  $DE$ . dicti semisegmenti  $ABC$  quod inveniri potest. Ergo potest duci recta  $DR$ . in quam cadit centrum gravitatis ipsius  $ABC$  semisegmenti. Hinc si semisegmentum volveretur circa  $XS$  vel  $TU$ . ipsi  $DR$ . axi aequilibrii parallelam, annulus productus aequabitur cylindrico cuius basis figura  $ABC$ . altitudo distantia ipsius  $DR$ . axis aequilibrii, ab axe revolutionis.

Hinc et p r o b l e m a , quamlibet circuli portionem statice bisecare.

Si quis alicuius portionis circularis momentum ex aliqua recta quae intra circulum (producta) in centrum non cadit, seu diametri portio non est, invenire posset, is quadraturam invenisset.

4 Sed (1) et habetur momentum ex basi  $BC$ . habetur enim momentum quadrantis  $ADE$  ex basi (2) si  $L$

19 annulus: genauer müsste der von Leibniz angegebene Wert noch mit  $2\pi$  multipliziert werden.

Sed ut ista clariora ⟨fiant⟩ ad calculos reducere operae pretium est.

Patet quadratum  $BC^2 = \square CD^2 - \square BD^2$ . Ergo ut habeatur summa quadratorum omnium parallelarum basi  $BC$ , ipsi  $AB$  applicatarum, inveniatur primum summa omnium quadratorum ipsius radii,  $CD$ . ad  $AB$  applicatorum, demta summa omnium  $BD^2$ .

Summa omnium radii quadratorum, ad  $AB$  applicatorum, posito  $AB = b$ . et  $CD = a$ . erit  $a^2b$ .

Summa omnium  $BD^2$  ad  $AB$  applicatorum est[:]

$$\begin{array}{rcl} a & + & a - \beta. \\ a & & \frac{a - \beta}{a^2 + a^2 + \beta^2 - 2\beta a} \\ \hline a^2 & + & a^2 + \beta^2 - 2\beta a + a^2 + 4\beta^2 - 4\beta a \end{array} \quad \text{etc.} \quad 10$$

$$\text{vel } a^2 + a^2 + a^2 \text{ etc.} + \beta^2 + 4\beta^2 \text{ etc.} - 2\beta a + 4\beta a + 6\beta a \text{ etc.} = a^2b + \frac{1}{3}b^3 - ab^2.$$

$$\text{Ergo summa omnium } BC^2 = a^2b - a^2b - \frac{1}{3}b^3 + ab^2. \text{ vel summa omnium } BC^2 = ab^2 - \frac{1}{3}b^3.$$

Hanc summam dimidiatam, seu momentum ne repetere necesse sit, appellemus ( $c^3$ ).

Iam ut quadrata omnium  $AB$  ad  $BC$  applicatarum, habeamus, ita procedendum est[:]

Dantur quadrata omnium parallelarum  $AD$  ad  $DE$  applicatarum, seu omnium applicatarum totius quadrantis, nempe  $a^3 - \frac{1}{3}a^3 = \frac{2}{3}a^3$ .

Dantur et quadrata omnium applicatarum portionis  $ELC$ . ipsi  $CL$ . parallelarum, nempe  $a EL^2 - \frac{1}{3}EL^3$ .

Ergo  $\frac{2}{3}a^3 - a EL^2 + \frac{1}{3}EL^3 = \text{summae omnium } \square^{\text{torum}}, \text{ applicatarum quadrilinei } CLDAFC. \text{ ipsi } AD \text{ parallelarum.}$  20

Quaeritur iam summa omnium quadratorum, applicatarum semisegmenti  $CBA$ , ipsi  $AB$  parallelarum.

13 dimidiatam, seu momentum *erg. L*

11 Leibniz verwendet hier verschieden große Vorzeichen, die größeren haben zugleich Klammerfunktion.

Et manifestum est  $AB^2 + BD^2 + AB \wedge BD = AD^2$ . itemque est in omnibus parallelis.

Ideo

$$AB^2 = AD^2 - BD^2 - AB \wedge BD.$$

vel quadratum parallelae ipsius  $AB$  aequatur quadrato parallelae ipsius  $AD$ . demtis:

- 5 quadrato ipsius  $BD$  perpetuo eiusdem, et rectangulo ex parallela ipsius  $AB$  in perpetuum  $BD$ .

Quare et summa quadratorum omnium parallelarum ipsius  $BD$  ad  $BC$  applicatarum aequatur summae  $\square^{\text{torum}}$ , omnium parallelarum  $AD$ . demto quadrato  $BD$  ducto in  $BC$ . seu demto  $BD^2 \wedge BC$ . demtaque praeterea summa omnium  $AB$  parallelarum, id est

- 10 spatio vel semisegmento  $ABC$  in  $BD$ . seu cylindrico cuius basis  $ABC$ . altitudo  $BD$ .

Fiet summa quadratorum parallelarum  $AB =$

$$\frac{2}{3}a^3 - a EL^2 + \frac{1}{3}EL^3 - BD^2 \wedge BC - ABC \wedge BD.$$

Est autem  $BC = a - EL$ . fiet:

$$\frac{2}{3}a^3 - a EL^2 + \frac{1}{3}EL^3 - a BD^2 - BD^2 \wedge EL - ABC \wedge BD.$$

- 15 vel quia  $EL = a - BC$ .

$$EL^2 = a^2 + BC^2 - 2a BC.$$

$$EL^3 = a^3 + a BC^2 - 2a^2 BC^2 - a^2 BC - BC^3 + 2a BC^2. \text{ vel}$$

$$a^3 - 3a^2 BC + 3a BC^2 - BC^3.$$

fiet:

$$20 \quad \frac{2}{3}a^3 - \underbrace{a^3 - a BC^2 + 2a BC}_{-a EL^2} + \underbrace{a^3 - 3a^2 BC + 3a BC^2 - BC^3}_{= EL^3} \cup 3$$

$$-BD^2 \wedge BC, -ABC \wedge BD.$$

7 ad BC applicatarum erg. L

1 manifestum est: Hier wird die Rechnung fehlerhaft. In der Folgegleichung vergisst Leibniz den Faktor 2. Zu diesem Versehen kommen im Laufe der Untersuchung weitere hinzu (S. 555 Z. 6, S. 555 Z. 13, S. 555 Z. 17, S. 556 Z. 5, S. 556 Z. 7). Die Fehler wirken sich bis zum Ende von Teil 1 aus und werden auch in den Teil 2 hinübergenommen.

Totum autem istud

$$\underbrace{\frac{2}{3}a^3 - a}_{\text{appellabimus}} \underbrace{EL^2 + \frac{1}{3}EL^3 - BD^2 \wedge BC}_{(d^3)} - ABC \wedge BD.$$

appellabimus  $(d^3)$   $-ABC \wedge BD.$

Et quia sector circuli,  $AFCD.$  est curva  $AFC$  in radium [dimidiatum]  $\frac{a}{2}$ . ideo curvam

appellabimus  $x,$  erit sector  $\frac{ax}{2}.$  A quo auferatur  $\nabla^{\text{lum}} DBC = \frac{BD \wedge BC}{2} = (e^2).$  erit 5

segmentum  $ABC = \frac{ax}{2} - e^2.$  et  $ABC \wedge BD = \frac{a^2x}{2} - e^2a.$

Ac summa quadratorum omnium ipsi  $AB$  parallelarum ad  $BC$  applicatarum erit  $d^2 - \frac{ax}{2} + e^2a.$  et momentum semisegmenti  $ABC$  ex basi vel semichorda aut sinu recto  $BC$  erit:

$$\frac{d^3}{2} - \frac{a^2x}{4} + \frac{e^2a}{2}.$$

$$\text{Ergo } \frac{FG}{BG} = \frac{d^3 - \frac{a^2x}{2} + e^2a}{2c^3}.$$

10

Ducatur parallela ipsi  $BF$  ex centro  $D.$  nempe  $DH.$  Actoque spatio  $ABC$  circa axem  $DH.$  momentum eius erit:  $\frac{ax}{2} \wedge BK.$

Investiganda ergo  $BK$  ex datis, quod ita facile fiet: Triangulum  $BKD$  est simile triangulo  $BGF$  (est enim simile  $\nabla^{\text{lo}} DKM.$  et hoc  $\nabla^{\text{lo}} DNK.$  et hoc  $\nabla^{\text{lo}} DLO.$  et hoc  $\nabla^{\text{lo}} BGF$ ) 15  
ergo

$$\frac{BK}{BG} \text{ cognita} = \frac{FB}{BD} \text{ cognita} \quad \text{ideo } BK = \frac{FB \wedge BG}{BD}.$$

4 dimidiatum *erg. Hrsg.* 8 vel ... recto *erg. L* 12 DH. | Intelligatur iam ducta, et ad eam perpendicularis  $BK.$  *gestr.* | Actoque  $L$

Posito  $BG = (f)$ . et  $BD = (g)$ . et  $FB = (y)$ . fiet:  $BK = \frac{yf}{g}$ .

Patet hinc:

$$\frac{ax}{2} \sim \frac{yf}{g} = \left( \frac{axyf}{2g} \right) = \text{momento semisegmenti } ABC \text{ ex axe } KI.$$

Cum autem  $y = FB$ . sit  $\sqrt{BG^2 + FG^2}$ . et  $FG = \frac{d^3 - \frac{a^2x}{2} + e^2a, \sim f}{2c^3}$ . vel pro  
 $\frac{d^3 + e^2a, \sim f}{2c^3}$  ponendo (i), fiet  $(FG) = i - \frac{a^2fx}{2c^3}$ , et  $FG^2 = i^2 + \frac{a^4f^2x^2}{4c^6} - \frac{2ia^2fx}{2c^3}$ .

et ponendo ( $\xi$ ) pro  $\frac{a^4f^2}{4c^6}$ . et (k) pro  $\frac{ia^2f}{c^3}$ , fiet  $FG^2 = i^2 + \xi x^2 - kx$ . Iam  $BG^2 = f^2$ .

Ergo

$$(FB) = \sqrt{f^2 - i^2 - \xi x + kx} = (y).$$

in quae ducta  $\frac{axf}{2g}$  dant momentum semisegmenti  $\frac{axyf}{2g}$ . Pro  $\frac{af}{2g}$  substituatur (l) fiet  
 momentum semisegmenti  $= \sqrt{f^2l^2x - i^2l^2x^2 - \xi x^4l^2 + kx^3l^2}$ .

10

[Teil 2, verworfen]

Idem vero momentum aliter investigabimus.

Ante omnia quaeremus momentum trapezii  $KBAP$  sive rectanguli  $KQ$ . et  $\nabla^{li} AQB$ .

Ac primum rectanguli  $KQ$  momentum investigare facile est, data recta  $KP$ . Est enim  
 $\frac{KB^2}{2} \sim KP$ . Investiganda est ergo ante omnia ipsa  $KP$ . quod ita fiet:

15

$DP$  est  $= FB$ .

ergo  $FB - DK = KP$ . investiganda ergo recta  $DK$ .

15 *Darüber*: Error NB.

1 f.  $\frac{yf}{g}$ . (1) Item aliter, quia  $\nabla^{lum}$  BDM simile  $\nabla^{lo}$  BGF. etiam  $\nabla^{lum}$  MGB simile erit  $\nabla^{lo}$  BGF,  
 ideo quia angulus MBF rectus recta FG producta incidet in M | *darüber separat gestr.*: falsum | ergo  
 $DM = BG$ . et  $DP = BF$ . seu  $\nabla^{lum}$  DMP = et simile  $\nabla^{lo}$  BGF. Iam et sic dici potest:  $\frac{BK}{BD} = \frac{BD}{BM}$ . ideo  
 $BK = \frac{BD = g \sim BD = g}{BM} = \frac{g^2}{z}$ . posito  $BM = (z)$ . falsum ergo  $BK = \frac{yf}{g}$ . et proinde | ut et *erg.* | id unde  
 deduxeramus rectam FG productam cadere in M. NB. falsum rectam  $DM = BG$ . ideo falsum et rectam  
 $BM$  esse cognitam. Sed haec mittamus, (2) Patet L

Et quia  $\nabla^{\text{la}} BKD$  et  $BGF$  similia erit  $\frac{DK}{FG} = \frac{BK}{BG}$ . Ergo  $DK = \frac{BK \cap FG}{BG}$ . vel quia  $BK$  rursus resolvenda in  $FB$ . brevius erit  $\frac{DK}{FG} = \frac{BD}{BF}$ . Ergo

$$DK = \frac{\frac{g}{FB} \cap FG}{FB}. \text{ seu } (DK) = \frac{ig - \frac{a^2 f g x}{2c^3}}{FB}.$$

a  $FB$  detractum relinquit  $KP$ . in quam rectam  $KP$ . ducendum quadratum dimidium rectae  $KB$ .

5

Est autem recta  $KB$   $\frac{yf}{g}$ . ergo  $KB^2 = \frac{y^2 f^2}{g^2}$  sive

$$\frac{f^4}{g^2} - \frac{i^2 f^2}{g^2} - \frac{\xi x^2 f^2}{g^2} + \frac{k x f^2}{g^2}.$$

et pro  $\frac{f^4}{g^2} - \frac{i^2 f^2}{g^2}$  ponendo ( $m^2$ ), pro  $\frac{\xi f^2}{g^2}$  ponendo ( $\omega$ ), pro  $\frac{K f^2}{g^2}$  ponendo ( $n$ ) fiet

$$(KB^2) = m^2 - \omega x^2 + nx.$$

ducendum in  $\frac{KP}{2}$ . quod cum sit radix surda, ipsum  $KB^2$  rursus quadrandum est, fiet

10

$$\left. \begin{array}{rcl} m^2 & -\omega x^2 & + nx \\ m^2 & -\omega x^2 & + nx \\ \hline +m^2 nx - \omega n x^3 + n^2 x^2 & & \\ -\omega x^2 m^2 & -\omega n x^3 + \omega^2 x^4 & \\ -\omega x^2 m^2 + m^2 nx & - & + m^4 \end{array} \right\} \text{sive}$$

15

$$\overline{+m^4 + 2m^2 nx - 2\omega m^2 x^2 + n^2 x^2 - 2\omega n x^3 + \omega^2 x^4} = KB^4.$$

ducendum primum in  $y^2$ . et a producti radice quadrata; adimenda est radix quadrata eiusdem  $KB^4$ , ducti in  $DK^2$ . Residui dimidium erit momentum quaesitum.

Porro quia in caeteris omnibus componentibus implicitum est  $x$ . demto  $m^4$ . ideo reliquis sequestratis, cogitemus tantum  $m^4$  duci in  $y^2$ . seu in  $f^2 - i^2$  etc. fiet  $m^4 f^2 - m^4 i^2 = (o^6)$ . Cumque reliquis omnibus terminis, sane quam plurimis implicitur  $x$ . ea omnia simul appellabimus  $z^6$ . Eritque

$$KB^4 \text{ in } FB^2 = o^6 \mp z^6.$$

Et quia idem  $KB^2$  ducendum in  $DK$ . manifestum est, nihil hic oriturum quod non incognito affectum sit, ob divisorem  $FB$  incognito affectum, etsi enim ex parte tantum, non potest tamen dividii per partes divisoris. Fieri tamen potest ut ab eo liberetur, dum scilicet oppositum aequationis per divisorem illum multiplicatur. Ideo se-

25

20

questratis caeteris ipsius  $KB^2$  terminis in  $DK$  ductis, quae simul ponamus facere:  $\omega^3$ ,

quia ipsa scilicet ab incognito liberari non possunt, cogitemus nunc  $m^2$  in  $\frac{ig - \frac{a^2 f g x}{2c^3}}{FB}$ ,

fiet: 
$$\frac{m^2 ig}{FB} - \frac{a^2 f g x m^2}{2 FB c^3}.$$

Sed quia posterius  $\frac{a^2 f g x m^2}{2 FB c^3}$  ab incognito illiberabile est, ideo nominemus ipsum  $v^3$

5 fietque

$$\sqrt{q} o^6 + z^6, -\frac{m^2 ig}{FB} + v^3 + \omega^3 = \text{momento rectanguli [K P.]}$$

Sed possum et simpliciter momentum totius rectanguli  $[BK(H)F]$  inire multiplicando  $KB^2$  in  $FB = \sqrt{q} o^6 + z^6$ . ergo momento.

Nunc et momentum  $\nabla^{\text{li}} AQB$ . est semitriangulum ductum in  $KB$ . et praeterea  
10 applicatarum  $\nabla^{\text{li}}$  ipsi  $AQ$  parallelarum quadrata dimidia.

Iam  $\frac{AQ}{BK} = \frac{a - g (AD - BD)}{g}$ . Ergo  $AQ = \frac{a BK - g BK}{g}$ .

Iam  $BK = \frac{FB f}{g}$ . Ergo  $AQ = \frac{af FB - gf FB}{g^2}$ .

Huius  $\square$ ,  $AQ^2$  erit  $\frac{a^2 f^2 FB^2 - f^2 g^2 FB^2}{g^4}$ .

Et quia  $FB^2$  est  $= f^2 - i^2 - \xi x^2 + kx$ . sumamus tantum  $f^2 - i^2$ , ea per  $\frac{a^2 f^2}{g^4}$ , vocemus  $(p^2)$

15 reliqua per eadem, vocemus:  $(\varphi^2)$  habemus:  $p^2 \neq \varphi^2$ . Eodem modo cum  $\frac{f^2 g^2}{g^4}, \sim f^2 - i^2$ ,

vocemus  $(q^2)$  et reliquum  $(\psi^2)$  fiet  $q^2 \neq \psi^2$ . ergo

$$AQ^2 = p^2 \neq \varphi^2 - q^2 \neq \psi^2.$$

Hoc ducamus in  $\frac{KP}{3}$ . seu in  $\frac{FB}{3} - \frac{ig - \frac{a^2 f g x}{2c^3}}{3FB}$  fiet  $\square$  ipsius  $AQ^2$ . nempe  $AQ^4$ . seu  
 $p^4 + q^4 - 2p^2q^2$  etc.  $\neq$  etc.

6f. rectanguli | KG ändert Hrsg.]. (1) Poteramus hoc labore supersedere, et simpliciter momentum (2) Sed  $L$  7 BKHF  $L$  ändert Hrsg. 9 est (1) triangulum (2) semitriangulum  $L$   
14 + kx. | Ac streicht Hrsg. | sumamus  $L$

Hoc ducatur in  $\frac{FB^2}{9}$ . ducatur ergo tantum in  $\frac{f^2 - i^2}{9}$  etc. sed hoc appellemus  $\alpha^6$ , reliqua neglecta omnia, ex ductu isto oriunda:  $(\omega^6)$  habemus:

$$AQ^4 \sim \frac{FB^2}{9} = \alpha^6 + \omega^6. \quad \text{et} \quad AQ^2 \text{ in } \frac{FB}{3} = \sqrt[4]{\alpha^6 + \omega^6}.$$

Idem  $AQ^2$  in  $\frac{ig}{3FB}$ , multiplicetur in ea tantum  $p^2 - q^2$ , fietque  $\left(\frac{\beta^4}{3FB}\right)$ . reliqua in idem

$$\frac{ig}{3FB} = (\varsigma^3). \text{ denique } AQ^2 \text{ in } \frac{a^2 f g x}{3FB \sim 2c^3} = (\rho^3). \text{ fiet: } \frac{\beta^4}{3FB} \neq \varsigma^3 - \rho^3 = AQ^2 \text{ in } DK. \quad 5$$

$$\text{Ergo } AQ^2 \text{ in } \frac{KP}{3} = \frac{\sqrt[4]{\alpha^6 + \omega^6} - \frac{\beta^4}{3FB}}{2} = \text{ momento trianguli } AQB.$$

Momentum iam quadrilinei  $QPHFQ$  quaerendum est.

Ac primum momentum totius  $HFAP$  semisegmenti, id est  $\square AP$  ductum in a demto cubo,  $HP^3$ .

Ac primum  $\square AP$  est  $BK + AQ$ ,  $\square$ . seu  $BK^2 + AQ^2 - 2AQ \wedge BK$ . 10

$$\text{Et quidem } AQ = \frac{afFB - gfFB}{g^2}, \text{ et } BK = \frac{FB \wedge f}{g}. \text{ Ergo}$$

$$AQ \wedge BK = FB^2 \sim \frac{af - gf}{g^2} \sim \frac{f}{g}.$$

$$\text{Iam } FB^2 = f^2 - i^2 - \xi x^2 + kx. \text{ Sumamus tantum } f^2 - i^2, \sim \frac{af - gf}{g^2}, \sim \frac{f}{g} = (\gamma^2) \text{ et}$$

reliqua omnia erunt  $(\pi^2)$  ergo  $AQ \wedge BK = \gamma^2 \pm \pi^2$ .

$$\text{Iam } \square AP = BK^2 + AQ^2 - 2\gamma^2 - \pm \pi^2$$

$$= m^2 - \omega x^2 + nx + p^2 \neq \varphi^2 - q^2 - \neq \psi^2$$

$$\text{seu: } \underbrace{m^2 + p^2 - q^2}_{(\delta^2)} + \underbrace{nx - \omega x^2}_{(\varpi)} \neq \varphi^2 - \psi^2.$$

Ergo  $\square AP = \delta^2 - \varpi^2$  in a erit  $a\delta^2 - a\varpi^2$ .

Nunc opus ut investigemus cubum ipsius  $HP$ .

$$\text{Iam } HP = a (= HD) - DP (= FB). \text{ ergo } HP = a - FB. \quad 15$$

15

20

Cubus de  $a - FB$ . est  $a^3 - 2a^2FB + 2aFB^2 - FB^3$ . seu

$$a^3 - \sqrt[3]{q} \theta^6 \neq \nu^6 \cup + \aleph^3 \neq \beth^3 - \beth^3 \neq \daleth^3.$$

$$\text{Ergo } a\delta^2 - a\varpi - \frac{a^3 + \sqrt[3]{q} \theta^6 \neq \nu^6 \cup - \aleph^3 \neq \beth^3 + \beth^3 \neq \daleth^3}{3}.$$

m o m e n t u m e s t s e m i s e g m e n t i.

5 Imo aliter potius, quadratum  $HP$  ducatur in  $\langle a \rangle$  erit  $a^3 + aFB^2 - \langle 2a^2FB \rangle$ .

Sed falsa determinatio ipsius  $HP$ , nempe  $a - FB$ . et hunc errorem iam supra [commisi], nec satis patientiae est, ad ista retexenda.

1

$$\begin{array}{r} a - b \\ a - b \\ \hline a^2 - ab + b^2 (!) \\ a - b \\ a^3 - 2a^2b + 2ab^2 - b^3 \end{array}$$

4 f. s e m i s e g m e n t i. | seu  $\frac{1}{3}$  in  $3a\delta^2 - a\varpi^2 - a^3$  gestr. | (1) Investigemus et momentum semi-segmenti CIH. ac primum  $\square FI = IK^2$ . (2) Imo  $L = 6$  erravi  $L$  ändert Hrsg.

## 33. VARIA AD CIRCULUM QUADRANDUM PERTINENTIA

[Sommer 1673]


**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 II 1 Bl. 194. 1 Bl. 2°. 1 S. auf Bl. 194 r° sowie 6 Z. nebst Fig. 3 auf Bl. 194 v° oben (= Teil 3). Fig. 1 und Teil 1 bis S. 564 Z. 6 vom übrigen Text mittels Trennstrich abgesetzt.  
Cc 2, Nr. 620

5

Datierungsgründe: Wegen des Verweises von S. 565 Z. 3 ist das vorliegende Stück nach N. 21 und nach N. 26 entstanden. Wegen des Wasserzeichens des Papiers ist es vor N. 40 vom August 1673 anzusetzen.

[Teil 1]

10



[Fig. 1]

---

11 [Fig. 1]: Zunächst hat Leibniz in Fig. 1 und im Text (bis S. 562 Z. 11) kleine Buchstaben zur Benennung verwendet; dann ist er zu Großbuchstaben übergegangen. In der Handzeichnung selbst hat Leibniz den Schnittpunkt von  $FH$  und  $EC$  mit  $I$  bezeichnet, gleichzeitig dient  $I$  aber auch zur Bezeichnung für den Fußpunkt des Lotes von  $C$  auf  $FH$ . Da Leibniz  $GL$  als infinitesimale Größe ansieht (vgl. S. 564 Z. 11), ist dies in 1. Näherung gerechtfertigt.

In circulo  $ACF$  ducta chorda  $EC$ . et ab extremis diametri  $F$ .  $G$ . iunctis rectis  $GC$ .  $FC$ . et ex centro  $A$  recta  $AB$  ducta, perpendiculari ad  $GC$ . aio triangula rectangula:  $ABC$  et  $FDC$  (vel  $DGC$ ) esse similia.

Nam ang.  $EFC =$  ang.  $GAC$ . ergo et ang.  $FEC$  vel  $FCE$  angulo  $AGC$  vel  $ACG$  aequalis.

5 Triangula ergo  $EFC$ .  $GAC$  similia, ergo et  $FDC$ .  $ABC$ . Q. E. D.

Ergo  $\nabla ABC$  simile triangulo characteristico cycloeidis. Sed hoc per se patet.

$$\nabla^{la} HFC \text{ et } IFC \text{ similia sunt seu } \frac{HF}{CF} = \frac{CF}{IF} = \frac{HC}{IC}. \text{ Ergo}$$

$$HF \wedge IF = CF \square. \quad HF \wedge IC = CF \wedge HC. \quad CF \wedge IC = IF \wedge HC.$$

Porro ex his colligi posse puto  $FI$ , quod quaerimus.

10 Esto  $FH = (a)$ .  $FC = (b)$ .  $FI = (x)$ . erit  $ax = b^2$ . Ergo  $\frac{b^2}{a} = x$ .

Porro  $FH = Rq_1 FL^2 - LH^2$ . et  $LH^2 = \text{Rad.}^2 - LA^2$ .

ergo  $FH = Rq_1 FL^2 - \text{Rad.}^2 + LA^2$ , sed  $FL^2 = \text{Rad.}^2 + LA^2 - 2FA \wedge LA$ .

Ergo  $FH = Rq_1 2LA^2 - 2FA \wedge LA$ .

$$15 \quad \left. \begin{array}{c} GH^2 = GL^2 + LH^2 \\ \quad \quad \quad \diagup \\ \underbrace{GL \wedge LF}_{\begin{array}{c} GL + LF \wedge GL \\ \underbrace{GF \wedge GL} \end{array}} \end{array} \right\} \text{ergo } GH^2 = GF \wedge GL.$$

$$20 \quad \text{Ergo } FH^2 = GF^2 - GF \wedge GL = \underbrace{GF - GL, \wedge GF}_{FH^2}.$$

8f.  $IF \wedge HC$ . | Ergo si  $FH$  sit diameter  $FG$ . et  $HC$  sit  $GC$ . et  $IC$  sit  $DC$ . erit diameter in *gestr.* |  
Porro  $L$

---

11–13 Die Rechnungen dieses Abschnittes sind nicht fehlerfrei. Bei korrekter Rechnung ergäbe sich  $FH = Rq_1 2\text{Rad.}^2 + 2FA \wedge LA$ .

$$FH = Rq GF^2 - GF \wedge GL. \quad FC = Rq GF^2 - GF \wedge GD.$$

$$\text{Ergo } \frac{GF^2 - GF \wedge GD}{Rq GF^2 - GF \wedge GL} = FI.$$

$$\frac{GF^4 + GF^2 \wedge GD^2 - 2GF^3, GD}{GF^2 - GF \wedge GL} = \boxed{FI^2 = \frac{GF^3 + GF \wedge GD^2 - 2GF^2, GD}{GF - GL}}.$$

$$\text{Ergo } \frac{FI^2}{GF} = \frac{GF^2 + GD^2 - 2GF, GD}{GF - GL}. \quad \text{Ergo } \frac{FI}{\sqrt{[GF]}} = \frac{GF - GD}{\sqrt{GF - GL}}. \quad \text{vel } \frac{FI^2}{GF^2} =$$

$$\frac{GF^2 + GD^2 - 2GF, GD}{GF^2 - GL \wedge GF}. \quad \text{Ergo } \frac{FI}{GF} = \frac{GF - GD = FD}{Rq GF^2 - GF \wedge GL, = FH}.$$

$$\frac{FI}{\sqrt{[GF]}} = \frac{GF - GD}{\sqrt{GF - GL}}. \quad \text{Ergo } FI = \frac{GF - GD}{\sqrt{\frac{GF - GL}{[GF]}}}.$$

$$FI \wedge FH = \underbrace{GF - GD}_{FD} \wedge GF = CF^2.$$

5

---

562,18 Nebenrechnung:

$$GL \wedge GL + GL \wedge LF = GL + LF \wedge GL$$

$$\begin{array}{rcl} aa & + & ab \\ & & \underline{ab} \end{array} = a + b, \wedge a$$

4+6 GD L ändert Hrsg. dreimal      5 Ergo (1)  $\frac{FI}{GF} \times \frac{GF - GD = FD}{Rq GF^2 - GF \wedge GL, = FH}$ . cylinder ergo  
 parabolicus = cylindro omnium FI, demto ductu omnium GD in FI (2)  $\frac{FI}{GF} L$

Ergo summa quadratorum  $CF^2$  pendet a summa quadratorum diametri, et summa omnium  $GD$  ducta in diametrum.

$$\frac{FD}{FL} = \frac{FI}{FH}, \text{ seu } \frac{FD}{FL} = \frac{FD \wedge GF}{FH^2}. \text{ Ergo } FL = \frac{FH^2}{GF}. \text{ Ergo } \frac{FD}{FL} = \frac{FD \wedge GF}{FH^2} = \frac{FI}{FH}.$$

$$\text{Ergo } \frac{FD \wedge GF}{FH} = FI.$$

$$5 \quad \frac{DI}{LH} = \frac{FI}{FH} = \frac{FD \wedge GF}{FH^2}. \quad DI = \frac{FD \wedge GF \wedge LH}{FH^2}. \quad CI = \frac{CF \wedge HC}{HF}.$$

$$\text{Ergo } \frac{FD \wedge GF \wedge HL}{FH^2} + \frac{CF \wedge HC}{FH} = DC.$$

In circulo  $LH$  sinus est  $Rq, a^2 - \alpha a - \beta$ .  $\square$

$$\begin{array}{c} \vee \\ a^2 + \beta^2 - 2a\beta = Rq, 2a\beta - \beta^2 \end{array}$$

10 ob  $\nabla^{\text{lum}}$  rectangulum  $ALH$ .

Idem  $LH$  sinus =  $GL \wedge LF$ ,  $Rq, = Rq, \beta, \wedge 2a - \beta, = Rq, 2a\beta - \beta^2$ ,. Multiplicetur per  $a - \beta$ . vel  $Rq, a^2 + \beta^2 - 2a\beta$ . fiet:

$$15 \quad \begin{array}{r} + a^2 + \beta^2 - 2a\beta \\ - \beta^2 + 2a\beta \\ \hline - \beta^4 - 4a^2\beta^2 \\ + 2a\beta^3 + 2a\beta^3 \\ - \beta^2 a^2 + 2a^3\beta \\ \hline \sqrt{\alpha - \beta^4 + 4a\beta^3 + 2a^3\beta - [5]a^2\beta^2} \end{array}$$


et horum quidem summa quadrari potest; puto etiam radicem extrahi posse. Imo dubito  
20 de radice.

Si iam differentiae sinuum sumantur:

$$Rq, 2a\beta - \beta^2, , - Rq, 4a\beta - 4\beta^2, , - Rq, 6a\beta - 9\beta^2, , \\ Rq, 4a\beta - 4\beta^2, , - Rq, 2a\beta - \beta^2, , \text{ summa pendet a q. c.}$$

4 f. FI. | AI =  $\frac{GF}{2\beta}$ . DI =  $\frac{GF}{2} - CI$ . streicht Hrsg. |  $\frac{DI}{LH} L$       18 3 L ändert Hrsg.      23 Unter  
Rq, 2a $\beta$  -  $\beta^2$ , :  $\sqrt{\alpha + a^2 + \beta^2 - 2a\beta}$ , L streicht Hrsg.

[Teil 2]



[Fig. 2]

Inspiciatur figura 2<sup>da</sup> *De ductibus*. In ea demittatur ex *K.* punto extremo rectae *AK.* sinus complementi perpendicularis in radium *AE.* esto *Kγ.* ne literas multiplicemus.

Manifestum  $\frac{K\gamma}{BO \sinus} = \frac{AO \text{ [sin. compl.]}}{AE \text{ [rad]}}$ . Ergo  $K\gamma = \frac{AO \wedge BO}{AE}$ . Datur autem qua-

dratura omnium  $K\gamma$ , quia  $K\gamma \wedge$  rad. = momentum sinus. Ergo cylinder omnium  $K\gamma$  aequalis momento sinuum et ideo quadrabilis.

$$\text{Aliter[:] } \frac{K\gamma}{HE \tan} = \frac{AK \sin. \text{ compl.}}{AH \sec.} = \frac{AK \square}{AE \text{ rad. } \square}.$$

$$\text{Ergo } K\gamma = \frac{AK \sin. \text{ compl. } \square^\wedge \text{ tang.}}{AE \text{ rad. } \square} \cdot \text{ vel } K\gamma^\wedge AE \text{ rad.} = \frac{\sin. \text{ compl. } \square^\wedge \text{ tang.}}{\text{rad.}}$$

Ergo  $K\gamma \wedge AE \square$  (quadrab.) = sin. compl.  $\square \wedge$  tang. Ergo  $\frac{K\gamma \wedge AE \square}{\sin. \text{compl.}}$  = mom. tang. 10

seu ductus hyperbolae in  $K\gamma$  = momento tangentium, is ergo ductus ex quadratura circuli pendet.

2 [Fig. 2] erg. Hrsg. nach Text u. N. 17. 5  $\frac{K\gamma}{BO \text{ sinus}} = (1) \frac{\text{AE rad.}}{\text{AO sin. compl.}} (2) \frac{\text{AO}}{\text{AE}} L \text{ ändert}$   
 Hrsg. 5 f. quadratura | summae streicht Hrsg. | omnium L

<sup>3</sup> *De ductibus*: vgl. N. 26 S. 433; die Figur befindet sich aber nicht dort, sondern N. 21 S. 388.

Substituamus pro  $K\gamma$  eius aequationem, erit:

$$\frac{\sin. \wedge \cancel{\sin. \text{compl.}}}{\cancel{\text{rad.}}} \wedge \text{rad.} \not\approx$$

$$\frac{\cancel{\sin. \text{compl.}}}{\sin. \text{compl.}} = \text{mom. tang.}$$

seu  $\frac{\sin. \wedge \cancel{\sin. \text{compl.}}}{\cancel{\text{rad.}}} \wedge \text{rad.} \not\approx$

$$\frac{\cancel{\text{rad.}}}{\sin. \text{compl.}} = \text{tang.} \wedge \cancel{\sin. \text{compl.}} \quad \text{fiet} \quad \frac{\sin. \wedge \text{rad.}}{\sin. \text{compl.}} = \text{tang.}$$

$\frac{\text{rad.} \wedge \text{rad.}}{\sin. \text{compl.}} - \frac{\sin. \wedge \text{rad.}}{\sin. \text{compl.}}$  horum id est differentiarum inter sec. et tang. summa

5 quadrabilis, seu horum  $\frac{\text{rad.} \square - \sin. \wedge \text{rad.}}{\sin. \text{compl.}}$ .

[Teil 3]

Operae pretium est examinare, an sinuum summa seu quadratura circuli exhiberi possit per infinitam seriem numerorum rationalium nulla surdorum mixtura ad exemplum hyperbolae.


7–567,6 Dazu oben am Rande: Imo id non procedit.

1 f. erit: (1)  $\frac{\text{AE rad.} \wedge \text{BO sin.} \wedge \text{rad.} \square}{\sin. \text{compl.}} = \text{mom. tang.}$  seu  $\frac{\text{radii cubus in sinum}}{\sin. \text{compl.} \square} = \frac{\text{mom. tang.}}{1}$ .

seu radii cubus in tangentem, aequatur sinus complementi cubo in sinum. (2)  $\frac{\sin. \wedge \cancel{\sin. \text{compl.}}}{\cancel{\text{rad.}}} \wedge \text{rad.} \not\approx$

L 5  $\frac{\text{rad.} \square - \sin. \wedge \text{rad.}}{\sin. \text{compl.}}$ . | Ergo si quadrari possent  $\frac{\sin. \wedge \text{rad.}}{\sin. \text{compl.}} \wedge \cancel{\sin. \text{compl. gestr.}}$  | L

5 quadrabilis: Dies ist nicht zutreffend.



[Fig. 3]

Esto quadrans circuli  $abc$ . sinusque duo  $de$ .  $fg$ . et sinus complementi  $eh$ .  $gi$ . ita tamen ut distantiae  $df$  vel  $hi$  intelligantur linea quavis assignabili minores. Quaeramus momenta portionum abscissarum  $bde$ , et  $bfg$ , ex axe librationis  $ac$ . quadrabilia. Differentia momentorum per sinum complementi divisa, dabit differentiam spatiorum, ipsum scilicet spatium  $dfge$  quoq; sinui coincidit, [Text bricht ab]

5

4 quadrabilia erg.  $L$       5 per sinum . . . spatiorum, erg.  $L$

34. ANNOTATIONES AD HONORATUM FABRI ET WALLISIUM. DE HYPERBOLA

[Sommer 1673]


Überlieferung: L Konzept: LH 35 II 1 Bl. 263–264. 1 Bog. 2°. 4 S.

5

Cc 2, Nr. 612

Datierungsgründe: Wie die gegenseitigen Bezüge zeigen, steht das Stück in engem Zusammenhang mit N. 26 und N. 27, ist also in deren zeitlicher Nähe anzusetzen.

[Teil 1]



[Fig. 1, Blindzeichnung]

10 Esto quadrans circuli  $ABC$  cuius altitudo  $AB$  divisa in partes infinitas aequales  $BF$ .  $FG$ . etc. Ex punctis divisionis ductae intelligantur applicatae basi  $BC$  parallelae  $GK$ .  $FL$ . etc. quibus comprehendentur quadrilinea infinita  $GKLF$ .  $FLCB$ . etc.

Momentum cuiuslibet applicatae ut  $FL$ , vel quod aequipolle, quadrilinei latitudinis infinite parvae ut  $FLBC$  ex basi  $BC$ , est factum ex ductu distantiae a b $\langle$ asi hoc $\rangle$  loco  
15  $FB$  in dictam  $FL$ .

Ideo momentum  $FL$  est  $1FL$ .

momentum  $GK$  est  $2GK$ .

momentum  $MN$  est  $3MN$ . etc.

momentum  $OP$  est  $8OP$ . posito  $FB$  esse = 1

Momentum totius quadrantis ex basi  $BC$  est  $\frac{2}{3}a^3$ . posita  $a = AB$ .

Momentum quadrilinei truncati  $BOPNC$  ex basi  $BC$  est compositum ex momento rectanguli  $BP$ , et momento semisegmenti  $PNCD$ .

Momentum rectanguli est:  $\frac{OB^2}{2} \hat{\wedge} \frac{OP}{BD}$ .

Momentum segmenti  $PNCD$  est  $a CD^2 - \frac{CD^3}{3}$ .

$$\text{Iam } \frac{\frac{2}{3}a^3 - \frac{OB^2}{2} \hat{\wedge} OP, -a CD^2 + \frac{CD^3}{3}}{OB} = OP.$$

Ita momentum quadrilinei truncati, est  $\frac{MB^2}{2} \hat{\wedge} MN - a CE^2 + \frac{CE^3}{3}$ .

$$\text{Et: } \frac{\frac{OB^2}{2} \hat{\wedge} OP + a CD^2 - \frac{CD^3}{3}, -\frac{MB^2}{2} \hat{\wedge} MN - \frac{CE^3}{3} + a CE^2}{MB} = MN.$$

Ecce novam exprimendarum circuli applicatarum seu Cartesiano more ipsius  $y$  (posito  $MB = x$ ) rationem, sed ex indivisibilium sive quadratricis geometriae calculo petitam, et quodammodo hyperboloeiforme, dum fractionum more quarum continue decrescent uniformiter nominatores, exprimuntur.

Iam aequationem istam polire conabimur:

$$\frac{OB^2 \hat{\wedge} OP}{2} + a CD^2 - \frac{CD^3}{3} - \frac{MB^2 \hat{\wedge} MN}{2} - \frac{CE^3}{3} + a CE^2 = MN \hat{\wedge} MB \hat{\wedge} (FB).$$

Quia autem ablatis a se invicem solidis, non nisi planum relinqu est solida illa aequalia esse, hinc sequitur:

$$\frac{OB^2 \hat{\wedge} OP}{2} + a CD^2 + a CE^2 = \frac{CD^3}{3} + \frac{MB^2 \hat{\wedge} MN}{2} + \frac{CE^3}{3}.$$

$$a CD^2 + a CE^2 - \frac{CD^3}{3} - \frac{CE^3}{3} = \frac{MB^2 \hat{\wedge} MN - OB^2 \hat{\wedge} OP}{2}.$$

---

8 Hinc apparent nunquam radices in serie sinuum exprimenda eliminari posse.

1–570,5 Zum Rechengang: die Werte für die Momente des Viertelkreises und des Segments müssten noch halbiert werden. Diese Flüchtigkeitsfehler haben keinen Einfluss auf die Ergebnisse, wohl aber der Vorzeichenfehler in Z. 7, der schließlich auf den von Leibniz selbst bemerkten Widerspruch führt.

et quia  $FB$  infinite parva, ideo  $CD = CE$ . et  $MB = OB$ . et  $OP = MN$ .


$$\text{Ideo iam } aCD^2 + aCD^2 - \frac{CD^3}{3} - \frac{CD^3}{3} = \frac{MB^2 \wedge MN - MB^2 \wedge MN}{2} = 0.$$

Ergo  $\cancel{2}aCD^2 = \cancel{2}CD^3$  (!). Quod est absurdum, necesse est alicubi lapsum in calculo latere.


- 5 Caeterum satis illud appetet surdarum mentionem vitari non posse.

[Teil 2]

De hyperbola P. Fabri *Synopsis geometrica* pag. 80. 184. 293. tab. 1 fig. 18.



[Fig. 2]



[Fig. 3]

- Nimirum si sit  $\nabla^{\text{lum}} LKU_1$  volutum circa axem  $LK$ . ac deinde secetur conus  $LKU_1$   
10 in  $O$ . ita ut sectio sit hyperbola quae traducatur in triangulum coni generatrix ita ut  
axis hyperbolae sit  $MK$ . basis  $KN$ . Volvantur rursus omnia circa axem  $LK$ . figura solida

7 De hyperbola P. Fabri: *Synopsis geometrica*, 1669. An drei der angezogenen Stellen befinden sich Marginalien, s. dazu N. 1. Zum mathematischen Sachverhalt vgl. E. A. FELLmann, *Die mathematischen Werke von Honoratus Fabry; Physis I* (1959), S. 21 f. 8 [Fig. 2, 3]: In Fig. 2 kommt die Bezeichnung  $U$  (wegen der Gleichheit der Strecken  $KU$ ) doppelt vor; sie wird eindeutigkeitshalber mittels  $U_1$  und  $U_2$  unterschieden. Fig. 3 stellt in Analogie zu Fig. 2 den allgemeinen Fall dar. Die sich daran anschließende Betrachtung (ab S. 572 Z. 2) ist verfehlt.

annularis genita a spatio  $MOU_1N$  aequabitur cylindro cuius altitudo  $MK$ . basis circulus [radii]  $MO$ .

Cuius rei haec ratio est, quod quadratum applicatae hyperbolae ut  $RS$  aequatur quadrato  $RT$  – quad.  $MO$ . Ergo et semiquadratum seu momentum applicatae hyperbolae aequatur momento seu semiquadrato  $RT$  demto semiquadrato  $MO$ . Iam momentum  $RT$  differt a momento  $RS$  momento  $ST$ . ergo momentum  $ST$  = semiquadrato  $MO$ . 5

Hinc iam manifestum est genito hyperbolico circa axem haberi posse hoc modo cylindrum aequalem.

Patet etiam memorabilis quaedam circuli (vel ellipsis) et hyperbolae relatio.

$$\text{In circulo est } y^2 = a^2 - x^2.$$

$$\text{In hyperbola est } y^2 = x^2 - a^2.$$

Videndum an hinc sequatur quadratura circuli ex data hyperbolae, vel contra.

Est autem  $x$  quantitas continue crescens in hyp. decrescens in circulo arithmeticamente ratione,  $a$  est invariabilis. Item  $y^2 + a^2 = x^2$ . si  $y$  arithmeticamente crescere seu abscissa,  $x$  applicata iam intelligatur. 15

Imo  $x$  vel  $y$  hoc loco non est abscissa, potest tamen intelligi abscissa et aliquid praeterea, ut si recta  $KN$  quae est hoc loco  $x$  continue decrescens intelligatur translata in  $KMU_2$  abscissa. Erit abscissa in  $M U_2 M = MO$ . abscissa in  $R$  erit  $U_2 R = RT$ . et  $U_2 K = KU_1$ . Notandum autem quod  $x$  in hyperbola continue crescit, sed non a minimo verum ab  $a$ . contra in circulo a minimo crescens desinit in  $a$ . Ergo sic potius ut pro  $x$  dicamus  $a + x$ . et eius  $\square$  erit  $a^2 + x^2 + 2xa$ . Ergo  $y^2 = a^2 + x^2 + 2xa - a^2$ . sive  $y^2 = x^2 + 2xa$ . cum contra in circulo sit  $y^2 = xa - x^2$ . Hinc si applicata circuli in applicatam hyperbolae ducatur, fiet  $\sqrt{2x^2a^2 - x^4}$ . 20

### 23 Nebenbetrachtungen:

$$\frac{2xa + x^2}{xa - x^2} \quad \frac{2 \sqrt[6]{6, +4}}{6 - 4} \quad \frac{16}{2} \quad \frac{2a + x}{a - x} \quad \frac{\sqrt{2xa + x^2}}{\sqrt{2xa - x^2}} \quad \frac{2xa + x^2}{2x^2a^2 - x^4}$$

2 diametri  $L$  ändert Hrsg.      12 Videndum ... contra. erg.  $L$

18 Erit: dies gilt für die von Leibniz vornehmlich betrachtete gleichseitige Hyperbel, wobei  $L$  und  $U_2$  koinzidieren.    21 f. contra in circulo: anstelle von  $xa - x^2$  müsste es  $2ax - x^2$  heißen. — Der Fehler wirkt sich auf die nächste Formel aus.

NB. haec aequatio:  $a^2 - y^2 = kx$ . est parabolae.

Si  $MS$  sit curva hyperbolae, cuius applicata  $RS$ . abscissa  $MR$ . latus transversum  $EM$ , erunt  $EM^2 + EM \cap MR = RS^2$ . ergo  $y^2 = \frac{a^2}{\beta^2} + \frac{ax}{\beta}$ . Idem  $y^2 = x^2 - a^2$ . Ergo  $x^2 - a^2 = \frac{a^2}{\beta^2} + \frac{ax}{\beta}$ . Est autem  $\beta$  ratio  $EM$  ad  $ML$  figurae superioris.

5 Investigemus et  $MF$ . vel  $SI$ . perpendiculares ad ipsam  $LU$ . quam sane  $LU$  utcunque productam nunquam hyperbolam attingere necesse est.

Manifestum autem est  $\frac{FM}{LM} = \frac{OM}{LO}$ . Ergo  $FM = \frac{LM \cap MO}{LO}$ .

Sed rectius investigabimus  $SI$ . ubi ac primum  $SG$ .  $ST$ .  $GI$ .

Nimirum  $SG = \frac{ST \cap LR}{RT}$ . et  $ST = RT - RS$ . et  $GT = \frac{ST \cap RT}{LT}$ .

10 Iam  $SI = \frac{GS \cap ST}{GT}$ .  $IT = \frac{ST \cap ST}{GT}$ .

Hinc facile habetur  $FI$ . si ab  $LT$  auferatur  $LF + IT$ .

Iam ut  $SI$  ad ultimam aequationem reducamus: cum sit  $= \frac{GS \cap ST}{GT}$  ponatur pro  $GS$  et  $GT$  eorum definitio, fiet:

$$\frac{\frac{ST \cap LR}{RT}, \cap ST}{\frac{\langle ST \rangle \cap RT}{\langle LT \rangle}} = SI = \frac{ST \cap LR \cap LT}{RT^2}.$$

15 et pro  $ST = RT - RS$  vel  $RT - \sqrt{MR^2 + 2MR \cap MO}$ . fiet

$$\frac{LR \cap LT}{RT} - \frac{\sqrt{MR^2 \cap LR^2 \cap LT^2 + 2MO \cap MR \cap LR^2 \cap LT^2}}{RT^2}.$$

Simplicior erunt omnia, si  $\nabla^{\text{lum}} LKU_1$  supponatur isosceles.

Erit  $GS = ST$ . et  $MO = LM$ . et quia  $ST = RT - RS$ . seu

$$RT - \sqrt{MR^2 + 2MO \cap MR}. \quad \text{erit etiam } GS.$$

20 et  $SI$  erit = radix dimidii  $\square^{\text{ti}}$   $ST$  seu

$$SI = \sqrt{\frac{RT - \sqrt{MR^2 + 2ML \cap MR}}{2}} = IT.$$

<sup>9</sup>  $GT$ : anstelle von  $\frac{ST \cap RT}{LT}$  müsste es umgekehrt  $\frac{ST \cap LT}{RT}$  heißen. — Das Versehen beeinträchtigt die gesamte folgende Rechnung.

Cumque sit  $LF = MF = \sqrt{\frac{MO^2}{2}}$ . ideo

$$FI \text{ erit } LT - \sqrt{\frac{MO^2}{2}} - \sqrt{\frac{RT - \sqrt{MR^2 + 2ML} \cap MR}{2}} \square.$$

Est autem  $MR = LR - MO$ . et  $LR = \sqrt{\frac{LT^2}{2}}$ . Ergo  $MR = \sqrt{\frac{LT^2}{2}} - MO$ . Et  $RT = LR$ . ergo  $RT = \sqrt{\frac{LT^2}{2}}$ .  $ML \cap MO = MO^2$ .  $MR^2 = \frac{LT^2}{2} + MO^2 - 2MO \cap \sqrt{\frac{LT^2}{2}}$ .

Ergo  $FI =$

$$LT - \sqrt{\frac{MO^2}{2}} - \frac{\sqrt{\frac{LT^2}{2}} - \sqrt{\frac{LT^2}{2} + MO^2 - 2MO \cap \sqrt{\frac{LT^2}{2}}} + 2MO \cap LR - 2MO^2}{\sqrt{2}}.$$

$$\text{vel } \sqrt{2} \cap FI = \sqrt{2} \cap LT - MO - \frac{LT}{\sqrt{2}} +$$

$$\frac{\frac{LT^2}{2} + MO^2 - 2MO \cap \frac{LT}{\sqrt{2}} + 2MO \cap \frac{LT}{\sqrt{2}}}{\sqrt{2}}.$$

$$\frac{\sqrt{2} \cap FI}{LT} = \sqrt{2} \cap LT - \frac{MO}{LT} - \frac{1}{\sqrt{2}} + \sqrt{\frac{1}{2}} + \frac{MO}{\sqrt{2} \cap LT}.$$

$$\frac{\sqrt{2} \cap FI}{LT} - \sqrt{2} + \frac{MO}{LT} + \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{\frac{1}{2}} + \frac{MO}{\sqrt{2} \cap LT},$$


---


$$\square = \frac{1}{2} + \frac{MO}{\sqrt{2} \cap LT}.$$

5

10

3 (1) Iam Cartesiano more (a) LF vocemus  $a + x + y$ . (b) FT vocemus  $x$ . et SI vocemus  $y$ . LF vocemus  $a$ . erit  $LF = a + x + y$ . Ergo posita (aa)  $x$  ut nota (bb) iam  $x$ . quaeramus  $y$ . Cum detur  $x$  (aaa). detur et (bbb) = FI. deturque LF. dabitur et  $LI = a + x$ . dabitur et  $MF = a$ . ergo et  $LM = \sqrt{2a^2}$ . (2) Est  $L$

---

9 Anstelle von  $\sqrt{\frac{1}{2}} + \frac{MO}{\sqrt{2} \cap LT}$ , müsste es  $\sqrt{\frac{1}{2}} - \frac{MO}{LT^2}$ , heißen. — Leibniz rechnet mit dem Fehler konsequent weiter.

## [Teil 3]

In Wallisii *De motu* observo quadraturas paraboloidum et hyperboloidum, sed simplicium tantum. Nam compositas, ubi v. g. quadrata abscissarum ducta in latus rectum aequantur cubis applicatarum, non attingit.

5 Miror Wallisium in *De motu*, non attingere quae figurae quibus motuum compositionibus efficiantur.

Explicat experimentum magni ponderis inflatione vesicae per spiritum humanum nonnihil elevari.

Disserit de descriptione hyperbolae Wrenniana, sive de cylindro hyperbolico, in quo infinitae duci possunt lineae rectae, idque demonstrat ex eo theoremate, quod sumtis quadratis arithmeticis proportionalium, ut:  $a^2 : 4a^2 : 9a^2$  etc. additoque uno quodam quadrato constanti, radices sint applicatae hyperbolicae:  $\sqrt{a^2 + b^2}$   $\sqrt{4a^2 + b^2}$   $\sqrt{9a^2 + b^2}$ .

10 Disserit et multis de sua cycloide. Ostendit Pascalium, Robervallium aliquos minime scivisse etiam segmenta omnia cycloidalia certo modo abscissa, esse tripla segmentorum semicirculi. Etiam a se demonstratum, quod curvae cycloidum contractarum et protractarum sint ellipses.

Item quod a quadratura hyperbolae dependeat recta aequalis curvae parabolae. Item superficie curvae conoidis parabolici tam parabolae circa axem quam circa tangentem volutae circulum a se exhibitum aequalis.

20 (Hinc NB. datur recta quaedam, in quam cadit centrum gravitatis curvae parabolae, adeoque cuidam superficie annuli cuiusdam parabolici exhiberi potest hyperbola aequalis.)


Idem Wallisius exponit a se observatum non tantum spiralem simplicem Archimedeam esse parabolam convolutam, ut vocat, sed et alias esse paraboloides involutas. Et

2 observo: Diese Aussage trifft objektiv nicht zu; s. J. WALLIS, *Mechanica*, 1670–71, S. 148–189 (WO I S. 667–693). — Die höheren Parabeln und Hyperbeln hat Wallis schon früher allgemein behandelt; vgl. insbesondere *Arithmetica infinitorum*, 1656, prop. LIX, LXIV, CII, S. 47f., 52f., 76f. (WO I S. 392, 395, 408). Erst später hat Leibniz Wallis' Ergebnisse zur Kenntnis genommen; s. dazu *De quadratura arithmeticis circuli*, hrsg. E. KNOBLOCH, 1993, S. 140. 7 Explicat: a. a. O. S. 759–767 (WO I S. 1056 bis 1060). 9 Disserit: a. a. O. S. 556–567 (WO I S. 929–938). 13–16 A. a. O. S. 367–465 (WO I S. 800–862). — Auf S. 459 (859) wird mit der Bemerkung: „Ille ne uspiam advertit.“ auf Pascal angespielt. Der Name Roberval fällt nicht, wohl aber spricht Wallis allgemein: „Neque illud prius adverterunt, credo, ex Gallis ulli.“ — Die Stelle bezüglich der verkürzten bzw. verlängerten Zykloiden steht auf der Seite davor. 17–19 A. a. O. S. 555 und S. 748–750 (WO I S. 923–925). 22–575,5 A. a. O. S. 488–531 (WO I S. 878–904). — Der Hinweis auf Stefano degli Angeli steht auf S. 530f. (903f.) und bezieht sich auf dessen Schrift: *De infinitorum spiralium spatiorum mensura, opusculum geometricum*, 1660.

in genere non areas tantum sed et curvas respondentes esse aequales. Idque a se dudum ostensum. Et cum lapsus quidam contigisset in calculo Stephanum de Angelis eo arrepto refutasse doctrinam suam, calculo considerato, demonstratione dissimulata, et quae a se una pagina dicta erant, iusto volumine explicuisse. Idem Wallisius observat posse omnes alias figuræ intelligi hoc modo convolvi in quasdam spiralium species.

5

Agit idem Wallisius de cissoeide, cuius integrum spatium infinitum aequari ostenderit triplo semicirculi. Ab eo tempore se ab Hugenio monitum posse hoc modo etiam partes quaslibet cissoeidis mensurari.



[Fig. 4]

6 Agit: *a. a. O. S. 531–533 und 754–759 (WO I S. 904–910).*

Semicirculus  $ABC$ . dividatur diameter in partes aequales et ex punctis divisionis  $D$  ducantur applicatae, per puncta applicatarum extrema  $E.E.B.E.$  etc. ducantur chordae  $AE$ . producanturque dum occurant in punctis  $H$  tangentis semicirculi  $CF$ . in infinitum si opus sit, id est si totam cissoeidem habere velis productae. Sin partem tantum, v. g.  
5 chordarum in  $GEEBEC$  cadentium produces usque in  $F$ . Denique rectis  $AE$  sumantur rectae  $HI$  respondentes, aequales, ita ut  $FI$  sit  $= AG$ . et ita in caeteris.

Curva per omnia puncta  $I$  transiens erit cissoeis, et spatium  $AIIFC =$  ni fallor segmento  $GBC +$  rectang.  $AGC$  triplicatis.

Nota,  $IK$  applicata cissoeidis semper aequalis  $AD$ . quia  $\nabla^{\text{lum}} IFK$  simile  $\nabla^{\text{lo}} AGD$ ,  
10 et  $AG = IF$ . ergo et  $IK = AD$ . et  $FK = GD$ .

Sed distantiae inter ipsas  $K$ . seu portiones  $KK$ . erunt infinite parvae, modo portiones  $DD$ . sint infinite parvae. Harum ergo portionum progressio investigandum est.

Sed quia  $IK$  sunt arithmeticae progressionis, ideo investigandae sunt omnes  $CK$ . sunt enim ordinatim applicatae.

15 Dantur autem omnes  $CH$ . si omnes  $DE$  multiplicentur per  $CA$ . productum dividatur per  $AD$ . quia  $\frac{CH}{DE} = \frac{CA}{AD}$ . Ergo  $CH = \frac{CA \wedge DE}{\langle AD \rangle}$ .

Ab hac summa auferatur summa omnium  $FK.HK.HK.$  etc. id est portio circularis. Residuum erit area cissoeidis.

Atqui summa omnium  $CH$  quadrabilis est. Est enim summa tangentium semiarcus complementi duplicatorum, seu summa tangentium falsorum ad basin, cuius quadraturam dudum invenimus.

---


$$16 \quad \text{Unter } CH = \frac{CA \wedge DE}{\langle AD \rangle} : \quad y = \frac{2ax}{\langle - \rangle}.$$

19–21 Male, non tangentium semicomplementi, sed semiarcus.

19 semiarcus erg.  $L$       20 ad basin erg.  $L$

---

7 ni fallor: Leibniz ist sich selbst nicht sicher, und in der Tat gilt: Zissoidenfläche =  $3 \cdot$  Segment  $GBC +$  Dreieck  $AGC$ .      21 dudum: vgl. insbesondere N. 27, prop. 33, S. 474 Z. 14–17. — Das Stück nennt Leibniz später selbst, s. S. 577 Z. 20.

Porro summa omnium  $CH$  (quarum maxima  $CF$ ) intelligatur esse rectangulum  $ADML$ . vel si de toto spatio cissoeidali asymptoto sermo sit, ea intelligatur esse rectangulum  $ACON$ . Ab hoc rectangulo  $ACON$ . summa scilicet omnium  $CH$ . quadrabili auferatur summa omnium  $FK$ .  $HK$ .  $HK$ . etc. id est semicirculus. Residuum quadrilineum concavum  $ANOCBA$  area cissoeidis a nobis inventa aequatur areae cissoeidis ab aliis inventae, nempe triplo semicirculo. Unde sequeretur reddito semicirculo, rectangulum  $ACON$  aequari quadruplo semicirculo, seu circulo duplicato. Quod prope est ut dicam absurdum.

5

An forte dicendum summam omnium  $CH$  non haberi, non enim esse tangentes semiarcus complementi duplicatos ad altitudinem, sed potius tangentes semiarcum duplicatos ad altitudinem. At horum quadratura non habetur, nisi ex supposita circuli quadratura. Quod adeo verum est, ut nec momentum eorum habeatur nisi ex supposita circuli quadratura. Ideo momentum quoque cissoeidis ex asymptota opposita parallela, seu vertice.

10

Videamus iam qualem quadraturam conchoeidi falsae, vel potius cissoeidi, ut nunc loquendum est, nam ut conchoeis est figura tangentium ademta scilicet portione circuli generatoris, ita eadem ademta cissoeis est figura tangentium falsorum NB. diminutorum sinubus. Unde illud quoque apparet semicissoeidem hoc modo sumtam seu semisinu auctam ad basin, esse differentiam hyperbolae et conchoeidis.

15


Iam *Inassignabilia* mea docent ipsum  $ACON$  aequari quadruplo semicirculo  $ABC$ . et rectangulum  $AML$  aequari quadruplo segmento  $AG$ . Ergo spatium cissoeidis totum aequatur triplo semicirculo, et spatium cissoeidis generatae ab arcu  $AG$  aequatur quadruplo segmento  $AG$ . demto  $AGD$ . portione circulari, restabitque triplum segmentum  $AG$  demto triangulo  $AED$ .

20


10 ad altitudinem *erg. L*      13f. Ideo ... vertice. *erg. L*      17f. NB. ... sinubus *erg. L*  
18f. seu ... auctam *erg. L*

20 docent: s. N. 27, prop. 13, coroll. 2, S. 469 Z. 8f. — Die Übertragung auf die Zissoide trifft nur für die Gesamtfläche zu.

[Teil 4]



*Fig. 2.*



*Fig. 3.*

[Fig. 5]

[Fig. 6, tlw. Blindzeichnung]

Ostendi alibi secantes ad basin aequari sectori duplicato seu radio ad arcum.

At vero applicari ad basin est duci in differentias ordinatarum, id est secans  $AB$   
 5 ducenda in  $CD - E_1F$ .

Iam  $AB \cap CD = AE_2 \cap E_2B$ . quare si et  $AE_2$  in  $E_1F$  commode haberit posset, habetur quadratura. Nam posita quadratura conchoeidis, si dua ista solidae fierent similia, differentia eorum, id est basis maioris circulo aequaretur.

2 [Fig. 5, 6]: Die beiden Figuren sind von Leibniz ineinander gezeichnet worden. Diese Anordnung wird vom Hrsg. nachvollzogen. In Fig. 5 kommt die Benennung  $E$  nur einmal (in Doppelfunktion) vor; sie wird vom Hrsg. eindeutigkeitshalber in  $E_1$  und  $E_2$  aufgespalten. 3 Ostendi: s. N. 27, prop. 1, S. 465 Z. 20–22.

Excogitandi sunt aliqui casus in quibus ductus in istas differentias haberi possunt. Utilis enim ista observatio est.

Momentum secantium complementi seu secantium ad basin ex sinu haberi potest, et quadrabile est.

Restant quadrata secantium complementi in sinus ductorum, quae sunt  $\frac{a^6 - 16a^4\beta^2}{9\beta^2}$ .<sup>5</sup>

Iam  $\frac{a^6}{9\beta^2}$  haberi possunt =  $\frac{a^3}{9\beta^2} \wedge a^3$ . Est autem  $\frac{a^3}{9\beta^2}$  species hyperboloidis quadrabilis.

Denique  $\frac{16a^4\beta^2}{9\beta^2} = \frac{16a^4}{9}$ .

Omnia  $\sqrt{a^2 - 16\beta^2}$  et similia ducta in  $3\beta$ , non sunt quadrabilia, sed ducta in  $4\beta$ . Horum quadrata haberi possunt, restant momenta at puto momenta secantium complementi haberi posse.<sup>10</sup>

$$\frac{a^2}{3\beta} \wedge \sqrt{a^2 - 16a^2} = \sqrt{\frac{a^6 - 16a^4\beta^2}{9\beta^2}} = \frac{\sqrt{a^6 - 16a^4\beta^2}}{3\beta}.$$

Ducatur quadratum radii in basis portionem, [Text bricht ab]

Figura secantium complementi est  $\frac{a^2}{y}$ . Est autem  $y = \sinus circuli = \sqrt{2ax - x^2}$ . posito  $x$  abscissa. Ergo si iam in figura secantium complementi applicata nominetur  $y$ ,

<sup>5</sup> in sinus ductorum erg. L 8–12 Omnia . . . radii in (1) sinum, (2) applicatam, dividat (3) basis portionem, erg. L

<sup>3</sup> Momentum: s. N. 26, prop. 29, S. 448 Z. 20 – S. 449 Z. 3.

$$\text{fiet } y = \frac{a}{\sqrt{2ax - x^2}} \text{ et } y^2 = \frac{a^4}{2ax - x^2}.$$

Ergo  $2y^2ax - y^2x^2 - a^4 = 0$ . sive  $2y^2ax - y^2x^2 = a^4$ . Ergo  $2y^2ax = a^4 [+] y^2x^2$ .

Habetur ergo summa cuborum ipsarum applicatarum huius curvae, quia omnium  $y^2x$  summa per summam cuborum indagari potest.

5 Fig. 3.

Esto quadrans  $ABC$  in cuius arcu designentur puncta quotlibet  $I. K. L. M. N.$  per quae ex centro  $B$ . ducantur rectae, productae donec tangentи quadrantis in  $C$ . in infinitum productae prout opus est, occurrant in punctis  $S. R. Q. P. O.$  fientque secantes  $BS. BR. BQ. BP. BO$ . Ex punctis arcus,  $I. K. L. M. N.$  demittantur perpendiculares in radium  $AB$ . tangentи infinitae  $CS$  parallelum, quae radio occurrant in punctis  $D. E. F. G. H.$  et punctis istis, applicentur secantes, ita ut situm accipient parallelum inter se, et ad radium  $AB$  perpendicularem. Transferetur  $BS$  in  $DT$ . et  $BR$  in  $EU$ . et  $BQ$  in  $FW$ . et  $BP$  in  $GX$ . et  $BO$  in  $HY$ . et  $BC$  in  $BZ$ .

Iam quod punctis arcus  $I. K. L. M. N. C.$  fecimus, idem fieri intelligatur punctis qui buslibet assignabilibus, ac linea curva per puncta  $T. U. W. X. Y. Z.$  aliae intermedia

1 Zusatz:

$$ax - x^2 - x \cap a - x \cap 2ax - x^2, \cap y^2 = a^4. \quad 2ax - x^2 - a^2, \cap y^2 = a^4 - a^2y^2.$$

$$\pm x \mp a = \frac{\sqrt{a^4 - a^2y^2}}{y}. \text{ vel } \mp x \pm a = \frac{a\sqrt{a^2 - y^2}}{y}. \text{ vel } \mp x \mp a = a\sqrt{\frac{a^2}{y^2} - 1}.$$

vel si  $a = 1$ . fiet:  $\pm x \mp 1 = \sqrt{\frac{1}{y^2} - 1}$ . Ecce figurae angulorum naturam, unde et fit si

$$\langle \text{mavi} \rangle \text{s: } \mp x \pm a = \sqrt{\frac{a^4}{y^2} - a^2} \text{ et } \mp x = \sqrt{\frac{a^4}{y^2} - a^2} \mp a.$$

2 – L ändert Hrsg.

1  $y = \frac{a}{\sqrt{2ax - x^2}}$ : Die Auflösung nach  $x$  erfolgt in der Zusatzrechnung, dort müssten aber die Vorzeichen unter der Wurzel jeweils vertauscht werden.

numero infinita transire intelligatur. Manifestum est maximam omnium secantium, tunc scilicet cum punctum arcus est ipsum initium eius  $A$ , esse infinitam. Cum enim sit parallela ipsi  $CS$ . non nisi infinito abhinc intervallo eam attinget. Quare recta  $A\alpha$  est asymptota ad quam curva  $ZXT$  semper propius accedit, sed eam tamen nunquam attingit.

Figuram autem ipsam  $BZXT\alpha A$  voco hyperbolam falsam. Nam si demissae fuissent perpendiculares ex punctis arcus non in radium  $AB$  tangentи parallelum, sed in radium  $BC$  tangentи perpendicularem, ut  $K\beta$  loco  $KE$ . et secans  $BKR$  non ipsi  $E$  in  $EU$ . sed ipsi  $\beta$  fuisset perpendiculariter ad  $BC$  applicata, idemque in caeteris punctis omnibus contigisset, figura hoc modo per puncta descripta, futura fuisset hyperbole, nunc autem est hyperbole falsa, quanquam non sit ex iis quas vulgo hyperboles id est vocant. 5

Sed eandem hyperbolam falsam alio praeterea nomine appello figuram angulariorem quemadmodum hyperbolam veram appellare posses figuram rationum, aut etiam figuram logarithmorum (quanquam alia quaedam sit curva logarithmica, ut vocant, sed quam hactenus nemo geometrice describere potuit, et qui descriptsisset, dedisset nobis hyperboles quadraturam). 10

Nimirum ostendit P. Sarrasa ex Gregorii a S. Vincentio, praeclaro admodum invento, quodque vel solum impensos ab eo in circuli hyperbolesque quadraturam labores repensaret; ostendit inquam Sarrasa, si figura  $BZXT\alpha A$  spatium hyperbolae asymptotum sit, et ductis basi  $ZB$  parallelis  $YH$ .  $XG$ .  $WF$ . quadrilinea  $GXWF$ .  $HYXG$ .  $BZYH$ . inter se comparata esse, ut si rectae abscissae ab altitudine,  $FG$ .  $GH$ .  $HB$ . sint geometrice proportionales, spatia cuilibet insistentia futura sint arithmeticè proportionalia, ac proinde si rectae sint ut termini quicunque, spatia futura sunt ut logarithmi. 15

Ego vero de hyperbola falsa theorema ostendam non minus praeclarum, neque ulli veterum observationi cessurum. Nimirum si figura praesens non hyperbola vera sed falsa seu nostra intelligatur rectaeque  $YH$ .  $XG$ . aliaeque basi parallelæ ducantur, tunc futurum est, ut si rectae sustinentes inde ab asymptota sumtae,  $AG$ .  $AH$ .  $AB$ . sint ut sinus versi, spatia  $AGXT\alpha A$ .  $AHYT\alpha A$ .  $ABZT\alpha A$ . vicissim sint in ratione arcuum 20

10f. , quanquam ... vocant erg.  $L$  16f. quadraturam). (1) Cur autem hyperbolam nostram falsam figuram (2) Nimirum  $L$  17 ostendit (1) Gregorius (2) P. Sarrasa  $L$  25

17 P. Sarrasa: A. A. de SARASA, *Solutio problematis a R. P. Marino Merseno Minimo propositi*, Antwerpen 1649, pars I prop. II u. III, S. 7f.

seu angulorum  $AM, AN, AC$ . Unde si arcus  $AI, IK, KL$  sint aequales spatia quoque  $ADT\alpha A, AEUT\alpha A, AFWT\alpha A$ . aequalia erunt. Ac generaliter recta quaecunque parallela basi, ut  $XM$ . spatium pariter figurae angulorum et arcum secabit in partes proportionales.

5 Porro figura angulorum quam dixi, geometrica est, describique potest. Nam aequatio eius essentialis est:  $2y^2ax - y^2x^2 - a^4 = 0$ . Et deprehendo per analysin, si ponatur  $z$  aequalis sinui recto  $GM$ . et  $a$  aequalis radio  $AB$ . tunc applicatam figurae angulorum respondentem  $GX$  fore  $\frac{a^2}{z}$ . Ac proinde summa secantium complementi opus esse ad angulos ex sinibus datis, vel contra supputandos. Quod ingens compendium dabit calculo canonis mathematici utcunque libuerit continuando, infinitisque aliis problematis appropinquatione facillima efficiendis.

10 Sed maius tamen est aliud a me inventum, quo omnia quae ad dimensionem circuli et partium eius, ad sectionem angulorum universalem, ad inventionem quotcunque medianarum proportionalium pertinent, nulla radicum mentione, sola numerorum ratio-  
15 narium serie adhibita facile effici possint. Quo nescio an ad geometriam mechanicam inveniri possit praestantius epicherema. Nam qui hactenus approximationes nobis per calculum dedere in infinitum continuabiles, aut fassi sunt constructionem fore difficilem linearum per calculum inventarum, aut successum in toto circulo aliquando casu quodam felicem ad partes non produxere. Cum ille casus, quo constructionem facilem reperere,  
20 non methodi ipsorum, sed fortunae fuerit, quoniam cum ubi longius prodiere, vel citerius substitere, omnia ad primam illam calculi difficultatem redierint.

Porro facile reducitur illa hyperbole falsa seu figura angulorum ad circulum, nam sector differt a portione circulari ductu sinus in sinum complementi, seu momento sinus ex basi. Ergo differentia inter summam sectorum, et summam portionum circularium  
25 est quadrabilis. Intelligi autem potest summa portionum circularium, vel incipiendo a

11 appropinquatione facillima erg.  $L$  14 nulla (1) radicum extractione (2) radicum mentione  $L$   
15 facile erg.  $L$  22 f. circulum, (1) nam summa omnium SI. RK. QL. aequatur duplice segmento AM.  
(a) ergo duplex (b) et sector | duplex erg. | diffe (2) nam sector differt (a) a duplice segmento rectangulo  
radii in sinum. Videor ergo errasse in calculo (b) a portione  $L$

23 sector differt: In der Aussage ist der Faktor 1/2 zu ergänzen. Leibniz rechnet mit dem doppelten Wert konsequent weiter.

minimo, quod tantum semel, vel a maximo quod tantum semel. Alterum horum quadrari potest, et coincidit cum momento ex basi, alterum cum momento ex vertice. Ergo cum summa portionum, maximam non nisi semel repetendo sit momentum sinuum ex basi, et summa sectorum eodem modo sumta, differat a summa portionum momento, sequitur summam sectorum hoc modo sumtam aequari duplo momento sinuum. At summa sectorum est summa arcuum in radium ducta. Summa ergo arcuum est quadrabilis, ut iam ab aliis inventum.

5

Sed cum summa sectorum non usque ad maximum quaeritur, sed v. g. inter  $A$  et  $N$  posito,  $AH$  divisum in partes infinitas aequales, dabitur adhuc iterum momentum, et rursus arcuum (sinuumve) summa. Puto tamen hanc summam arcuum cum cycloidali illa non coincidere, ubi ni fallor ab opposito incipitur. Unde et summa sectorum opposita adhibenda est.

10

Considerari meretur linea illa curva in summa sectorum constituenda, quae de plano in planum instar cochleae transit sive ascendit. Sed haec obiter.

Pergo illud tantum monere, si figurae angulorum quadratrix reperiatur, et quadratrix circuli quoque, sane figurae angulorum quadratricem fore altioris gradus (probabiliter), quam figuram circuli quadratricem, et tamen unam ex altera facile fieri posse, ista adiectione sinus in sinum complementi ducti.

15

Momentum figurae angulorum aequatur summae sectorum.

---

7 ab aliis: B. PASCAL, *Traité des sinus et des arcs de cercle*, 1658, prop. 1 S. 10 (PO IX S. 78).


## 35. DE TANGENTIUM METHODO

[Sommer 1673]

**Überlieferung:** L Konzept (zwei Zusätze aus je späterer Zeit): LH 35 II 1 Bl. 265–266. 1 Bog.  
 2°. 3 S. Bl. 266 v° leer. Hauptteil 2 S. und 4 Z. auf Bl. 265 sowie Bl. 266 r° oben, Zusätze  
 5 auf Bl. 266 r°.  
 Cc 2, Nr. 613

Datierungsgründe: Die Verwendung des Begriffs *functio* sowie das Wasserzeichen des Papiers sprechen für eine Abfassungszeit kurz vor N. 40 vom August 1673.

Cognatae sunt figurae, quae locum quandam functionum habent communem, uti  
 10 circulus ellipsis hyperbola, in quibus locus reductarum est triangulum. Sed diverso modo  
 adhiberi potest locus functionis, vel ut crescat cum applicatis, quod facit triangulum  
 in hyperbola, vel ut crescentibus applicatis decrescat, quod fit in ellipsi et circulo. Unde  
 intelligi potest, ellipsim et circulum non tantum cognatas, sed et e i u s d e m n a t u r a e  
 (sic enim malim, quam speciei) esse. Porro inter eiusdem naturae figurae variae sunt  
 15 species, ut in ellipsi, prout scilicet ratio recti ad transversum sumitur.



[Fig. 1]

15+585,1 sumitur. | Errorem calculi | sive eius qui manu typisve descripsit erg. | in Geometria Cartesii lib. 2. pag. 46. editionis Schotenianaee 1659. mihi videor observasse. Nimirum, in eo est, ut inquirat rectam quae ellipsin in dato punto ad angulos rectos secet. Ac [s. Fig. 1] ubi quadratum huius secantis PC posuit esse  $s^2$ , et abscissam AM assumvit y. latus rectum r. | latus transversum GA = q. erg. | rectam PA = v. ostendit pag. 41. ex natura ellipsis hanc aequationem:  $y^2 \frac{+qry - 2qvy + qvv - qss}{q - r}$ . Unde pag. 46. invenit  $0 - 2ey$ , vel (quia  $e = y$ )  $0 - 2y^2 = qry - 2$ . gestr. | Ad L

16 [Fig. 1]: Die Figur kommt in der Hs. insgesamt dreimal vor; einmal mit vielen Korrekturen in Zusammenhang mit der Streichung von Z. 15 – S. 585 Z. 1 sowie zweimal je auf Bl. 265 r° und 265 v°. — Der Buchstabe P kommt (wegen der Gleichheit der Strecken MP) doppelt vor.

Ad tangentes vel perpendicularares curvarum inveniendas, mihi commodissima Huddenii ratio videtur, nimirum ille invento quadrato perpendicularis  $PC$ , atque altero indeterminatarum  $y$ .  $AM$  abscissae, vel  $x$ .  $CM$  applicatae, ex aequatione, ut a Cartesio praescriptum est, ope aequationis cuiusdam naturam curvae exprimentis eliminato; ita ut altera indeterminatarum, v. g. abscissa  $y$ . tantum restet; hoc inquam facto Huddenius aequationis inde productae terminos multiplicat per exponentem ipsius  $y$  in unoquoque termino repertae. Atque ideo termini in quibus nulla est  $y$  abiciuntur. Inde orta aequatio perpendiculararem dabit.

Hoc ille in conchoide expertus, apud Schotenium, notis ad secundum *Geometriae Cartesii* librum pag. 255.

Placet in ellipsi experiar, ut appareat an calculus consentiat Cartesiano. Ostendit Cartesius pag. 41, posita perpendiculari  $PC = s$ . et abscissa  $AM = y$ . et latere recto  $= r$ . latereque transverso  $GA = q$ . recta denique  $PA = v$ . ostendit inquam ex natura ellipsis:

$$y^2 \frac{+qry - 2qvy + qv^2 - qs^2}{q - r} = 0.$$

Indeque pag. 46, invenit:

$$0 - 2ey, \text{ vel (quia } e = y) \quad 0 - 2y^2 = \frac{qry - 2qvy}{q - r}.$$

$$\text{Unde } 0 = \frac{qry - 2qvy}{q - r} + 2y^2. \text{ sive } 0 = qry - 2qvy + 2y^2q - 2y^2r. \text{ vel } qr + 2yq = 2vq + 2yr.$$

Igitur  $2vq = qr + 2yq - 2yr$ . sive denique:

$$v = \frac{r}{2} + y - \frac{yr}{q}.$$

Idem Huddenii methodo sic reperitur:

Aequatio est:

$$y^2 \frac{qry - 2qvy + qs^2}{q - r} = 0.$$

10 f. pag. 255. (1) Ergo in ellipsi statim facilique (2) Placet  $L$  13 ex natura ellipsis erg.  $L$   
17 f. +2yr. (1) Igitur  $qr - 2yq + 2yr = 2qv$ . Ac denique  $v = \frac{r}{2} - y + \frac{yr}{q}$ . (2) Igitur (a)  $qr = 2yq - 2yr + 2qv$ .

Ergo  $qr - 2(b) 2vq L$

1 f. Huddenii ratio: Im Folgenden setzt sich Leibniz mit dem Hudde'schen und dem Descartes'schen Verfahren, Tangenten bzw. Normalen zu bestimmen, auseinander. Neben den von Leibniz selbst genannten Stellen aus der *Geometria*-Ausgabe ist insbesondere noch J. HUDDDE, *De reductione aequationum*, DGS I S. 436, zu nennen.

5

10

15

20

fiet per multiplicationem Huddenianam:

$$\begin{array}{r} 2. \quad 1. \quad 1. \quad 0. \quad 0. \\ \hline 2y^2 \quad \frac{+qry - 2qvy}{q - r} + 0 = 0. \end{array}$$

Hinc ecce aequationem eandem cum aequatione a Cartesio inventa:

$$0 - 2y^2 = \frac{+qry - 2qvy}{q - r}.$$

5 Caeterum videndum est quemadmodum datis abscissa  $AM$  applicata  $MC$  inveniri possint tangentes  $CH$ , sive perpendiculares  $PC$ , sive reductae  $PM$ , sive productae  $AH$ . Ita vicissim ope tangentis solius, vel perpendicularis solius, vel reductae solius, vel productae solius, ac praeterea abscissae, inveniri possit applicata. Et ut facilior haec sit inquisitio, retento exemplo praecedente, tentemus regressum.

10 Ponamus ergo ex cognitis  $PM$ . quas reductas voco, quaerendas applicatas  $CM$ .

Cum autem sit  $PA$  vel  $v = \frac{r}{2} + y - \frac{yr}{q}$ . erit

$$PM = \frac{r}{2} + y - \frac{yr}{q} - y. \text{ seu } PM = \frac{r}{2} - \frac{yr}{q}. \text{ sive } PM = \frac{qr - 2yr}{2q}.$$

Unde manifestum est locum omnium  $PM$  fore lineam rectam, et si rectae  $AM$  velut altitudini applicatae intelligantur, incidere omnes in figuram rectilineam.

5 est (1) an haec tangentium method (2) quemadmodum datis (a) applicatis (b) abscissa  $L$   
6 sive reductae  $PM$ , sive productae  $AH$  erg.  $L$  7 f. ope (1) tangentium | solarum erg. |, vel perpendicularium | solarum erg. |, vel reductarum, vel productarum, inveniri queant (a) soli (b) una nimirum ex aliqua (2) tangentis solius, vel perpendicularis solius, vel reductae | solius erg. |, vel productae | solius erg. |, ac  $L = 12 - y$ . (1) et quia per naturam ellipsis:  $xx = ry - \frac{r}{q}yy$ . vel  $xxq = ryq - ryy$ . vel  
 $\frac{xxq}{r} = yq - ryy$ . conemur (a) iungere (b) inserere hanc aequationem priori:  $0 = qry - 2qvy + 2y^2q - 2y^2r$ .  
vel sic potius:  $\underbrace{qry - yyr}_{xxq} - 2qvy + 2y^2q - yyr = 0$ . Erit  $xxq + 2y^2q = 2qvy - yyr$ . (2) seu  $L = 14$  in (1)  
triangulum AMP. (2) figuram rectilineam  $L$

---

6 productae  $AH$ : Dies weicht vom üblichen Gebrauch ab; mit producta bezeichnet Leibniz gemeinhin die ganze Subtangente  $MH$ .

Cuius ut constitutio intelligatur, posita  $AM$  minima seu  $y = 0$ . erit  $PM = \frac{r}{2}$ . seu lateri recto dimidio, quae ad  $A$  applicata esto  $AI$ .

Similiter in  $L$ . ellipsis centro erit  $y = \frac{q}{2}$ . Ergo  $PM = \frac{qr - 2yr}{2q}$ . erit  $\frac{qr}{2q} - \frac{2qr}{4q}$  sive  $\frac{r}{2} - \frac{r}{2} = 0$ .

Ergo figura omnium  $PM$  erit triangulum  $LAI$ . cuius basis dimidium latus rectum ellipsis, 5 altitudo dimidium latus transversum.

Ponamus iam datum esse locum omnium  $PM$ . quemadmodum datus est locus omnium  $AM$  (qui ipso  $PM$  applicatus semper triangulum exhibit), quaeri autem locum omnium  $CM$ . seu ipsam figurae  $MCEA$  naturam.

Ergo ut ante posita  $CP = s$ .  $PA = v$ . et  $PM = v - y$ . erit

$$PM^2 = v^2 + y^2 - 2vy \text{ vel } \frac{r^2}{4} + \frac{y^2r^2}{q^2} - \frac{2yv^2}{2q}.$$

quoniam scilicet altera ex his, nempe vel  $PM$ , vel  $PA$  seu  $v$ . vel  $y$  seu  $AM$ . elidi potest.

$$\text{Huic } PM^2 \text{ addatur } CM^2 = x^2, \text{ fiet } s^2 = \frac{r^2}{4} + \frac{y^2r^2}{q^2} - \frac{yr^2}{q} + x^2.$$

Sed quoniam  $x$  quaeritur, ut methodus duplicum radicum aequalium commodius adhiberi queat, de integro ordiendum, quaerendamque ellipsis tangentem arbitror, non 15  $y$ , sed  $x$  assumto, atque  $y$  eliminato.

Nimirum  $s^2 = x^2 + v^2 - 2vy + y^2$ . Iam quia  $xxq = ryq - ryy$ . porro ex aequatione priore sequitur esse  $y = v - \sqrt{s^2 - x^2}$ , haec ergo ipsius  $y$  definitio in locum eius in secunda aequatione substituatur:

2 f. AI. (1) et (a) triangulum (b) figura, omnes MP. comprehendens erit trapezium MPAI. portio trianguli LAI. cuius vertex L. in ellipsis centro, (aa) quoniam L. (bb) quoniam tunc  $y = \frac{q}{2}$ . ergo

$$\frac{qr - 2yr}{2q} = \frac{r}{2} - \frac{\frac{qr}{2}}{\frac{2q}{2}} = \frac{r}{2}. \text{ (2)} \text{ Similiter } L \quad 15 \text{ queat, (1) ab initio statim, (2) de } L$$

fiet:  $xxq = rqv - rq\sqrt{s^2 - x^2}, -rv^2 - rs^2 + rx^2 + 2rv\sqrt{s^2 - x^2}$ . vel

$$x^2q = rqv - \sqrt{s^2r^2q^2 - r^2q^2x^2} - rv^2 + rx^2 \quad [-rs^2] + \sqrt{4r^2v^2s^2 - 4r^2v^2x^2}.$$

$$2x^2q = 0 + rqx - 0 + 2rx^2 \quad [-0] - 2rvx.$$

Unde fieret:  $2x^2q = rqx + 2rx^2 - 2rvx$ . vel  $2x^2q + 2rvx = rqx + 2rx^2$ . vel:

$$5 \quad \cancel{qv} = \frac{rqx + 2rx^2 - 2x^2q}{2rx}. \text{ sive } \frac{q}{2} + \cancel{x} - \frac{xq}{r} = v.$$

Unde sequitur:  $\frac{q}{2} + x - \frac{xq}{r} = \frac{r}{2} + y - \frac{yr}{q}$ . seu  $x - \frac{xq}{r} = \frac{r}{2} + y - \frac{yr}{q} - \frac{q}{2}$ . et

$$x = \frac{\frac{r}{2} + y - \frac{yr}{q} - \frac{q}{2}}{1 - \frac{q}{r}}. \text{ Quod cum sit absurdum, errorem in calculo esse necesse est. Credo}$$

in eo quod surdos per exponentes ipsius  $x$  multiplicavi.

Possimus autem eliminare surditates, si ponamus  $\sqrt{s^2r^2q^2 - r^2q^2x^2}$  cum  $\odot$

10  $\sqrt{4r^2v^2s^2 - 4r^2v^2x^2}$  ab una aequationis parte, caetera ab altera, et utrumque quadre-  
dum

mus, reliquum appellemus  $\wp$  fiet  $\odot + \wp - 2\sqrt{\odot \wp} = \wp$ . Unde duae surditates reductae ad unam quae denique eliminatur, nam  $0 - 2\sqrt{\odot \wp} = \wp - \odot - \wp$  ideoque  $[4\odot \wp] = \underbrace{\wp - \odot - \wp}_{\square}$ . Sed haec prolixiora, quam ut iis insistere opus sit, brevius cum ostend-

sum sit  $PM = \frac{r}{2} - \frac{yr}{q}$ . substituendo  $x$  pro  $y$ . Quod ut fiat consideranda aequatio:

$$15 \quad x^2 = ry - \frac{r}{q}yy.$$

$$\text{Ergo } 0 - x^2 = \frac{r}{q}y^2 - ry. \quad \text{Pone } \frac{r}{q} = \frac{1}{4}. \text{ erit } r^2 \cancel{+0} - x^2 = \frac{r}{q}y^2 - ry + r^2.$$

$$\text{Ergo } \sqrt{r^2 - x^2} = 2\frac{r}{q}y - r. \quad \text{Ergo in eo casu: } \frac{\sqrt{r^2 - x^2}, +r}{2\frac{r}{q}} = y.$$

2  $-rs^2$  erg. Hrsg.    3  $-0$  erg. Hrsg.    12  $2\sqrt{\odot \wp}$  L ändert Hrsg.

1 fiet: die folgende Rechnung ist fehlerhaft und führt schließlich auf die von Leibniz bemerkte Unstimmigkeit.

Imo idem fieri potest in omni ellipsi, nam si data sit aequatio:  $0 - x^2 = \frac{r}{q}y^2 - ry$ , addendo

utrobique  $\frac{q}{2r}r^2 = \frac{qr}{2}$ ; fiet

$$\left(\sqrt{\frac{r}{q}} y\right)$$

$\sqrt{\frac{qr}{2} - x^2} = \sqrt{\frac{ry^2}{q}} - \sqrt{\frac{qr^2}{2r}}$ . Nam haec in se ducta dant:  $\frac{r}{q}y^2 - ry + \frac{qr}{2}$ . Ergo

$\sqrt{\frac{qr}{2} - x^2} + \sqrt{\frac{qr}{2}} = \sqrt{\frac{ry^2}{q}}$ . Ergo  $\frac{\sqrt{\frac{qr}{2} - x^2} + \sqrt{\frac{qr}{2}}}{\sqrt{\frac{r}{q}}} = y$ . sive

$$\sqrt{\frac{q^2}{2} - \frac{x^2q}{r}} + \sqrt{\frac{q^2}{2}} = y.$$

$\begin{array}{c} \diagup \\ \diagdown \\ \frac{q}{\sqrt{2}} \end{array}$

Ponamus nos figuram seu locum applicatarum, quaerere ex dato loco reductarum, idque in ellipseos exemplo tentemus.

Primum posito  $MA = y$ . et  $CM = x$ . et  $PC = s$ . et  $AP = v$ . et  $PM = v - y$ . erit 10  
 $PM^2 = v^2 + y^2 - 2vy$ . et  $CM^2 = x^2$ . Ergo  $s^2 = v^2 + y^2 - 2vy + x^2$ . Cum autem

---

8–590,3 *Daneben am Rande:*

$$y^2 = ax. \quad \frac{y^2}{a} = x. \quad \text{sive} \quad \frac{y^4}{a^2} = x^2. \quad \text{Ergo} \quad \frac{\frac{y^4}{a^2}}{y} = \frac{y^3}{a^2}.$$

588,17–589,1 y. (1) Memorabile hoc videtur, esse quoddam ellipseos genus, praeter circulum, in qua tam (a) applicata ad abscissam (b) applicata, quam abscissa pura relatione explicari potest, scilicet, quando latus transversum recti quadruplum est. Idem in aliis figuris (aa) explicari (bb) tentari potest.  
(2) Imo L

---

1 f. addendo utrobique: anstelle von  $\frac{qr}{2}$  müsste es  $\frac{qr}{4}$  heißen. — Leibniz rechnet mit dem Versehen konsequent weiter.

quaeramus relationem  $x$  ad  $y$ . ponatur  $x$  esse  $\xi y$ . fiet:

$$s^2 = v^2 + y^2 - 2vy + \xi^2 y^2.$$

In qua aequatione cum sint duae radices aequales fiet:

$$0 = 0 + 2y^2 - 2vy + 2\xi^2 y^2.$$

5 Ergo  $2y^2 + 2\xi^2 y^2 = 2vy$ . atque ideo  $v = y + \xi^2 y = v$ . Ergo  $PM$  seu  $v - y = \xi^2 y$ . Atqui

$$\text{idem } PM = \frac{r}{2} - \frac{yr}{q}. \text{ Ergo } \xi^2 y = \frac{r}{2} - \frac{yr}{q}. \text{ Ergo } \xi^2 y^2 \text{ vel } x^2 = \frac{ry}{2} - \frac{y^2 r}{q}.$$

Deberet esse:  $ry - \frac{y^2 r}{q}$ . error ergo, non calculi, sed methodi, quia scilicet in isto  $\xi^2 y^2$  non potest sciri quot unitatum sit exponens ipsius  $y$ . quia in ipso  $\xi^2$  latet quoddam  $y$ .

Ergo nos ad Cartesii methodum duarum radicum aequalium, potius quam Hudde-  
10 nianam, recurrere debere arbitror.

$$\text{Nimirum } s^2 - v^2 - y^2 + 2vy - \xi^2 y^2 = 0. \text{ et } y^2 + e^2 - 2ye, \text{ etiam } 0.$$

$$\text{ergo: } s^2 - v^2 - y^2 + 2vy - \xi^2 y^2 = y^2 + e^2 - 2ye y^2.$$

$$\text{Ergo } s^2 - v^2 - \cancel{y^2} + 2vy - \xi^2 y^2 = \cancel{y^2} + e^2 - \cancel{2y} \cancel{y}.$$

$$\text{Ergo } \begin{array}{c} s^2 - v^2 + 2vy - \xi^2 y^2 = y^2. \\ \xi^2 y^2 + y^2 + v^2 - 2vy \end{array}$$

$$\text{Ergo } \xi^2 y^2 + \cancel{y^2} + \cancel{v^2} - \cancel{2vy} - \cancel{\xi^2 y^2} + \cancel{2vy} - \xi^2 y^2 = \cancel{y^2}.$$

15 Verissima quidem, sed quibus nihil explicari patet. Tollatur ergo iam  $v$  ex aequatione, quoniam eius comparatio cum  $y$  cognita est.

$$\text{Est autem } v = \frac{r}{2} + y - \frac{yr}{q}. \text{ Ergo erit } v^2 = \frac{r^2}{4} + ry - \frac{yr^2}{q} + y^2 - \frac{2y^2 r}{q} + \frac{y^2 r^2}{q^2}. \text{ et}$$

20  $2vy = ry + 2y^2 - \frac{2y^2 r}{q}$ . fiet:

$$s^2 - \frac{r^2}{4} - \cancel{ry} + \frac{yr^2}{q} - \cancel{y^2} + \frac{2y^2 r}{q} - \frac{y^2 r^2}{q^2} + \cancel{ry} + \cancel{2y^2} - \frac{2y^2 r}{q} - \xi^2 y^2 = \cancel{y^2} 0.$$

Sed nihil ex hac quoque aequatione duci potest, quoniam si  $s^2$  explicandum sit, omnia tolluntur.


$5 = v$ . (1) At iam aliunde constat esse (2) Ergo  $L$

Videamus an reverti liceat ad methodum Huddenianam sed aliam.


$$\xi^2 y^2$$

Aequatio ista:  $s^2 - v^2 - y^2 + 2vy - x^2 = 0$ . duas habet radices aequales, multiplicetur per progressionem arithmeticam, ubi prius recte fuerit ordinata. Sed malum in eo est, quod recte ordinari non potest, cum exponens verus ipsius  $y$  in termino  $\xi^2 y^2$ , non sit notus quia  $y$  ipsi  $\xi$  implicatum est. 5

[Zusatz 1]



[Fig. 2]



[Fig. 3]

Differentia inter applicatam circuli et hyperbolae:

$$\sqrt{2ax + x^2} - \sqrt{2ax - x^2} \sqcap z.$$

10

fiet:  $\cancel{(2ax)} + 2x^2 \sqcap z^2 + 2z\sqrt{2ax - x^2} \cancel{(+2ax)} \cancel{(-x^2)}$ .

Ergo  $4z^2 \wedge 2ax - x^2 \sqcap 4x^4 \cancel{(-4z^2x^2)} + z^4 \sqcap 8z^2ax \cancel{(-4z^2x^2)}$ .

Aliter  $\sqrt{a^2 + y^2} - \sqrt{a^2 - y^2} \sqcap v$ , unde  $\sqrt{a^2 + y^2} \sqcap v + \sqrt{a^2 - y^2}$ , sive  $\cancel{(a^2)} + y^2 \sqcap v^2 + 2v\sqrt{a^2 - y^2} \cancel{(+a^2)} - y^2$ , sive  $2y^2 - v^2 \sqcap 2v\sqrt{a^2 - y^2}$ , et quadrando  $4y^4 \cancel{(-4y^2v^2)} + v^4 \sqcap 4v^2a^2 \cancel{(-4v^2y^2)}$ . Ergo  $2y^2 \sqcap \frac{v}{2}\sqrt{[4a^2] - v^2} \cdot \frac{4y^4}{v^2} \sqcap 4a^2 - v^2 \sqcap 2a - v \wedge 2a + v$ . 15

Patet ante omnia figurae differentiarum quadratorum summam; pendere a momento segmenti ex centro.

1+3 methodum (1) Hugenianam (2) Huddenianam | sed aliam erg. |. Aequatio  $L = 4$  ordinata. | Sed hic rursus subesse. streicht Hrsgr. | Sed  $L = 15 a^2 L ändert$  Hrsgr. 16 differentiarum (1) dari momentu (2) quadratorum  $L$

$$y \sqcap \sqrt{\frac{v}{2} \sqrt{[4a^2] - v^2}}.$$

Iam  $v$  ista investigabimus:

$$v^4 - 4v^2a^2 + a^4 \sqcap a^4 - 4y^4.$$


Unde  $a^2 - v^2, \wedge a^2 - v^2 \sqcap a^2 - 2y^2 \wedge a^2 + 2y^2,$

5 sive  $a + v, \square, \wedge a - v \square \sqcap a + y\sqrt{2} \wedge a - y\sqrt{2}, \wedge a^2 + 2y^2;$

$\pm v^2 \pm a^2 \sqcap \sqrt{a^4 - 4y^4}$ , et  $v \sqcap \sqrt{\pm \sqrt{a^4 - 4y^4} + a^2}.$

$$4y^4 \sqcap 4v^2a^2 - v^4, \text{ unde } 16y^3l \sqcap 8v^2a^2 - [4v^4]. \text{ Ergo } l \sqcap \frac{8v^2a^2 - [4v^4]}{16y^3}.$$

$$\frac{l \pm y}{z} \sqcap \frac{l}{v}. \text{ Ergo } z \sqcap \frac{lv \pm yv}{l}.$$



[Fig. 4]

10 Ope differentiarum inter duas figuras commensurabiles, novae habentur quadratura, eis

v.g.  $\frac{2ay^2}{y^2 + a^2} \sqcap x$ . Ergo  $y^2x + a^2x \sqcap 2ay^2$ .  $y^2 \wedge x - 2a, +a^2x \sqcap 0$ , pone  $x - 2a \sqcap z$ , fiet  
 $y^2z + a^2z + 2a^3 \sqcap 0$ .

Differentia inter  $y \sqcap \sqrt{\frac{a^2x}{2a - x}}$ . et inter  $\sqrt{2ax - x^2}[:]$

$$\sqrt{2ax - x^2} \sqcap \sqrt{\frac{a^2x}{2a - x}} + z.$$

1  $a^2 L$  ändert Hrsg. 7  $v^4 L$  ändert Hrsg. zweimal 12 f.  $\sqcap 0$ . | In parabola:  $y^2z - a^2z + 2a^3 \sqcap 0$ .  
streichet Hrsg. | Differentia L

---

4 Unde: Auf der linken Seite der Gleichung vernachlässigt Leibniz den Term  $-2v^2a^2$  und löst nun diese vereinfachte Gleichung auf. 9 [Fig. 4]: Die grob gezeichnete Merkfigur entspricht nicht den Gegebenheiten des Textes. — Für eine graphisch korrekte Darstellung vgl. LSB III, 1 S. 156.

Unde  $2ax - x^2 \sqcap \frac{a^2x}{2a-x} + 2z \sqrt{\frac{a^2x}{2a-x}} + z^2$ . sive  $2ax - x^2 - \frac{a^2x}{2a-x} - z^2 \sqcap 2z \sqrt{\frac{a^2x}{2a-x}}$ .

Sed nihil inde.

[*Zusatz 2*]

$\sqrt{aa+yy} - \sqrt{aa-yy}$  aequ. z. Ergo  $2aa + \sqrt{a^4 - y^4}$  aequ. zz. Seu  $\sqrt{a^4 - y^4}$  aequ.  $zz - aa$ . Seu  $\sqrt{aa+yy}$ .  $\sqrt{a+y}$ .  $\sqrt{a-y}$  aequ.  $\sqrt{z+a}$ .  $\sqrt{z-a}$ . 5

Momentum figurae ex axe coniugata datur ex data  $\int \sqrt{a^4 - y^4} dy$ . Sit  $\boxed{a^4} = y^4$  aequ.  $z^4 \boxed{+a^4} = 2zzaa$ . et fit:  $2zzaa$  aequ.  $z^4 + y^4$ . seu  $yy$  aequ.  $z\sqrt{2aa-zz}$ . Et  $y$  aequ.  $\sqrt[2]{z}\sqrt[4]{2aa-zz}$ .

$\sqrt{bb+cyy} + \sqrt{dd+eyy}$  aequ. z. fiet:  $bb + cyy$  aequ.  $zz + dd + eyy - 2z\sqrt{dd+eyy}$ . Ergo  $b^4 + 2bbcy^2 + ccy^4 + z^4 + 2zzdd + 2zzeyy + d^4 + 2ddeyy + eey^4 - 2bbzz - 2bdd - 2bbey^2 - 2cy^2zz - 2cy^2dd - 2cey^4 - 4zzdd - 4zzeyy$  aequ. 0. 10

Tollamus  $zzeyy$ , faciendo  $+2e - 2c - 4e$  aequ. 0. seu  $c$  aequ.  $-e$ . ita tollamus alia quam volumus.

5 f.  $\sqrt{z-a}$ . (1)  $z+a$  aequ.  $\sqrt{\frac{a^4-y^4}{z-a}}$ . Ergo momentum ipsius | (a) ordi (b) abscissae erg. |  $z+a$ . ex  $z-a$ . (2) Momentum  $L$

---

4–8 Leibniz beginnt mit dem Ansatz von S. 591 Z. 13. Aufgrund von Flüchtigkeiten und Vereinfachungen ist das Ergebnis mit der Ausgangsgleichung nicht kompatibel.

## 36. FINES GEOMETRIAЕ

[Sommer 1673]

**Überlieferung:** *L* Konzept: LH 35 II 1 Bl. 256. 1 Bl. 2°. 1 1/4 S. auf Bl. 256 r° und v°. Auf dem übrigen Teil des Blattes *LBS* VII, 1 N. 115.  
Cc 2, Nr. 552

5

Datierungsgründe: Leibniz spricht in diesem Stück von seiner methodus transmutandarum figurarum, eine Anspielung auf den im 1. Halbjahr 1673 gefundenen Transmutationssatz (vgl. *LSB* III, 1 S. 115 f.). Das Wasserzeichen des Papiers ist bis August 1673 bezeugt.

Fines geometriae, seu classes problematum (omne enim theorema propter problema  
10 est) describere figuras; metiri figurarum datarum quantitates, invenire figuras quantitatis  
desideratae.

Horum porro omnium rursus tres sunt gradus, est enim geometria vel Euclidea, vel Apolloniana (quam Vieta et Cartesius resuscitavere), vel Archimedea, cui Guldinus, Cavale-  
rius, aliquie incubuere.

15 Euclidea dicit, metiturque rectilineas, invenitque figuras quantitatis desideratae recti-  
lineas, quoties ratio quaesitarum ad datas haberi potest, seu quoties problema est planum, ductuque rectarum et circuli solvi potest.

Sed quoniam interdum rectilinea quantitatis desideratae inveniri non possunt nisi  
aliis quibusdam curvis, seu locis, quos vocant descriptis, eam provinciam Apollonius  
20 praeclare exornavit, et Vieta, Cartesius, Slusiusque amplificavere.

Caeterum ad geometriam Apollonianam dimensione figurarum curvarum, opus non est,  
sed sufficit eas describi posse, et tangentes earum inveniri quare saepe miratus sum  
a doctissimis viris, sed qui scilicet hoc unum agitavere geometriam Apollonianam pro  
absoluta ac perfecta venditari.

25 Commune istud est eorum peccatum, qui in Cartesii verba iuravere: ita enim ille  
saepe loquitur splendidius sane quam verius; methodo sua geometriam ad perfectionem  
perductam esse, quanta ab homine optari possit; nullum esse problema, cuius non aut

10 est) (1) invenire, scilicet puncta; describere scilicet locos, seu seriem punctorum infinitam; ac  
denique comparare, seu metiri figuras, constituereque (2) velut subiectum contemplationis, invenire loca,  
invenire quantitates desideratas, (3) describere *L* 27 problema, (1) quod eius ope aut solvi non queat  
(2) cuius *L*

solutionem aut solvendi impossibilitatem monstrat. Certas sibi rationes esse praescribendi limites intellectui, definiendique quicquid aliquando inveniri possit.

Sed quantopere in eo negotio lapsus sit, vir caetera utique magnus, docuit eventus. Crediderat enim arte humana curvam rectae aequalem inveniri non posse quod in *Geometria* diserte satis expressit, forte quod ex ea quam sequebatur geometriae methodo, cui nihil addi posse putabat aditus et ad hanc speculationem nullus aperiretur. At Wrennus certe ac Heuratius ac novissime Hugenius praeclaris speciminibus, spem intellectui humano reddidere.

Constat Cartesium inveniendae dimensioni areae cycloidis imparem, donec eius quantitas a Robervallo demonstrata, ei a Mersenno, (quanquam sine demonstratione) transmissa est.

Cuius rei ratio est (operae pretium enim est, intimas scrutari harum rerum causas, cum eas nemo satis persecutus sit), quia algebra quam hactenus habemus in surdarum calculo imperfecta est. Nam quis mortalium duas quasdam radices surdas

$$Rq. a^2 + b^2. + Rq. a^2 + c^2.$$

in unam quandam, quanquam compositam seu binomiam redigere potest? At hoc plerumque in curvilineorum dimensione requiritur.

Alterum est quod per binomia vel residua dividi non potest quemadmodum per ea potest multiplicari, nam ex  $a, \sqrt{b+c}$ . fieri possunt plures producti uninomii,  $ab+ac$ . at si divisor sit binomius, ut

$$\frac{a}{b+c}$$

producti uninomii haberi non possunt nisi numero infiniti. Quorum summa iniri quidem potest, sed quae binomium datum nobis reddit.

Magni tamen usus hoc est ad approximationes quod Mercator in quadratura hyperbolae ostendit; ego in quadratura circuli exacta sed arithmeticata, et sectione angulorum univer-

5

10

15

20

25

9 areae erg.  $L$  20–22 binomius, (1) ex eo divisores (2) ut  $\frac{a}{b+c}$  (a) divisores uninomii ex eo

(b) producti  $L$  23 f. reddit. (1) Cuius tamen maximus est usus ad approximationes (2) Magni  $L$  25 exacta sed arithmeticata erg.  $L$  25–596,1 universalis, (1) scilicet arithmeticata per approximationes (2) non  $L$

5 expressit: R. DESCARTES, *Geometria*, DGS I S. 39. 8 reddidere: s. Chr. HUYGENS, *Horologium oscillatorium*, 1673, S. 68–72 (*HO* XVIII S. 202–211). 10 f. transmissa: Mersenne – Descartes, Brief vom 28. April 1638, in: R. DESCARTES, *Lettres*, Bd 3, 1667; S. 380–384 (*DO* II S. 116–122; *MCW* VII S. 173–179). 25 ostendit: N. MERCATOR, *Logarithmotechnia*, 1668, S. 31–34.

sali, non exacta quidem, sed per approximationes, expeditissimas tamen idem, ingenti opinor fructu, exhibeo.

Tertium quod observavi malum est imperfectio arithmeticæ serierum, et quae ab ea pendet arithmeticæ infinitorum; quoties quadratura alicuius figuræ reducta est ad infinitam seriem numerorum rationalium (rationalium inquam, surdi enim sunt intractabiles).

Quod primus omnium in hyperbola praestit Vicecomes Bruncker, Societatis Regiae Anglicanae praeses, geometra insignis, in circulo autem hactenus, nemo, donec a me quoque eius rei ratio excogitaretur, qua circulum (et ellipsin) ad quanquam figuram hyperboloidem reduxi, et ostendi serie quadam numerorum rationalium infinitorum exacte exhiberi posse circuli imo et segmenti cuiuslibet magnitudinem. Unde sequitur vera et exacta (id est non per approximationes), attamen arithmeticæ tantum quadratura, et quanquam per approximationes (sed expeditissimas), sectio angularum universalis, et quotcunque mediarum proportionalium inventio, cubique, ac surdesolidi, altiorisque cuiuscunq; potestatis duplicatio, triplicatione etc.; et ut verbo dicam *perfectio geometriae in usu communis versantis*.

Sed haec aliquando fusius dicam, peculiari dissertatione de *approximationibus*, seu *perfectione geometriae in usu versantis*. Nunc admonuisse sufficit, hanc arithmeticæ infinitorum imperfectionem, quod omnes series infinitas numerorum rationalium in summam colligere nequit, redundare in geometriam.

Neque hic algebra sufficit, nisi ei ars combinatoria succurrat.

Haec sunt quae faciunt, ut hactenus in potestate artificis non sit, datam figuram curvam metiri. Quare data quadam figura, cuius resolutio nos in surdas dicit, eousque transformanda est, donec eliminatis surdis ad infinitam seriem rationalium numerorum redigatur, qui primus est ad quadraturam gradus.

3 et (1) in primis (2) quae  $L = 9$  (et ellipsis) erg.  $L = 21$  f. succurrat. (1) His ita positis, fit ut non sit in potestate artificis, invenire (2) Haec sunt quae faciunt, | fit streicht Hrsg. | ut  $L = 23$  metiri. (1) Necesse est enim fig (2) Quare  $L = 24$  eliminatis surdis erg.  $L$

7 praestit: W. BROUNCKER, *The squaring of the hyperbola*, in: *Philosophical Transactions* Bd III, Nr. 34 vom 23. April/3. Mai 1668, S. 645–649. 10 reduxi, et ostendi: vgl. N. 27 Teil 3.

Et regula est generalis a me inventa: omnis figura plana curvilinea, cuius solidum revolutione genitum, circa altitudinem basinve, quemadmodum et solidum cuiuslibet partis eius a vertice revolutionis abscissae, reduci potest ad cylindrum, quod in circulo, ellipsi, hyperbola, cycloide, figura sinuum, aliiisque multis fieri potest, reduci potest ad speciem quandam hyperboloidis, seu infinitam seriem numerorum rationalium; quod est arithmeticam eius, (exactam tamen) quadraturam dare.

5

Atque haec quidem dimetiendarum figurarum methodus recta est, est et alia obliqua, et fortuna subnixa, cum figura mutatur in aliam figuram, donec tandem in quadrabilem incidamus. Hoc sane hactenus factum est casu, sed qui certam quandam methodum exhibuerit transmutandarum figurarum, quam nihil effugiat, nemo comparuit. Hanc ego ausim dicere a me detectam, fontesque apertos, geometriae Archimedae quos qui persequatur, efficere possit, quod in geometria Apolloniana iactatur, solvere problema, aut ostendere insolubilitatem.

10

Mira res est, et summae facilitatis, ac ne contemplationi quidem intricatissimae curvarum obnoxia; eo usque ut ex simplici quodam diagrammate, in quo nihil nisi circulus et aliquot rectae sese intersecantes depictae erunt, deduxerim, triginta et ultra propositiones admirandas, quibus curvilinea plurima, partim quadrantur partim in alia curvilinea commutantur methodo tam facili, ut non nisi rectilinea per Euclidea *Elementa* tractari videantur.

15

Tota res nititur triangulo quodam orthogonio laterum infinite parvorum, quod a me appellari solet *charaktericum*, cui alia communia, laterum assignabilium, similia, ex proprietate figurae constituantur. Ea porro triangula similia characteristico comparata, exhibent propositiones multas, pro tractabilitate figurae, quibus diversi generis curvae inter se comparantur. Pauca sunt, quae ex hoc *triangulo charakteristico* non deducantur.

20

Ars autem combinatoria praestare potest ut nihil effugiat. Atque ita secure pronuntiari potest, etiam de problematum possibilitate quamdui scilicet arithmeticā surdorum, atque infinitorum, separata opera non perficiuntur.

25

1 a me inventa erg. *L* 20 triangulo (1) assignabili quodam, quod a inassi (2) quodam orthogonio  
*L* 27 potest, | non *gestr.* | etiam *L*

1 regula . . . a me inventa: vgl. dazu N. 17 S. 340 Z. 8f. 16 triginta et ultra: s. vor allem N. 27.  
— Das charakteristische Dreieck hat Leibniz bei seinen Studien zu Pascals *Lettres de A. Dettonville*, 1659, gefunden; vgl. dazu N. 10.

## 37. DE PARABOLOEIDUM ET HYPERBOLOEIDUM QUADRATURA I

[Sommer 1673]

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 II 1 Bl. 239. 1 Bl. 4°. 2 S.  
Cc 2, Nr. 693

- 5 Datierungsgründe: Das vorliegende und die beiden folgenden Stücke stehen in engem inneren Zusammenhang; sie sind jeweils Vorstufen voneinander und sind offenbar nach N. 26 und N. 27 entstanden. Aufgrund des Wasserzeichens des Papiers müssen sie vor N. 40 von August 1673 liegen.




fig. 1.




fig. 2.

- 10 Sunto tria in axe producto puncta, unum ( $A$ ) quo occurrit applicatae, alterum quo tangentis ( $B$ ), tertium ( $C$ ) quo perpendiculari, hinc lineae  $AB$  et  $AC$ , aio hanc regulam esse generalem[:]

Applicata semper est media proportionalis inter  $AB$  et  $AC$ .

Ergo si  $y$  sit applicata, et  $x$  sit abscissa, habeatque  $AB$  constantem semper rationem ad abscissam, ut in hyperboloidibus et paraboloidibus[,] ea ratio ponatur esse  $\beta$ . Ergo

$$\frac{y^2}{x\beta} = AC.$$

11 proportionalis (1) | inter nicht gestr.| punctum (2) li (3) inter  $L$

Quod si iam ex natura curvae  $y^2 = ax$ . erit  $AC = \frac{ax}{\beta x} = \frac{a}{\beta}$ . Et quia  $\beta$  est ratio exponentium potestatis  $x$  et  $y$ . = 2. erit  $\frac{a}{\beta} = \frac{a}{2}$ .

At quid si  $y^3 = ax^2$ . erit  $y^2 = \frac{ax^2}{y}$ . (vel  $y = \frac{ax^2}{y^2}$ . vel  $1 = \frac{ax^2}{y^3}$ .) ideoque  $AC = \frac{ax^2}{\beta xy} = \frac{ax}{\beta y}$ . Iam hoc loco  $\beta = 3$ . ideo  $\frac{ax}{3y} = AC$ . Ergo  $AC^3 = \frac{a^3x^3}{9y^3}$ . et pro  $y^3$  substituendo  $ax^2$  fiet  $AC^3 = \frac{a^3x^3}{9ax^2} = \frac{a^2x}{9}$ . Ergo  $AC = \frac{\sqrt{a^2x}}{3}$ . Hinc memorabile est, si aequatio curvae  $ax^2 = y^3$ . tunc determinationem ipsius  $AC$ , fore  $\frac{\sqrt{a^2x}}{3}$ .

Contra, si aequatio curvae  $a^2x = y^3$ , erit  $y^2 = \frac{a^2x}{y}$ . Ergo  $AC$  vel  $\frac{y^2}{x\beta}$  erit  $= \frac{a^2x}{\beta xy} = \frac{a^2}{\beta y}$ .

(Ideoque [locus] omnium  $AC$  in curva ista, ad basin applicatarum, erit hyperbola. Eodem modo in aliis orietur hyperboloeis, ubicunque  $x$  tollitur; cum contra, ubi  $x$  manet,

alia quaedam paraboloeis sit locus omnium  $AC$ , ut in praecedenti, ubi  $AC = \left[ \frac{2\sqrt{c}a^2x}{3} \right]$ . seu applicata parabolae cubicae. Ergo [locus] omnium  $AC$  hic quadrari potest, at ubi est  $\frac{a^2}{\beta y}$  pendet eorum summa ad basin ex quadratura hyperbolae; sed ad altitudinem, potest opinor etiam quadrari, quod apparebit, si auferemus  $y$  ut mox sequetur.)

Iam si  $AC = \frac{a^2}{\beta y}$ . Ergo  $AC^3 = \frac{a^6}{\beta^3 y^3}$ . vel (quia  $y^3 = a^2x$ )  $\frac{a^6}{[\beta^3]a^2x} = \frac{a^4}{[\beta^3]x}$ . Ergo hoc casu [locus]  $AC$  est genus quoddam hyperboloidis altioris, si axi applicentur, ut est hyperbola communis, si applicentur basi.

9 summa L ändert Hrsg. 11  $\frac{\sqrt{a^2x}}{3}$  L ändert Hrsg. 12 summa L ändert Hrsg. 15 fehlende

Faktoren erg. Hrsg. 16 casu | summa erg., ändert Hrsg. | AC L 17–600,1 basi. (1) Hinc (2) NB.  
(3) Omnium L

3–6 Hier begeht Leibniz verschiedene Flüchtigkeitsfehler; bei richtiger Rechnung müsste sich  $AC = \frac{2\sqrt{c}a^2x}{3}$  ergeben.

Omnium  $AC$  axi applicatarum solidum haberi potest ex vertice, modo summa haberi possit quadratorum  $AY$  seu applicatarum paraboloidis nostrae ( $a^2x = y^3$ ) ad axem. Ratio est quia  $AC \cap AB$  (vel  $AC \cap AX \beta$ )  $= AY^2$ . At summa horum quadratorum ita habebitur:

5 Datur momentum huius paraboloidis ex vertice, datur et eius quadratura, ergo eius centrum gravitatis, ergo et momentum ex ipsa  $AX$ , seu quadrata omnium  $AY$ . sed momenta omnium  $[AC]$  ex  $X$  aliunde habentur, sunt enim summa omnium  $a^2$ .

Iam intelligantur omnia inversa, et fig. 2. relationem quaeri omnium curvae punctorum, non ad lineam  $AX$ , sed ad lineam  $AY$ .

10 Tunc  $BX$  tangens curvae in punto  $X$  erit infinita, quia  $CX$  coincidit cum  $AX$ , et ideo  $BX$  parallela  $AB$ , ideoque infinita. Sed hoc non contingit in quolibet punto  $X$ , sed tum demum cum  $AX$  est axis figurae.  $AY$  enim axis non est, etsi sit altitudo.

Porro ut investigemus  $AX$ , posito  $AY$  velut cognito, et  $[Y]$  punto inimmutabili, cum sit  $a^2x = y^3$ . alia nunc instituenda aequatio est, in qua  $y$  ipsi  $a$  misceatur,  $x$  separatim 15 inquiratur. Ergo  $\frac{y^3}{a^2} = x$ . Quod si sit  $ax^2 = y^3$ . fiet:  $x^2 = \frac{y^3}{a}$ .  $x = \sqrt{\frac{y^3}{a}}$ .

Hinc facilis quadratura figurae[,] tantum enim summa omnium cuborum ex  $Y$  (quae iniri potest, quia  $y$  crescit uniformiter) dividenda per  $a^2$ .

At in hyperbola aut hyperboloida ita aequatio primum:  $xy = a^2$ . ergo nihil refert ad summam habendam sive dicas  $x = \frac{a^2}{y}$ , sive  $y = \frac{a^2}{x}$ .

20 Quod si aequatio sit:  $x^2y = a^3$ . fiet vel  $y = \frac{a^3}{x^2}$  (quorum momentum est cylinder hyperbolicus  $\frac{a^3}{x}$ ) vel  $x = \frac{a^3}{yx} = \sqrt{\frac{a^3}{y}}$ . et horum  $\sqrt{\frac{a^3}{y}}$  momentum est  $\sqrt{a^3y}$  quod est genus seriei paraboloidis, in quo  $x^4 = a^3y$ . Et  $\frac{x^4}{a^2} = ay$ . Cumque quadrari hoc possit,

2 f. axem. (1) At hanc haberi posse puto (2) Ratio  $L$  7 AY  $L$  ändert Hrsg. 13 Y erg. Hrsg.  
22 seriei | paraboloidis darüber parabolae| in quo (1)  $x^2 = a^3y$ . Et  $x^2 = ay$ . (2)  $x^4 L$

---

22 in quo: in den beiden folgenden Ausdrücken stand zunächst  $x^2$  (s. die Variante), Leibniz hat dann abgeändert und die neue Kurve weiter betrachtet.

habebitur et series omnium  $x^2$ , habita scilicet summa omnium  $x$  earumque momento aliquo. Series autem omnium  $x$  habetur ex serie omnium  $y$ , quae est  $\frac{x^4}{a^3} = y$ . quorum manifesta est quadratura. Cumque momentum etiam omnium  $y$  ex vertice, seu summa omnium  $yx$  manifeste detur, aequalis:  $\frac{x^5}{a^3}$  ad basin, constat momentum etiam ex basi, et ideo centrum gravitatis, atque ideo momentum ex altitudine, atque ideo summam quadratorum applicatarum ad altitudinem,  $x^2$ , dari.

Hinc paeclarum duco demonstrationem: quadraturam hyperboloidis  $x^2y = a^3$ . ex quadratura hyperbolae dari. Idemque de omnibus hyperboloidibus in infinitum demonstrari posse arbitror.

Suppono quadraturam omnium dari praeter primae seu Apollonianae. Esto fig. 2. hyperboloeis 2<sup>da</sup>  $a^3 = x^2y$ , eius momentum ex vertice  $Y$  est cylinder hyp.  $\frac{a^3}{x}$ . Quadrata omnium  $y = AX$  sunt  $\frac{a^6}{x^4}$ . quae quadrabilia, quia cylinder hyperboloidis  $\frac{a^5}{x^4}$  quadrabilis. Momenta omnium (x)  $XH$  ex vertice  $D$   $\sqrt{a^3y} = xy$ . ergo  $= \sqrt{ay}, \hat{a}$ . seu cylindro parabolae. Restant quadrata omnium (x)  $XH$ , seu momentum ex  $DF$  est  $\frac{a^3}{y}$  seu cylinder hyperbolae. Ergo cum momentum ex vertice  $Y+$  mom. ex basi  $DF$  componant cylindrum hyperboloidis quadrabilem, ergo duo cylindri hyperbolici eiusdem altitudinis, tantum quod una hyperbola est  $\frac{a^2}{YF}$ , altera  $\frac{a^2}{DF}$  componunt cylindrum hyperboloidis quadrabilem. Possunt autem duae hyperbolae ad se invicem reduci, et ita invenietur quadratura, dum scilicet hyperbolae concavae duae, similes, compleat cylindrum. Ergo differentia earum habetur a convexa. Hinc quadratura.

Nota quia  $AB$  ad basin aequantur ipsis  $AY$  ad altitudinem, ideo in fig. 2. ubi paraboloidis inverso quodam modo assumitur, nec ad axem sed basin applicatae ducuntur

4 ad basin erg.  $L$  5 ex |axe darüber altitudine|, atque  $L$  9–21 arbitror. (1) Sed demonstratio omnium pulcherrima et generalissima haec est, qua demonstro summam omnium  $AB$ . aequari figurae. Hinc quadraturam habemus omnium paraboloidum, in quibus summa omnium  $AB$ . semper  $\nabla^{\text{lum}}$  est. Hinc summam habemus aliarum figurarum infinitarum, quae paraboloides non sunt, in quibus  $AB$ . parabolam aliamve figuram quadrabilem conficiunt. NB. omnes  $AB$ . in figura 2<sup>da</sup> constituant spatium asymptotum. Huius ergo quadratura hoc modo habetur sane admirabilis. (2) | Suppono ... quadratura. erg. | Nota  $L$

novum quoddam genus figurarum, et quidem asymptotarum, quadrabilium orietur[,] nam in fig. 2. ultima  $AB$  est infinita, quia et ultima  $XB$  infinita est.

Porro habebimus  $AB$ . si scilicet  $AX^2$  dividatur per  $AC$ . erit  $AB = \frac{AX^2}{AC}$ .

Vel aliter[:] Si axem figurae inquiremus qui ponatur esse  $DFE$  (fig. 2.), quo casu  $AX$  non est axis, nec  $XB$  infinita, ductaque perpendiculari  $XCE$ , et tangente  $XG$ . patet angulum  $XBA$  esse = angulo  $AXC$ , triangulaque  $XAC$  et  $BAX$  similia, ergo  $\frac{AB}{AX} = \frac{AX}{AC} = \frac{XB}{CX}$ .

Ergo  $AB \hat{\wedge} AC = AX^2$ . Ergo  $AB = \frac{AX^2}{AC}$ .

Sed eadem  $AB$  conemur ut opinor simplicius sic determinare: Angulus  $CEF$  = angulo  $ABX$ . Triangulaque  $BAX$  et  $EHX$  similia sunt ergo. Ergo  $\frac{AB}{AX} = \frac{EH}{HX}$ . Ergo  $AB = \frac{EH \hat{\wedge} AX}{HX}$ .

Eodem modo fig. 2. habetur summa omnium  $XB$  ad basin, si summa omnium  $AX$  ad arcum. Qualis habetur si  $AX$  est axis parabolae, sed non si applicata axi. Summa omnium  $XB$  applicata ad  $FD$  = omnibus  $AB$  ad arcum.

NB. si aequatio hyperboloidis sit  $y^3x = a^4$ . fiet vel:  $x = \frac{a^4}{y^3}$ . (quorum momentum

15 in distantias a vertice  $Y$  ductorum est cylinder hyperbolae, cuius aequatio:  $\frac{a^3}{y^2}$ , hoc ergo momentum pendet a quadratura hyperboloidis praecedentis) vel  $y = \frac{\sqrt{c} a^4}{x}$ . quae ducta in  $x$  vel  $\sqrt{c} x^3$  dabunt:  $yx = \sqrt{c} a^4 x^2$ . Summa autem seriei cuius termini sunt  $\sqrt{c} a^4 x^2$ , vel  $[\sqrt{c} a^4 \beta^2, \sqrt{c} a^4 4\beta^2]$  etc.

iniri potest, sunt enim applicatae paraboloidis cuiusdam ad axem. Ergo et cubi applicatarum istarum.

2 f. est. (1) Posita autem  $XB$ . finita, eam sic investigabimus (2) Porro  $L$  3 f.  $\frac{AX^2}{AC}$ . (1) Sed quia AC. et AB. nunc aequae ignotae, rectius (2) Vel  $L$  7 f.  $\frac{AX^2}{AC}$ . (1) | Cumque summa omnium  $AX^2$  id est quadratorum applicatarum  $\nabla^{\text{li}}$  ad basin, detur. *nicht gestr.* | Caeterum omnes AC. sunt (a) etiam applicatae parabolae (aa) et i (bb) si (b) radices differentiarum inter duarum parabolae applicatas. (2) Sed  $L = 11$  basin, (1) aequalis summae (2) si  $L = 15$  in ... ductorum erg.  $L = 18\sqrt{c} a^4 \beta, \sqrt{a^4 2\beta}$   $L$  ändert Hrsg. 19 potest, (1) | ergo et *nicht gestr.* | (a) qua (b) sum (2) sunt  $L$

Nimirum generali regula ostendendum est, quadratorum, cuborum, etc. summam cuiuslibet applicatae parabolae iniri posse.

Sed id impraesentiarum facile fieri potest si quaeratur  $\sqrt{c ax^2} = \frac{yx}{a}$ . Ergo momentum istud hyperbolae quadrato-quadraticae est cylinder parabolae cubicae.

---

2 applicatae (1) hyperbolae (2) parabolae (3) parabolae  $L$     4 hyperbolae quadrato-quadraticae  
erg.  $L$     4 cylinder (1) | parabolae *nicht gestr.* | quadrato cubicae (2) parabolae  $L$

---

4 parabolae cubicae: in neuerer Terminologie: semicubicae.

## 38. DE PARABOLOEIDUM ET HYPERBOLOEIDUM QUADRATURA II

[Sommer 1673]

**Überlieferung:** *L* überarbeitetes Konzept: LH 35 II 1 Bl. 135–136. 1 Bog. 2°. 4 S. Bl. 135  
insgesamt gestrichen.

5 Cc 2, Nr. 638

Datierungsgründe: s. N. 37.

[Teil 1, gestrichen]

Multa nuper a me demonstrata sunt, exigua licet neglectaque in schedula de quadratura paraboloeidum ac hyperboloeidum.

10 Ac primum quod ad paraboloeidum quadraturam pertinet methodum reperi generalem, qua non tantum paraboloides quadraticae aut cubicae, simplices, quarum quadratura tantum vulgo extat, sed et compositae quadrantur, repetam breviter:

Quaeritur quadratura paraboloidis simplicis, cuius haec est aequatio[:]  $a^2x = y^3$ .  
vel  $\sqrt{a^2x} = y$ . Hanc aequationem in aliam commutemus, qua surditas evitetur[:] ex  
15  $a^2x = y^3$ , fiet  $x = \frac{y^3}{a^2}$ . Summa ergo omnium  $x$ , applicatarum axi parallelarum haberi  
potest, quia haberi potest summa omnium  $\frac{y^3}{a^2}$ , quia  $y^3$  crescent uniformiter, est ergo  
summa summarum, pyramidalium, seu summa triangulo-triangularis, divisa per  $a^2$ , quia  
 $a$  immutabile est.

At si aequatio paraboloidis non simplicis, sed compositae sit v. g.  $ax^2 = y^3$ , nam  
20 quoties nimirum non immutabilis parameter, sed mutabilis applicata potestate affecta  
est, paraboloidem compositam appello. Aequatio haec erit  $x = \frac{y^3}{ax}$ . vel  $x^2 = \frac{y^3}{a}$ . unde  
statim hanc consequentiam duco quadrata omnium  $x$  summari posse. Quadrata autem  
applicatarum aequantur momento ex altitudine, quae hoc loco est basis, sunt enim  $x$  basi  
parallelae axi applicatae, at  $y$  axi parallelae, basi velut altitudini applicatae. Habemus  
25 ergo momentum paraboloidis compositae ex basi.

8 Multa: s. N. 37.

Altera aequatio est:  $y = \sqrt[c]{ax^2}$ . Ergo  $y^3 = ax^2$ . At summa omnium  $ax^2$  haberi potest, ergo et summa omnium  $y^3$ . Sed nos opus habemus summa omnium  $y^2$ . Est autem  $y^2 = \frac{ax^2}{y}$ . sed  $y = \sqrt[c]{ax^2}$ . Ergo  $y^2 = \frac{ax^2}{\sqrt[c]{ax^2}}$ . Ut auferri possit surditas, erit  $y^2 y^2 y^2 = \frac{a^3 x^2 x^2 x^2}{ax^2}$ , vel  $y^6 = \frac{a^3 x^6}{ax^2} = \frac{a^2 x^4}{1}$ . Ergo  $y^3 = ax^2$ . nullo hactenus fructu.

Ergo quaerendum si  $y$  ducamus in distantiam a vertice  $x$ . fiet  $yx = \sqrt[c]{ax^5}$ . Unde patet quadraturam huius paraboloidis solidi (nota[:] paraboloidi solida non sunt hactenus considerata) pendere a quadratura huius paraboloidis plani:  $y = \sqrt[c]{ax^2}$ .

Diximus supra  $x = \frac{y^3}{ax}$ . Ergo  $x = \frac{y^3}{ay^3}$ . Ergo  $x = x$ . inepte.

An aliter pro  $y^3$  substituendo  $ax^2$ , fiet  $x = \frac{ax^2}{ax} = x$ . iterum inepte.

Habemus  $x^2 = \frac{y^3}{a}$ . Ergo  $x = \sqrt{\frac{y^3}{a}}$ .

Sed cum haec frustra tentari videantur nova methodus ineunda est:

Cum sit  $x = \sqrt{\frac{y^3}{a}}$ . erit  $x = \frac{y}{\sqrt[a]{a}}$ . Id est summa indivisibilium omnium  $y$ , dividenda est per radicem quadratam summae indivisibilium ipsius  $a$ . Quod ita facile opinor nunc assequemur novo licet isto surditatis genere ablegato. Si data nobis aequatione:  $x = \sqrt{\frac{y^3}{a}}$ .

pro summa omnium  $\sqrt{\frac{y^3}{a}}$  substituamus  $\sqrt{\frac{a^4 \beta}{a}}$ . fiet  $x = \sqrt{\frac{a^4 \beta}{a}}$ . vel  $x = \sqrt{a^2 \beta}$ . Ergo  $x = a \sqrt{\beta}$ .

<sup>2</sup>  $y^3$ . (1) Ergo et momentum paraboloidis ex (a) altitudine (b) axi. Quare habetur eius centrum gravitatis, et cum detur momentum eius, habebitur et quadratura, quae area enim est momentum distantia centri gravitatis ab axe divisum. Restat no (2) Sed  $L$

---

12–16 Zunächst hatte Leibniz überall  $\sqrt[c]{}$  bzw. radicem cubicam stehen; er hat dann aber ohne sonstige Änderung die Kubikwurzel durch die Quadratwurzel ersetzt. Dasselbe geschieht, wenn auch nicht an allen Stellen S. 606 Z. 26 – S. 607 Z. 2 und S. 608 Z. 10–13.

At  $\sqrt{\beta}$ . facile haberi potest, quia  $\beta$  haberi potest, est enim certus quidam numerus, ratio scilicet omnium  $y^3$ , ad omnia  $a^3$ , seu ad  $a^4$ . quae aliunde dudum nota est.

Ecce ergo repertam rationem generalem quadrandi omnes paraboloides simplices et compositas.

5 Addo quod intactum, omnium dimensionum, id est planas, solidas, quadrato-quadraticas; etsi enim illae sint imaginariae, tamen representationes earum utiles sunt, aliisque figuris exprimi possunt. Ita  $\sqrt{c} ax^5 = y^2$ . vel  $ax^5 = y^6$ . aequatio est exprimens naturam cuiusdam figurae solidae, cuius planum applicatum in se cubice ductum, aequatur surdesolido distantiae a vertice, in quandam parametrum constantem ducto.

10 Unde illud quoque appetit omnium paraboloidum applicatorum quadrata, cubos, etc. momenta, aliaque id genus innumera haberi posse. Neque in hanc rem expectari posse perfectius quicquam.

Porro ista quoque paraboloidi solida aut supersolida, ad nova ut dixi planarum paraboloidum genera exhibenda, utilia sunt, v. g. si sit  $\frac{\sqrt{c} ax^5}{a} = (y)$ . Eius utique paraboloidis area hoc modo haberi potest. Sed videndum an ea aliter exprimi possit:  $\sqrt{c} ax^5 = (y)a$ . Ergo  $ax^5 = (y)^3 a^3$ . Ergo  $x^5 = (y)^3 a^2$ . Quare huius quidem generis aequationes paraboloidum planarum irregulares non nisi frustra inducerentur. Solidae autem hac methodo ad suas planas reducuntur, a quibus pendent. V. g. data est aequatio  $\sqrt{c} ax^5 = y^2$ . et summa quaeritur omnium  $y^2$ . Eam ita habebimus si substituamus:

20  $\frac{\sqrt{c} ax^5}{a} = \frac{y^2}{a}$ . Iam si pro  $\frac{y^2}{a}$  substituatur  $(y)$  (quod consulto includo parenthesi ne duo  $y$  inter se confundantur), fiet  $\frac{\sqrt{c} ax^5}{a} = (y)$ . Ergo dicto modo:  $x^5 = (y^3)a^2$ , vel potius  $\frac{x^5}{a^2} = (y^3)$ . vel  $\sqrt{c} \frac{x^5}{a^2} = (y)$ . Ita summa omnium  $(y)$  iniri potest, quae ducta in  $a$  dabit summam omnium  $y^2$ .

Non possum hinc abire, nisi admoneam, admirandam illam consequentiam, quae ex 25 hac demonstratione duci potest:

Cum  $x$  sit  $= \sqrt{\frac{y^3}{a}}$ . ostensum est reperiri posse summam omnium  $x$ . Iam idem  $x = \frac{y}{\sqrt{a}}$ , ut supra dictum est, et haberi potest summa omnium  $\langle \frac{y}{a} \rangle$ . (Quae est  $\frac{a}{2}$ . posito maximum  $y = a$ . seu quando basis seu maxima applicata lateri recto aequalis est, sin minus habetur proportione.) Cumque  $\sqrt{c} a$ . sit semper eadem, hinc sequitur quantitatem ipsius  $\sqrt{c} a$ .

seu rationem eius ad  $a$ . definiri posse, quia ratio omnium  $\frac{y}{\sqrt{a}}$  planum constituentium ad omnia  $\frac{y}{a}$  lineam facientia, haberi potest.

Notabile enim est, rationes puras in geometricis esse nullas, sed indivisibilia communia designari quoties divisor dividendo quantum ad dimensionem aequalis; sin inferior, designari indivisibilia communibus inferiora, quorum non nisi infinita indivisible commune constituant.

Huius rei manifestam hanc demonstrationem affero per impossibile[:]

Sunto v. g.  $y$  et  $a$  aequalia, ergo  $\frac{y}{a}$  significant 1. ita inquies. Ego fateor, sed aio illud 1 notandum esse hoc modo 1r. neque enim esse 1, seu numerum illum, sed esse indivisible aliquod, quod in praesenti constructione unitatis personam sustinet, sive quod est infinitesima pars lineae cuiusdam, in partes aequales infinitas cogitatione divisae. Fateor tamen dici posse  $\frac{y}{a}$  esse unitatem communem, nam  $\frac{y^2}{a^2}$  non augent dimensionem, nam v. g.  $\frac{y^2 a}{a^2}$  non nisi lineam facit. Et haec manifesta sunt sciendum enim istis  $a^2$ . vel  $a$ . non significari lineam, sed numerum infinitum, unde praeclare Proclus *Comm. in 1. Eucl.*[:] ut elementa arithmeticæ sint: unitas et multitudo, ita geometriae esse: τὸ ἄτομον, καὶ τὸ ἄπειρον. Id est occupari eam numero sed infinito, indivisibilium velut unitatum.

Caeterum illud manifestum est, si v. g. curvae cuiusdam in rectam ductae superficies cylindrica aequetur seriei

$$\sqrt{a\beta} + \sqrt{2a\beta} + \sqrt{3a\beta} \text{ etc.}$$

curvam ipsam aequari huic seriei ex indivisibilibus conflatae:

$$\frac{\sqrt{a\beta}}{a} + \frac{\sqrt{2a\beta}}{a} + \frac{\sqrt{3a\beta}}{a} \text{ etc.}$$

Id ipsum ergo  $\frac{\sqrt{a\beta}}{a}$ , vel simile est indivisible quoddam.

4 dividendo (1) maior (2) quantum  $L$

14 praeclare: vgl. dazu a. a. O. (ed. Friedlein) S. 19.

Caeterum ad id unde coepi redeundum est: haberi posse valorem ipsius  $\sqrt{a}$ . vel  $\sqrt{c} a$ . etc. in ratione ad  $a$ . Quod nescio an non usum haberi possit, ad construendas in plano aequationes alioquin desperatas.

V. g. si aequatio prodierit  $z = \sqrt{c} c^2 v$ . posset  $\sqrt{c} c^2$ . et  $\sqrt{c} v$ . quodam valore exhiberi,  
5 haberetur aequationis reductio, imo sufficeret valorem cogniti  $\sqrt{c} c^2$ . exhiberi. Certe data summa horum  $\sqrt{c} \frac{y^3}{a} \left( \text{seu } \frac{y}{\sqrt{c} a} \right)$  seu quadratura dicta, dabitur ratio eius ad summam  $\frac{\sqrt{c} y^3}{a}$ . seu ad  $\frac{y}{a}$ .


Caeterum ut clarior sit modus quadraturae paraboloidum compositarum, sic procedendum:

10 Data aequatione:  $x = \sqrt{\frac{y^3}{a}}$ . substituatur  $x = \frac{y}{\sqrt{a}}$ . Iam summa omnium  $y$  inveniatur more communi, cuius ratio ad  $a^2$ . cum nota sit  $\beta$ . fiet summa omnium  $x$ . seu  $\frac{xb}{\gamma} = \frac{a^2 \beta}{\sqrt{a}}$ . Ergo  $\frac{x^2 b^2}{\gamma^2} = \frac{a^4 \beta^2}{a}$ . Quod absurdum, in eo ergo peccatum quod pro  $\sqrt{q} \frac{y^3}{a}$ . substitutum  $\frac{y}{\sqrt{q} a}$ . vel  $\frac{y}{\sqrt{c} a}$ . Neutrum procedit.

Nihil ergo actum est, nisi alia rectior, generaliorque via reperiatur de qua pagina  
15 sequenti.

[Teil 2, gültig]

Quadratura paraboloidum generalis



[Fig. 1]

Paraboloidis cuiusque natura aequatione quadam exprimitur qua omnia curvae  
20 puncta ad axin basinve determinantur, eam autem aequationem ingreditur parameter seu latus rectum, recta quaedam constans atque invariata ( $a$ ), distantiam

20f. parameter seu latus rectum erg.  $L$

puncti a vertice seu abscissa m appellabimus ( $x$ )  $BX$ , distantiam eius ab axe seu applicatam ad axem ( $y$ )  $BY$ .

His ita positis paraboloidum genera haec sunt:


$$\begin{array}{llll}
 \frac{1}{3} & a x = y^2 & a^4 x = & a x = y^2 \\
 \frac{1}{4} & \left\{ \begin{array}{l} a^2 x = \\ a x^2 = \end{array} \right\} y^3 & a x^4 = & a x^5 = \\
 \frac{2}{5} & \left\{ \begin{array}{l} a^3 x = \\ a^2 x^2 = \\ a x^3 = \end{array} \right\} y^4 & a^3 x^2 = & a^4 x^2 = \\
 & & a^2 x^3 = & a^2 x^4 = \\
 & & & a^3 x^3 = \\
 & & & a^4 x = y^5
 \end{array} \quad \begin{array}{l} a^5 x = \\ a x^5 = \\ a^2 x^4 = \\ a^3 x^3 = \end{array} \quad \begin{array}{l} a x = y^2 \\ a^2 x = y^3 \\ a^3 x = y^4 \\ a^4 x = y^5 \end{array} \quad \begin{array}{l} 5 \\ 10 \\ \text{etc.} \end{array}$$

---

4-11 Anmerkungen zur Tabelle:

gültig: NB.  $a^2 x^2 = y^4$  frustra diceretur, reducitur enim ad  $ax = y^2$ . ut et  $a^3 x^3 = y^6$  ad  $ax = y^2$ .  
 $a^4 x^2 = y^6$ .  $a^2 x = y^3$ .

gestr. neben der 4. Spalte: Area trilinei concavi  $\frac{1}{3}$



[Fig. 2]

Porro in omnibus istis paraboloidibus, haec est regula generalis tangentium ducendarum, a geometris praestantibus dudum prodita, nimirum si tangens sit  $YC$ . rectam  $x$  ( $BX$ ) fore ad rectam  $BC$ , ut est exponentis potestatis  $x$  ( $BX$ ) ad exponentem potestatis 5  $y$  ( $BY$ ). Ideo in parabola communi  $BC$  est  $(2 BX) 2x$ , quia cum aequatio sit:  $ax = y^2$ . patet exponentem  $x$  esse 1. exponentem  $y^2$  esse 2.

At hinc se methodus mihi aperuit nova prorsus et admiranda, quadrandi figuram quamcunque, quotiescumque ea eius est natura, ut certa constansque sit ratio  $CX$  ad  $BX$ , vel  $BC$  ad  $BX$ . Quae methodus utique infinitas alias figuras comprehendit, quae 10 paraboloides, sive ex earum, quas tabella in infinitum continuata contineret, genere; non sunt.

Fiat triangulum figurae datae characteristicum, indivisibilium repraesentantium  $HIY$ . Ducatur et recta  $XG$  perpendicularis ad tangentem  $CY$ . seu intervallum tangentis a vertice. Patet triangula  $CBY$  et  $HIB$  esse similia, angulumque  $BCI$  angulo 15  $IHY$  aequalem. Ergo cum angulus  $XCG$  (vel  $BCY$ ) angulo  $IHY$  sit aequalis, triangula quoque  $CGX$  et  $HIY$  similia erunt; ideoque

$$\frac{CX}{HY} = \frac{GX}{IY}, \text{ vel } CX \cdot IY = GX \cdot HY,$$

id est  $CX$  ad basin aequantur intervallis tangentium a vertice seu  $GX$  ad arcum, ac

per consequens (ut alibi demonstravimus) segmento  $XY$ , vel si longius procedas  $XE$ , duplicito.

Porro quando rectae  $CX$  habent certam et constantem rationem ad rectas  $BX$ , etiam summa omnium  $CX$  ad basin  $DE$ , vel  $XK$ , constantem habet rationem ad summam omnium  $BX$  (vel  $FY$ ) ad eandem  $XK$ . vel ad aream spatii  $XYEK$ . Haec ratio esto  $\beta$ .  
Summa omnium  $BX$ , seu area concavi trilinei  $XYEK$  quaesita esto:  $z^2$ . Ergo

$$\text{summa omnium } CX \text{ erit } \beta z^2, \text{ ac segmentum } XYE \text{ erit } \frac{\beta z^2}{2}.$$

Iam trilineum concavum  $XYEK$  segmento  $XYE$  auctum constituit triangulum  $EXKE$ .  
habemus ergo aequationem:

$$z^2 + \frac{\beta z^2}{2} = \nabla XKE. \text{ Ergo } z^2 = \frac{\nabla XKE}{1 + \frac{\beta}{2}} \quad 10$$

Habemus ergo quadraturam trilinei concavi  $XYEK$  quaesitam.

Exemplo veritas demonstrationis statim comprobatur, si curva sit parabolae communis, erit  $\beta = 1$ . ergo  $1 + \frac{\beta}{2} = \frac{3}{2}$ . Ergo  $z^2 = \frac{\nabla XKE}{\frac{3}{2}}$  vel  $= \frac{\square XE}{3}$ .

Innumerae supersunt figurae; eadem methodo quadrabiles, quae in tabula preecedente non continentur, uti, in quibus exponentes sunt ut numeri fracti, aut ut integri ad fractos, v. g.  $ax^{\frac{1}{2}} = y$ , sed id reducitur ad hanc aequationem:  $\frac{ax}{2} = x^2$ . Sed in haec ulterius inquirendum, et an exponentes numeri surdi esse possint.  
15

Sed quicquid eius sit, illud certe manifestum est, si  $CX$  sit ad  $CB$  aliter quam integer rationalis ad integrum rationalem, v. g. ut  $\frac{1}{2}$  ad 1. vel ut  $\frac{3}{4}$  ad  $\frac{2}{3}$ . vel ut  $Rq$  2. ad 1. quod certe fieri posse manifestum est, patet non ideo minus quadrari figuram, etsi 20 paraboloidum forma enuntiari non possit.

1 (ut alibi demonstravimus) erg. L

---

14–17 Hier benutzt Leibniz eine neuartige Bezeichnungsweise, wendet diese aber nicht konsequent an. Hinzu kommen Unzulänglichkeiten in der Rechnung. — Derselbe Ansatz tritt erneut in N. 39 S. 627 Z. 18 – S. 630 Z. 2 auf.

Hinc habemus quadraturas innumerabiles figurarum quae a paraboloidum quadratura non dependent, et operae pretium, naturam aliquot figurarum eiusmodi, aequatione exprimere; quod alias fiet.

Videamus exemplum, si  $\frac{CX}{(BX)} = \frac{Rq 2}{1}$ . seu  $\frac{CX}{x} = \frac{Rq 2}{1}$ . seu  $CX = Rq 2x^2$ .

5 Ergo  $CB = x + Rq 2x^2$ . Iam  $(BY) = y$ .  $\frac{XM}{BY} = \frac{CX}{CB}$ . Ergo  $XM = \frac{CX \wedge y}{CB} = \frac{Rq 2y^2}{1 + Rq 2}$ .

Iam  $CXM \left( \frac{CX \wedge XM}{2} \right) = \frac{Rq 4y^2 x^2}{1 + Rq 2} = \frac{yx}{1 + Rq 2}$ .  $\square XN = BX \wedge XM =$

$\frac{Rq 2y^2 x^2}{1 + Rq 2}$ .  $NY = BY - XM = y - \frac{Rq 2y^2}{1 + Rq 2}$ . Sed et tamen  $\frac{NY}{y} = \frac{1}{1 + Rq 2}$ . quia

$\frac{NY}{BY = (y)} = \frac{XB (1)}{CB (1 + Rq 2)}$ . Ergo  $NY = \frac{y}{1 + Rq 2}$ .

(Ergo  $\frac{y}{1 + Rq 2} = y - \frac{Rq 2y^2}{1 + Rq 2}$ . seu  $\frac{1}{1 + Rq 2} = 1 - \frac{Rq 2}{1 + Rq 2}$ . Ergo  $\frac{1}{1 + Rq 2} +$

10  $\frac{Rq 2}{1 + Rq 2} = 1$ . vel  $\frac{1 + 2Rq 2 + 2}{1 + 2 + 2Rq 2}$  nota veritatis. NB  $\frac{a}{a+b} + \frac{b}{a+b} = \frac{a+b}{a+b} = 1$ .)

Iam  $\nabla NMY = \frac{yx}{2 + 2Rq 2}$ . ac denique  $CBY = x + Rq 2x^2 \wedge y = \frac{xy + Rq 2x^2 y^2}{2} =$

$\frac{yx + Rq 2x^2 y^2 + \frac{yx}{2}}{1 + Rq 2}$ . Sed sic ubique  $y$  tolli potest nec inde aequatio.

$BL = \frac{y^2}{x + Rq 2x^2}$ . Ergo  $BYL \nabla^{\text{lum}} = \frac{y^3}{2x + 2Rq 2x}$ .

quod +  $\left( \frac{yx + Rq 2y^2 x^2 + \frac{yx}{2}}{1 + Rq 2} \right) \frac{xy + Rq 2x^2 y^2}{2} = \frac{CL \wedge y}{2}$ .

---

4–613,12 In diesem Abschnitt versucht Leibniz vergeblich, den Fall eines irrationalen Exponenten zu behandeln, kommt aber trotz verschiedener Ansätze (der letzte zudem fehlerhaft) zu keinem Ergebnis.

Sed  $\frac{CL}{LY} = \frac{[LY]}{BL}$ . item  $LY = Rq y^2 + \frac{y^4}{x^2 + 2x^2 + 2Rq 2x^4}$ . ita veniemus credo ad aequationem.

Vel breviori aequatione [:]

$$\begin{aligned}\nabla^{\text{lum}} CYL &= CL \cap BY \quad \text{vel } \frac{xy + Rq 2x^2 y^2}{2} + \frac{y^3}{2x + 2Rq 2x^2} \\ &= \frac{CY \cap LY}{2} \quad \sqrt{x^2 + 2x^2 + Rq 8x^4 + y^2} \cap \sqrt{y^2 + \frac{y^4}{x^2 + 2x^2 + Rq 8x^4}}.\end{aligned}\quad 5$$

Divisis omnibus per  $y$  vel  $Rq y^2$  fiet[:]

$$x + Rq 2x^2 = \underbrace{\sqrt{x^2 + 2x^2 + Rq 8x^4 + y^2}}_{\sim 1 + \frac{y^2}{x^2 + 2x^2 + Rq 8x^4}} \cap 1 + \frac{y^2}{x^2 + 2x^2 + Rq 8x^4} - \frac{y^2}{2x + 2Rq 2x^2}.$$

Dividantur et omnia per  $x$  quantum possunt, fiet:

$$1 + Rq 2 = \sqrt{1 + 2 + Rq 8 + \frac{y^2}{x^2}} \cap 1 + \frac{y^2}{x^2 + 2x^2 + Rq 8x^4} - \frac{y^2}{2x^2 + 2Rq 2x^4}.$$

Vel multiplicando rursus sed aliter, per  $x^2$ :

$$\begin{aligned}x^2 + Rq 2x^4 &= \underbrace{\sqrt{1 + 2 + Rq 8 + \frac{y^2}{x^2}}}_{\sim x^2 + \frac{y^2}{1 + 2 + Rq 8}} \cap x^2 + \frac{y^2}{1 + 2 + Rq 8} - \frac{y^2}{2 + Rq 8} \\ &= \sqrt{x^4 + 2x^4 + Rq 8x^8 + y^2 x^2} + \sqrt{\frac{y^4 + 2y^4 + Rq 8y^8 + \frac{y^6}{x^2}}{x^2 + 2x^2 + Rq 8x^4}} - \frac{y^2}{2 + Rq 8}.\end{aligned}$$

Caeterum ex eodem principio aliae adhuc quadraturae aperiuntur, non minus late fusae. Nam si summa omnium  $CX$  ad basin seu  $XK$  applicatorum haberi potest, ut si (non trilineum concavum sed veram) parabolam constituant, quadrari potest segmentum figurae  $XYE$  duplicatum, quare et figura.

Ecce aliud[:] Summa omnium  $XM$  ad altitudinem; seu summa omnium  $BN$ , aequatur itidem segmento figurae duplicato, quod ita facile demonstro[:]

Triangula similia  $HLY$  et  $XGM$ , quia anguli  $GXM$  et  $IHY$  aequales. Ergo  $\frac{XM}{HY} = \frac{XG}{HI}$ .

Ergo  $XM \cap HI$  (seu  $XM$  ad altitudinem)  $= XG \cap HY$ . intervallo tangentis ad arcum. 20

1 BY  $L$  ändert Hrsg.    12  $\frac{y^2}{2 + Rq 8}$ . | Divide rursus per  $x^2$  fiet[:]  $1 + Rq 2 = \sqrt{1 + 2 + Rq 8 + \frac{y^2}{x^2}}$   
gestr. | L

Et summa  $XM$  ad altitudinem = segmento figurae duplicito.

Unde illud quoque appareat[:] habita quadratura omnium  $XM$ , ad altitudinem, haberet quadraturam omnium  $NY$ . Vicissim, habita quadratura omnium  $NY$ , habetur differentia inter figuram et segmentum duplicitum; est enim [summa omnium]  $NY$  differentia inter figuram et segmentum figurae duplicitum seu inter summam omnium  $BY$  quae constituit figuram, et omnium  $BN$  quae constituit segmentum figurae duplicitum. At differentia inter figuram convexam et segmentum figurae duplicitum est trilineum figurae concavum, quod facile patet: sit enim segmentum  $XOE$  introrsum insistens chordae  $XE$ , aequale et simile extrosum insistenti  $XYE$ , patet cum aequalia sint tota, triangula  $XDE$  et  $XKE$ , et ablata segmenta  $XOE$ ,  $XYE$ , etiam residua trilinea concava  $XDEOX$  et  $XKEYX$  aequalia fore. Est autem trilineum concavum  $XDEOX$ , residuum figurae convexae  $XDEYX$ , ablato dupli segmento  $XYEOX$ ; ergo id residuum figurae convexae, demto dupli segmento, triangulo figurae concavo aequale est.

Quare data quadratura omnium  $NY$  seu summa earum ad altitudinem, datur quadratura figurae et vicissim.

Hinc nova iterum methodus, qua aliae figurae innumerabiles quadrari possunt, synthetice pariter atque analytice.

Synthetice inquam, cum ex datis figuris quadrabilibus, ut paraboloidibus, aliisque derivatur quadratura omnium  $XM$ , vel omnium  $NY$ ; analytice cum assumitur certa quaedam progressio quadrabilis omnium v. g.  $XM$ , et per analysin investigatur, quaenam sit figura, cuius omnes  $XM$  sint assumtae progressionis. Eaque figura ostenditur esse quadrabilis. Sed accurate loquendo omnis ista investigatio est synthetica: Nam data figura invenire methodum quadrandi, analyticum est, data methodo invenire figuram, cui methodus applicari possit syntheticum. Nec vero hactenus aliter quam synthetice in geometria transformatrice procedi potest, quoniam series infinitae, in primis ubi surdae radices interveniunt, per analysin tractabiles non sunt.


Est tamen analysis quaedam succenturiata in his rebus, ut scilicet in figura data methodos omnes, quas hoc loco demonstravi, ac quibus parum admodum ex geometria certe addi potest, quamdiu ipsa arithmeticamentum infinitorum, aut etiam analysis non perficitur.

Experiamur.

4 summa omnium erg. Hrsg.

$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$	$\frac{1}{1}$		
$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{3}$	
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{1}{6}$	
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{16}$	etc.	$\frac{1}{10}$	
$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{25}$	etc.	$\frac{1}{15}$	5
	$\frac{1}{36}$			
	$\frac{1}{49}$			

Inspiciatur figura hyperbolae aut hyperboloidis pag. 89 libri Hugenii.



[Fig. 3]

1–7 Tabelle am Rande erg. L

8 Inspiciatur: HUYGENS, *Horologium oscillatorium*, 1673, S. 89. Leibniz hat keine eigene Figur gezeichnet. Die vorliegende Figur hat Hrsg. textkonform unter Berücksichtigung des Leibnizschen Handexemplars rekonstruiert. (Für die vollständige Figur s. N. 2.)

Ibi  $SK = KH$ . si hyperbola est communis, quia  $xy = a^2$ . exponentes autem  $x$  et  $y$  sunt aequales in  $xy$ .

Perpendicularis  $KN$  ad arcum = ipsi  $KH$  ad basin.

Ergo  $SQ$  ad arcum =  $SH$  ad basin quia dupla priorum, atqui  $SH$  ad basin = figurae 5  $BRTAB$  duplicatae.

Et eiusdem dimidium seu simplex ista figura =  $SBTS$ .

Quod videtur absurdum,  $x$  implicans. Sed ratio est, quia tunc ipsa linea ultima  $ST$  comprehenditur, quae non comprehendebatur sectori ipsi  $SBTR$ , nimirum ultima ista linea scilicet dimidia = triangulo  $SBR$ , quia rectangulum  $SKBR$  = toti lineae  $ST$  infinitae.

10 Si partes tantum sumas res eodem redit. Esto spatium  $BRPUAB$  aequalis sectori  $SBAUS$  quod non mirum cum  $UPS$  sit =  $BRS$ . Atque haec quidem si curva  $TUAB$  sit hyperbolica communis.

Inquiramus quid futurum sit si sit aliqua hyperboloidum, v. g. ubi  $x^2y = a^3$ . quo casu  $KH$  duplum  $SK$ .

15 Iam summa omnium  $SK$  ad arcum vel duplus sector  $SBAUS$  = omnibus  $SH$  ad basin quae tripla omnium  $SK$  ad basin, seu tripla spatii  $BRPUAB$ .

Ergo 2,  $SBAUS = 3, BRPUAB$ .

seu, quod idem est:

2,  $LBAUL + 2, SLB = 3, LBAUL + 3, UPRL$ .

20 Ergo: 2,  $SLB - 3, UPRL = LBAUL$ .

vel 2,  $SLB - 2, UPRL = (LBAUL + UPRL) BRPUAB$ .

Habemus ergo quadraturam spatii hyperboloidis,  $BRPUAB$ . Quo posito hyperbolae quoque quadratura omniumque hyperboloidum in infinitum haberi potest.

8 comprehendebatur (1) in figura (2) segmento (3) sectori  $L$  14 f. duplum SK. (1) Ergo SH (a)  
 triplum (b)  $\frac{3}{2} KH$ . ideoque sector  $SBAUS = (aa)$   $\frac{3}{2} BAUPRB$ . seu  $LUABL + SLB = \frac{3}{2} LUAB +$   
 $\frac{3}{2} UPRL$ . Ergo:  $SLB = \frac{1}{2} LUAB + \frac{3}{2} UPRL$ . (aaa) Ergo 2,  $SLB - (bbb)$   $\frac{3}{2} UPRL = \frac{1}{2} LUAB$ .  
 Ergo 2,  $SLB - 2, UPRL = BAUPR$ . quo posito haberemus huius hyperboloidis quadraturam. (bb)  
 $\frac{3}{2} BAUPRB$ . Ergo  $\frac{1}{4} LUABL + \cancel{SLB} = \frac{3}{4} UPRL - SLB$ . seu  $LUABL = 3UPRL - 4SLB$ . vel:  $(LUABL +$   
 $UPRL) BAUPRB = 4UPRL - 4SLB$ . Habemus ergo quadraturam spatii hyperboloidis BAUPRB. (2)  
 Iam  $L = 23$  potest. | Tentandumque an ea ratione spatii quoque asymptoti infiniti quadratura haberi queat. Quod ut fiat tantum demonstrandum est, quodnam planum lineae infinitae ST sit aequale.  
*gestr. | L*

## 39. DE PARABOLOEIDUM ET HYPERBOLOEIDUM QUADRATURA III

[Sommer 1673]

**Überlieferung:** *L* überarbeitetes Konzept: LH 35 II 1 Bl. 95–96, 250–251, 138–139 (Text);  
Bl. 140 (fig. 1. und fig. 2.). 3 Bog. und 1 Bl. 2°. 12 S. sowie zwei separate Figuren.  
Cc 2, Nr. 555B, 635A, 635B, 692

5

Datierungsgründe: s. N. 37.

39<sub>1</sub>. PARS PRIMA. DE PARABOLOEIDUM QUADRATURA

[Prop. 1.]

„ Superficies cylindrica truncata super curva quadam velut basi ita erecta, ut ei cur-  
„ vae in puncto quolibet intervallum tangentis sui a vertice, perpendiculariter insistat; 10  
„ aequatur segmento, recta a vertice ad extreum curvae punctum ducta abscisso,  
„ duplicato.

8 Prop. 1. erg. Hrsg.




fig. 1.

Esto figura quaelibet  $ABC$  cuius altitudo  $AB$  in partes numero infinitas sive aequales, sive inaequales, qualis est  $DE$  aut  $OD$ , quas infinite parvas pono, divisa intelligatur. Et ex punctis divisionis omnibus  $D$ . et  $E$ . ducantur applicatae,  $DF$ .  $EG$ , et ad puncta curvae  $F$ .  $G$ . tangentes  $HFI$ , et  $KPL$ . quarum a vertice  $A$  intervalla sunt perpendicularares ductae a vertice ad tangentes, nempe  $AM$ ,  $AN$ . Haec intervalla tangentium, punctis tangentium suarum cum curva communium, perpendiculariter imponantur,  $AM$  punto  $F$ , et  $AN$  punto  $G$ . idemque in omnibus curvae  $AFG$  punctis fieri intelligatur. Aio portionem superficiei cylindrici recti inde enatam, aequari duplo segmento  $AFGA$ , recta scilicet  $AG$ , verticem  $A$  cum extremo curvae,  $G$ . connectente; et curva ipsa  $AFG$ , contento; idemque est ubicunque punctum ultimum  $G$ . in curva  $AFC$  assignetur.

Hoc ita demonstro: intelligatur figura data constare infinitis trapeziis, ut  $OPFD$ , vel  $DFGE$ , quae scilicet duabus quibusdam applicatis, ut  $OP$  et  $DF$ , vel  $DF$  et  $EG$ , parte altitudinis infinite parva,  $OD$ , vel  $DE$ , ac denique portione quadam tangentium, ut  $KPFL$ , vel  $HFGI$  inassignabili seu infinite parva, nempe ut  $PF$ . vel  $FG$ , contineantur. Unde fit ut curva in infinitas rectas inassignabiles, ut  $PF$ . vel  $FG$ , velut latera polygoni irregularis numeri laterum infiniti, fracta intelligatur.

Nunc vero ex vertice  $A$ . ducantur rectae ad omnia puncta extrema horum latera, ut  $AP$ .  $AF$ .  $AG$ . quas ad circuli exemplum c h o r d a s appellare possis. Manifestum est totidem oriri triangula, quot sunt latera, quorum vertex in  $A$ , basis, ipsum latus, velut  $APF$ .  $AFG$ . iisque triangulis infinitis totum segmentum  $AFG$  compleri. Unde constat figuram huic triangulorum summae aut eius duplo aequalem, ipsi segmento eiusve duplo aequari.

Qualem vero superficiem cylindricam propositam esse, ita facile ostendemus: quoniam constat ex *Elementis* altitudinem, ut  $AM$ , vel  $AN$ , ductam in basin, ut  $PF$ , vel  $FG$  duplo trianguli, ut  $APF$ , vel  $AFG$  aequari, ergo summa omnium rectangulorum, quorum altitudines, intervalla tangentium a vertice, bases vero, latera infinite parva curvam componentia, tangentiumve portiones, vel quod idem est superficies cylindrica, ex intervallis tangentium punctis contactus perpendiculariter impositis conflata, summae omnium triangulorum numero infinitorum duplicatae, id est duplo segmento aequatur. Q.E.D.

1 infinitas (1) inter se aequales (2) sive  $L$

21 aut eius duplo und eiusve duplo erg.  $L$

1 Esto figura: Die Kurve in der Handzeichnung folgt zuerst der Näherungskurve; in der Umgebung von  $A$  ist sie an die Secanslinie angeglichen.

C o r o l l . 1.

- „ Si curva proposita in rectam extendatur, cui velut altitudini, intervalla tangentium
- „ in punctis contactus applicari intelligantur; figura inde nata eidem segmento, curva
- „ inde a vertice sumta, rectaque contento; duplicato; aequabitur.

5 Quoniam manifestum figuram hanc nihil aliud esse quam superficiem cylindricam supradictam, in planum explicatam.

C o r o l l . 2.

- „ Segmentum circuli duplicatum aequatur figurae sinuum versorum arcui applicatorum, seu momento arcus sui ex puncti extremi tangente librati.

10 Nam si curva *AFG* sit arcus circuli, intervallum tangentis a vertice aequatur sinui verso seu abscissae per applicatam *DF* vel *EG* ex punto dato *F* vel *G* ductam, ad radius *AB* in verticem *A* terminatum, perpendicularem; ut constat, ita *AM* erit aequale *AD*, *AN* erit aequale *AE*. Ideo in semisegmento *AEGFA* summa sinuum versorum seu abscissarum ad arcum, seu quod idem est, momentum arcus *AFG* ex tangente *AR* (Quod, inquam, idem est, quia intervalla punctorum arcus, ab *AR* tangente verticis, ut *QF*, vel *RG*. aequantur sinibus versis seu abscissis ut *AD*, vel *AE*; intervalla autem ab axe librationis ponderanti applicata dant eius momentum.) aequabitur duplo segmento *AFGA*.

$\Sigma \chi o \lambda$ . Haec quae de summa sinuum versorum diximus, pulchre convenient cum iis  
 20 quae iam apud alios demonstrata habentur. Illi nimirum ostenderunt momentum arcus *AFG* ex basi *BS* seu summam sinuum complementi (qui in circulo ob uniformitatem coincidunt cum sinibus rectis, nisi quod inverse sumantur), arcui suo *AFG* applicatorum, ut si *DB* vel *EB* arcui in punctis *F*. vel *G*. perpendiculariter insistere intelligantur, quadrari posse; et radio in maximum eius sinum rectum *EG*, vel triangulo *AC*. id est  
 25 triangulo *AGB* duplicato aequari. Et hoc quidem ex dimensione superficie hemisphaerii Archimedea deducere in proclivi fuit. Cum ergo summa sinuum versorum ut *AD* ad arcum, det duplex segmentum *AFG*. et summa sinuum complementi ut *DB* ad arcum, det duplex triangulum segmento suffultum, ideo summa amborum, *AD* + *DB*, seu *AB*. radius, in arcum *AFG*. aequabitur dupli sectori *AFG*. quod verum esse dudum constat.  
 30 Et talia quidem apud eos qui de cycloide scripsere, Torricellum, Pascalium, Fabrium, Laloveram, legi possunt, velut omnium quae illi demonstravere fundamenta. At doctissi-

---

25 Et hoc quidem: zur Gesamtproblematik s. MAHNKE, *Neue Einblicke*, 1926, S. 17–19.

mus geometra, Iohannes Wallisius, ad rem praesentem propius accessit, ipsamque figuram sinuum versorum dimensus est; nostra tamen demonstratio facile p[ro]ae caeteris se commendaverit, quandoquidem methodi universalis novae non nisi corollarium est; ipsosque recta sinus versos aggreditur, nullo per rectorum ambages circuitu.

P r o p. 2.

„ Figura ex productis ad basin ordinatim recto angulo applicatis nata, aequatur segmento duplicato.

P r o d u c t a s appello compendii causa, altitudinem ultra verticem eousque productam, donec occurrat tangent[ia], qualis est in fig. 1.  $AH$ . vel  $AK$ , vel  $AT$ . id est quicquid in figurae altitudine  $AB$ , quantum satis est, producta, inter verticem  $A$ , et tangentis occursum  $H. K. T.$  cadit; quae si basi  $AC$ . vel ei respondent[ia] rectae  $AR$ . ordinatim ad perpendicularum applicentur; ordinatim inquam, id est  $AH$  producta, translata in  $RX$ , quoniam  $R$  in basi, puncto curvae  $F$ , cuius tangens  $FH$  altitudini  $BAH$  productae in  $H$  occurrit, ad perpendicularum respondet; eandemque ob causam  $AK$  transferatur in  $QW$ , et  $AT$  in  $ZU$ , atque idem ad quodlibet curvae punctum, factum putetur; figura inde conflata  $AUWXR$  aequabitur segmento  $AFGA$  duplicato.

Quod ut demonstretur, cogitandum est: Triangula  $FYG$  et  $HGB$  vel  $HUA$  esse similia: posito nimirum  $BG$  esse perpendicularē ad curvam: atque ideo, ut est  $AU$  ad  $YG$ , ita erit  $AH$  ad  $FG$ , unde sequitur rectangulum ex  $AU$  in  $FG$ , vel quod eodem reddit, ut prop. 1. ostensum est, triangulum  $AFG$  duplicatum; aequari rectangulo  $AH$  in  $YG$ . vel rectangulo  $XR$  in  $QR$ . Eodem modo rectangulum ex  $WQ$  in  $ZQ$ . triangulo  $APF$  duplicato aequabitur. Et quoniam positis  $YG$  vel  $QR$ . et  $FG$  infinite parvis, omnia triangula segmentum  $AFGA$  exhauiunt, et omnia rectangula quae dixi, figuram  $AUWXR$  compleant, ideo figura haec segmento isti duplicato aequabitur.

$\Sigma \chi o \lambda$ . Magni sunt momenti huius generis demonstrationes; quoniam nullis figurarum speciebus, nullis figurae propositae partibus continentur; nam et curva  $AFG$  cuiuslibet naturae, et punctum ultimum  $G$ , in ea utcunque continuata, ubilibet assumi potest.

2 versorum erg.  $L$       3 novae erg.  $L$

---

1 Iohannes Wallisius: *Mechanica*, 1672, S. 283–305 (WO I, S. 752–766).

Illud tantum admoneri debet, si curva eius sit naturae, ut aliqua applicatarum altitudini perpendicularium,  $BC$ . ad ipsam curvam perpendicularis sit, ut in circulo, ellipsi, aliisque ovalium speciebus contingit, tangentem ad punctum hoc  $C$ . utcunque productam, nunquam attingere altitudinem  $BA$ , utcunque productam; cum sit ei parallela, utraque  
5 enim altitudo pariter et tangens est hoc casu ad applicatam  $BC$  perpendicularis: quare si in figura productarum  $AUWXR$  constituenda, punctum  $R$  ipsi  $C$  respondere ponatur, recta  $RX$  erit infinita, sive quod idem est, extremum eius  $X$  distabit a basi  $BR$  recta maiore quam quae assignari possit, spatiumque  $AUWXR$  erit asymptotum longitudinis infinitae, sed finitae magnitudinis, cum non nisi segmento  $AFCA$  duplicato aequetur.

10 Quodsi curva  $AFG$  sit arcus circuli, et  $AFC$  arcus quadrantis; manifestum est spatium  $AUWXSB$  aequari sectori  $AFGB$  duplicato: et si  $R$  ipsi  $C$  respondeat, seu si recta  $RX$  sit infinita, spatium  $AUWXCB$  quanquam infinite longum aequabitur semicirculo. Et hanc quidem appellare soleo figura m̄ angulorum, item hyperbolam falso am, quemadmodum enim portiones spatii asymptoti hyperbolici sunt ut logarithmi, ut ex praeclarō P. Gregorii a S. Vincentio theoremate primus P. Sarrasa deduxit;  
15 ita portiones spatii asymptoti huius figurae sunt ut arcus sive anguli, ductisque rectis parallelis, eadem proportione secantur; posito enim rectam  $QF$  vel  $RG$  esse magnitudinis cuiusdam assignabilis, erit ut arcus circuli  $AF$  ad arcum  $AG$ , vel angulus  $ABF$  ad angulum  $ABC$ . ita spatium  $BAUW\alpha$  ad spatium  $BAUXS$ .

20 Hyperbolē autem falsam cur vocem manifestum est, quia eaedem secantes, ut  $BH$ . vel  $BK$ , quae altitudini  $AB$  in punctis ut  $D$ .  $E$ . ad perpendicularē ordinatim applicatae hyperbolē formant, punctis baseos  $BC$ . ut  $\alpha$ . vel  $S$ . impositae dant quam dixi figuram angulorum.

25 Eodem modo data qualibet curva inveniri potest figura quae eadem cum curva ratione secetur.

### P r o p . 3. P r o b l e m a

„ Parabolam et paraboloides in universum omnes et figuram quamlibet quadrare, in „ qua producta ad abscissam habet eandem semper rationem certam atque „ constantem.

30 In eadem fig. 1. esto curva  $AFC$  parabolae, aut paraboloidis, aut alterius cuiusdam figurae, in qua productae sunt abscissis proportionales, seu in qua  $AT$  est ad  $AO$ ,

---

15 deduxit: A. A. de SARASA, *Solutio problematis*, 1649, S. 5–17.

ut  $AK$  ad  $AD$ . Nam in parabola quidem communi productae sunt abscissis aequales; in caeteris, proportionales. Et placet tabulam aequationum, quibus natura paraboloidum exprimitur, hoc loco exhibere, unde eadem opera ratio abscissarum ad productas in unaquaque appetet. Cumque harum figurarum aequationes, applicatarum ad abscissas relationem exhibentes, ingrediantur rectae quaedam constantes et invariatae, quas parametros aut latera recta appellare solent, eas appellemus (a). abscissas ut  $AO$ , vel  $AD$ , (x). applicatas ut  $OP$ , vel  $DF$ , (y). Tabula vero haec erit.

5

2 proportionales. (1) Quod ut appareat tabulam paraboloidum, qualem iam dudum geometra nobilis Christianus Hugenius in suo de Horologiis oscillatoriis tractatu novissimo, posuit; placet huc transferre, et qua (2) Et  $L = 6$  (a). (1) distantiam puncti in curva assunti a vertice, seu (2) abscissas  $L$

---

2 *Zur Variante:* Zunächst wollte Leibniz die Huygens'sche Tabelle der Paraboloide, *Horologium oscillatorium*, 1673, S. 88 (*HO XVIII* S. 237), heranziehen, hat dann aber gemerkt, dass diese hier nicht passt.

[1. Fassung, gestr.]

Tabula Paraboloidum

	quadratica seu communis	$ax = y^2$
5	simplex	$a^2x$
	cubica	$\left. \begin{array}{l} a^2x \\ ax^2 \end{array} \right\} = y^3$
	quadratiformis	$a^3x$
	(seu $ax = y^2$ ) .....	$\left. \begin{array}{l} a^3x \\ a^2x^2 \\ ax^3 \end{array} \right\} = y^4$
10		$\left. \begin{array}{l} a^4x \\ a^3x^2 \\ a^2x^3 \\ ax^4 \end{array} \right\} = y^5$
15	(seu $a^2x = y^3$ ) .....	$\left. \begin{array}{l} a^5x \\ a^4x^2 \\ a^3x^3 \\ a^2x^4 \\ ax^5 \end{array} \right\} = y^6$
	(seu $ax = y^2$ ) .....	etc.
	(seu $ax^2 = y^3$ ) .....	etc.
20		

Unde nonnulla satis notatu digna primo aspectu apparent, primum, parabolarum quadraticarum esse speciem unam, cubicarum duas, quadrato-quadraticarum tres una demta (quae stella notata est), surdesolidarum quatuor, cubico-cubicarum quinque 25 una rursus, stellata, demta. Sive, quadraticarum esse speciem unam, cubicarum et

2 Zur Tabelle: \* nebst zugehörigen Klammereinschüben erg. L 24 (quae stella notata est)  
erg. L 25 una | rursus, stellata, demta erg., ändert Hrsg. | demta L

quadrato-quadraticarum duas; surdesolidarum et cubico-cubicarum tres; atque ita porro, regula generali, ut tot sint species paraboloidum dimensionis cuiusdam propositae, exponentem habentis numerum imparem vel parem, quot sunt unitates in exponente pari, proxime minori. Cur autem ab iis dimensionibus quae exponentes habent pares, una species stellata adimatur manifestum est; quoniam stellata per extractionem radicis ad dimensionis cuiusdam inferioris speciem iam ante nominatam nimirum ad primam reduci potest. Ita ex aequatione  $* a^2x^2 = y^4$ . per extractionem radicis quadratae fit,  $ax = y^2$ , et ex  $* a^3x^3 = y^6$ . fit per extractionem radicis cubicae aequatio eadem quae ante  $ax = y^2$ . Sed haec impraesentiarum persequi nihil attinet.

Illud tantum quod ad nostrum institutum facit, cuiusque causa tabulam attuli nunc exponendum est, nimirum methodum tangentium, ad has curvas ducendarum, a geometris praestantibus hanc esse, dudum proditam, ut sicuti est exponens potestatis  $x$  abscissae, ad exponentem potestatis  $y$  applicatae, ita sit ipsa  $x$  abscissa, ut in figura nostra recta  $AD$ , ad rectam  $DK$ , ex abscissa  $AD$ , et producta ad tangentem usque, recta scilicet  $AK$ , compositam.

Hinc iam illud appetit infinitas esse alias figurae, quae eadem problematis nostri methodo quadrari possint, quanquam tabula paraboloidum utcunque continuata non contineantur, ut si recta  $DK$ , sit ad abscissam  $AD$ , ut numerus surdus ad integrum, vel ut integer ad surdum, vel ut surdus ad surdum; neque enim potestates enuntiari possunt, quarum exponentes sint numeri surdi, v. g.  $y^{Rq6} = ax^{Rq6 - 1}$ . nisi quis forte methodum inveniat, tollendi irrationalitatem, quod fieret ducento ipsum  $ax^{Rq6 - 1}$  toties in se, quot in  $Rq$  6 sunt unitates, fieret  $y^6$ . sed altera aequationis pars non ideo statim ab aequatione (!) liberata foret cum fiat  $y^6 = a^{Rq6} x^{6 - Rq6}$ . Quare huius generis figurae paraboloidum more, hac quidem methodo enuntiare difficillimum fuerit. Forte putet aliquis methodo

4 minori (1) : et tot sint species paraboloidum dimensionis cuiusdam exponentem habentis numerum parem, quot sunt exponentes dimensionis proxime inferioris, (2) . Cur  $L = 6$  nimirum ad primam erg.  $L = 24$  fuerit (1), sed ut enuntiari tamen geometrico more possint; adhibenda est methodus a me alibi tradita de inveniendis applicatis ex datis productis. Quae si succedit hoc loco, nobisque aequationem geometrice enuntiatam praebet, eum inde ducemus fructum sane ingentem, ut et inexpectatum, ut enuntiationes huiusmodi plane irregulares et intractabiles, reducamus ad formulas usitatas; quemadmodum, si exponentes sint numeri fracti, facilis reductio est, ponamus enim aequationem hanc esse:  $ax^{\frac{1}{2}} = y^{\frac{2}{2}}$ , ea ad hanc aequationem revocari posset:  $ax = y^2$ , (a) si modo regula illa de ratione (b) quoniam exponens  $x$ . ad exponentem  $y$ . est ut 1. ad 2. Meminisse tamen debemus eandem plane rationem abscissarum ad applicatas in diversis generibus figurarum paraboloidum (2) . Forte  $L = 24 - 626,1$  methodo | quadam certa gestr. | quam  $L$

quam alibi explicui, ex datis productis, quaerendi applicatas, eiusmodi aequationes irregulares ad communes formulas reduci posse. Sed considerandum est iisdem licet positis productis, diversas esse posse applicatas, nec proinde problema satis esse determinatum, nam in duabus paraboloidibus quarum una aequationem habet  $a^2x = y^3$ , altera aequationem [bricht ab]

[2. Fassung, gültig]

[Tabelle, s. S. 628 und S. 629]

Ubi nonnulla, notatu satis digna, primo aspectu apparent. Ac primum, parabolarum quadraticarum f o r e speciem unam, cubicarum duas, quadrato-quadraticarum tres, sur-  
10 desolidarum quatuor, cubico-cubicarum quinque; f o r e , inquam, nisi eae species stella notatae adimendae essent, in quibus aequationes deprimi possunt, quod fit quando potestatum omnium aequationem ingredientium exponentes habent unum divisorem communem,

$$\begin{array}{llll} \text{ita} & a^2x^2 = y^4 & a^4x^2 = y^6 & a^3x^3 = y^6 \\ 15 \quad \text{dat} & ax = y^2 & a^2x = y^3 & ax = y^2 & ax^2 = y^3. \end{array}$$

Unde fit, ut quotiescumque exponentis potestatis  $x$  habet divisorem communem cum exponente potestatis  $y$ . Idem divisor etiam exponenti potestatis  $a$  applicari possit, quia exponentes potestatum  $a$  et  $x$  iuncti faciunt exponentem potestatis  $y$ . Quare ut abscissa ad applicatam datam quandam habeat rationem certam atque constantem, non nisi in  
20 una figurae paraboloidis specie contingere potest, et si quidem in alia contingere posse videtur, ea ad priorem reduci potest.

---

7 Zur 2. Spalte der Tabelle:  $\frac{1}{\beta}$  ratio productae ut  $AK$  ad abscissam ut  $AD$ , ut est exponentis potestatis ( $a$ ) ad exponentem potestatis ( $x$ ).  
 Zur 4. Spalte der Tabelle: Valor trili⟨nei⟩ parabo⟨lici⟩  $AFGR$ , portione ⟨rectangu-  
li⟩ circumscripti  $E\langle R$  aliqua,⟩  $ER = b^2$ ; expressus.

---

1 alibi explicui: vgl. dazu N. 18. Leibniz spielt darauf noch einmal S. 630 Z. 8 an. 22–25 Zu den Ergänzungen zu Spalte 2 und 4 s. u. S. 630 Z. 18–22 sowie S. 631 Z. 8–11.

Quibus intellectis exponamus regulam, cuius causa tabulam attulimus, quae haec est, ex methodo tangentium ad huius generis curvas ducendarum, a praestantissimis geometris dudum prodita:

ut sicuti est exponens potestatis ipsius  $a$ . lateris recti, ad exponentem potestatis ipsius  $x$ . abscissae  $AD$ , ita sit producta  $AK$  ad ipsam  $x$ . seu abscissam  $AD$ .

5

Nec quisquam metuat, ne forte eadem exponentium  $y$  et  $x$  ratio in diversae specie curvis obtingat, v. g. in aequatione  $a^2x^2 = y^4$ , et  $ax = y^2$ , quia, ut dixi, aequatio illa ad hanc reduci potest.

Hinc iam illud apparent, infinitas esse alias figuras, quae eadem problematis nostri methodo quadrari possint, quanquam tabula paraboloidum utcunque continuata non contineantur, ut si producta  $AK$  sit ad abscissam  $AD$ , ut numerus integer ad surdum, vel ut surdus ad integrum, vel ut surdus ad surdum. Nam si ponatur  $AK$  ad  $AD$ , exempli gratia, ut 1. ad  $Rq$  6. – 1. figura paraboloidum more ex regulae allatae praeceptis tractata daret hanc aequationem:  $y^{Rq\ 6} = ax^{\overline{Rq\ 6}-1}$ . ubi  $y$  et  $x$  ad dimensiones quasdam imaginarias, quales inter quadratum et cubum, cubum et quadrato-quadratum, aliasque potestates mediae fingi possunt, ascendunt. Quas vero formulas ad communem enuntiandi rationem revocare, non adeo expeditum opinor futurum est.

10

Annotabit forte aliquis numeros fractos surdorum loco adhibitos eandem facturos difficultatem, ut si aequatio sit  $ax^{\frac{1}{2}} = y^{\frac{3}{2}}$ . ascendi ad imaginarios. Sed sciendum est  $x^{\frac{1}{2}}$  idem esse, quod  $\frac{x}{2}$ . et  $y^{\frac{3}{2}}$  idem esse  $\frac{y^2}{2}$ . ac proinde hanc formulam ad communem illam

15

20

$ax = y^2$ . reduci. Idemque apparent ex ratione productae  $AK$  ad abscissam  $AD$ , quae si intelligatur esse ut numeri integri ad fractum, aut fracti ad integrum, aut fracti ad frac-

4 exponens (1) potestatis (y) | applicatae DF. erg. | ad exponentem potestatis (x) | abscissae AD. erg. |, ita sit (a) composita ex abscissa (b) in figura nostra prima recta KD (composita ex (aa) abscissa DA, et (bb) producta KA, et abscissa AD) (2) potestatis  $L = 12$  surdum (1); neque enim potestates enuntiari possunt, quarum exponentes sint numeri surdi, ut exempli gratia:  $y^{Rq\ 6} = ax^{\overline{Rq\ 6}-1}$ . Quomodo enim  $y$ . toties in seipsum duci intelligemus, quot sunt in  $Rq\ 6$ . unitates, cum  $Rq\ 6$ . non sit unitati commensurabilis? (a) Sane nisi sit aliqua reducendi ratio (b) Sane figuras talium aequationum geometricae describere difficultum arbitror, nisi aliqua reductio adhibeat. (c) Quae sane ex communibus algebrae legibus (aa) difficillima futu (bb) quam (2). Nam  $L = 17$  opinor erg.  $L$

18–630,2 Leibniz greift auf die Bezeichnungsweise von N. 38 zurück, aber auch hier leidet die Be- trachtung unter Unzulänglichkeiten in der Rechnung.

## Tabula

A e q u a t i o n e s

	$y^2 = a x \dots$	$\frac{1}{1}$	
5	$y^3 = \left\{ \begin{array}{l} a x^2 \dots \\ a^2 x \dots \end{array} \right.$	$\frac{1}{2}$	
		$\frac{2}{1}$	
		$\frac{1}{3}$	
10	$(\text{seu } ax = y^2) \quad y^4 = \left\{ \begin{array}{l} a x^3 \dots \\ a^2 x^2 * \dots \\ a^3 x \dots \end{array} \right.$	$\frac{2}{2} = 1$	
		$\frac{3}{1}$	
		$\frac{1}{4}$	
15	$y^5 = \left\{ \begin{array}{l} a x^4 \dots \\ a^2 x^3 \dots \\ a^3 x^2 \dots \\ a^4 x \dots \end{array} \right.$	$\frac{2}{3}$	
		$\frac{3}{2}$	
		$\frac{4}{1}$	
		$\frac{1}{5}$	
20	$(\text{seu } ax^2 = y^3) \quad y^6 = \left\{ \begin{array}{l} a x^5 \dots \\ a^2 x^4 * \dots \\ a^3 x^3 * \dots \\ a^4 x^2 * \dots \\ a^5 x \dots \end{array} \right.$	$\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$	
		$\frac{3}{3} = 1$	
		$\frac{4}{2} = 2$	
		$\frac{5}{1}$	
		etc.	
		etc.	

## Paraboloidum

Nomenclatura

quadratica	seu communis	$\left(\frac{2b^2}{6}\right) \frac{b^2}{3}$	
..... cubica	quadratiformis	$\frac{2b^2}{5}$	5
	simplex	$\left(\frac{2b^2}{8}\right) \frac{b^2}{4}$	
..... quadrato- quadratica	cubiformis	$\frac{3b^2}{7}$	10
	quadratiformis	$\frac{2b^2}{6} \left(\frac{1}{3}b^2\right)$	
	simplex	$\left(\frac{2b^2}{10}\right) \frac{b^2}{5}$	
..... surdesolida	$\square^{\text{to}} \square^{\text{ti}}$ formis	$\frac{4b^2}{9}$	15
	cubiformis	$\frac{3b^2}{8}$	
	quadratiformis	$\frac{2b^2}{7}$	
	simplex	$\left(\frac{2b^2}{12}\right) \frac{b^2}{6}$	
..... quadrato- cubica	quadrato- cubiformis	$\frac{5b^2}{11}$	15
	quad. quadratiformis	$\frac{4b^2}{10} \left(\frac{2b^2}{5}\right)$	
	cubiformis	$\frac{3b^2}{9} \left(\frac{1}{3}b^2\right)$	
	quadratiformis	$\frac{2b^2}{8} \left(\frac{1}{4}b^2\right)$	
	simplex	$\frac{b^2}{7}$	

15 (1) cubico- (2) quadrato-cubica L

tum, semper revocari potest ad rationem integri ad integrum; ut si  $AK$  ad  $AD$  sit, ut  $\frac{3}{4}$   
 ad  $\frac{1}{6}$ . perinde est ac si diceretur esse ut 18 ad 4.

At si ratio sit ut  $Rq$  6. ad 1. utique aequatio ad paraboloidum formulam concepta  
 eam, quam dixi, irregularitatem, nunquam exuet: neque enim nisi unquam surdus ad  
 5 numerum erit ut numerus ad numerum.

Ut vero figura tali aequatione formata quam geometricam esse negari non potest,  
 cum tangentes eius duci possint, communi more enuntiabilis, ac continuo quodam motu  
 descriptibilis reddatur, adhibenda est methodus a me inventa, et alibi tradita, inveniendi  
 applicatas ex datis productis.

10 Posito regulam, de eadem in talibus aequationibus ac figuris ratione linearum  $AK$  ad  
 $AD$ , quae est exponentium  $a$  et  $x$  esse adeo universalem, ut obtineat tunc quoque, cum  
 ratio linearum surda est. Quod nunc excutere non vacat.

Ita enim ex ea methodo praeter alios ingentes, hunc quoque fructum capiemus, ut aequa-  
 tiones eiusmodi plane irregulares et intractabiles ad formulas usitatas reducantur, quod  
 15 nescio an ulla algebrae arte fieri semper possit.

Et fortasse maior inde lux ad surdas tractandas, quae hactenus leges a nobis recusant,  
 oriri potest.

Ut autem figurarum eiusmodi omnium quadrangularium rationem universaliter de-  
 monstremus, rationem illam constantem abscissae  $AD$  ad productam  $AK$  appellemus  $\beta$ .  
 20 ita ut producta multiplicata per  $\beta$  det abscissam, et abscissa divisa per  $\beta$  productam.  
 Aream trilinei concavi  $AFGR$ . quod figurae datae  $AFGE$  supplemento est ad rectangu-  
 lum  $ER$ . appellemus  $z^2$ . et rectangulum  $ER$  vocemus  $b^2$ . Constat autem hoc trilineum  
 concavum esse summam omnium abscissarum ad  $AR$  perpendiculariter ordinatimque ap-  
 plicatarum:  $AO$  translata in  $ZP$ . et  $AD$  in  $QF$ . et  $AE$  in  $RG$ . etc. Quod si iam abscissae  
 25 sunt productis proportionales, sive si abscissae ad productas respondentes, eandem sem-  
 per habent rationem [quae  $\beta$  ad 1], etiam summa abscissarum  $AUWXR$ , vel per p r o p.  
 2. segmentum duplicatum [ $AFGA$ ]. erit ut [ $\beta$  ad 1]. Ergo[:]

---

13–15 Daneben großes NB.

6 f. quam geometricam ... communi more erg. L 10 in ... figuris erg. L 12 Quod ... vacat.  
 erg. L 26 rationem (1)  $\beta$  (2) quae 1 ad  $\beta$  L ändert Hrsg. 27+631,3 AFGθA L ändert Hrsg.  
 zweimal 27 1 ad  $\beta$  L ändert Hrsg.

$2z^2$  (trilineum concavum  $A\theta GE$  + trilineum concavum simile et aequale  $AFGR$ ) +  $\frac{z^2}{\beta}$  (segmentum duplicatum  $[AFGA]$ ) =  $b^2$  (rectangulo  $ER$ . quia duplex trilineum concavum cum duplaci segmento totum rectangulum  $ER$  compleat). Ergo

5

$$z^2 = \frac{b^2}{2 + \frac{1}{\beta}}. \text{ Q. E. F.}$$

Hoc est[.]

Rectanguli ( $ER$ ) pars aliqua, a numero ex binarii et alterius numeri  $\frac{1}{\beta}$  rationem productae ad 1. abscissam exprimentis additione orto, denominata trilineo figurae concavo ( $AFGR$ ) aequatur.

10

Exemplo veritas regulae statim confirmatur. Si curva sit parabolae communis, erit  $\beta = 1$ . ergo  $z^2 = \frac{b^2}{2 + 1 = 3}$ .

T a b u l a vero qua V a l o r e s t r i l i n e o r u m continentur secundum hanc regulam supputata, mirabiles detegit rerum naturae harmonias, quae profunda potius meditatione sentiuntur, quam paucis verbis satis libantur. Introducam tamen, atque aditum menti his dapibus inescatae dabo.

15

Ac primum illud animadverto, si ut solent facere primum aequationes stellatas, quae in alias dudum positas reducebantur, eliminasse; deinde recto ordine valores sibi invicem subrogasssem, nullis velut gradibus atque generibus constitutis; pro pulchra quadam serie, harmoniae plena, rude nescio quid atque indigestum reportassem, in quo nec suspicio concinnitatis restaret.

20

Deinde illud consideratione dignum arbitror, esse in quolibet parabolaram gradu, velut inter ipsas cubicas aequationis  $y^3$ , aut quadrato-quadraticas aequationis  $y^4$ , alias aliis simpliciores. Atque eas nimirum, in quibus abscissa nulla potestate affecta est, ut

25

6f. Q. E. F. (1) Hoc est: binario numeri rationem abscissae ad productam exprimentis (integri vel fracti, rationalis vel surdi) accessione aucto, | rectanguli ER erg. u. gestr. | pars aliqua secundum numerum productum rectanguli ER est (2) Hoc  $L$

$ax = y^2$ , vel  $a^2x = y^3$ , vel  $a^3x = y^4$ , vel  $a^4x = y^5$ , vel  $a^5x = y^6$ , etc. esse caeteris simpliciores, unde et trilineorum valores simplicissime exprimuntur, sunt enim tertia, quarta, quinta, sexta, septima portio rectangulorum. Atque huius generis paraboloides propemodum solae vulgo considerantur. Certe non nisi istarum quadraturas ab aliis demonstratas legi. Caeteras uspiam exstare aut demonstratas, aut saltem indicatas, non memini.

Has vero simpliciores ita communiter explicare solent[:] Parabolae quadraticae, applicatas ad axem seu basi parallelas, esse in subduplicata ratione altitudinum, cubicae (simplici scilicet, sed quae vulgo sola nominatur) in subtriplicata, quadrato-quadraticae in subquadruplicata, et ita porro. Contra sumto trilineo, et in eo applicatis ad basin seu axi parallelis; quadraticae applicatas esse in duplicata, cubicae in triplicata, quadrato-quadraticae in quadruplicata ratione altitudinum.

Subtilissimus Wallisius vocat elementa huiusmodi in trilineo seu ordinatim ad altitudinem uniformiter crescentem applicatas axi parallelas: primanos, secundanos, tertianos, quartanos; vel in ipsa parabola, axi applicatas: subprimanos, subsecundanos, etc. Quemadmodum in hyperbola et hyperboloidibus, primanorum, secundanorumve, vel subprimanorum, subsecundanorum reciprocos.

Atque ita factum est, ut de simplicium tantum paraboloidum quadratura cogitaretur, praesertim cum illi omnes, qui hactenus seriebus numerorum respondentibus in unam summam colligendis operam dedere, quos inter novissimus pene ac subtilissimus omnium *Trianguli arithmeticici* autor Pascalius eminent, non nisi numerorum quos vocant triangularium, pyramidalium, etc., itemque quadratorum, cuborum, altiorumque potestatum summam collegerint.

At vero ad summam seriei eiusmodi ineundam sive finitam sive infinitam:

$$25 \quad 1 \quad Rq\ 8. \quad Rq\ 27. \quad Rq\ 64. \quad Rq\ 125. \quad Rq\ 216. \\ = 8$$

qua radices quadratae numerorum cubicorum exhibentur, aut ad habendam summam seriei talis:

$$1 \quad Rcub.\ 4. \quad Rc.\ 9. \quad Rc.\ 16. \quad Rc.\ 25. \quad Rc.\ 36.$$

4–6 Certe ... non memini: Zur Problematik der Quadratur der höheren Parabeln und Hyperbeln vgl. HOFMANN, *Leibniz in Paris*, 1974, S. 55–57. 13 Wallisius vocat: *Mechanica*, 1672, S. 144f. (WO I, S. 665f.), bzw. *Arithmetica infinitorum*, 1656, S. 35 u. 54 (WO I, S. 384 u. 390).

ex radicibus cubicis numerorum quadratorum, nemo unquam vel aspiravit. Quarum utraque ex quadratura paraboloidis cubicae compositae seu quadratiformis (nam ex parabolis cubicis non nisi una composita est) manifeste pendet; cuius scilicet aequatio est  $ax^2 = y^3$ .

Unde aequatio duplex; una:

5

$$x = \sqrt[q]{\frac{y^3}{a}} = \frac{\sqrt[q]{y^3}}{\sqrt[q]{a}}, \text{ unde posito } y = 1. \text{ vel } 2. \text{ vel } 3. \text{ etc. et } a = 1. \text{ fiet:}$$

$$Rq \ 1. \quad Rq \ 8. \quad Rq \ 27. \quad \text{etc.}$$

altera aequatio:

$$y = \sqrt[c]{ax^2}, \text{ unde posito } x = 1. \text{ vel } 2. \text{ vel } 3. \text{ et } a = 1. \text{ fiet:}$$

10

$$Rc \ 1. \quad Rc \ 4. \quad Rc \ 9.$$

Ita inter parabolas quadrato-quadraticas, una est cubiformis  $ax^3 = y^4$ , qua radices cubicae numerorum quadrato-quadratorum; vel quadrato-quadraticae numerorum cubicorum in summam colligi possunt, alia est quadratiformis  $a^2x^2 = y^2$ , quae coincidit parabolae quadraticae; tertia est simplex, qua summa numerorum quadrato-quadraticorum, vel radicum quadrato-quadraticarum ex numeris naturalibus initur,  $a^3x = y^4$ .

15

Quod si caeteras quoque paraboloides prout cuiusque nomenclatura in tabula est, prosequamur, apparebit nihil huius generis nos effugere posse, qualia certe nemo ab algebra aut simplici arithmeticis infinitorum, a geometria separata, speraverit. Et vero cum haec methodus etiam ad finitas series in summam colligendas serviat, poterit eius usus esse ingens in reducendis aequationibus. Saepe enim duae pluresve radices surdae addi poterunt in unam summam aut sibi subtrahi; cum hactenus non nisi dicis causa signa + vel - interposita sint, idque illi si Diis placet additionem subtractionemque vocant.

20

Exempli causa ostendi potest  $Rq \ a^2 + Rq \ 2a^2 = \frac{4}{3}Rq \ 2a^2$ . Ita  $Rc \ 9a^3 + Rc \ 16a^3$ . in unam

quantitatatem colligi potest. Quod si termini affecti non sint iidem, ut  $Rq \ a^2 + Rq \ 2b^2$ , ratioque eorum nota sit, ea ascribatur, ut si  $b$  sit =  $3a$ . fiet:  $Rq \ a^2 + Rq \ 18a^2$ . Et haec

25

10 f. Rc. 9. (1) Aliae series | huiusmodi erg. | infinitae eadem methodo in summam colligi possunt; quod al (2) Ita  $L = 20$  in (1) poliendis (2) reducendis  $L = 24$  f. potest. (1) Idemque verum est, si (2) | Quod si (a) terminorum alio (b) termini ... + Rq  $2b^2$ , (aa) vel ne (bb) imo si alter sit cognitus (cc) ratioque ... + Rq  $18a^2$ . erg. | Et  $L$

23 ostendi potest: Diese Aussage trifft nicht zu.

quidem facile fieri possunt, modo termini addendi sint continui alicuius seriei potestatum, id est numerorum naturalium, quadraticorum, cubicorum; nec refert cuius radicis extractio postuletur; nam datis terminis continuis numerorum v. g. cubicorum, summa radicum, sive quadratarum, sive cubicarum, sive quadrato-quadraticarum, sive aliarum,  
5 quarumcunque ex illis extractarum in infinitum, iniri potest: modo scilicet eiusdem simul dimensionis radix ex omnibus extrahatur, nam colligere velle  $Rq\sqrt{2} + Rc\sqrt{3}$ . id hac quidem methodo fieri non potest. Sed nec subtractio radicum promovetur, v. g.  $Rq\sqrt{3} - Rq\sqrt{2}$ . saepe tamen per transpositionem subtractio in additionem mutari potest in aequationibus.

Quod si termini continui non sint, cogitandum est an continuorum ritu tractari  
10 possint arte quadam, v. g.  $Rq\sqrt{a^2} + Rq\sqrt{3a^2}$ . Sane fangi potest 1. 3. esse terminos progressionis arithmeticæ continuae, cuius intervallum 2. substitui possit in locum 1. salvo alioquin calculo.

Sed haec cum sint momenti sane maximi alias accuratius excutiemus. Quemadmodum illud quoque an non et radices quadraticæ, cubicaeve, numerorum triangularium  
15 aliorumve, ut pyramidalium, etc. hac methodo iniri possint. Nunc vero possumus tot serierum summa tot figurarum quadratura nove detecta contenti esse.

Caeterum praetereo tot alias quadraturarum nostrarum harmonias, quas attenta tabulae consideratione detegere quivis potest.

At nunc quidem abibo hinc, ubi id unum admonuero, si productae abscissis sint  
20 proportionales figuram productarum  $AUWXR$  fore figuræ abscissarum  $AFGR$  homogeneam, ac proinde si  $AFG$  sit curva cuiusdam paraboloidis, curvam  $AUWX$  eiusdem specie, quanquam alterius magnitudine (latere quippe recto, mutato) paraboloidis fore.

#### P r o p . 4. P r o b l e m a

„ Centrum gravitatis omnium paraboloidum, et quod hinc sequitur solidorum ab illis  
25 „ revolutione circa axem quemcunque genitorum dimensiones invenire; quadratorum-  
„ que, et cuborum, et quarumlibet ab applicatis potestatum summam inire.

Constat invento centro gravitatis, areaque figuræ, momentum eius ex axe quocunque, sive solidum circa axem illum genitum haberi. Cumque areas omnium paraboloidum habeamus restat ut centra gravitatis quaeramus.

30 Centrum gravitatis datur, dato momento figuræ quadrabilis ut  $AFGE$ , vel  $AFGR$ . tum ex altitudine  $AE$ , tum basi (eiusve opposita)  $AR$ . Hoc enim momento per figuræ

26 applicatis | cuiuslibet streicht Hrsg. | potestatum  $L$

magnitudinem diviso, distantia centri, ab axe librationis habetur, habitis autem distantiis eiusmodi duabus centrum habetur.

Momentum figurae ex quodam axe librationis aequatur summae semiquadratorum, quorum latera sunt perpendiculariter figurae. Ita summa semiquadratorum

$$\frac{OP^2}{2} + \frac{DF^2}{2} + \frac{EG^2}{2} \text{ etc. seu omnium } y$$

5

aequatur momento figurae convexae  $AFGE$  ex axe librationis  $AE$ .

Eodem modo summa semiquadratorum

$$\left[ \frac{RG^2}{2} + \frac{QF^2}{2} + \frac{ZP^2}{2} \right] \text{ etc. seu omnium } x$$

aequatur momento figurae concavae  $AFGR$  ex opposita basi  $AR$ .

Dato autem momento figurae concavae  $AFGR$  ex  $AR$ . etiam momentum convexae  $AFGE$ .

10

ex eadem  $AR$  datur; datur enim dudum momentum rectanguli  $ER$ , ex recta  $AR$ , a quo si momentum cognitione trilinei concavi detrahatur, restabit utique momentum convexi residui.

Aio nunc in omni paraboloidi summam pariter omnium  $x^2$ , et omnium  $y^2$  iniri posse. Ac primum  $y$  semper est radix, sive quadrata, sive cubica, sive altior quaecunque quam vocabo:  $R\beta$ . alterius partis aequationis, in qua exponens potestatis ipsius  $a$  quicunque  $\gamma$ . et ipsius  $x$  quicunque  $\delta$ . eritque  $\gamma + \delta = \beta$ . et aequatio figurae haec:

$$y = R\beta a^\gamma x^\delta. \text{ et } y^2 = R\beta a^{2\gamma} x^{2\delta}.$$

15

Aio horum:  $R\beta a^{2\gamma} x^{2\delta}$  summam iniri posse.

Quaeratur aequatio naturam huius figurae solidae exprimens. Quaeratur paraboloidis cuius eadem aequatio est, qualis deesse non potest; ea quanquam plana figurae huic solidae, homogenea est, ac proinde eam habebit rationem figura solida ad prisma eiusdem cum figura solida altitudinis et basis (quod prisma quadrabile est, cum eius

20

8  $\frac{RX^2}{2} + \frac{QW^2}{2} + \frac{ZU^2}{2} L$  ändert Hrsg. 18  $y^2 = (1) R\beta a^{\gamma^2} x^{\delta^2}$ . Aio horum:  $R\beta a^{\gamma^2} x^{\delta^2}$  summam iniri posse. Nam  $R\beta x^{\delta^2}$  semper haberi potest, qualiscunque sit exponens  $\beta$  aut  $\delta$ . ut ex (a) figura (b) problemate praecedente constat, ut ponamus  $\beta$  esse (aa) 5. et  $\delta^2$  esse 4. erit  $R\beta x^{\delta^2}$  radix surdesolida (bb) 6. et  $\delta^2$  esse 4. erit  $R\beta x^{\delta^2}$  radix cubico-cubica ex termino quadrato-quadratico, qualium summa iniri potest | ope parabolae cubico-cubicae quadrato-quadratiformis erg. |, productum per  $R\beta a^{\gamma^2}$ , quae semper eadem est multiplicetur. Intelligatur figura plana, huic solidae homogenea, in qua sit  $y^2 = a^{\gamma^2} x^{\delta^2}$  (2)  $R\beta a^{2\gamma} x^{2\delta} L$  20 exprimens (1); nimur ablegata irrationalitate, omnibusque toties in se ductis, quot in  $\beta$  sunt unitates, fiet aequatio  $y^{2\beta} = a^{2\gamma} x^{2\delta}$ . (2). Quaeratur  $L$

basis, quadratum scilicet maxima y nota sit) quam habet paraboloeis homogenea ad rectangulum eiusdem cum ipsa altitudinis basisque. Habebitur ergo figura haec solida sive quadratorum summa.

Eodem plane modo summa omnium  $x^2$  inibitur, aequatione enim posita

$$y^\beta = a^\gamma x^\delta, \text{ fiet } x = R\delta \frac{y^\beta}{a^\gamma} \text{ et } x^2 = R\delta \frac{y^{2\beta}}{a^{2\gamma}}.$$

Inde aequatio paraboloidis homogeneae investigetur cuius paraboloeis summae omnium  $x^2$  homogenea est.

Exemplo res fiet manifestior. Esto paraboloeis cubica quadratiformis aequationis

$$ax^2 = y^3. \text{ Ergo } y = R\delta ax^2. \text{ et } y^2 = R\delta a^2x^4,$$

patet  $y^6 = a^2x^4$ . Sed quia applicata hoc loco non est y sed  $y^2$ , ideo si fingatur esse y, fiet  $y^3 = a^2x^4$ , reformanda in istam  $y^3 = \frac{x^4}{a}$ , vel  $y^3a = x^4$ , quae figura plana seu paraboloeis quadrato-quadratica cubiformis, figurae omnium  $y^2$ , paraboloidis datae, homogenea est, sunt enim cubi applicatarum  $y^2$  in solida, y in plana, ut quadrato-quadrata abscissarum x.

Eritque summa omnium  $y^2$ , seu applicatarum in figura AFGE, usque ad maximam  $EG_{[,]} = \frac{2EG^3}{7}$ , quae dimidiata divisa per aream ipsius paraboloidis datae  $\frac{3EG^2}{5}$  dabit  $\frac{5}{21}EG$ , distantiam centri gravitatis paraboloidis cubicae quadratiformis ab axe AE.

Vicissim si summa omnium  $x^2$  in eadem paraboloeide, vel potius trilineo eius concavo ineunda sit, cum sit  $y^3 = ax^2$ , erit  $x^2 = \frac{y^3}{a}$ . cuius quidem facile est aliunde inire summam, cum summa omnium  $y^3$ , quae haberi potest, per a dividenda sit. Sed ut methodo tamen

9f.  $Rc a^2x^4$ , (1) unde aequatio:  $y^6 = a^2x^4$ . reducibilis ad | priorem erg. |  $y^3 = ax^2$ . Est ergo momentum eius | paraboloidis erg. u. gestr. | seu solidum revolutione circa axem AB. genitum, ipsi figurae hoc loco proportionale, quod alioquin (a) non nisi (b) et in figura logarithmorum observavi. In eadem paraboloeide  $x = Rq \frac{y^3}{a}$ . Ergo  $x^2 = \frac{y^3}{a}$ . Unde aequatio  $ax^2$  (2) patet L 21 , cum summa ... sit erg. L

---

15 summa omnium  $y^2$ : genauer müsste es  $\frac{3}{7} AE \cdot EG^2$  heißen. Leibiz rechnet mit dem unrichtigen Ergebnis bis S. 637 Z. 10 weiter.

nostrae insistamus, substituta  $x$  pro  $x^2$ , fiet  $x = \frac{y^3}{a}$ , et correcta aequatione  $xa = \frac{y^3}{a}$ ,  
 vel  $xa^2 = y^3$ . Ergo figura plana, solidae omnium  $x^2$  homogenea est parabola cubica  
 simplex, quae cum sit quarta pars sui rectanguli, etiam figura solida omnium  $x^2$ , sui  
 parallelepipedici quarta pars erit. Id vero verissimum esse iam tum manifestum est, cum  
 sit  $x^2 = \frac{y^3}{a}$ . et maximum horum quadratorum  $AE^2 = RG^2 = \frac{EG^3}{a} = \frac{AR^3}{a}$ . Iam summa  
 omnium  $y^3$ ,  $= \frac{\text{maximum } y^4}{4}$  seu  $\frac{EG^4}{4}$ . Ergo summa omnium  $x^2$  erit  $\frac{EG^4}{4a}$ . eorumque  
 dimidium seu momentum omnium  $x$ , ex  $AR$ , erit  $\frac{EG^4}{8a}$ . subtractum a momento totius  
 rectanguli  $ER$ ,  $\frac{AE^2 + AR}{2}$  relinquet  $\frac{AE^2 + EG}{2} - \frac{EG^4}{8a}$ , momentum figurae convexae  
 $AFGE$ , quod per aream eius  $\frac{3EG^2}{5}$  divisum, dabit  $\frac{5 AE^2}{6 EG} - \frac{5 EG^2}{24a}$  distantiam centri  
 gravitatis figurae  $AFGE$ , ab  $AR$ .

Atque haec quidem methodus centra inquirendi generalis est, et in omnibus para-  
 boloidibus successura, aliae sunt particulares; cum  $y$  in  $x$ . vel  $x$  in  $y$ . cum fructu duci  
 potest, ut in paraboloidi cubica simplici,  $a^2x = y^3$ , et ideo  $x = \frac{y^3}{a}$ , erit  $xy = \frac{y^4}{a^2}$ , id est  
 cylinder trilinei paraboloidis quadrato-quadratici simplicis, cuius aequatio est  $xa^3 = y^4$ .  
 Item cum ob aequationem  $a^2x = y^3$  sit  $y = Rc a^2x$ , erit  $yx = Rc a^2x^4$ , sed hic mani-  
 festum est, non ita facilem exitum esse, nisi methodo a me exposita ad figuras planas  
 homogeneas solidae reducantur.

Operae pretium autem foret, calculum centrorum in his figuris prosequi tabulaque  
 exponere, spes enim est, si recte distinguatur, harmonias quasdam non inelegantes, qua-  
 les ipse figurarum valor dedit, quaeque pulcherrimae certe sunt, calculi confirmationes,  
 non before; sed ista nunc prosequi non vacat. Attamen observationes aliquot principales  
 omittere non possum, nimirum:

Momentum omnium  $x$  ex vertice, seu  $xy$  figurae paraboloidis simplicis cuiuscunque esse  
 cylindrum trilinei paraboloidis simplicis proxime altioris. Ita momentum trilinei concavi

3 sui | parallelepipedici streicht Hrsg. | rectanguli  $L$  21 vacat. (1) Lubet tamen spatium relinquere,  
 ut si (a) quando otium (b) alias per otium attexi possint. Unam hoc loco tantum adicio observationem,  
 (2) Attamen  $L$

parabolae communis, esse cylindrum trilinei parabolae simplicis cubicae; et ostendimus paulo ante huius quoque trilinei momentum esse cylindrum trilinei parabolae simplicis quadrato-quadraticae; idemque de caeteris intelligendum.

Et huic observationi aliam non absimilem addo, omnes scilicet paraboloeides pene 5 simplices, seu simplicibus proximas cuiuscunque gradus (quippe quas ingreditur  $x^2$ ), habere momentum trilinei ex ipsa  $AR$ , basi paraboloidis  $BC$  parallela, homogeneum

trilineo figurae plane simplici gradus proxime sequentis, quoniam in talibus  $x^2 = \frac{y^3}{a}$  vel

$\frac{y^4}{a^2}$  vel  $\frac{y^5}{a^3}$  vel  $\frac{y^6}{a^4}$  etc. Sunt autem semiquadrata omnium  $x$ , seu omnia  $\frac{x^2}{2}$  momento earum

ex altitudine cui applicatae sunt  $AR$  aequalia, ut constat. Rectius dicam non tantum 10 homogenea esse haec solida, illis planis, sed esse eorum cylindros, nam summa omnium

$\frac{y^3}{a}$  est cylinder omnium  $\frac{y^3}{a^2}$ , seu summa omnium  $x^2$ , paraboloidis pene simplices,

est summa omnium  $x$ , paraboloidis planes simplices, gradus proxime sequentis, ducta in  $a$ .

Sed haec cum sint specialia praelibare volui tantum. Ac nunc ad theorematha generalia 15 obiter tradenda accedo.

Ac primum regula fieri potest, elegans admodum et universalis, pro summis omnium  $y^2$  habendis, quae ita habet:

Data paraboloeide in qua summa omnium  $y^2$  quaeritur. Ad habendam novam paraboloidem summae omnium  $y^2$  homogeneam, distinguendi sunt duo casus, nam, aut exponentis 20 ipsius  $x$  est maior, quam ipsius  $a$ , aut minor vel aequalis.

Si maior, tunc ita procedendum est:

Ipsius  $y$  potestati ascribatur exponentis duplicatus potestatis ipsius  $x$  in aequatione paraboloidis datae occurrens, et ipsius  $a$  potestati ascribatur exponentis differentiae exponentium  $x$  et  $a$ , et habebitur aequatio paraboloidis homogeneae solido cuius quadratura 25 quaeritur.

Ita esto paraboloeis  $ax^3 = y^4$ , fiet:  $y^6 = a^2x^4$  ac proinde paraboloeis cubico-cubica [quadrato]-quadratiformis erit figurae omnium  $y^2$ , paraboloidis quadrato-quadraticae

14 f. Sed ... accedo. erg. L 18–21 Ad habendam ... procedendum est: erg. L 24 x et a | et quod tamen omitti quoque potest, uterque ducatur in exponentem ipsius  $y$  priorem erg. u. gestr. |, et L 27 quadrato- erg. Hrsg.

cubiformis homogenea. Ratio haec est, cum sit

$$ax^3 = y^4. \text{ erit } Rqq ax^3 = y. \text{ et } Rqq a^2x^6 = y^2.$$

Hic habemus primum exponentem  $x$  duplicatum, nempe 6 ex 3, estque  $Rqq a^2x^6$  planum seu secundae dimensionis, et summa omnium solidum. Cui solido, ut planum homogeneum habeatur, dividatur eousque per  $a$ . donec ista  $Rqq$  praesens in lineam transeat.

5

Productum enim manebit homogeneum priori, quia  $a$  cum sit perpetuo eadem, non variat rationes. Dividenda est ergo quantitas  $a^2x^6$  per  $a$ . dimidio exponentium numero affectum, seu per  $a^4$ . fiet  $Rqq \frac{a^2x^6}{a^4}$ . vel  $Rqq \frac{x^6}{a^2}$ . Est enim (2) differentia inter (4) dimidium summae (2 + 6), et partem minorem (2), eadem cum (2) differentia inter terminos (4 et 2) maiorem et minorem dimidiatos (seu 3 et 1 exponentes in aequatione data, potes-

10

tatum  $x$  et  $a$ ). Nam  $\frac{a+b}{2} - b = \frac{a+b-2b}{2} = \frac{a}{2} - \frac{b}{2}$ . Iam cum sit  $y = Rqq \frac{x^6}{a^2}$ , eliminata irrationalitate fiet  $\frac{x^6}{a^2} = y^4$ , atque ideo  $x^6 = y^4a^2$ , vel potius; sumendo  $y$  pro termino cuius unius potestas potestati duorum caeterorum terminorum aequatur  $y^6 = a^2x^4$ .

Si vero exponens potestatis  $a$  sit maior exponente potestatis  $x$  vel ei aequalis, exponens potestatis (non  $y$ ) sed  $x$  duplicitur, et summa exponentium datorum  $x$  et  $a$ , ab exponente  $a$  dato duplicato subtracta, residuum ipsi  $a$  ascribatur.

15

Ut esto paraboloeis, surdesolida quadratiformis, aequationis  $a^3x^2 = y^5$ . fiet aequatio paraboloidis solidi omnium  $y^2$  homogeneae,  $x^4a = y^5$ . quae est surdesolida quadrato-quadratiformis. Nam quoniam ob aequationem datam

$$y = R \textcircled{5} a^3x^2. \text{ erit } y^2 = R \textcircled{5} a^6x^4.$$

20

hinc habemus exponentem  $x$  duplicatum. Iam ut figuram planam homogeneam inveniamus, dividamus  $a^6x^4$  per  $a$  toties in se ductum, donec  $R \textcircled{5} a^6x^4$  fiet linea, id est per  $a$ , exponente, omnium exponentium  $6 + 4$ , dimidio,  $3 + 2 = 5$ , id est summa exponentium

4 dimensionis, (1) id (2) et ... solido  $L$  5–7 lineam (1) finit (2) transeat. | Productum ... rationes. erg. | Dividenda  $L$  12 fiet (1)  $\frac{x^{24}}{a^8} = y^4$  (a) sive  $x^{24}$  (b) (unde patet ad eliminandam rationalitatem (!) exponentes productos 6. et 2. in exponentem ipsius y. datum, hoc loco 4. ducendos) atque ideo  $x^{24} = y^4a^8$ , vel potius; sumendo y pro termino cuius | unius erg. | potestas potestati duorum caeterorum terminorum aequatur  $y^{24} = x^4a^8$ , vel (2)  $\frac{x^6}{a^2} = y^4 L$  13 f.  $y^6 = a^2x^4$ . | Unde patet in his casibus non opus esse, ut gestr. | Si  $L$  18 est (1) cubico-cubica quadrato-cubiformis (2) surdesolida  $L$

initio datorum, affectum, fiet  $R \circledcirc \frac{a^6 x^4}{a^5}$ ; et quoniam hic exponens 5 semper minor est, exponente  $a$  dato duplicato, ab eo subtrahatur, fietque  $R \circledcirc a x^4 = y$ , sive  $a x^4 = y^5$ .

Superest tantum ut quadrata omnium  $x$  quoque regula aliqua complectamur, quae sane brevis est et generalissima:

- 5 Exponens  $y$  duplicetur, et exponens  $a$  duplicatus, exponente  $x$  augeatur, habebiturque aequatio trilinei paraboloidis, summae omnium  $x^2$  homogenei.

Ita si sit paraboloidis surdesolida cubiformis, aequationis  $y^5 = a^2 x^3$ . fiet aequatio  $y^{10} = a^7 x^3$ , cuius paraboloidis trilineum omnium  $R \circledcirc \frac{y^{10}}{a^7} = x$ , summae omnium  $x^2$  paraboloidis datae homogeneum est. Nam ob aequationem datam

$$10 \quad x = R \circledcirc \frac{y^5}{a^2}. \text{ Ergo } x^2 = R \circledcirc \frac{y^{10}}{a^4}.$$

Hinc primum exponentes tam  $y$  quam  $a$  duplicatos habemus. Sed ut ex  $R \circledcirc \frac{y^{10}}{a^4}$ , plano, salva progressionis ratione fiat linea, dividendum est per  $R \circledcirc a^3$ , differentia enim inter 10 – 4 quae nunc est potestas quantitatis productae, et 5 – 2 quae esse deberet, ut linea fiat, est 5 – 2, nam  $2a - 2b - a + b = a - b$ . Iam 5 – 2. seu differentia inter exponentem  $y$  datum, et  $a$  datum, semper est exponens  $x$ . Igitur exponenti  $a$  dato, nempe 2. duplicato, 4. addendus exponens  $x$ . seu hoc loco 3. fiet  $R \circledcirc \frac{y^{10}}{a^7} = x$ , sive aequatio paraboloidis homogeneae inventae erit:  $\frac{y^{10}}{a^7} = x^3$ , vel  $y^{10} = a^7 x^3$ .

Nec dubito, ut dixi qui calculum ordine persequeretur, praeclaras in eo harmonias detecturum. Idemque futurum esse si ad cubos altioresque ipsorum  $x$  aut  $y$  potestates in 20 summam colligendas assurgatur, methodo universalis nunc aperta.

Ne quis autem putet quadrata applicatarum figurae homogeneae inventae quadratae figurae datae repraesentantium cubos eiusdem figurae datae repraesentare, exemplum

13 quae ... productae erg. L 20 f. aperta. (1) Praesertim cum quadrata | applicatarum erg. | figurae homogeneae inventae quadrata figurae datae repraesentantium cubos eiusdem figurae datae repraesentare (a) possint (b) fortasse possint, sed hanc suspicionem nunc excutere non vacat, quod facile foret; neque (aa) ea regula (bb) hoc quadratorum repraesentantium interventu opus est, cum methodo generali semper haberi possint repraesentantes applicatae. Dazu am Rande (nachträglich gestr.) großes A (2) Ne L

adiciemus, quod eadem opera methodum nostram confirmat, et hanc [suspicionem] refutat.

$a^2x = y^3$ . Hinc  $y^6 = a^5x$  aequatio paraboloidis homogenae omnium  $x^2$ , nam  $x = \frac{y^3}{a^2}$ .

Ergo  $x^2 = \frac{y^6}{a^4}$ , homogenea huic:  $x = \frac{y^6}{a^5}$ . Qualibus exemplis, in quibus summa omnium  $x^2$  metodo vulgari ac facili, sed ipsis peculiari haberi potest, elegans nostrae methodi confirmatio praebetur.

Sed et in hoc exemplo  $x^3 = \frac{y^9}{a^6}$  quare et summa omnium  $x^3$  haberi hoc loco potest; eadem

homogenea figurae planae aequationis huiusmodi:  $\frac{y^9}{a^8} = x$ . Videamus an eadem figura sic

inventa, etiam quadratis figurae homogeneae praecedentis, cuius aequatio  $x = \frac{y^6}{a^5}$  homo-

genea sit, minimum  $x^2 = \frac{y^{12}}{a^{10}}$ , homogenea huic  $x = \frac{y^{12}}{a^{11}}$ , id ergo falsum deprehenditur.

Quare metodo universalis a me hoc loco aperta, applicatarum cuiuscunq[ue] paraboloidis cuiuscunq[ue] gradus potestates in summam colligendi, difficultate omni ad figuras planas homogeneas, ubi post demonstrationes nostras nulla est, id est quadraturam paraboliarum revocata, possumus, opinor esse contenti.

Et vero cum Wallisius ipse quem nullus in hoc genere facile praeverterit non nisi primanos, secundanos, tertianos, etc.; subprimanos, subsecundanos, subtertianos, etc.; et singulorum, quadratos, cubos, aliasque potestates; ac horum denique omnium (demis tamen quibusdam) reciprocos in summam colligendi, tradiderit tantum rationem; facile agnoscit potest, quanta nunc accessione haec scientia augeatur; ubi cuilibet specie serierum ab ipso traditae, infinitae aliae a me adduntur. Nam, si ille secundanos dedit, ego secundano-tertianos, secundano-quartanos, secundano-quintanos, etc. Si tertianos, ego tertiano-quartanos, tertiano-quintanos, tertiano-sextanos, etc. (idem est de subsecundano-tertianis; horumque omnium potestatisbus) adicio. Ac proinde cum ille non

1 suspicionem erg. Hrsg. 20 serierum (1) infinite aliae | propemodum erg. | a me (2) ab L

15 Et vero: eine ähnliche Aussage bezüglich Wallis macht Leibniz bereits in N. 34; s. o. N. 34, S. 574 Z. 2 f. — s. a. oben S. 632 Z. 4–6.

nisi simplices exhibuerit, ego infinites infinitos addo, qui uno quoque simplicium cum caeteris omnibus distincte complicato, surgunt.

Et nunc vero etiam ad reciprocorum, quibus hyperboloeides constant, dimensiones transire placet.

39<sub>2</sub>. PARS SECUNDA. DE HYPERBOLOEIDUM QUADRATURA

Hyperboloeides omnium graduum generumque quadrare,  
excepta tantum earum prima, sive hyperbola ipsa.




fig. 2.

Sunto in fig. 2. rectae  $AB$ .  $AC$ . in infinitum productae, versus  $B$ . vel  $C$ . angulum in  $A$  constituentes rectum; et curva  $DEF$  eius naturae, ut versus  $B$ . vel  $C$ . continuata magis magisque ad rectas expositas accedat, non tamen nisi infinito ab  $A$  intervallo eas attingat; ut proinde si puncta  $B$ . et  $C$ . loca concursus esse intelligantur, rectas  $AB$ . 5 vel  $AC$ . necesse sit esse longitudine infinitas, non quod eis nulli sint termini, sunt enim aliae etiam versus easdem partes, longiores seu quae ultra  $B$ . et  $C$ . procurrant, quod hoc loco ostendere nihil attinet (quanquam mire faciat, ad declarandam infiniti naturam falsis notionibus involutam), sed quod termini  $B$ .  $C$ . sint intervallo ab  $A$  dissiti, quod sit quolibet a nobis assignabili maius. Et has ob causas rectae  $AB$ .  $AC$ . a s y m p t o t i 10 appellantur, quod nomen postea ipsi spatio longitudine infinito  $BDEFCA$ . utrinque, id est versus  $B$ . pariter et  $C$ . infinito, vel etiam portioni eius  $BDEFH$  aut  $CFHA$  ab altera parte infinitae, communicatum est.

Caeterum asymptotos habent conchoeis, cissoeis, item quam ego angulorum figuram, seu hyperbolam falsam appellare soleo, quod insigni plane proprietate eadem cum 15 angulis proportione per applicatas secetur; aliaeque infinitae, sed in primis hyperbole atque hyperboleoides, de quibus hoc loco solis dicendum est: et quarum haec est proprietas generalis, ut sumto curvae punto quolibet, ut  $D$ . vel  $F$ . potestas quaedam certa abscissae, ut  $AI$ . vel  $AK$ . duxa in potestatem quandam certam applicatae  $DI$ . vel  $AK$ . certae potestati lineae cuiusdam invariatae, ac proinde eidem semper, vel quadrato, vel cubo, 20 vel surdesolido, etc. pro curvae natura aequetur.

Quemadmodum ergo in paraboloidibus, ita et in hyperboloidibus (quae ex elementorum paraboloides constituentium reciprocis conflantur) agnoscit debent tum gradus curvarum, tum in gradu quolibet genera varia. Nam prout potestas rectae invariatae: quadratum, cubus, quadrato-quadratum etc. est, hyperboleoidem quoque quadraticam, 25 cubicam, quadrato-quadraticam, appellare licet; sed prout abscissae atque applicatae potestates varie complicantur, hinc in eodem gradu genera multa existere possunt.

Sed ut verbis parcatur tabulam exponere operae pretium est, qualem paraboloidum dedimus, ubi primum admonuerimus, perinde ut illic, rectam invariatam a nobis appellari ( $a$ ), asymptoto parallelam abscissamve inde a punto concursus seu centro asymptotorum

sumtam ( $x$ ), eidem vero perpendicularem sive applicatam ( $y$ ).

Atque ita eas primum ad paraboloidum exemplum ordinemus.

[Tabelle, s. S. 646]

Sed haec tabula, etsi continua in speciem, indiget tamen reformatio. Semper enim species quaevis speciei alteri eiusdem gradus, permutatis  $y$  et  $x$  coincidit, sive homogenea est; ita  $y^2x$  et  $x^2y = a^3$ . homogeneae sunt, nec est cur altera potius quam altera simplex, aut quadratiformis appelletur. Sane et quae uni asymptotae parallela est, alteri est applicata, ideoque non est cur altera potius quam altera, abscissa potius quam applicata appelletur. Sumta portione ab utraque parte finita aut infinita, omnia quae de  $x$  aut  $y$  dici possunt, manifeste permuntantur. Sumto spatio ab una parte infinito, ab altera finito, ut *FEDBIH*. fateor rectam *BH* infinitam, instar axis, et rectam *HF* instar basis considerari posse, quae ubilibet finiat. Sed compensatur haec consideratio, cum primum animadvertisit istud spatium velut alterius figurae *BDEFCA* portionem recta axi (pro quo in spatio utrinque infinito alterutram asymptotorum assumere licet) *CA* parallela *FH* ac per consequens ad basin *AB* abscissam, intelligi posse. Quare aliter ordinandae sunt hyperboloidum species, et quoniam paraboloidum reciprocis constant elementis, collationem instituere operaे pretium videtur.

Exempli causa, paraboloidi quadrato-quadraticae simplici hanc aequationem tribuo:  $y^4 = a^3x$ . erit  $y = R \sqrt[4]{a^3x}$ . et posito  $a = 1$ . et  $x = 1$ . vel 2. vel 3. vel 4. etc. erit series ipsorum  $y$  in numeris:

1 f. (y). | Denominationes autem, ut in paraboloidibus sumsimus ab x. potius quam ab a. ac paraboloidem cuius haec aequatio est  $y^4 = ax^3$ . quadrato-quadraticam, quidem, ob  $y^4$ , sed ob  $x^3$  cubiformem, neglecto a. appellavimus; et  $y^4 = a^3x$ . simplicem, ob x. nulla potestate affectam; erg., streicht Hrsg., ita hoc loco denominationem ab y. potius quam ab a. sumimus; ac hyperboloidem, cuius aequatio  $a^4 = yx^3$ . simplicem appellamus. Cum enim alterutra eligenda esset; x. potius eximenda visa est, quoniam naturalius est x. quam y. constituere abscissam; abscissae autem progressionis arithmeticæ intelliguntur, ac proinde ipsi a. uniformi, propiores, saltem enim crescunt uniformiter, quod minime faciunt applicatae. Quod si nondum satisfacit, rationem mox alias subiciemus, eamque convincentem. erg. u. gestr. | Atque L 15 ac per ... AB erg. L 17f. videtur. | Si quis hanc dispositionem atque nomenclaturam nostram, velut arbitrariam, pertinacius impugnat, ei opinor satisfactum erit, ubi (1) quas ego hyperolas nomine (2) hyperboloides, ut a me appellantur, paraboloidum cognominum reciproca habere elementa ostendero. At pro paraboloidum dispositione ac nomenclatura, satis illa ipsa inde surgentis harmoniae concinnitas perorabit: gestr. | Exempli L

3 Tabelle: zum Aufbau und den Ergänzungen s. u. S. 648 Z. 15–18 sowie S. 649 Z. 24 f.

## [Tabula Hyperboloeidum]

HyperboloeidesParaboloeides respondentes

quadratica

$$a^2 = yx \quad \dots \quad a^0 x = y$$

seu hyperbola communis

5 reciproca trianguli

10	cubica	$\left\{ \begin{array}{l} \text{quadratiformis} \\ \text{reciproca para-} \\ \text{bolae communis} \\ \boxed{\text{simplex}} \end{array} \right.$	$a^3 = \left\{ \begin{array}{l} y^2 x \\ yx^2 \end{array} \right\}$	$\dots$	$ax = y^2$
15	quadrato– quadratica	$\left\{ \begin{array}{l} \text{cubiformis} \\ \text{quadratiformis} \\ \boxed{\text{simplex}} \end{array} \right.$	$a^4 = \left\{ \begin{array}{l} y^3 x \\ y^2 x^2 \\ yx^3 \end{array} \right\}$	$\dots$ $* \text{ (vel } a^2 = yx)$	$a^2 x = y^3$ $a^0 x^2 = y^2$
20	surdesolida seu quadrato – cubica	$\left\{ \begin{array}{l} \square^{\text{to}} \square^{\text{ti}} \text{formis} \\ \text{cubiformis} \\ \boxed{\text{quadratiformis}} \\ \boxed{\text{simplex}} \end{array} \right.$	$a^5 = \left\{ \begin{array}{l} y^4 x \\ y^3 x^2 \\ y^2 x^3 \\ yx^4 \end{array} \right\}$	$\dots$	$a^3 x = y^4$ $ax^2 = y^3$
20	cubico – cubica	$\left\{ \begin{array}{l} \square^{\text{to}} \text{cubiformis} \\ \square^{\text{to}} \square^{\text{ti}} \text{ formis} \\ \text{cubiformis} \\ \boxed{\square^{\text{ti}} \text{ formis}} \\ \boxed{\text{simplex}} \end{array} \right.$	$a^6 = \left\{ \begin{array}{l} y^5 x \\ y^4 x^2 \\ y^3 x^3 \\ y^2 x^4 \\ yx^5 \end{array} \right\}$	$\dots$ $* \text{ (vel } a^3 = y^2 x)$ $* \text{ (vel } a^2 = yx)$ $* \text{ (vel } a^3 = yx^2)$	$a^4 x = y^5$ $a^2 x^2 = y^4$ $a^0 x^3 = y^3$

1 Tabula Hyperboloeidum *erg. Hrsg.*

$$R \textcircled{4} 1. \quad R \textcircled{4} 2. \quad R \textcircled{4} 3. \quad R \textcircled{4} 4. \quad \text{etc.}$$

Contra erit  $x = \frac{y^4}{a^3}$ , eodemque modo posito  $a = 1$ . et  $y = 1$ . vel 2. vel 3. vel 4. etc. erit series ipsorum  $x$  in numeris:

$$1 \qquad 16 \qquad 81 \qquad 256$$

Sumtis iam hyperboloidibus quadrato-quadraticis duabus, altera cuius aequatio est:  $a^4 = yx^3$ , altera cuius aequatio est:  $a^4 = y^3x$ , videamus utra harum potius paraboloidis alicuius simplicis reciproca dici mereatur; reducta ad numeros serie elementorum.

Ac primum ob aequationem  $a^4 = yx^3$ , erit  $y = \frac{a^4}{x^3}$ , et posita  $a = 1$ . et  $x = 1$ . vel 2.

vel 3. vel 4. erit series omnium  $y$  in numeris

$$\frac{1}{1} \qquad \frac{1}{8} \qquad \frac{1}{27} \qquad \frac{1}{64} \qquad \text{etc.}$$

10

Patet ergo elementa haec paraboloidis, verum non quadraticae, sed cubicae simplicis reciproca esse.

Eodem modo  $x = R \textcircled{3} \frac{a^4}{y}$ . hinc series omnium  $x$  in numeris:

$$\frac{1}{R \textcircled{3} 1} \qquad \frac{1}{R \textcircled{3} 2} \qquad \frac{1}{R \textcircled{3} 3} \qquad \frac{1}{R \textcircled{3} 4} \qquad \text{etc.}$$

Unde intelligi potest, quam in tabula nominaveram: hyperboloidem quadrato-quadraticam simplicem cuius aequatio:  $a^4 = yx^3$ , esse paraboloidis cubicae simplicis cuius aequatio:  $y^3 = a^2x$ , reciprocum.

Nunc alteram quoque hyperboloidem quadrato-quadraticam aequationis  $a^4 = y^3x$ , quae sola priori controversioni de simplicitate movere posset, examinemus. In ea  $y =$

$R \textcircled{3} \frac{a^4}{x}$ , eritque series omnium  $y$  in numeris:

$$R \textcircled{3} 1 \qquad R \textcircled{3} 2 \qquad R \textcircled{3} 3 \qquad R \textcircled{3} 4$$

Habemus ergo seriem omnium  $y$  hyperboloidis quadrato-quadraticae istius, homogeneam seriei omnium  $x$  hyperboloidis quadrato-quadraticae prioris. Et contra hoc loco

series omnium  $x$  seriei omnium  $y$  prioris, homogena est; nam hoc loco  $x = \frac{a^4}{y^3}$ , id est in

numeris:

$$\frac{1}{1} \qquad \frac{1}{8} \qquad \frac{1}{27} \qquad \frac{1}{64} \qquad \text{etc.}$$

15

20

25

Non est ergo cur hae duae species distinguantur, aut cur altera pree altera simplex vocetur, cum curva utriusque eadem sit.

Iam ut species hyperboloidum distinctius habeantur, ex paraboloidibus reciproca earum elementa sunt indaganda.

- 5 Ita in prima seu communi parabola elementa axi parallela, seu omnia ( $x$ ) sunt:

$$1 \quad 4 \quad 9 \quad 16$$

horum reciproca:

$$\frac{1}{1} \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{9} \quad \frac{1}{16} \quad \text{etc.}$$

Unde aequatio:  $x = \frac{a^3}{y^2}$ . vel  $y^2x = a^3$ .

- 10 Elementa basi parallela, seu omnia ( $y$ ) sunt:

$$Rq\ 1 \quad Rq\ 2 \quad Rq\ 3 \quad Rq\ 4$$

quorum reciproca

$$\frac{1}{Rq\ 1} \quad \frac{1}{Rq\ 2} \quad \frac{1}{Rq\ 3} \quad \frac{1}{Rq\ 4}$$

Unde aequatio:  $\sqrt{\frac{a^3}{x}} = y$ , sive  $y^2x = a^3$ .

- 15 Igitur parabolae quadratice, reciproca est hyperbolae cubica. Quod mirum videri non debet, quoniam hyperbola quadratica seu communis, non parabolae communi, sed triangulo, quod iure omnium paraboloidum primum intelligi potest, reciproca habeat elementa.

- Parabolae cubica quadratiformis, aequationis  $y^3 = ax^2$ , elementa habet radices quadratas ex numeris cubis, vel radices cubicas ex numeris quadratis; illarum reciproca

$$\frac{1}{Rq\ 1} \quad \frac{1}{Rq\ 8} \quad \frac{1}{Rq\ 27} \quad \frac{1}{Rq\ 64} \quad \text{etc.}$$

unde aequatio:  $Rq \frac{a^5}{x^3} = y$ . vel  $y^2x^3 = a^5$ .

Harrum, radicum inquam cubicarum ex numeris quadratis, reciproca:

$$\frac{1}{R\ ③\ 1} \quad \frac{1}{R\ ③\ 4} \quad \frac{1}{R\ ③\ 9} \quad \frac{1}{R\ ③\ 16}$$

Unde aequatio:  $R\ ③ \frac{a^5}{x^2} = y$ , vel  $y^3x^2 = a^5$ .

Ergo paraboloeidi cubicae quadratiformi, [hyperboloeides] surdesolida quadratiformis, vel quod idem est cubiformis, reciproca est.

Atque ut semper ex data aequatione paraboloeidis, aequationem hyperboloeidis reciprocae brevissime investigemus:

Esto aequatio paraboloeidis  $y^3 = ax^2$ . et ex  $y$  vel  $x$  eligatur utrumlibet, et si placet

minori potestate affectum, ut hoc loco  $x$ . Ergo  $x = Rq \frac{y^3}{a}$ , et invertendo  $Rq \frac{a}{y^3}$ , quod ut

possit esse = alicui  $x$ , seu lineae, per  $a$  multiplicandum, donec ad debitam dimensionem

assurgat, hoc loco  $\frac{a^5}{y^3}, Rq = x$ . vel  $\frac{a^5}{y^3} = x^2$ , quod ab initio statim fieri poterat, extrac-

tione radicis omissa; nam aequatio paraboloeidis data convertatur in aliam, cuius unum

latus continet, potestatem datam alterutrius variabilium ( $y$  vel  $x$ ) solam, alterum frac-

tionem, cuius denominator sit alterius variabilium potestas data, numerator potestas,

invariabilis  $a$ , prout natura novae aequationis postulat, aucta. Unde patet potestatem

linearum variabilium non mutari, at exponentem ipsius  $a$  novum summam exponentium

$x$  et  $y$  debere aequare, quorum antea tantum differentiam aequaverat; differentia autem

inter summam et differentiam  $a+b-a+b$  est minor terminus duplicatus. Ergo inventam

habemus

„ regulam expeditam et generalem aequationem paraboloeidis datae mutandi in

„ aequationem hyperboloeidis reciprocae, si  $a$  ponatur ab uno latere aequationis expo-

„ nente eius duplo minoris variabilium exponente, aucto; contra data aequatione hy-

„ perboloeidis, datur aequatio paraboloeidis respondentis, si ab exponente  $a$  detraha-

„ tur exponentis variabilium minoris, et maioris variabilium potestas ab uno aequatio-

„ nis latere, caetera ab altero collocentur. Vel brevius, retento exponente literae  $x$  et

„  $y$ . ipsius  $a$  exponentis erit differentia eorum.

Et secundum hanc regulam calculatas paraboloeides respondentes, margini hyperboloeidum in tabulam adiciemus, unde appareat sane fieri non posse, ut hyperboloeidum et paraboloeidum gradus sibi respondeant, quoniam aliqua hyperboloeis cubico-cubica habet cubicam paraboloeidem sibi respondentem, et contra una hyperboloeis surdesolida habet respondentem sibi paraboloeidem quadrato-quadraticam. Quare hyperboloeides nomina, quae imposuimus retinere possunt; sed quando eadem hyperboloeis diversa

1 paraboloeides *L ändert Hrsg.* 22 f. Vel ... eorum. erg. *L*

habet nomina, quod scilicet tantum literarum  $x$  et  $y$  permutatione varietur, retinebit maius. Ita hyperboleis surdesolida: quadrato-quadratiformis et simplex eadem est, sed nomen quadrato-quadratiformis retinebit, quoniam paraboloeis cui reciproca est, quadrato-quadratica est, ac proinde hyperboloidis gradum ab exponente literae  $a$ . speciem ab 5 exponente literae  $x$  vel  $y$  utra maior est, determinari.

Quaestio hoc loco obiter institui potest, quid illis seriebus faciendum sit, quae sane fractionum habent formam, sed in quibus numerator non minus ac denominator continue crescit, ut si series sit:

$$\frac{1}{Rq\ 1} \quad \frac{2}{Rq\ 2} \quad \frac{3}{Rq\ 3} \quad \frac{4}{Rq\ 4} \quad \text{etc.}$$

10 cuius aequatio est  $\frac{ax}{\sqrt{ax}} = y$ . vel  $\frac{a^2x^2}{ax} = y^2$ . vel  $ax = y^2$ . Unde apparet hanc seriem ad parabolam communem reduci.

Esto alia:

$$\frac{1}{Rq\ 1} \quad \frac{2}{Rq\ 8} \quad \frac{3}{Rq\ 27} \quad \frac{4}{Rq\ 64} \quad \text{etc.}$$

aequatio  $\frac{x^{..}}{Rq\ x^3} = Rq\ \frac{a^4x}{x^3} = y$ . vel  $a^4x = y^2x^3$ . vel  $a^4 = y^2x^2$ . vel  $a^2 = yx$ . Hanc ergo 15 manifestum est reduci ad hyperbolam communem.

Idemque de caeteris speciebus omnibus iudicandum est, sublata enim irrationalitate alterum ex  $x^{..}$  destruitur. Et divisio alicuius potestatis sive radicis per aliam, gignit potestatem aliquam vel radicem; ut:  $\frac{3}{Rq\ 3} = Rq\ 3$ . quia  $3 = Rq\ 3 \cap Rq\ 3$ .

Atque his ita de hyperboloidum gradibus speciebusque, praelibatis, ad dimensiones 20 ascendemus, usi perinde ut in paraboloidibus, ratione productae ad abscissam, quae hoc quoque loco invariata est ac constans in eadem specie figurae. Et vero dudum a doctissimis viris, qui de maximis ac minimis, ac tangentium ducendarum ratione scrip-25 sere observatum est[:] sumta spatii concavi hyperboloidis cuiuslibet, applicata qualibet asymptoto uni parallela, et a curvae punto  $G$  ad alteram usque asymptoton producta, ut  $GL$ . fore abscissam  $AL$  ad productam  $LM$  (productam inquam ab  $L$  usque ad punctum  $M$ , in quo  $GM$  tangens curvae in  $G$  asymptoto  $AC$  occurrit), ut est exponentis potestatis ipsius abscissae  $x$  vel  $AL$ . ad exponentem potestatis ipsius applicatae  $y$  vel  $GL$ .

15 reduci: in Wirklichkeit ergibt sich die quadratische Hyperbel  $a^3 = y^2x$ . Die Bezeichnung  $x^{..}$  bei der Rationalisierung ist mnemotechnischer Natur.

Cumque in hyperbola communi cuius aequatio  $a^2 = xy$ . exponentes isti sunt aequales, erunt rectae quoque  $AL$  et  $LM$  aequales. At in hyperboloidi cubica  $a^3 = y^2x$ , cum exponens  $y$  sit 2. et exponens  $x$  sit 1. etiam  $LM$  ipsius  $AL$  dupla erit. Idem est si applicata assumatur  $EN$ . abscissa  $AN$ . producta  $NO$ . tangens  $EO$ .

Notandum autem abscessas hoc loco intelligi non a vertice sed a basi, et productas non ultra verticem, sed trans applicatam.

Nunc tres intelligantur esse applicatae  $EN$ .  $GL$ .  $FK$ . quarum distantiae  $NL$ .  $LK$ . sint infinite parvae. Constat tangentem per duarum applicatarum distantiae infinite parvae extrema transire intelligi posse. Ea enim est natura tangentis, ut duas eiusdem curvae applicatas, nisi distantiae infinite parvae, ac quae pro eadem haberi possint, non attingat. Igitur tangentem  $GM$  ponamus transire per  $F$ , et tangentem  $EO$  per  $G$ . Iamque intelligamus spatium constare ex infinitis numero trapeziis ut  $ENLG$ ; et  $GLKF$  latitudinis infinite parvae; et curvam ipsam ex rectis numero infinitis, magnitudine infinite parvis, ut tangentium scilicet portionibus inter duas applicatas proximas interceptas velut polygonorum irregularium lateribus compositam; ex punctis curvae  $F$ .  $G$ .  $E$ . demittantur rectae perpendicularares in basin  $FH$ .  $GP$ .  $EQ$ . ac tangentibus quoque usque ad basin productis,  $MFG$  in  $R$ , et  $OGE$  in  $S$ . Ex punto  $A$ . centro seu concursu asymptotorum demittantur perpendicularares in tangentes productas, quae occurant in punctis  $T$ .  $U$ , tangentibus productis ut  $MFGTR$ ,  $OGEUS$ . Denique puncta ut  $W$ . vel  $Z$ . quibus duorum punctorum curvae proximorum, tangentem communem habentium, ut  $E$  et  $G$  (vel  $G$  et  $F$ ) rectae, ut  $EN$  et  $GP$  (vel  $GL$  et  $FH$ ) ex uno quidem a basi remotiore  $G$  (vel  $F$ ) in basin  $AB$ , ex altero ab axe remotiore  $E$  (vel  $G$ ) in axem  $AC$  perpendicularares se intersecant.

Habebimus triangula rectangula  $EWG$  (vel  $GZF$ ), quorum latus unum ut  $WG$  (vel  $FZ$ ) est differentia abscissarum  $EQ$ ,  $GP$  (vel  $GP$ .  $FH$ ) aequalis  $NL$  ( $LK$ ) distantiae applicatarum  $EN$ .  $GL$  ( $GL$ .  $FK$ ) et latus alterum idem est inverso modo si applicatas abscissas permutes;  $EW$  ( $GZ$ ) differentia applicatarum  $EN$ ,  $GL$  ( $GL$ .  $FK$ ) aequalis  $QP$  ( $PH$ ) distantiae abscissarum vel intervallorum a basi  $EQ$ .  $GP$  ( $GP$ .  $FH$ ). Basis autem seu hypotenusa, sit latus polygoni infinite parvum, seu portio tangentis inter duas applicatas abscissasve intercepta  $EG$  ( $GF$ ).

Manifestum est autem triangulum  $AUO$  ( $ATM$ ), intervallo tangentis a centro  $A$ . nempe  $AU$  ( $AT$ ), portione tangentis  $OU$  ( $MT$ ), et summa abscissae productaeque,  $AO$

15 irregularium erg.  $L$  28–30 Basis ... (GF). erg.  $L$

(AM) comprehensum, esse simile triangulo  $EWG$  ( $GZF$ ), et angulum  $EGW$  ( $GFZ$ ) esse angulo  $UOA$  ( $TMA$ ) aequalem. Unde sequitur ut est  $AU$  ( $AT$ ) ad  $EW$  ( $GZ$ ) ita esse  $AO$  ( $AM$ ) ad  $EG$  ( $GF$ ) ac proinde rectangulum ex  $AU$  in  $EG$  ( $AT$  in  $FG$ ), rectangulo ex  $AO$  in  $EW$ , vel  $QP$  ( $AM$  in  $GZ$ , vel  $PH$ ) aequari.

5 His ita positis sumatur portio curvae quantacunque  $DEGF$  divisa in latera numero infinita, magnitudine infinite parva ut  $EG$ .  $GF$ . et ex puncto  $A$  ducantur ad horum laterum terminos, rectae  $AD$ , et post infinitas intermedias  $AE$ .  $AG$ .  $AF$ .

Manifestum est, totum sectorem concavum  $ADEGFA$  infinitis triangulis  $AFG$ .  $AGE$ . etc. compleri. At vero haec eadem triangula duplicata aequari basibus eorum, id est 10 tangentium portionibus  $EG$  vel  $GF$  in altitudines, id est tangentium intervalla  $AU$ , vel  $AT$  ductis, manifestum est.

Vicissim vero ostensum paulo ante, rectangula  $AU$  in  $EG$ , vel  $AT$  in  $GF$ , rectangulis  $AO$  in  $QP$ . vel  $AM$  in  $PH$ . aequari, ergo triangulum  $AGE$ , vel  $AFG$  duplicatum rectangulo  $AO$  in  $QP$ , vel  $AM$  in  $PH$  aequabitur.

15 Describantur rectangula haec, rectis  $AO$  in  $P\alpha$  vel  $Q\theta$ , et  $AM$  in  $H\lambda$  vel  $P\gamma$  translatis, et basibus  $QP$  et  $PH$  impositis. Quod si idem fieri intelligatur in quolibet curvae  $DEGF$  punto, quod in punctis  $E$ .  $G$ .  $F$ . factum est, infinita numero rectangula eiusmodi, basi  $IH$  imposita, constituent spatium curvilineum concavum  $ID\theta\lambda H$ , sectori concavo  $ADEGFA$ , duplicato, id est omnibus illis triangulis numero infinitis ut  $AFG$ ,  $AGE$ , etc. 20 sectorem complementibus, duplicatis; aequale.

Manifestum est autem curvam  $D\theta\lambda$  esse eiusdem speciei cum priori  $DEGF$ . quoniam enim applicatae sunt proportionales, seu  $\lambda H$  ad  $FH$ , ut  $\theta Q$  ad  $EQ$ . figurae erunt homogeneae, duae autem figurae planae homogeneae sunt eiusdem speciei, nec nisi laterum rectorum, si qua habent, magnitudine differunt, uti ellipsis et circulus eadem certe 25 aequatione possunt exprimi.

Datur ergo ratio spatii  $IDEGFH$ , ad spatium  $ID\theta\lambda H$ , quae scilicet applicatarum respondentium, sive quae abscissarum, ad summas ex abscissis et productis. Rationem sum-

24 differunt, (1) ac ut obiter dicam, similes sunt, (2) uti  $L$

---

15–20 Bei der Konstruktion der Hilfskurve für die Transmutation weist Leibniz dem Punkt  $D$  unbedingt eine Sonderrolle zu, so dass die Hilfskurve in seiner Handzeichnung wie die Ausgangskurve durch  $D$  läuft. Der Fehler beeinflusst die folgenden Betrachtungen nur unwesentlich.

mae ad abscissam vel exponentis  $a$  ad exponentem  $x$ , appellemus  $\mathbb{D}$ . quae in hyperbola  
communi  $= \frac{2}{1}$ . Quare spatium  $\mathbb{D}^{\wedge} IDEGP$  = sectori concavo  $ADEGA$  duplicato, seu  
 $\mathbb{D}^{\wedge} IDEGP = 2 ADEGA$ .

Quoniam vero  $IDEGP$  est aequale his duobus, trapezio  $ID\mu P$ , et sectori concavo  $\mu DEG$ ,  
simil sumptis; ac eodem modo  $ADEGA$  est aequale his duobus; triangulo  $A\mu G$ , et eidem  
sectori concavo  $\mu DEG$ , simul sumtis, ideo

$$\mathbb{D}^{\wedge} ID\mu P + \mathbb{D}^{\wedge} \mu DEG = 2 A\mu G + 2 \mu DEG.$$

Et quia in hyperbola communi  $\mathbb{D} = 2$ , ideo in ea aequatio ista sic interpretanda est:

$$2 ID\mu P + 2 \mu DEG = 2 A\mu G + 2 \mu DEG.$$

Unde cum  $2 \mu DEG$  utrinque destruatur, manifestum est in hyperbola communi aequatio-  
nem propositam nihil conferre ad spatii curvilinei quadraturam, neque aliud inde sequi,  
quam

$$2 ID\mu P = 2 A\mu G \text{ vel } ID\mu P = A\mu G.$$

Unde, si utrique addatur triangulum  $\mu PA$ , fient duo triangula vel etiam, si duplicantur,  
 $AID = APG$ , vel rectangulum  $AID$  aequale rectangulo  $ALG$ . Quae nota est hyperbo-  
lae proprietas, omnia scilicet rectangula sub abscissa et applicata, ubicunque in spatio  
asymptoto assumtis, inter se, ac proinde quadrato cuidam certo ac perpetuo aequalia  
esse seu  $a^2 = xy$ , insigni documento veritatis tam eleganti harmonia demonstrationum  
comprobatae.

At vero in caeteris hyperboloidibus omnibus (praeter eas quae ad communem revo-  
cantur, qualis est:  $a^6 = x^3y^3$ ), quadraturam spatii curvilinei haberi necesse est. Ut enim  
ad aequationem propositam

$$\mathbb{D}^{\wedge} ID\mu P + \mathbb{D}^{\wedge} \mu DEG = 2 A\mu G + 2 \mu DEG \text{ vel } \mathbb{D}^{\wedge} ID\mu P - 2 A\mu G = 2 \mu DEG -  
2 \mu DEG redeamus, patet inde fieri$$

$$\frac{\mathbb{D}^{\wedge} ID\mu P - 2 A\mu G}{\mathbb{D} - 2} = \mu DEG, \text{ et } ID\mu P + \frac{\mathbb{D}^{\wedge} ID\mu P - 2 A\mu G}{\mathbb{D} - 2} = IDEGP \quad 25$$

1 appellemus (1)  $\beta$  (2)  $\mathbb{D} \cdot L$       2 Quare (1) ratio (a) quoque spatii IDEGFH (b) IDEGP ad  
sectorem concavum dabitur,  $= \frac{2\beta}{1}$ . Ac proinde spatium (2) spatium  $L = 23 + 2\mu DEG$  (1) redeamus,  
vel  $\mathbb{D}$  est maior quam 2, vel minor, si maior erit (2) quam sic polien (3) vel  $L$

24 inde fieri: anstelle von  $\mathbb{D} - 2$  müsste es umgekehrt  $2 - \mathbb{D}$  heißen. Der Fehler wirkt sich bis  
zum Ende des Stückes aus. — Im Zuge der anschließenden Rechnungen unterlaufen Leibniz weitere  
Flüchtigkeitsfehler, so dass er lediglich stellenweise richtige Zwischenergebnisse erreicht.

seu

$$\frac{\mathbb{D}^2 ID\mu P - 2 ID\mu P - 2 A\mu G}{\mathbb{D} - 2} = IDEGP$$

id est spatio hyperboloeidis ad quadrandum proposito. Q.E.F.

Ut autem  $ID\mu P$  et  $A\mu G$  comparemus, recta  $P\mu$  appelleatur =  $b$ . recta  $\mu G$  =  $c$ .

$PG = b + c$ . et  $PA = d$ .  $PI = e$ . et  $AI = d + e$ . erit  $\nabla^{\text{lum}} P\mu A = \frac{bd}{2}$ . et  $A\mu G = \frac{cd}{2}$ . et

5  $APG = \frac{bd + cd}{2}$ .

Porro  $ID = \frac{P\mu \wedge AI}{PA} = \frac{bd + be}{d} = b + \frac{be}{d}$ . Et constat  $ID\mu P$  ex rectangulo  $P\xi$ , et

triangulo  $D\xi\mu$ . Rectangulum autem  $P\xi = be$ , et quia  $D\xi = ID - P\mu = b + \frac{be}{d} - b = \frac{be}{d}$ .

erit  $D\xi\mu = \frac{be^2}{2d}$ . Ergo  $ID\mu P = be + \frac{be^2}{2d}$  vel  $\frac{2dbe + be^2}{2d}$ . Ergo per aequationem supra positam:

10 
$$\frac{\frac{\mathbb{D}dbe + \mathbb{D}be^2}{2d} - \frac{cd}{2}}{\mathbb{D} - 2}, \text{ seu } \frac{\frac{2}{4}dbe + \frac{2}{4}be^2 - \frac{2}{4}cd^2}{\frac{4}{4}d\mathbb{D} - \frac{4}{4}d} = \mu DEG.$$

Positoque  $\pi d = b$ . fiet:  $\frac{\mathbb{D}be + \mathbb{D}\pi e^2 - cd}{2\mathbb{D} - 2} = \mu DEG$ .

et posito  $2\mathbb{D} - 2 = \delta$ . fiet:  $\frac{\mathbb{D}be + \mathbb{D}\pi e^2 - cd}{\delta} = \mu DEG$ .

Addatur utrobique  $P\mu A = \frac{bd}{2}$ . fiet:  $\frac{\mathbb{D}dbe + \mathbb{D}be^2 - cd}{2d\mathbb{D} - 2d} + \frac{bd}{2} = IDEGP$ .

Ergo  $\frac{\frac{2}{4}dbe + \frac{2}{4}be^2 - \frac{2}{4}cd^2 + \frac{2}{4}bd^2}{4d\mathbb{D} - 4d} = IDEGP$ .

15 Posito  $\mathbb{D} = 3$ . erit:  $\frac{\frac{3}{4}dbe + \frac{3}{4}be^2 - \frac{2}{4}cd^2 + \frac{2}{4}bd^2}{\frac{8}{4}d} = IDEGP$ .

Detrahatur utrobique rectangulum  $DP = \text{rectang. } P\xi (= be) + \text{rectang. } D\xi\mu \left( \frac{be^2}{d} \right)$ .

15 Posito ... IDEGP. erg. L

Residuum cognitorum hoc rectangulo detracto aequabitur spatio  $DEG\beta$ . Posito iam  $\delta = 3$ , erit

$$\frac{\cancel{6}bde + \cancel{6}be^2 - 2cd^2 + 6bd^2 - \cancel{12}dbe + \cancel{4}de - \cancel{12}be^2 + \cancel{4}be^2}{2} \quad 2$$

In omnibus his aequationibus non determinatur utrum altero maius, seu utrum subtrahens an subtrahendum, nunc enim unum, nunc alterum maius. Fiet autem hoc loco:

$$\frac{6bd^2 - 2cd^2 - 2dbe - 2be^2}{12d - 4d}.$$

(Si  $D$  ponatur  $B$ . seu recta  $AD$  infinita seu coincidens ipsi  $AB$ . necesse est spatium  $BDEGP$  aequari  $2\delta \cap BP$ , quoniam recta  $BP$  infinite longa quoddam exhibet trapezium infinite longum, quale istud  $ID\mu P$ .)

Porro ad contrahendam aequationem adhibenda est figurae aequatio, in qua  $a^{(\beta+\delta)} = x^\beta y^\delta$ . sumendo scilicet  $\beta$  et  $\delta$  pro exponentibus incognitis. Porro  $PA$  vel  $d$  potest cogitari ut  $x$ . quemadmodum et  $AI$  vel  $d+e$ . contra  $PG$  seu  $b+c$ . item  $ID$  seu  $b + \frac{be}{d}$  possunt sumi pro  $y$ . Ergo:  $PA^\beta \cap PG^\delta = AI^\beta \cap ID^\delta$ . seu  $d \circledcirc \beta \cap b+c \circledcirc \delta = d+e \circledcirc \beta \cap b + \frac{be}{d} \circledcirc \delta$ .

Posito iam  $\delta = 1$ . et  $\beta = 2$ . erit:

$$d^2b + d^2c = bd^2 + be^2 + 2bde, + bed + \frac{be^3}{d} + 2be^2. \quad 15$$

Ergo  $d^2b + d^3c = \cancel{bd^3} + \cancel{3}be^2d + \cancel{2}bd^2e + \cancel{be^2} + be^3 + \cancel{2}be^2d$ .

vel  $d^3c - 3be^2d + 3bd^2e = be^3$ . vel:  $\frac{d^3c}{3e^2d + 3d^2e + e^3} = b$ .

Quod in aequatione superiori ad  $IDEGP$  in locum ipsius  $b$  substitui potest. Fiet in exemplo hyperboloeidis  $a^3 = xy^2$ . fiet inquam:

$$\frac{3d^4ec + \cancel{5}e^2d^3c - \cancel{3}e^2d^3c - 3d^4ce - e^3cd^2 + 2d^5c}{12e^2d^2 + 12d^3e + 4e^3} = IDEGP. \quad 20$$

7 est (1) | (a) rectam (b) ID fieri infinite parvam, et ideo erg. | spatium BDEGP aequabitur (2)  
spatium  $L$  10 (1) Porro PA  $\cap$  PG seu  $d \cap b+c$  seu  $db+dc = a^2 = (2)$  Porro  $L$

## 40. DE FUNCTIONIBUS PLAGULAE QUATTUOR.

August 1673

**Überlieferung:** *L* überarbeitetes Konzept mit Zusätzen: LH 35 VIII 3 Bl. 1–8. 4 Bog. 2°.  
 7  $\frac{1}{2}$  S. Bl. 2 vor dem Beschreiben unten beschnitten (Abschnitt ca 23,5 cm x 14,0 cm). Ge-

5 ringe Textverluste durch Randschäden (insbesondere Bog. 1), im Wesentlichen an Hand  
 der Sicherheitsverfilmung (April 1967) behoben. Überschriften, Datierung, Bogennummerierung sowie Gesamttitel sukzessive ergänzt. Textfolge: Bl. 1 r° (Haupttext), Bl. 1 v° oben  
 (bis S. 662 Z. 7), Bl. 1 r° (Randtext), Bl. 2 v°, Bl. 1 v° unten (ab S. 666 Z. 12), Bl. 2 r° sowie  
 zwei Zusätze auf Bl. 1 v° in Zusammenhang mit dem zweiten Beispiel (S. 660 Z. 19 – S. 661  
 10 Z. 5) = N. 40<sub>1</sub>; Bl. 3 und 4 = N. 40<sub>2</sub>; Bl. 7 und 8 = N. 40<sub>3</sub>; Bl. 5 und 6 = N. 40<sub>4</sub>. (Reihenfolge  
 von Teil 3 und 4 durch Kustode gesichert.)  
 Cc 2, Nr. 575

1673. August.

Methodus tangentium inversa seu De functionibus.

15 De locis locorum inveniendis, seu de applicatis loci cuiusdam dati  
 functionem in alio loco, qui quaeritur, facientibus.  
 Seu de inveniendo loco, in quo applicatae loci dati, faciunt  
 functionem propositam.  
 Est haec methodus methodo tangentium opposita.

---

14 In parte 2<sup>da</sup> est mirabilis observatio de expressionibus, tangentium per infinitas replicationes, item parte [3<sup>tia</sup>].

22 4<sup>ta</sup> L ändert Hrsg.

---

14 Eine ausführliche Behandlung des Inhalts gibt D. MAHNKE, *Neue Einblicke*, 1926, S. 43–59.

40<sub>1</sub>. PLAGULA PRIMA

## Pars prima

Methodus nova investigandi tangentes linearum curvarum  
 ex datis applicatis, vel contra applicatas ex datis  
 productis, reductis, tangentibus,  
 perpendicularibus, secantibus.

5

Esto figura curvilinea  $ABCPD$  in qua relatio applicatae  $ED$  ad abscissam  $AE$  aequatione quadam nobis cognita explicatur: id enim utique necesse est, si modo figurae natura nobis nota est. Quod si figura geometrica non est, ut cyclois, nil refert tamen, tractabitur enim ad geometricae exemplum fingendo rectarum cum curvis ex quibus factae sunt notam nobis esse comparationem; nec ideo minus tangens sive geometrica sive agometrica ducetur, prout figura natura patitur.

10

Intelligatur abscissa  $AE$  dividi in partes aequales infinitas, quales sunt  $EF$ .  $FG$ . easque proinde infinite parvas, constat figuram intelligi posse compositam ex infinitis trapeziis quales sunt  $EFHD$  et  $FGKH$ . Et curva  $ADC$  intelligi poterit constare ex infinitis lineis rectis velut lateribus, quae scilicet portiones sint tangentium, duas applicatas proximas (seu distantia infinite parva a se invicem remotas) iungentium; qualis recta est  $HD$ . portio tangentis  $MD$ . per puncta  $H$ .  $D$  extrema applicatarum  $FH$  et  $ED$  intervallo infinite parvo  $EF$  distantium, transeuntis; qualis item est  $KH$ . portio tangentis  $NH$ . per  $K$  et  $H$  extrema puncta applicatarum sibi proximarum  $GK$ .  $FH$  transeuntis.

15


Iam manifestum est triangula  $HID$  et  $MED$ . vel  $KLH$  et  $NFH$ . esse similia, ergo  $\frac{ME}{ED} = \frac{HI}{ID}$ . Iam  $ID = ED - FH$ . Ergo  $ME = \frac{HI \wedge ED}{ED - FH}$ . Inventa autem  $ME$ , inventa est tangens, cum non nisi rectam  $MD$  duci opus sit, ex punto  $M$  invento, ad punctum  $D$  datum.

20

Rem exemplo comprobemus, ut appareat an ad usum transferri possit.

25

<sup>2</sup> Pars prima erg.  $L$  12f. patitur. (1) Intelligatur figura ex infinitis parallelogrammis | aequo altis erg. | constare, et curva ex infinitis | numero erg. | rectis infinite parvis, quorum parallelogrammorum unum intelligatur esse  $EFGH$ . Eritque recta  $EF$ . vel  $GH$ . infinite parva, eademque erit infinitesima rectae  $AE$ . abscissae. Cum autem parallelogram (2) Intelligatur  $L$  14f. infinitis (1) parallelogrammis (2) trapeziis  $L$



[Fig. I]

Esto infinite parva  $EF = b$ . recta  $AE = \xi b = x$ . ipso  $\xi$  exprimente numerum infinitum portiuncularum  $b$ . Figura autem intelligatur esse parabola, in qua applicata est  $\sqrt{ax}$  ( $a$  posito latere recto, et  $x$  abscissa). Erit  $\sqrt{\xi ba} = ED$ . et quia  $AF$ . abscissa applicatae  $FH$ . est  $\xi b - b$ . erit  $FH = \sqrt{\xi ba - ba}$  et  $ID = ED - FH$ . erit  $\sqrt{\xi ba} - \sqrt{\xi ba - ba}$ . Et  
 $ME$  erit  $= \frac{\sqrt{q} \xi ba}{\sqrt{\xi ba} - \sqrt{\xi ba - ba}}$ .

5

Porro ratio ipsius  $a$  ad  $x$  seu  $\xi b$  data est, ea intelligatur esse  $\frac{1}{\beta}$  fiet

$$ME = \frac{\sqrt{q} \xi b^3 \frac{\xi b}{\beta}}{\sqrt{\xi b \frac{\xi b}{\beta}} - \sqrt{\xi b \frac{\xi b}{\beta} - \frac{b^2 \xi}{\beta}}} = \frac{\xi b^2}{\xi b - \sqrt{\xi^2 b^2 - b^2 \xi}} = \frac{b^2}{b - \sqrt{b^2 - \frac{b^2}{\xi}}} \\ ME \xi b - \sqrt{\xi^2 b^2 ME^2 - b^2 \xi ME^2} = \xi b^2.$$

Ergo  $\underbrace{ME^2 \xi^2 b^2 + \xi^2 b^2 ME^2}_{2ME^2 \xi^2 b^2} - b^2 \xi ME^2 - 2\sqrt{\xi^4 b^4 ME^4 - b^4 \xi^3 ME^4} = \xi^2 b^4$ .

$$2ME^2 \xi^2 b^2 - b^2 \xi ME^2 - \xi^2 b^4 = 2\sqrt{\quad}.$$

10

Ergo cum  $b^2 \xi ME^2 - \xi^2 b^4$  tuto negligi, velut infinites minora quam  $2ME^2 \xi^2 b^2$ . fiet:

$$4ME^4 \xi^4 b^4 = 2, \quad \xi^4 b^4 ME^4 - b^4 \xi^3 ME^4.$$

Male[!] ergo  $\xi^2 b^4$ , etc. reici non debuerant, quanquam caeteris infinites minora, quadreramus, qualia sunt, fiet:

$$\cancel{2} ME^4 \xi^4 b^4 - \cancel{2} ME^4 \xi^3 b^4 - 4ME^2 \xi^4 b^6 + b^4 \xi^2 ME^4 + 2b^6 \xi^3 ME^2 + \xi^4 b^8 \\ = \cancel{2} \cancel{\xi^4 b^4} ME^4 - \cancel{2} \cancel{b^4} \cancel{\xi^3} ME^4 = 0.$$

15

Ponatur  $ME = \delta \xi b$ . fiet:

$$2b^8 \xi^8 \delta^4 - 2b^8 \xi^7 \delta^4 - 4b^8 \xi^6 \delta^2 + b^8 \xi^6 \delta^4 + 2b^8 \xi^5 \delta^2 + \xi^4 b^8 = 0.$$

8 (1) Ponatur  $ME = \sqrt{q} \delta \xi b$ . Ergo (a)  $ME \xi^2 b^2 - EM$  (b)  $\sqrt{\delta} \sqrt{\xi^2 b^2} - \sqrt{(aa)} d\xi^3 b^3 - d\xi^2 b^3 = \xi b^2$ . Ergo  $\delta \xi^4 b^4 - d$  (bb)  $\delta \xi^3 b^3 - \delta \xi^2 b^3 = \xi b^2$ . (2)  $ME \xi b L$

12 Auf der rechten Seite müsste konsequent statt des Faktors 2 vielmehr der Faktor 4 stehen. Bei der nachfolgenden Korrektur bleibt dieser Fehler stehen; er beeinträchtigt die Rechnungen bis S. 660 Z. 2 und ist die Ursache für Leibniz' anschließende Bemerkung.

Nota  $b$  non est numerus, sed linea.  $\xi$  est numerus infinitus.  $\delta$  est numerus finitus quaesitus.  
 $2b^8\xi^8\delta^4 + b^8\xi^6\delta^4 + 2b^8\xi^5\delta^2 + \xi^4b^8 = 2b^8\xi^7\delta^4 + 4b^8\xi^6\delta^2$ .

Sed non video quomodo hinc veniatur ad solutionem. Imo videtur esse haec aequatio impossibilis, examinanda ergo omnia denuo.

- 5 Breviter res eoredit: Recta  $ED$ , applicata, divisa per  $ID$ , differentiam ab ipsam et applicata praecedente, dat rectam  $ME$ .

$$\frac{\sqrt{a\xi b}}{\sqrt{a\xi b} - \sqrt{a\xi b - ab}} = ME.$$

Ergo  $\frac{\sqrt{a\xi b}}{-1} = ME \sqrt{\sqrt{a\xi b} - ab}$

10  $ME \sqrt{\sqrt{a\xi b} - ab} = ME \sqrt{\sqrt{a\xi b} - b}$ .

Ergo  $\cancel{ME^2\xi b} + \xi b - 2ME\xi b = \cancel{ME^2\xi b} - ME^2b$ .

$2ME\xi b - \xi b = ME^2b$ . Ergo  $2ME\xi b - \xi b = ME^2$ . seu omittendo  $\xi b$  et quoniam  $AE = \xi b$ . erit  $2ME \sqrt{AE} = ME^2$ . Ergo  $2AE = ME$ . quod erat demonstrandum. Idemque in parabola verissimum esse aliunde notum est.

- 15 Hinc intelligi potest puncta in geometricis esse velut numeros, dividere rectam per rectam infinite parvam esse aliquo numero multiplicare aut dividere.

Hinc apparet quam difficile futurum sit ex dato  $AM$  et  $AE$  invenire  $ED$ ,  $\langle - \rangle$  enim nec  $ED$  sumi possunt, nec satis patet an sufficiat sumere bina  $AM$ .

$$\frac{\frac{\cancel{x^2} 1}{\sqrt{2ax - x^2}}}{\frac{\cancel{x^2} 1}{\circ \sqrt{2ax - x^2}} - \frac{\cancel{x^2} 1}{\mathbb{D} \sqrt{2ax - 2ab - x^2 - b^2 + 2xb}}} = ME.$$

---

19  $x - b, \square = x^2 + b^2 - 2xb$ .

15–18 Hinc intelligi . . . sumere bina AM. erg. L

---

19 Zur Vernachlässigung der mit  $b$  behafteten Glieder, s. u. S. 661 Z. 6 ff.

$$\text{Ergo } \frac{1}{\sqrt[3]{2ax - x^2}} = \frac{ME}{\odot} - \frac{ME}{\mathbb{D}}. \text{ Ergo } 1 = \frac{ME \wedge \wp}{\odot} - \frac{ME \wedge \wp}{\mathbb{D}}.$$

$$\wp = \odot. \text{ Ergo } \frac{ME \wedge \wp \wedge \mathcal{D} - ME \wedge \wp \wedge \mathbb{D}}{\mathcal{D} \wedge \mathbb{D}} = 1. \text{ Ergo } ME \wedge \odot - ME \wedge \mathbb{D} = \mathbb{D}. \text{ Ergo}$$

$$ME \wedge \sqrt{2ax - x^2} = \mathbb{D} + ME \wedge \mathbb{D}. \text{ Ergo } ME^2 \wedge \odot^2 = \mathbb{D}^2 + ME^2 \mathbb{D}^2 + 2 \mathbb{D}^2 ME. \text{ Ergo}$$

$$ME^2 \wedge \odot^2 - \mathbb{D}^2 - ME^2 \mathbb{D}^2 = 2 \mathbb{D}^2 ME. \text{ Ergo}$$

$$+ME^4 \odot^4 - 2 \odot^2 ME^2 \mathbb{D}^2 - 2ME^4 \odot^2 \mathbb{D}^2 + \mathbb{D}^4 + 2 \mathbb{D}^4 ME^2 + ME^4 \mathbb{D}^4 = 2 \mathbb{D}^2 ME, \square.$$

5

Non est tutum ipsius infinite parvi  $b$  multiplos ab initio reicere, aliaque fieri enim potest, ut eorum cum aliis compensatione, in alium plane statum veniat aequatio. Illud tamen utiliter a Wallisio, quem in eadem incidisse video, admonitum est omnes terminos in quibus habetur  $b^2$  posse reici[,] item eos qui neque  $b$  habent, neque in  $b$  ducentur, quippe aequales utrinque prodituri.

10

$$1 \text{ f. } \frac{ME \wedge \wp}{\mathbb{D}}. (1) \frac{ME \wedge \wp \wedge \odot - ME \wedge \wp \wedge \mathbb{D}}{\odot \wedge \mathbb{D}} = 1. \text{ Ergo } ME \wedge \wp \wedge \odot - ME \wedge \wp \wedge \mathbb{D} = \odot \wedge \mathbb{D}.$$

$$\text{Ergo } ME = \frac{\odot \wedge \mathbb{D}}{\wp \wedge \odot - \wp \wedge \mathbb{D}}. \text{ Iam } \wp = \odot. \text{ ergo: (a) } ME = \frac{\odot \wedge \mathbb{D}}{\odot^2 - \odot \wedge \mathbb{D}}.$$

Nebenrechnung:

$$\begin{aligned} \odot \wedge \mathbb{D} &= 2ax - 2ab - \frac{x^2 - b^2 + 2xb}{2ax - x^2} (2ax - x^2) \\ &\quad - 2ax^3 + 2abx^2 + x^4 + x^2b^2 - 2x^3b \\ &\quad - 2ax^3 - 4a^2xb + 4a^2x^2 - 2ab^2 + 4ax^2b \\ \sqrt{+x^4 + 4x^2a^2 - 4ax^3}[-2x^3 + 6ax^2 - 4a^2x + x^2 - 2a] &= \odot \wedge \mathbb{D}. \\ 2ax - x^2 &= \odot^2. \end{aligned}$$

$$\text{Ergo } ME = \frac{\sqrt{x^4 + 4x^2a^2 - 4ax^3}}{2ax - x^2 - \sqrt{x^4 + 4x^2a^2 - 4ax^3}} = ME = \frac{\sqrt{x^2 + 4a^2 - 4ax}}{2ax - x - \sqrt{x^2 + 4a^2 - 4ax}}, \text{ seu } ME = \frac{x - 2a}{2}$$

$$(b) ME = \frac{\odot \wedge \mathbb{D}}{\odot^2 - \odot \wedge \mathbb{D}}. \text{ Ergo } \frac{1}{ME} = \frac{\odot^2 - \odot \wedge \mathbb{D}}{\odot \wedge \mathbb{D}}. \text{ Ergo } \frac{1}{ME} = \frac{\odot}{\mathbb{D}} - 1. (2) \wp = \odot. L$$

$$3 \text{ ME} \wedge \mathbb{D}. \text{ Ergo (1) } \cancel{ME^2 zax} - \cancel{ME^2 x^2} = 2ax - 2ab - x^2 - b^2 + 2xb + \cancel{2ME^2 ax} - 2ME^2 ab - \cancel{ME^2 x^2} - ME^2 b^2 + 2EM^2 xb. \text{ Ergo } 2ax - 2ab - x^2 - b^2 + 2xb - 2ME^2 ab - ME^2 b^2 + 2EM^2 xb = 0. (2) ME^2 \wedge \odot^2 L 9 \text{ qui neque (1) a (2) b habent } L$$

2 Ergo ... = 1.: Auf der linken Seite der Gleichung müsste das Vorzeichen vertauscht werden. Leibniz rechnet mit dem Fehler konsequent weiter. 8 a Wallisio: *Epitome binae methodi tangentium*. In: *Philosophical Transactions* VII Nr. 81 vom 25. März/4. April 1672, S. 4011. Leibniz paraphrasiert, s. insbesondere Z. 9 (Variante) und S. 662 Z. 8, wo Leibniz die Wallis'sche infinitesimale Einheit  $a$  nennt.

Breviter: Wallisius alia licet via, aliisque ratiocinandi loquendique modis, in eandem ante me methodum incidit. Etsi ego id minime observassem, donec non constituissem tantum, sed et iam in parabola confirmassem, et video parabolae exemplo et Wallisium usum, quippe admodum expedito.

- 5 Sed magna iam quaestio est an hac methodo datis intervallis tangentium aut perpendicularium ab applicata in altitudine sumtis, inveniri possint applicatae. Hic puto assumi debere duo intervalla pro una applicata, ut antea duae applicatae pro una tangente.

$$\langle \text{Iam} \rangle \frac{a}{b} [=] \frac{NF}{KL = 1} = \frac{FH}{LH} \cdot \frac{ME}{HI = b = 1} = \frac{FH + ID}{ID} = \frac{FH}{ID} + \frac{ID}{ID} (= 1).$$

$$ME \wedge ID = FH (+ID). NF \wedge LH = FH. \text{ Ergo } ME \wedge ID(+ID) = NF \wedge LH.$$

- 10 Ergo  $\frac{ME}{NF} = \frac{LH}{ID}$ . Inventa ergo est ratio  $LH$  ad  $ID$ .

Ergo et  $ID$  ad  $IP = ID$  ad  $LH = ME$  : ad  $NF$  :

Ergo data applicata una  $GK$ , aliaque  $FL + LH$ . dabitur tertia  $ED = GK + LH + ID$ .

Porro  $DQ$  dabitur absolute, quam  $\frac{DQ}{HI} = \frac{DP}{IP}$ . cognitis, datur iam  $HI$ . quippe 1,

ergo datur  $DQ = \frac{DP}{IP}$ . Iam  $\frac{MN}{QD} = \frac{MH}{HD} = \frac{ME}{HD} = \frac{ED}{ID}$  cognita.  $\frac{ED}{ID} = \frac{ME}{HI} = ME$ .

- 15 nota est, item  $\frac{FH}{LH} = NF$ . Ergo nota  $\frac{\frac{ID}{FH}}{\frac{ED}{LH}}$  seu  $\frac{ED \wedge LH}{FH \wedge ID} = \frac{ME}{NF}$ . Quae dividantur per

10 Dazu: male

$$14 \quad \text{Unter dem zweiten } \frac{ED}{ID} : \quad \left( \frac{ED}{ID} = ME \right)$$

$$8 = \text{erg. Hrsg.} \quad 8 = \frac{FH}{ID} + \frac{ID}{ID} (= 1) \text{ erg. L} \quad 9 (+ID) \text{ zweimal erg. L}$$

8–663,7 Die folgende Betrachtung enthält mehrere Fehler bzw. Verschreibungen. Den Hauptfehler nennt Leibniz selbst; er versucht zunächst zu verbessern, begnügt sich dann aber mit bloßen Vermerken.

11  $ME$ : bedeutet hier  $\frac{1}{ME}$ .

notum  $\frac{LH}{ID}$ . fiet nota tandem ratio  $\frac{ED}{FH} = \frac{ME}{NF}$ . ac proinde constructio applicatarum, ex data ratione productarum.

Ut rectam  $EM$  productam, ita rectam  $ER$  reductam appellare possis, rectam  $RM$  secantem,  $RD$  radium,  $EB$  sinum complementi.

Hac methodo inverso modo investigare queas tangentem, datis applicatis, in quibus nota primum  $\frac{ED}{FH}$ . et  $\frac{ED}{ID}$ . et  $\frac{FH}{LH}$ . Ergo et  $\frac{LH}{ID} = \frac{ME}{NF}$ .

Eodem modo ex data  $ER$  caetera investigabuntur.

⊕ Vera methodus ex data producta inveniendi applicatam.

Sunto duo latera inassignabilia curvae, sibi proxima  $KH$ .  $HD$ .  $\langle---\rangle$  duo tangentes in  $H$  se secantes  $NH$ .  $MD$ . tresque applicatae, ad totidem duorum laterum extrema puncta  $K$ .  $H$ .  $D$ .  $\langle$ descriptae $\rangle$   $GK$ .  $FH$ .  $ED$ . ex quibus  $FH$  attingit tangentem utramque in punto intersectionis earum  $H$ . Reliquae dueae applicatae producantur, ab una tangente ad alteram,  $GK$ . donec tangentia  $MH$  occurrat in  $S$ . et  $ED$  producatur, donec tangentia  $NH$  producto occurrat in  $P$ .

Iam suppono notam esse rectam  $AG$  eiusque infinitesimam  $GF = a = \langle b \rangle = FE$  vel  $HI = 1$ . est enim unitas constructionis. Suppono et notam esse rectam  $FN$  vel  $GN$  non minus ac  $EM$ . Nam ex cognita progressione seu loco productarum, quaeritur locus applicatarum seu figura ipsa. Constat etiam, quemadmodum  $ST$  est  $= HI$ , ita  $TH$  esse  $= ID$ , et  $SH = HD$ .

Cumque sit:  $\frac{LH}{FH} = \left[ \frac{1 = KL}{NF} \right]$ . erit  $(LH) = \frac{FH}{NF}$ . et eodem modo  $\frac{ED}{ME} = (ID)$ .

Porro  $IP = LH$  (quia  $KL = HI$ , unde et  $KH = HP$ ). Ergo  $(DP =) LH - ID = \frac{FH}{NF} - \frac{ED}{ME}$ . Ergo posita  $FH$  applicata velut cognita, cuius iam sequens  $ED$  indaganda

1 Zu ratio: inutiliter[,] bis utimur eadem aequatione[,] seu  $\frac{ME}{NF} \times \frac{NF}{ME} = 1$ .

15–22 Daneben, durch Trennstrich abgesetzt:  $\frac{3}{1} - \frac{3}{5} = a$ .  $3 = a \wedge 1 - 5$ . (!)

$a = \frac{12}{5}$ .  $\frac{12}{5} \wedge 1 - 5$  fit  $\frac{12}{5} - 12$ .

3 Ut rectam (1) AM (2) EM L      20  $\frac{1 = ST}{MF}$  L ändert Hrsg.

est, constat esse  $\frac{EP}{EN} = \frac{FH}{FN}$ . seu  $EP = \frac{EN \cap FH}{FN}$ . et  $ED$  esse  $EP - DP$ . erit

$$ED = \frac{EN \cap FH}{FN} - \frac{FH}{NF} + \frac{ED}{ME}.$$

Ergo  $ED - \frac{ED}{ME} = \frac{EN \cap FH}{FN} - \frac{FH}{NF} = \frac{ME \cap ED}{ME} - \frac{ED}{ME}$ .

Ergo  $\frac{\frac{EN \cap FH}{FN} - \frac{FH}{NF}}{1 - \frac{1}{ME}} = \frac{EN - 1 \cap \frac{FH}{FN} \cap ME}{ME - 1} = ED$ .

5 Utile est autem ipsam [FH] applicatam datam, supponere aequalem ipsi [AF] abscissae, ad inchoandum applicatarum calculum, quoties aequationem figurae, seu calculum applicatarum quaerimus.

Figurae sunt loci applicatarum. Alioquin fieri potest ut v. g. circulus sit locus applicatarum hyperbolae si considerentur ut chordae, hyperbola vel ellipsis locus applicatarum 10 trianguli si considerentur ut reductae, parabola locus applicatarum parallelogrammi, si functionem reductae facere intelligantur.

Videndum an sint curvae, in quibus nunquam contingit, ut applicata aliqua sit abscissae aequalis vel maior. Nam si aliqua maior est, etiam aliqua aequalis est, cum certum sit semper aliquas esse minores; quare aequalis aliqua inter maiores et minores.

15 Sed ut aequationem coeptam absolvamus, datur ratio  $EN$  ad  $ME$ . ergo  $ME$  appellenus  $\beta EN$ . Datur et ratio  $FN$  ad  $ME$ . ergo idem  $ME$  alias appellabimus  $\gamma FN$ . Fiet ergo aequatio haec ex praecedente:

$$\frac{EN \cap FH}{FN} - \frac{FH}{FN} = \frac{\beta EN \cap ED}{\gamma FN} - \frac{ED}{\gamma FN}.$$

ergo  $EN \cap FH - FH = \frac{\beta EN \cap ED}{\gamma} - \frac{ED}{\gamma}$ . et  $\frac{EN \cap FH - FH}{\frac{\beta EN}{\gamma} - \frac{1}{\gamma}} = ED$ .

---

14 Über aliquas:  $\mathfrak{A}$

5 ipsam (1) ED (2) EH L ändert Hrsg. 5 AE L ändert Hrsg. 9 vel ellipsis erg. L

---

8 Alioquin: Zum Kreis s. o. S. 660 Z. 19; zu Hyperbel und Ellipse vgl. N. 35 S. 584 Z. 10 f.

Sed his ambagibus non est opus, sufficit ex aequatione superiore dicere:

$$\frac{\frac{EN \wedge FH}{FN} - \frac{FH}{FN}}{1 - \frac{1}{ME}} = ED.$$

Unde notari potest, quoties ex aliis linearum in figura data functiones facientium generibus assumtis, applicatae quaeruntur, unam semper applicatam ponendam velut assumtam, et sequentem velut quaequitam. Quodsi enim ex una quadam applicata assumta proxime sequens aut antecedens determinari potest figura geometrice, id est per omnia puncta describi ac determinari potest.

5

Unum annotandum est, antequam hinc abeamus, ipsam  $DP$  ( $= LT = KS$ ), item ipsam  $QD$  et  $QP$  esse ipsis infinite parvis, ut  $HI$ , infinites minores. Nam cum triangula

$MNH$  et  $DQH$  sint similia, erit  $QD = \frac{MN \wedge HD}{MH}$ . Iam  $MN$  est linea infinite parva

10

eiusdem dimensionis cum  $FE$ . Saepe enim fit, ut  $MN$  sit  $= FE$ . ut in parabola, aut proportionale, ut in paraboloidibus aut hyperboloidibus; semper ut sit eiusdem dimensionis. Et certe si  $MN$  esset linea finita, seu assignabilis, non posset intelligi  $NH$  et  $MD$  eiusdem puncti tangentes esse, quod tamen supponimus, et si id punctum rursus cogitatione in partes, quibus certe non caret, discernamus. Lineam autem infinite parvam  $MN$  per aliam lineam infinite parvam eiusdem dimensionis  $HD$  multiplicari at per infinites maiorem seu assignabilem  $MH$  dividi, est eam reddi infinites infinite parvam, seu subcubicam.  $HD$  autem infinite parvam eiusdem dimensionis cum  $MN$  patet, quia est eiusdem dim. cum  $HI$ . quod ostendo, quia  $ME : ID :: MH : HD$  [sic!]. Iam si

15

3 in figura ... facientium erg.  $L$       10  $\frac{MN \wedge HD}{MH}$ . (1) (at) (2) aliquot (3) infinite parvo, | ut  
 MN nicht gestr. | (a) id enim suppono esse (b) homo (4) Iam (a) punctum (b) MN  $L$       18 seu (1)  
 subquadraticam (2) subcubicam  $L$

---

18 subcubicam: In der Variante steht richtiger subquadraticam, genauer handelt es sich um Unendlichkleine zweiter Ordnung.    19 quod ostendo: Der Beweisversuch geht fehl, die Aussage hingegen ist richtig.

*QD* infinites infinite parva, ergo talia erunt etiam *QP* et *DP* quae eiusdem dimensionis, quia sunt proportionales lineis eiusdem dimensionis, nam  $\frac{QD}{HI} = \frac{QP}{HP} = \frac{DP}{IP}$ . Sunt autem lineae *HI*. *HP*. *IP*. eiusdem dimensionis, quia lineis *NE*. *NP*. *EP*. quas eiusdem dimensionis, quippe assignabiles finitas esse, ex constructione constat, sunt proportionales, nam  $\frac{HI}{NE} = \frac{HP}{NP} = \frac{IP}{EP}$ . Regula autem quod quantitates quantitatibus eiusdem dimensionis proportionales sint eiusdem dimensionis inter se, manifesta, aut certe facilis demonstratu est.

Notabilis est haec doctrina de linearum dimensionibus. Sunt enim lineae variarum dimensionum, prout sunt inassignabiles infinitae, aut infinite parvae. Sunt enim 10 quae quadratis cubis etc. Sunt contra quae radicibus quadraticis cubicisque linearum finitarum assignabilium comparantur.

Invenimus (vide pag. seq. versam sub signo ⊙) modum ex datis productis inveniendi applicatas. Nunc operae quoque pretium est invenire applicatas ex datis 15 redditis. Facilis autem processus est priore invento, fere enim tantum pro punctis *N* et *M* substituuntur puncta *R* et *U*, ducta perpendiculari *RD* ad tangentem *MD* et perpendiculari *UH* ad tangentem  $\langle NH \rangle$ . Quare utile erit praecedentem processum hoc loco relegere, et ea tantum notare in quibus hic variatur, ne bis eadem dicere necesse sit.

1 Zu *QD* auf der Gegenseite, gestr.:

$$EP = FH \cap \frac{EY}{FR}. \quad QD = \frac{DP = LH - ID}{LH}. \quad \text{Ergo } QD = 1 - \frac{ER}{ED \cap LH}. \quad \text{Idem } QD = NE \cap \frac{DP = EP - ED}{EP}. \quad \text{Ergo } QD = NE \cap 1 - \frac{ED \cap FR}{FH \cap EY} = 1 - \frac{ER}{ED \cap LH}. \quad \text{Ergo } \frac{ER}{ED \cap LH} = ED^2 \cap \frac{FR}{FH \cap EY}. \quad \text{seu } \frac{ER \cap FH \cap EY}{LH \cap FR} = ED^2. \quad \text{et quia } LH = \frac{FU}{FH}. \quad \text{fiet: } \frac{ER \cap FH^2 \cap EY}{FU \cap FR} = ED^2.$$

12 vide: s. o. S. 663 Z. 8.

Igitur, cum  $\nabla^{\text{lum}} KLH$  sit simile  $\nabla^{\text{lo}} HFU$ . erit:  $LH = \frac{FU}{FH}$ . et  $ID = \frac{ER}{ED}$ . et  
 $DP = \frac{FU}{FH} - \frac{ER}{ED}$ .

((Iam assumo  $FH$  velut notam, et invenio  $EW = \frac{FH \wedge EU}{FU}$ . Iam  $WI = \frac{EW}{EU}$ .

Ergo  $WI = \frac{FH \wedge EU}{\frac{FU}{EU}}$ . Ergo  $WI = \frac{FH}{FU}$ . Porro  $WI \wedge IP = 1$ . et  $IP = ID + DP$ .

ergo  $WI \wedge ID + WI \wedge DP = 1$ . Ergo  $\frac{FH \wedge ER}{FU \wedge ED} + 1 - \frac{FH \wedge ER}{FU \wedge ED} = 1$ . Recte id quidem 5  
 sed nullo fructu, cum sit aequatio inter eadem, nota tamen est calculi veri. Porro cum  
 cognitae sint rectae  $FH$  et  $FU$ . cognita etiam erit recta  $HU$ . sed de ea non est cur  
 laboremus.))

Ducatur recta  $PY$  parallela  $HU$ . Cum sit  $KH = HP$ . erit  $RU = RY$ . et ob triangula 10  
 similia  $HFU$  et  $PEY$ , fiet

$$EP = \frac{FH \wedge EY}{FR} = FH + LH = FH + \frac{FU}{FH}.$$

et  $ED = EP - DP = \frac{FH \wedge EY}{FR} - \frac{FU}{FH} + \frac{ER}{ED}$ .

((Ergo  $ED - \frac{ER}{ED} = \frac{FH \wedge EY}{FR} - \frac{FU}{FH}$ . Ergo  $ED^2 - ER = \frac{FH \wedge EY \wedge ED}{FR} - \frac{FU \wedge ED}{FH}$ .

$(ED^2 = \frac{ED \wedge FH \wedge EY}{FR} - \frac{ED \wedge FU}{FH} + ER)$ . Ergo  $ED^2 - \frac{ED \wedge FH \wedge EY}{FR}$  [+] 15

$\frac{ED \wedge FU}{FH} = ER$ . Eadem  $ED = FH + ID$ . et  $ID = \frac{ER}{ED}$ . Ergo  $ED = \frac{ER}{ED} + FH$ .

Ergo  $ED^2 = ER + FH \wedge ED$ . Habemus ergo

$$\cancel{ER} + FH \wedge ED - \frac{ED \wedge FH \wedge EY}{FR} [+] \frac{ED \wedge FU}{FH} = \cancel{ER}.$$

5 = 1. (1) ergo  $FH^2 = FU^2$ . seu  $FH = FU$ . quod est absurdum, errorem ergo calculo inesse  
 necesse est. Ergo (2) Recte  $L = 11$  f.  $\frac{FU}{FH}$ . | An ergo breviter: si applicata cognita per suam reductam  
 dividatur, habebitur differentia eius a proxime maiorem. Eodem modo fere breviter de reducta, ut adeo  
 alii ambagibus non sit opus, si modo unam applicatarum velut cognitam assumere licet. *gestr.* | et  $L$   
 14+17 Vorzeichen ändert Hrsg. zweimal

11 In der ersten Teilgleichung der Kette müsste es im Nenner anstatt von  $FR$  vielmehr  $FU$  heißen.  
 Das Versehen wirkt sich bis S. 671 Z. 9 aus.

Nullum hinc, potius hoc consideremus:  $HX = RU \cap \frac{HO}{[OU]}$ . sed nihil hoc ad rem.))

Tandem cogitemus ob  $\nabla^{\text{la}}$  sim.  $HIP$  et  $QDP$  esse

$$QD = \frac{DP = LH - ID}{LH} = 1 - \frac{ER}{ED \cap LH}. \text{ Iam assumta } NE \text{ pro cognita, ideo ob}$$

5  $\nabla^{\text{la}}$  similia  $NEP$  et  $QDP$  fiet:

$$QD = \frac{NE \cap DP = EP - ED}{EP} = NE - \frac{ED \cap NE}{EP = FH + LH}.$$

Ergo  $1 - \frac{ER}{ED \cap LH} = NE - \frac{ED \cap NE}{FH + LH}$ . (seu  $NE - \frac{ED \cap NE \cap FR}{FH \cap EY}, + \frac{ER}{ED \cap LH} = 1$ .)

vel  $NE - \frac{ED \cap NE}{FH + LH} + \frac{ER}{ED \cap LH} = 1$ . et quia  $ED = \frac{FH \cap EY}{FR} - \frac{FU}{FH} + \frac{ER}{ED}$ . seu  $c + \frac{ER}{ED}$ .

ideo  $\frac{ED \cap NE}{FH + LH} = \frac{c \cap NE + NE \cap \frac{ER}{ED}}{FH + LH}$  seu  $g + \frac{h}{ED}$ . (ut brevitatis) causa facio (c. g.)

10  $h$ . in cognitarum locum substitutis.

Iam ergo:  $NE - g - \frac{h}{ED} + \frac{ER}{ED \cap LH} = 1$ . Ergo  $\frac{ER}{ED \cap LH} - \frac{h}{ED} = 1 + g - NE$ . Ergo

$$\frac{1}{ED} = \frac{1 + g - NE}{\frac{ER}{ED} - h}. \text{ Ergo denique } ED = \frac{\frac{ER}{ED} - h}{1 + g - NE}. Q.E.F.$$

Quod si recedere, id est ex applicata data proxime minorem quaerere velimus, patet  $GK$  facile haberi, cum sit  $FH + LH$ . quae cognita sunt. Eodem modo  $GS$  ex inventa aut 15 data  $ED$  innotescit, nam differentia inter  $ED$  et  $GS$  perinde innotescit, ut  $LH$  differentia inter  $FH$  et  $GK$ , vel aliter etiam sed longiori ambage, supposita scilicet non tantum  $ED$  sed et  $FH$  cognita, data enim  $ED$  pariter et  $FH$  datur  $EP$ . est autem  $DP = KS$ . quod addatur ad  $GK$  iam notam ex posita sola  $FH$ . (Idemque aliter si ab  $ED$  subtrahatur bis  $ID$ , seu 2  $ID$ , quia  $ID = HT$ . fiet  $GS$  vel  $FH - ID = GS$ .) Ex his intelligi potest, cum 20 duplici modo inveniatur  $GS$ . partim ex posita sola  $ED$ . partim ex positis  $ED$  et  $FH$  simul. Hinc si ipsa  $ED$  incognita intelligatur, patet aequationem haberi ad ipsam  $ED$

1 HU  $L$  ändert Hrsg. 8  $\frac{ER}{ED}$ . (1) Ergo haec omnia  $\cap$  per  $LH \cup ER = (2)$  seu  $L$

inveniendam utilem, supposita ea velut cognita, et ipsa  $GS$  bis investigata. Quod statim comprobemus.

Cum cognita sit  $ER$  posita etiam  $ED$  velut cognita, habemus etiam  $EM = \frac{ED^2}{ER}, -2 = GM$ . Iam ob  $\nabla^{la}$  similia  $MGS$  et  $MED$ . erit

$$GS = \frac{ED \cap MG}{ME} = \frac{ED \cap \frac{ED^2}{ER} - 2 ED}{\frac{ED^2}{ER}} = \frac{ED^2 - 2 ER}{ED} = ED - \frac{2 ER}{ED} = GS. \quad 5$$

Unde illud tantum sequitur  $ED - GS = \frac{2 ER}{ED} = 2 ID$  ac proinde  $ID = \frac{ER}{ED}$ . (Quod iam ante habuimus, ut pateat veritas calculi, et resolutio aequationis huius in priorem.)

Inventa iam  $ID$ . datur  $FH$ . qua tamen nondum in hac aequatione usi sumus. Ergo  $ED - \frac{ER}{ED} = FH$ . Sed quia  $ED$  hoc modo replicatur in se ipsam et quidem partim per multiplicationem partim per divisionem, ideo nondum hinc absoluta aequatio est. Nam si sic fuisset  $ED - \frac{ED}{ER} = FH$ . habuissemus aequationem  $ED = \frac{FH}{\left[1 - \frac{1}{ER}\right]}$ . et tali

methodo paulo ante cum ex productis applicatas investigaremus, usi sumus. Nunc vero porro eundum est.

Iam  $GS = GK + KS$ . Et  $GK = \frac{FH \cap NG}{NF}$ . Ergo

$$\overbrace{ED - \frac{2 ER}{ED}}^{GS} - \frac{FH \cap NG}{NF} = KS = DP; +ID \left( = \frac{ER}{ED} \right) = LH = \frac{FU}{FH}. \quad 15$$

Ergo  $ED - \frac{ER}{ED} = \frac{FU}{FH} + \frac{FH \cap NG}{NF}$ .

((Ergo  $ED^2 - ER = \frac{FU \cap ED}{FH} + \frac{FH \cap NG \cap ED}{NF}$ . quia autem  $FH = ED - \frac{ER}{ED}$ . erit

11 1 – ER L ändert Hrsg.

---

14–671,7 Im Folgenden versucht Leibniz zweimal, die Größe  $ED$  zu bestimmen. Dies gelingt nicht, da Leibniz die (unrichtige) Ausgangsgleichung von S. 667 Z. 12 bzw. S. 668 Z. 12 zugrundelegt, und bei demale zusätzliche Rechenfehler hinzukommen.

$$\frac{FU \wedge ED}{FH} = \frac{FU \wedge ED}{ED - \frac{ER}{ED}} = \frac{FU}{1 - \frac{ER}{ED^2}}. \text{ et } \frac{FH \wedge NG \wedge ED}{NF} = \frac{ED^2 \wedge NG - ER \wedge NG}{NF}.$$

 $\odot$  $\mathbb{D}$ 

$$\text{Ergo } ED^2 = ER + \odot + \mathbb{D}. \text{ Ergo } ED^2 - \frac{FU}{1 - \frac{ER}{ED^2}} - \frac{ED^2 \wedge NG}{NF} = ER [-] \frac{ER \wedge NG}{NF}).)$$

$$\text{Iam ex inventa supra aequatione } \frac{ER}{ED} = \frac{ER}{\frac{FH \wedge EY}{FR} - \frac{FU}{FH} + \frac{ER}{ED}} = \frac{ER}{ED}. \text{ Sed haec non-}$$

5 dum satis proclivia ad reductionem, nisi invertas.

$$(?) \frac{\frac{FH \wedge EY}{FR} - \frac{FU}{FH}}{ER} + \frac{\left(\frac{ER}{ED}\right)}{ER} \frac{1}{ED} = (4) \frac{1}{\frac{FU}{FH} + \frac{FH \wedge NG}{NF}, -ED}.$$

seu  $\wp + \frac{1}{ED} = \frac{1}{\frac{1}{4} - ED}$ . multiplicatis omnibus per  $ED$  fiet:  $\wp \wedge ED + 1 = \frac{ED}{\frac{1}{4} - ED}$ .

Ergo  $\wp \wedge ED \wedge \frac{1}{4} - \wp \wedge ED^2 + 1 = ED$ . sed nulla ex his reductio.

Unde patet si eadem data paulo aliter tractentur omnem saepe reductionem impediri,  
10 quae alias facilis est. Quod in regulas fortasse cogi posset, sed quas hactenus apud neminem invenio. Ratio huius rei esse videtur, inter caetera, quod per binomia dividere non possumus ut de extractione radicum nihil dicam. Videndum an quadratura hyperbolae, et constructio logarithmorum geometrica huic malo remedium afferant.

Sed nos hoc loco inventa solutione possumus esse contenti. Tantum  $h$  et  $g$  explicabimus in aequatione supra inventa. Ergo:

3 +  $L$  ändert Hrsg. 4 (1) Quam aequationem reducemos ut ante pro  $ED$  (2) Iam  $L$  4  $\frac{ER}{ED}$ .

(1) Iam  $ED - \frac{ER}{ED} = \frac{ED^2 - ER}{ED}$ . (2) Sed  $L$

$$\begin{aligned}
ED &= \frac{\frac{ER}{FU} - \frac{NE \wedge ER}{FH, \wedge LH \left( = \frac{FU}{FH} \right)}}{\frac{FH \wedge EY \wedge EN}{FR} - \frac{FU \wedge EN}{FH}} \\
&= \frac{\frac{ER \wedge FH}{LH} - \frac{NE \wedge ER \wedge FH}{FH \wedge EY \wedge EN}}{1 + \frac{FR}{FH \wedge FU} - \frac{EN}{FH}} \\
&\quad \overbrace{\frac{FR \wedge FU + FH \wedge EY \wedge EN}{FR \wedge FU} + \frac{EN}{FH}} \\
&= \frac{\frac{ER \wedge FH \wedge FU - NE \wedge ER \wedge LH}{LH \wedge FU} = \frac{FU^2}{FH}}{\frac{FR \wedge FU \wedge FH + FH^2 \wedge EY \wedge EN + EN \wedge FR \wedge FU}{FR \wedge FU \wedge FH}} \\
&= \frac{\frac{ER \wedge FH^2 \wedge FU \wedge FR - NE \wedge ER \wedge LH \wedge FR \wedge FH}{FR \wedge FU^2 + \underbrace{FH \wedge EY \wedge EN \wedge FU}_{FH}} + \frac{EN \wedge FR \wedge FU^2}{FH}}{5}
\end{aligned}$$

Hoc videtur tuto reici posse, cum divisio per ipsum faciat nimis parvum, at divisio per reliqua producit differentiam duorum planorum proximorum, id est lineam.

Nota producta ex lineis per lineas assignabilem differentiam habentes divisis, eiusdem sunt dimensionis cum differentiis linearum inassignabilibus.

[Zusätze auf Bl. 1v°]

10

*Zusatz 1:*


Nota si qua figura describi non possit geometrice ut figura sinuum circuli aut figura sinuum parabolae ad arcum, possint tamen omnes eius portiones abscissae quadrari. Tunc hac ipsa methodo tangentium etiam descriptio eius geometrica, seu ductus eius tangentium applicatarumque omnium inveniri potest, descripta earum figura quadratrice, et ductis lineis datis functionem obtinentibus; ergo hae omnes applicatae duci poterunt. 15

Praecaeteris utile est methodum adhibere in qua functionem facientes sunt applicatarum partes. Ex hac autem geometrica hoc modo mechanicarum alioquin linearum descriptione quadratura curvilinearum ex quibus pendent sequitur.

Quod si aliqua abscissarum portionum tantum quadrari potest, ut in cycloide (ex-  
5 emto semicirculo) seu figura arcum, portio sectione per medium abscissa, aut altera cuius quadraturam invenit Hugenius, etiam illa pars tantum describi poterit, id est recta inveniri poterit, arcui quadrantis aequalis, non arcubus omnibus, ex istius quidem figurae quadratura.

*Zusatz 2:*

10 An si logarithmi construi possint geometrice ex data ratione partium possit inveniri ratio totorum, v. g.  $\frac{a}{x}$  et  $\frac{a}{y}$  datis invenire  $\frac{a}{x+y}$ . Seu si sit  $\frac{a}{a+b}$ , an haec fractio possit a binomio liberari. Quod videtur sequi ex quadratura hyperbolae. Sufficit autem a binomio ⟨liberari⟩ aut in plures numero fractiones resolvi, dummodo eae non sint numero infinitae, nec ulla ⟨fractionum⟩ binomio ⟨affecta⟩.



15

[Fig. 2]

Datur ratio  $\frac{ABDA}{ABCD} = \frac{AFB + BFDA}{ABC + ADCA}$ . Datur et ratio  $\frac{AFB}{ABC}$ . Sed nondum tamen datur ratio  $AFDA$  ad  $ADCA$ , nam si daretur[,] eadem ratione porro concluderem addendo  $A[B]F$  ad  $AFDA$  et  $ABC$  ad  $ADCA$ , cum nota sit ratio  $A[B]F$  ad  $ABC$  et, ex

18–673,2 E L ändert Hrsg. viermal

---

4 in cycloide: s. N. 17 S. 344 Z. 2 – S. 346 Z. 2 sowie Chr. HUYGENS, *Horologium oscillatorium*, 1673, S. 79 (HO XVIII S. 205); vgl. auch LSB III, 1 N. 29 (Leibniz für [Huygens?], vermutlich Sommer 1674) S. 115 f. und N. 30 (Leibniz an Oldenburg, 15. VII. 1674) S. 119 f.

hypothesi  $AFDA$  ad  $ADCA$ , ideo etiam notam fore

$$\frac{A[B]F + AFDA = A[B]DA}{ABC + ADCA = ABCD}.$$

Data autem ratione alicuius segmenti seu noti sectoris, ad circulum, datur et ratio segmenti ad suum sectorem, et proinde quadratura eius sectoris seu circuli ex his positis daretur.

5

Definita tamen res est fateor. Satis enim patet ex datis partium rationibus determinari et rationes totorum. Quod statim experiri licet, quoties in numeris dantur, ex illis enim possumus colligere quantitatem totorum.

Quod si hoc unum ad Gregorii a. S. Vincentio quadraturam desiderabatur, et ex hyperbolae quadratura effici potest,  $\langle$ daretur nobis $\rangle$  quadratura circuli ex nota hyperbolae quadratura.  $\langle$ Sed omnium $\rangle$  portionum abscissarum  $\langle$ quadratura $\rangle$  non ideo daretur  $\langle\rightarrow\rangle$  sectione angulorum universali  $\langle\rightarrow\rangle$ .

10

---

<sup>9</sup> hoc unum: s. Chr. HUYGENS, *Theorematum de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli ... Quibus subiuncta est Ἐξέτασις cyclometriae ... Gregorii a S. Vincentio*, 1651 (HO XI S. 281–337, insbesondere S. 319–329).

40<sub>2</sub>. PLAGULA SECUNDA

August. 1673.

Methodus tangentium inversa seu De functionibus.  
Pars 2 da

5 Ostendi folio de functionibus, id est parte prima (ubi figura m inspice) *ED*, applicatam quaesitam, data *FH* praecedente, datisque duabus productis *FN* et *EM* inveniri posse.

Exempli causa: Esto locus productarum, triangulum, et producta  $2x$ . posita  $x$  abscissa *AF*. erit  $AE = x + 1$ . et  $ME = 2x + 2$ . *FH* esto  $y$ .  $EF = FG$  etc. = 1. erit  
10  $EN = FN + 1 = 2x + 1$ .  $FM = 2x + 1$ .

$$\text{Aequatio autem illi c inventa est haec: } ED = \frac{EN - 1. \cap \frac{FH}{FN}, \cap ME}{ME - 1.}$$

Caeterum semper verum est  $EN$  esse =  $FN + 1$ . quaecunque sit figurae species, fiet ergo:  $EN - 1. = FN + 1. - 1. = FN$ . et  $EN - 1. \cap \frac{FH}{FN} = FN \cap \frac{FH}{FN} = FH$ .

$$\text{fietque } ED = \frac{FH \cap ME}{ME - 1.} = \frac{FH \cap ME}{FM} = \frac{y \cap 2x + 2}{2x + 1.} = y \cap 1 + \frac{1}{2x + 1.} = y + \frac{y}{2x + 1.}$$

15 differentia:  $\frac{y}{2x + 1.} = \frac{ED \cap 1}{[EM]}$ .

$$\sqrt{ax + a} - \sqrt{ax} = \frac{\sqrt{ax}}{2x + 1}. \text{ Ergo } ax + a + ax - 2\sqrt{a^2x^2 + a^2x} = \frac{ax}{4x^2 + 1 + 4x}.$$

12–15 NB. ex his intelligitur frustra introductam duplicem tangentem, cum ea rursus e medio tollatur.

5 functionibus, | (1) quod inscriptum Methodus tangentium inversa seu de functionibus. August. 1673. (2) id est parte prima erg. | (ubi *L* 12 (1) quae ex hypothesi assumti trianguli | valorumque *FN* et *ME* erg. | reformata, dabit: (2) Caeterum *L* 15 FM *L ändert Hrsg.*

16–675,18 In den folgenden beiden Rechnungen begeht Leibniz einige Flüchtigkeiten (z. B. sollte es ab S. 675 Z. 12 anstelle von  $\frac{a^2}{16x}$  durchweg  $\frac{a^2}{16x^2}$  heißen), diese haben aber keinen Einfluss auf die Schlussbemerkung.

Ergo  $2ax + a - \frac{ax}{4x^2 + 1 + 4x} = 2\sqrt{a^2x^2 + a^2x}$ , quadrataque utraque aequationis parte:

$4a^2x^2 + 4a^2x - \frac{4a^2x^2}{4x^2 + 1 + 4x} + a^2 - \frac{2a^2x}{4x^2 + 1 + 4x} = 4a^2x^2 + 4a^2x$ . Reiectisque utrobique

$4a^2x^2 + 4a^2x$ , fiet:  $a^2 = \frac{4a^2x^2 - 2a^2x}{4x^2 + 1 + 4x}$ , fietque  $4x^2a^2 + a^2 + 4xa^2 = 4a^2x^2 - 2a^2x$ ,  $a^2 +$

$6a^2x = 0$ . Quod cum sit absurdum, hinc dignosci potest, errorem alicubi in calculo latere.

Imo minime, ut post dicetur.

5

Si simpliciter ex data  $MG$ ,  $GS$ ,  $ST$ , invenire velimus  $FH$ , ita procedi potest, cum sit  $\frac{TH}{ST} = \frac{GS}{MG}$ , erit  $TH = \frac{GS \wedge ST}{MG}$ , positaque  $GS = y$ ,  $ST = 1$ , et  $MG = 2x$ , fiet:

$TH = \frac{y}{2x}$ , differentia ipsius  $y$  ab applicata sequente. Quod an verum sit statim experiri

possimus in parabola. Posita  $GS = y = \sqrt{ax}$ , et  $FH$  esse  $\sqrt{ax+a}$ , erit  $\sqrt{ax+a} - \sqrt{ax} =$

$\frac{y}{2x} = \frac{\sqrt{ax}}{2x}$ , et quadrata aequatione[:]  $ax + a + ax - 2\sqrt{a^2x^2 + a^2x} = \frac{y^2}{4x^2} = \frac{ax}{4x^2} = \frac{a}{4x}$ .

10

Ergo  $2ax + a - \frac{a}{4x} = 2\sqrt{a^2x^2 + a^2x}$ , ergo quadrata rursus aequatione:  $4a^2x^2 + 4a^2x -$

$a^2 + a^2 - \frac{a^2}{2x} + \frac{a^2}{16x} = 4a^2x^2 + 4a^2x$ . Ergo  $\frac{a^2}{16x} - \frac{a^2}{2x} = 0$ , vel  $\frac{a^2}{16x} = \frac{a^2}{2x}$ , vel  $2a^2x = 16a^2x$ ,

seu  $14a^2x = 0$ . Quod absurdum, et tamen error in calculo latere non potest. Dicendum ergo, sufficere aequationem dimensionum altiorum, minoribus neglectis. Ea vero semper

reperta est, nempe  $4a^2x^2 + 4a^2x = 4a^2x^2 + 4a^2x$ , inferiora ergo ut  $\frac{a^2}{2x}$ , item  $\frac{a^2}{16x}$ , aliaque

15

similia, quae scilicet ad eandem dimensionem non ascendunt, reicienda sunt. Cuius rei

ratio est, quod ipsa hypothesis, quod scilicet in parabola sit  $MG = 2x = 2AG$ , simili

rejectione nata demonstrataque est.

Tota iam quaestio est, quomodo ex datis  $ID$ , seu differentiis duarum applicatarum (huc enim semper reddit constructio), ipsae inveniri queant applicatae. Posita enim ap-

20

plicata minore  $y$ . differentia eius a maiore sequente est  $\frac{y}{MG}$ , ac proinde invenienda est

---

2 An fortasse quae velut inutilia reicimus ad haec ipsa problemata solvenda inser-  
vire possent.

figura, cuius ordinatarum series haec v. g.:

$\frac{y}{2}$ , posita  $x$  minima = 1, et posita  $y$  applicatarum minima, inde  $\frac{y}{2} + \underbrace{\frac{y}{4}}_{\frac{y}{2}}$ , deinde

$\frac{y}{2} + \underbrace{\frac{y}{4}}_{\frac{y}{2}} + \underbrace{\frac{y}{6}}_{\frac{4}{6}}$ , atque ita in infinitum, ita ut problema propositum solvere, sit invenire eiusmodi seriei summam.

5      Terminii ipsi quorum summa quaeritur, seu differentiae sunt hoc loco:  $\frac{y}{2} + \frac{y}{8} + \frac{y}{48} + \frac{y}{384}$  etc, vel  $\frac{y}{1} \frac{y}{4} \frac{y}{24} \frac{y}{192}$  etc, vel divisis omnibus per 4 seriem hanc  $\frac{y}{1} \frac{y}{6} \frac{y}{48}$  et ita porro. Si  $x$  posita fuisset  $\frac{1}{2}$ ,  $2x$  fuisset 1, et habuissemus seriem

$$\frac{y}{1} \frac{y}{2} \frac{y}{6} \frac{y}{24} \frac{y}{[120]} \text{ etc.}$$

Eiusmodi ergo seriei sane admirabilis, semperque variantis, ut nec in aequationem re-  
10 vocari possit, summa iniri potest, ope parabolae, scilicet in infinito, ita enim crescunt differentiae inter parabolae applicatas, scimus enim primam seu minimam eius applicatarum. Sed et differentiarum harum series iniri potest, si  $y$  seu prima assumta ponatur esse linea assignabilis. Atque ita habemus modum aequationes explicandi serierum replicatarum in se ipsum, ut hoc loco  $\frac{y}{MG}$ , quando scilicet  $y$  explicatur per  $x$  et aliud  $y$   
15 praecedens. Sed ubi in seriem res reducta est,  $y$  est semper eadem.

1 In hyperbola primus terminus est  $a^2 = y$ . a quo decrescit, in parabola  $\sqrt{a}$ , a quo crescit.

1 Bei der Berechnung der Reihe verwendet Leibniz irrtümlich die Ordinatendifferenz anstelle der Ordinaten (s. aber unten z. B. S. 683 Z. 7 f.), zudem sind die Umformungen der Reihe nicht ganz korrekt. Die Schlussfolgerungen sind aber im Wesentlichen richtig. Insbesondere erkennt Leibniz den fundamentalen Zusammenhang seiner Reihe mit der der reziproken Fakultäten.

Hoc modo infinitae aliae series haberi possunt, ut si  $MG$  ponatur  $x + \frac{xq^2}{q^2 + x^2}$ , etc.,  
aliisque modis infinitis.

Sed ut datae seriei summa reperiatur, idem est cum problemate, ex dato loco functionum invenire locum ordinatarum.




fig. 1.

$$AM = x. \quad MC = y. \quad PC = s. \quad PA = v. \quad PM = v - x. \quad 5 \\ PC^2 = MC^2 + PM^2, = MC^2 + \underbrace{PA, -AM}_{\square}, \text{ vel } s^2 = y^2 + v^2 + x^2 - 2vx.$$

Ponatur iam  $v = \frac{a}{2} + x$ . erit  $v^2 = \frac{a^2}{4} + x^2 + ax$ . et  $2vx = ax + 2x^2$ .

fiet:  $s^2 = y^2 + \frac{a^2}{4} + x^2 + ax + x^2 - ax - 2x^2$ . fietque  $s^2 = y^2 + \frac{a^2}{4}$ . Quod statim ab initio poterat sine ambagibus dici.

$$\sqrt{ax} = \frac{x^3}{a^2}, \text{ ergo } \frac{y^4}{ax} = \frac{x^6}{a^4}, \text{ vel } \frac{y^4}{x} = \frac{x^6}{a^3}, \text{ vel } y^4 = \frac{x^7}{a^3}, \text{ contra } y^4 a^3 = x^7. \text{ Unde fit} \quad 10 \\ 4y^4 a^3 = 7x^6 l, \text{ eritque } l = \frac{4y^4 a^3}{7x^6}.$$

$$ax^2 - a^3 = y^3, \text{ vel } ax^2 = y^3 + \alpha, \text{ unde } 2axl = 3y^3 + \alpha, \text{ vel } l = \frac{3y^3}{2ax}.$$

12–678,1  $\frac{3y^3}{2ax} \cdot (1) \frac{x^2 a}{2a^2 + y^2} = l$ . reddatur, fiet:  $2a^2 l + y$  (2)  $\frac{y^2 a}{2a^2 + 2x^2} L$

10 Unde fit:  $l$  bezeichnet hier und im Folgenden die nach dem Sluse'schen Verfahren bestimmte Subtangente.

$$\frac{y^2 a}{2a^2 + 2x^2} = l. \quad \frac{2y^2 a^2 + 2y^2 x^2}{x^2 a} [Formel bricht ab]$$

Videtur regressus functionum problema esse quod pertineat ad algebraam illam mirabilem, reflexam in se ipsam de qua et alibi monui. V. g. invenire aequationem, quae certo quodam modo tractata, producat aliquid datum. V. g. aequationem invenire, loci cuiusquam naturam experimentem, in quo differentia inter duo semiquadrata applicatarum, sit data.

Esto  $l$  data:  $\frac{y^2 a}{a^2 + x^2} = l. \quad \frac{\frac{2y^2 a}{2}}{\frac{a^2 + 3x^2}{3}} = l$ , fiet  $la^2 + \frac{3lx^2}{3}$ , et restituto  $x$  in locum

$l$ , abiectisque exponentibus multiplicantibus, fiet:  $a^2 x + \frac{x^3}{3} = \frac{y^2 a}{2}$ . Atque ita exemplum

habemus data functione inveniendi figuram, quod facit, ut nec de reliquis desperem.

Difficultatem mihi pati videtur regula Slusiana quoad regressum in certae cuiusdam speciei aequationibus: v. g. in hyperbola  $y^2 = x^2 - a^2$ . Reiecto  $a^2$  ab aequatione caeterisque ut iubet factis, fiet:  $2y^2 = 2xl$ . fietque  $\frac{2y^2}{2x} = l = \frac{y^2}{x}$ , positoque  $y^2 = x^2 - a^2$ , fiet:  $l = x - \frac{a^2}{x}$ . Quod videtur utique verissimum, sed regressus in his difficilis, videtur tamen agnoscere posse quoniam non potest  $y^2$  esse  $= x^2$ , fieret enim locus linea recta, contra hypothesis, regressus hic foret difficillimus. Eligenda nimur aequatio, quae hoc modo tractata sibi ipsi consentiat. In eo etiam regressus difficilis, quod bis saepe ponendi termini, iidem, qui se non debent mutuo tollere, sed alter eorum abici.

Nota[:] Non tantum hac methodo summae serierum quarundam sane mirabilium haberi possunt, sed et notari potest, figuram ipsam, cuius applicatarum differentia quaeritur, esse aequalem illis differentiis in numeros arithmeticæ progressionis ductis.

Item hoc enuntiandi modo figuræ omnes paraboloides fiunt harmonicae, item omnes hyperboloides.

6 f. data. Invenire l. esto l. data invenienda = L ändert Hrsg.      16 f. In eo . . . abici. erg. L

3 alibi monui: s. z. B. LSB VI,3 N. 41 S. 408.




fig. 2.

Est semper in hyp.  $AM = ML = x$ . Ergo in hyperbola erit

$$\frac{y}{1} \quad a^2 \quad \frac{y}{2} \quad a^2 - 1 \quad \frac{y}{6} \quad a^2 - 2 \quad \frac{y}{24} \quad \frac{y}{[120]} \quad \text{etc.}$$

Ergo hyperbola et parabola omnesque hyperboloeides ac paraboloeides hoc quidem modo[,] si istae series in distantias ipsas, seu  $x$  ducantur[,] videntur homogeneae esse; imo res exactius investiganda. Sequeretur enim inde esse ut sinus angulorum contingentiae; seu ut minimas applicatas. Sed haec accuratius rimanda. Latet enim in his quiddam mirabile.

5

Minima omnium applicata in hyperbola infinite abest. Sed nihil refert, si cum parabola conferri non potest, poterit conferri cum hyperboloeide altiori, quarum omnium quadratura habetur.

Inspice hic figuram 1. Ducatur  $AF$  parallela  $MC$ , et  $FG$  parallela  $AM$ .  $F$  autem est in tangente  $LC$ . Summa omnium  $AF$  ad  $AM$  applicatarum aequatur segmento  $AKCA$  duplicato, ut alibi demonstratum est. Igitur summa omnium  $GC$  aequatur triangulo  $AMC$ . Haec alibi a me inventa ac demonstrata, convertere hoc loco tentemus in rem nostram.

10

---

13 Zur Variante: rectius mox

2  $a^2$ ,  $a^2 - 1$ ,  $a^2 - 2$  erg.  $L$     2 125  $L$  ändert Hrsg.    4 si istae ... ducantur erg.  $L$     8 cum  
(1) paraboloeide (2) hyperboloeide  $L$     13 AMC | duplicato gestr. |. Haec  $L$

Quaeritur figura, cuius producta  $ML$ , sit semper dupla  $AM$ , seu  $2x$ . Manifestum est applicata aliqua posita  $y$ , eius differentiam ab applicata sequenti esse  $\frac{y}{2x}$ . Quare minima applicata posita  $y$ , erit pene minima  $y + \frac{y}{2x}$ , et posita abscissa  $x$ , minima = 1, erit pene minima applicata:  $y + \frac{y}{2}$ . Iam posita  $MC$  applicatarum minima =  $y$ . et  $AM = 1$ . erit

5  $AF = \frac{y}{2}$ . et  $GC = \frac{y}{2}$ . Porro alibi a me demonstratum est omnium  $\frac{MG}{2} = \frac{AF}{2}$  summam aequari segmento  $AKCA$ . Ergo posito  $NG = \frac{AF}{2}$ . summa omnium  $NC$  aequabitur triangulo  $AMC$ . Ergo hoc loco

$$\underbrace{GC = \frac{y}{2} + NG = \frac{y}{4}}_{NC} = \frac{3y}{4}.$$

ductum in  $AM = 1$ . seu  $\frac{3y}{4} \cap x = x$  in  $NC = \frac{3}{4}y$ . triangulo.

9 seu (1)  $\frac{3y}{4} \cap 1 = AMC = \frac{y}{2} \cap 1$  (2)  $\frac{3y}{4} \cap x = (a) AMC = \frac{y}{2} \cap x$  (b)  $x$  in  $L$

7 hoc loco: Leibniz unterscheidet nicht hinreichend zwischen oberer Grenze und Integrationsvariablen; er erhält daher einen Widerspruch, der einen Neubeginn erzwingt.




fig. 3.

Si sit polygonum quotcunque laterum  $AB$ .  $BC$ . etc. sumtaque directrix ad quam latera omnia referantur  $DE$ . Ducatur tangens  $CBF$  quae rectam  $DA$  ipsi  $DE$  perpendicularem productam secet in  $G$ . Recta  $DG = HI$ , applicata ad  $HL$ , aequatur triangulo  $DBC$  duplicato, ut alibi demonstratum est, et ideo  $HI$  dimidiata in  $M$ , ducta in  $LH$ , seu rectangulum  $LHM$  triangulo  $DBC$  aequatur. Eodem modo  $LDN = DAB$ .

5

Data iam  $LD = AQ$ , et  $DP$ , quaeritur  $DA = LQ$ , et  $QB$ .

Esto  $LD = x$ .  $DP = p$ .  $DA = y$ . erit  $QB = \frac{yx}{p}$ . Sed ad ipsam  $y$  cognoscendam opus foret alia adhuc aequatione; sed cuius ego principium invenio nullum. Verum est quidem summam omnium  $RB$  posita [ $2RQ = LQ$ .] semper aequari triangulo. Sed non video quid inde duci queat, tentandum tamen.

10

9  $RQ = 2LQ$   $L$  ändert Hrsg.

Esto quaedam recta sumta pro applicata =  $b$ . positaque minima  $x = \xi$ . fiet  $\frac{b\xi}{p} = b - y$ .

posito  $y$  esse applicatam sequentem quae quaeritur. Erit  $b - \frac{b\xi}{p} = y$ . positoque  $\xi = 1$ .

et  $p = 2x$ . fiet  $b - \frac{b}{2x} = y$ . Iam fiat  $DG = g$ . patet esse  $\frac{DG = g}{DF = x} = \frac{LB = b}{LF = p = 2x}$ . fiet

$g = \frac{bx}{p}$ . hoc loco  $= \frac{b}{2}$ . et  $LR = \frac{b}{4}$ . Eritque  $QB = \frac{b}{2}$ , et  $RB = \frac{3}{4}b$ , et erit summa omnium

$$5 \quad RB = \frac{bx}{2}.$$

(At si, sumta sit non  $b$ , sed proxime minor nempe  $y = b - \frac{b}{2x}$ , erit pro  $x$  ponendum  $x - 1$ ,

et pro  $p$  ponendum  $2x - 2$ , et pro  $\frac{yx}{p}$  fiet  $b - \frac{b}{2x}, \hat{\wedge} \frac{x-1}{2x-2} = \frac{b}{2} - \frac{b}{4x}$ . Subtrahatur ab

$y = b - \frac{b}{2x}$ , restat  $\frac{b}{2} - \frac{b}{4x}$ , cui addatur prioris dimidium  $\frac{b}{4} - \frac{b}{8x}$ , fiet:  $\frac{3b}{4} - \frac{5b}{8x} = DG$ .)

At summa omnium  $RB$ , demta ultima  $RB$ , seu demta  $\frac{3}{4}b$ , aequatur  $y \hat{\wedge} \frac{x-1}{2} = b - \frac{b}{2x} \hat{\wedge}$

10  $\frac{x-1}{2}$ . seu  $\frac{b \hat{\wedge} x}{2} - b - \frac{b}{2x}, \hat{\wedge} x-1, \hat{\wedge} = \frac{3}{4}b$ . sive  $\frac{x}{2} - 1 - \frac{1}{2x}, \hat{\wedge} x-1, \hat{\wedge} = \frac{3}{4}$ . Ita evanescit

$b$  et cum eo calculus. Si relinquas  $\frac{b \hat{\wedge} x}{2} - y \hat{\wedge} x-1, \hat{\wedge} = \frac{3}{4}b$ , vel  $\frac{bx}{2} - \frac{3}{4}b = y \hat{\wedge} x-1$ ,

vel  $y = \frac{\frac{b \hat{\wedge} x}{2} - \frac{3}{4}b}{x-1} = y$ . Ergo  $\frac{\frac{x}{2} - \frac{3}{4}}{x-1} = \frac{y}{b}$ . Unde nihil novi sed idem fit quod supra

$$y = b - \frac{b}{2x}.$$

$$8 - \frac{5b}{8x} \quad (1), \text{ et ducatur in } x-1, \text{ fiet: } \frac{3bx}{4} - \underbrace{\frac{5b}{8} - \frac{3b}{4}}_{\frac{5b}{8x}} + \frac{5b}{8x} = \frac{xy}{2}. \quad (2) = DG. \quad L$$

1–13 Die folgende Betrachtung leidet unter unklarer Bezeichnungsweise, vor allem die Z. 6–8, welche Leibniz deshalb auch eingeklammert, d. h. aus dem laufenden Text herausgenommen hat. Außerdem enthält sie verschiedene Ungenauigkeiten, insbesondere wiederholt Leibniz in Z. 10 den vorherigen Rechenfehler.

Esto in fig. 2. portio hyperbolae vel hyperboloidis cuiusdam  $MCHI$ . maxima applicata assumta  $MC = m$ . minima assumta  $HI = h$ .  $AM = c$  (vel etiam  $AH = AM + MH = c + x$ ). et semper  $AM = ML$ . erit differentia inter duas quaslibet applicatas proximas

$\frac{y}{c+x}$ , et quia  $y = \frac{a^2}{c+x}$ , fiet differentia inter duas applicatas proximas

$\frac{a^2}{c^2 + x^2 + 2cx}$ . Unde patet differentias duplarem in modum exprimi posse, vel per modum

loci, vel terminis semper in se reflexis, ut si nesciremus esse  $y = \frac{a^2}{c+x}$ .

Prima  $y$  nota est, nempe (1)  $m$ , fiet (2)  $m + \frac{m}{c+x}$  proxime maior, (3)  $\frac{m + \frac{m}{c+x}}{c+x}$ ,

(4)  $\frac{m + \frac{m}{c+x}}{c+x}$  (!), vel potius erunt differentiae:

5

7 Zu nempe am Rande:

$$\begin{array}{rcl} & \frac{m}{c+x} & \\ - & + & \frac{m}{c+x} \\ \hline & + & \frac{m + \frac{m}{c+x}}{c+x} \\ \hline & + & \dots \end{array}$$

3 = ML. | eritque differentia inter duas quaslibet applicatas proximas  $c + x$  streicht Hrsg. | erit  
L

7-684,4 Die mnemotechnische Darstellung der Folge ist in sich konsequent, nicht aber die explizite Ausrechnung. Setzt man, wie Leibniz,  $c + x = g$  sowie  $m = m_o$ , ergibt sich für das allgemeine Glied  $m_n = \frac{m_o (g+1)^n}{g^n}$  und für die Differenz  $m_n - m_{n-1} = \frac{m_o (g+1)^{n-1}}{g^n}$ . Der Fehler wirkt sich bis zum Ende von Teil 2 aus.

$$\begin{aligned} & \frac{m}{c+x} \quad \frac{m}{c^2 + x^2 + 2cx} \quad \frac{m}{c^3 + 3cx^2 + 3c^2x + x^3} \quad \text{etc.} \\ \text{Vel } m \quad & \frac{mc + mx + m}{c + x} \quad \boxed{\frac{mc + mx + m}{c + x} + \frac{mc + mx + m}{c + x}} \quad \text{vel} \\ & \frac{mc + mx + m, \cancel{c + x} + mc + mx + m}{c^2 + x^2 + 2xc} \\ \text{seu positio } c + x = g, \text{ fiet: } m & \frac{mg + m}{g} \quad \frac{mg^2 + mg + m}{g^2} \quad \frac{mg^3 + mg^2 + mg + m}{g^3} \end{aligned}$$

5 Memorabilis haec est observatio, si qua unquam: applicatas hyperbolae ita crescere:  
 Et quoniam idem manet  $m$ , eo omnia possunt dividi, atque ipsum omitti, salva seriei  
 ratione. Quoniam autem  $x$  semper crescit, arithmeticā progressionē, etiam  $g$  semper  
 arithmeticā ratione descrescere putandum est.

Fietque series haec:

10	$\frac{a^2}{c} \sim m$	$1 = m.$ id est, omnia ducunda in $m$
	$\frac{a^2}{c-1} \sim \frac{g+1}{g} m$	$(g = c - x = c - 1. \text{ quia } x \text{ hic } = 1.) = 1 + \frac{1}{g}$
	$\frac{a^2}{c-2} \sim \frac{g^2+g+1}{g^2} m$	$(g = c - 2. \text{ quia } x = 2.) = 1 + \frac{1}{g} + \frac{1}{g^2}$
	$\frac{a^2}{c-3} \sim \frac{g^3+g^2+g+1}{g^3} m$	$(g = c - 3.) = 1 + \frac{1}{g} + \frac{1}{g^2} + \frac{1}{g^3}$
	$\frac{a^2}{c-4} \sim \frac{g^4+g^3+g^2+g+1}{g^4} m$	$(g = c - 4.) = 1 + \frac{1}{g} + \frac{1}{g^2} + \frac{1}{g^3} + \frac{1}{g^4}$

10–15 Zum Schema: Error

4 (1) Ecce ergo regulam progressionis[:] semper m, ducta in potestatem aliquam ipsius c + x, et  
aucta eadem m, ducta in potestatem proxime inferiorem ipsius c + x, divisaque per potestatem (2) seu  
*L*

Seriei huius ut fiat additio:

$$\left. \begin{array}{c} 1 \\ g+1 \\ \hline g \\ g^2+g+1 \\ \hline g^2 \\ g^3+g^2+g+1 \\ \hline g^3 \\ g^4+g^3+g^2+g+1 \\ \hline g^4 \end{array} \right\} \frac{\frac{2g+1}{g}}{\frac{3g^2+2g+1}{g^2}} \left\} \frac{\frac{4g^3+3g^2+2g+1}{g^3}}{\frac{5g^4+4g^3+3g^2+2g+1}{g^4}} \right\}$$
5

et ita in infinitum.

Sed sciendum est hanc additionem decipere, nisi caveamus, quoniam scilicet  $g$  semper mutat valorem, resumenda ergo

$$\begin{aligned} 1 + \frac{g+1}{g} &= \frac{2g+1}{g} \\ \frac{2g+1}{g} + (2) \frac{g^2+g+1}{g^2} &= \frac{2g(2)g^2 + (2)g^2, + g(2)g^2 + g(2)g + g}{g(2)g^2} = \\ &= \frac{3g(2)g^2 + (2)g^2 + g(2)g + g}{g(2)g^2} \\ \frac{3g(2)g^2 + (2)g^2 + g(2)g + g}{g(2)g^2} + (3) \frac{g^3+g^2+g+1}{g^3} &= \\ &= 3g(2)g^2(3)g^3 + (2)g^2(3)g^3 + g(2)g(3)g^3 \end{aligned}$$
10
15

Sed haec prolixiora, sufficit ergo repraesentatio sub signo  $\odot$

Caeterum ne labamur, aut potius ne supra forte lapsi simus, resumendus est calculus.

---

11–15 Die geklammerten Zahlen des Schemas bezeichnen Indices, sie stellen einen der frühesten Versuche Leibniz' zu einer Indexschreibweise dar; s. dazu E. KNOBLOCH, *Übersicht über die unveröffentlichten mathematischen Arbeiten von Leibniz (1672–1676)*, 1978, S. 29–31.

$$\begin{aligned}
 & m \dots \\
 & m + \frac{m}{g} \dots \\
 & \underline{\quad} + \frac{m + \frac{m}{g}}{g} \dots \\
 & \underline{\quad} + \frac{m + \frac{m}{g} + \frac{m + \frac{m}{g}}{g}}{g} \dots \\
 \\[5pt]
 5 & \dots \frac{m}{mg + m} \\
 & \dots \frac{mg + m}{g} \\
 & \dots + \frac{mg + m}{g(2)g} = \overbrace{\frac{mg^2(2)g + mg^2 + mg(2)g + mg}{g^2(2)g}}^{\wp} \\
 & \dots + \frac{mg^4(2)g^2(3)g + mg^4(2)g^2, + mg^4(2)g(3)g + mg^4(2)g, +}{g^4(2)g^2(3)g} \\
 & \dots + \frac{+mg^3(2)g^2(3)g + mg^3(2)g^2, + mg^3(2)g(3)g + mg^3(2)g}{g^4(2)g^2(3)g}
 \end{aligned}$$

10 Patet ergo supra fuisse erratum, diversis  $\underline{g}$  inter se confusis.

Summam huius seriei inire est hyperbolam quadrare; ut tamen inde tentemus approximationes derivare in summam inquirendum est.

Ponatur autem  $g = c - x$ . vel  $c - 2x$ . vel  $c - 3x$ . ac decrescere semper  $g$  eo usque donec plane evanescat. Tunc manifestum est unumquemque terminum per idem  $g$  multiplicari  
15 per quod dividitur, seu toties poni quot in  $g$  sunt unitates; ac proinde

---

1+4 Neben den  $g$  der Hauptnenner jeweils:  $\wp$

Dazu am Rande:  $g$  simplex =  $c \neq x$ .  $g$  nominator binomii significat  
 $c \neq 2x$ . trinomii  $c \neq 3x$ . etc.

$$mg + m + m + \frac{m}{g} + m + \frac{m}{g} + \frac{m + \frac{m}{g}}{g} \text{ etc. vel}$$

$$2mg - m + \frac{m}{g} + \frac{m}{g} + \frac{m + \frac{m}{g}}{g} \text{ etc.}$$

aequari summae omnium, ac proinde ipsi spatio hyperbolae asymptoto. Atque hoc iterum repeti potest, nisi quod notandum  $g$  quod abicitur hoc modo fore maius unitate numero repetitionum termini a quo abicitur. Si iterum repetitur postea abiectio,  $g$  erit debito maior binario. Semper autem quoties abiectio fit, toties addi potest  $mg$ . Sed  $g$  est minor unitate quam proxima ante (Caeterum quod omnium maxime notandum, summa ipsa

differentiarum inter applicatas:  $m \frac{m}{g} \frac{m + \frac{m}{g}}{g}$  etc. esse  $= a^2$  seu ipsi asymptoto.),

fiet summa

$$mg, \hat{+} g, \hat{+} \frac{m}{g}, \hat{+} 1 + \frac{m}{(2)g}, \hat{+} 2 \text{ etc.}$$

Id alias peculiari tabula accuratius deducendum.

5

10

1f. 1) restat  $mg$

2) ..... +  $m$

3) ..... +  $m + \frac{m}{g}$

4) ..... +  $m + \frac{m}{g} + \frac{m + \frac{m}{g}}{g}$

etc.

Summa omnium applicatarum.

Sed semper appropinquari ad hanc summam potest si ista multiplicatio per  $g$  continuetur.

40<sub>3</sub>. PLAGULA TERTIA

August (1673)

Pars [III<sup>tia</sup>]

Methodi tangentium inversae et de functionibus.


- 5 Regressus an haberri possit a tangentibus, aut aliis functionibus ad ordinatas, quaesito est magna.

Exempli gratia[:]

$ax = y^2$ , unde fit  $al = 2y^2 = 2ax$ . Ergo  $l = 2x$ . Data ergo hac aequatione  $l = 2x$ , multiplicetur utrumque per  $a$ , fiet  $al = 2xa$  etc. Si sit  $l = x$ .  $al = ax$ .


- 10  $a^2 = yx$ . Ergo  $yx = yx$ . Ergo  $yl = yx$ .

Res est accuratissime investiganda, per canones aequationum, ut appareat quot modis aliquid produci possit ex aliis aequationibus, et quanam postea ex illis eligi debeat. Est quaedam ipsius analyseos analysis. Sed in qua profecto consistit apex scientiae humanae, in hoc quidem genere rerum.



15

[Fig. 1]



[Fig. 2]

Si sit parabola,  $ABGC$ . et spatium hyperbolae asymptoton  $adb gf$ . ita ut minima seu prima parabolae sit punctum, prima seu maxima hyperbolae sit infinita seu asymptotos. Ante omnia minimae atque maxima applicatarum investiganda quantitas. Nimirum in

3 IV<sup>ta</sup>  $L$  ändert Hrsg.      9 ax. | Ergo  $ax = ax$ .  $a = a$ . gestr. |  $L$       10  $yx$ . |  $\frac{a^2 y}{xy} = l$ . Ergo

$a^2 y = x^2 y$ . gestr. |  $L$       16  $adb gf$ . (1) sumanturque in utraque ordinatae duae, EB, FG, et (2) ita  $L$

parabola, ob  $ax = y^2$ , posita  $x$  minima  $= \frac{1}{2}$ , fiet  $\frac{a}{2} = y^2$ , et  $y = \sqrt{\frac{a}{2}}$ . In hyperbola, ob  $a^2 = yx$ , posita  $x$  minima  $= 1$ , fiet  $a^2 = y$ .

Sumatur abscissa in parabola  $AE$ , eiusque dupla in hyperbola  $ae$ . indeque ducta applicata  $EB$ , vel  $eb$ . ad abscissam perpendiculari ad punctum  $B$  vel  $b$ . ducatur tangens  $Bf$ . vel  $bf$ . quae axi seu directrici assumtae occurant in  $f$ . Constat in parabola  $Ef$  esse  $= 2AE$ , et in Hyperbola  $ef$  esse  $= ae$ . et quoniam in hypothesi nostra semper  $ae$  duplum est  $AE$ , erit  $Ef$   $= ef$ .<sup>5</sup>

Porro alibi demonstratum est, differentiam inter duas applicatas proximas seu infinite parvo dissitas intervallo esse, a p p l i c a t a m alterutram in minimam  $x$  ductam, et per p r o d u c t a m suam divisam. Ideoque cum utrobique producta sit  $x$ , et in parabola

minima  $x$  sit  $\frac{1}{2}$ , in Hyperbola minima  $x$  sit 1. hinc ut a prima applicata ordiamur, series differentiarum in parabola haec erit:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \sqrt{\frac{a}{2}} & \frac{\sqrt{\frac{a}{2}} \frac{1}{2}}{1} & \frac{\sqrt{\frac{a}{2}} + \frac{\sqrt{\frac{a}{2}} \frac{1}{2}}{1}}{2} & & & & \\ & & & & & & & \\ 0 & \sqrt{\frac{a}{2}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{a}{2}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{a}{2}} + \frac{1}{4}\sqrt{\frac{a}{2}} & \frac{1}{2}\sqrt{\frac{a}{2}} + \frac{1}{4}\sqrt{\frac{a}{2}} + \frac{1}{4}\sqrt{\frac{a}{2}} + \frac{1}{8}\sqrt{\frac{a}{2}} & & & \text{etc. in} \\ & & 1 & 2 & 3 & & & \text{infinitum.} \\ 0 & \boxed{\sqrt{\frac{a}{2}}} & \boxed{\frac{1}{2}\sqrt{\frac{a}{2}}} & \boxed{\frac{1}{4}\sqrt{\frac{a}{2}} + \frac{1}{8}\sqrt{\frac{a}{2}}} & \boxed{\frac{1}{6}\sqrt{\frac{a}{2}} + \frac{1}{12}\sqrt{\frac{a}{2}} + \frac{1}{24}\sqrt{\frac{a}{2}}} & \boxed{\frac{1}{48}\sqrt{\frac{a}{2}}} & & \end{array}$$

Si sit hyperbola, pro + adhibendum –. fietque[:]

$$\begin{array}{ccccccccc} a^2 & \frac{a^2}{1} & \frac{a^2 - \frac{a^2}{1}}{2} & \frac{a^2 - \frac{a^2}{1} - \frac{a^2 - \frac{a^2}{1}}{2}}{3} & & & & \\ & & & & & & & \end{array}$$

---

8 Porro: s. o. N. 401 S. 660 Z. 5 f.




fig. 1.




fig. 2.

[Fig. 3]

[Fig. 4]

Si sumatur non asymptotos ut fig. 2. sed axis hyperbolae, vid. fig. 1. pro directrice, applicata omnium minima sic habebitur[:]  $2ax + x^2 = y^2$ , vel  $\sqrt{2a+1} = y$ . cum in parabola sit  $\sqrt{a} = y$ . In circulo erit  $\sqrt{2a-1} = y$ . Porro  $2al \neq 2xl = 2y^2$ , fiet  $l =$

$$5 \quad \frac{y^2}{a \neq x} = \frac{2ax + x^2}{a \neq x} = x + \frac{ax}{a \neq x}.$$

Ergo posita  $\sqrt{2a \neq 1} = y$ , fiet:

$$y \quad \frac{y \wedge a \neq 1}{2a \neq 1} \quad \frac{y + \frac{y \wedge a \neq 1}{2a \neq 1}}{4a \neq 2} \quad \frac{y + \frac{y \wedge a \neq 1}{2a \neq 1} + \frac{y + \frac{y \wedge a \neq 1}{2a \neq 1}}{4a \neq 2}}{6a \neq 3} \quad \text{etc.}$$

Quoniam autem differentiae in distantias a vertice 1. 2. 3. 4. ... ductae dant summam complementi figurae, hinc[:]

$$10 \quad y \quad \frac{y \wedge a \neq 1}{2a \neq 1} \quad \frac{y + \frac{y \wedge a \neq 1}{2a \neq 1}}{2a \neq 1} \quad \frac{y + \frac{y \wedge a \neq 1}{2a \neq 1} + \frac{y + \frac{y \wedge a \neq 1}{2a \neq 1}}{4a \neq 2}}{2a \neq 1}$$

Complementum circuli aut hyperbolae latus rectum transverso aequale habentis ad quadratum circumscripsit.

2 (1) An fortasse comparatio (2) Si L

---

6 fiet: Die Nenner in der Folge sind bis auf den Nenner des zweiten Gliedes unrichtig: anstelle von  $2an \neq n$  müsste es jeweils  $2an \neq n^2$  heißen. Leibniz rechnet mit dem Fehler konsequent weiter.

Inventum hoc est universalissimum, cuiusque ope progressio ordinatarum cuiuscunque figurae exhiberi potest geometrice infinita serie numerorum rationalium, ita ut habeatur *m e t h o d u s u n i v e r s a l i s*, exhibendi quadraturas *a r i t h m e t i c a s*, prorsus exactas, et *m e c h a n i c a s* quantumlibet *g e o m e t r i c i s* propinquas, usui cuilibet suffecturas; data figura quacunque.

5

Hoc autem in qualibet figura succedere cuilibet manifestum est, quia in qualibet figura *l* exprimi potest fractione quam nulli ingrediuntur termini irrationales. At inquis interdum si alterutram indeterminatarum eleminare velis, non poteris carere terminis irrationalibus. Respondeo non esse necessariam hanc eliminationem, etsi quando fieri potest salva rationalitate, utilis sit. Quoniam enim ipsa *y* non variatur, contenti enim prima sumus, quam cognitam suppono. Caetera omnes ex ipsa pariter et *x* analytice componuntur. Opus autem est ad hunc calculum *y p r i m a m* assumere non minimam maximamque applicatarum, finitam, aut infinite parvam quoties illa non potest explicari, nisi per irrationalitatem; sed potius aliquam finitam, assumtam, pro arbitrio. Imo nil refert aliquando etsi eligas minimam vel maximam applicatarum, licet irrationales; quoniam statim eliminari potest, omnibus per eam divisis; quoties scilicet illa ex valore ipsius *l* eliminari potuit.

10

*Q u a d r a t u r a a r i t h m e t i c a* est aream figurae exacte ac geometrice exhibere infinita serie numerorum rationalium. *G e o m e t r i c a* ac plane perfecta est quadratura, quoties finita magnitudine exacte exhiberi potest area; denique *m e c h a n i c a* est cum area finita exhiberi potest magnitudine, cuius differentia a vera tam parva est, ut in praxi neglegi possit.

20

Quadratura circuli arithmetic a nemine ante me data est, mechanica, quae ad partes quoque eius geometrice designabiles extendatur, ita absoluta.

25

Hactenus de arithmetic figurata tam multa post Diophantum scripta sunt, sed ita ut ultra quadrata, cubos, etc. tum trigona, pentagona, pyramides etc. breviter ultra figurae rectilineas itum non sit. At parabolam, hyperbolam, quod parum est, imo circulum et ellipsin repraesentare in numeris, et quidem non per approximationem sed exacte ac geometrice, imo generaliter omni figurae geometrice arithmeticam respondentem exhibere rationalem (nam irrationalem cuilibet facile quivis exhibuerit); res fortasse a nemine ne


30

15 aliquando *erg. L*    18 est (1) exhibere infinitam seriem (2) aream *L*    20 exacte *erg. L*  
23f. Quadratura . . . extendatur, (1) a tabulis ⟨—⟩ (2) ita (a) per (b) absoluta. später *erg. L*

sperata quidem aut suspicione libata est. Adeo ut etiamnum plerisque impossibilem visum iri, non dubitem.

Vieta numerosam aequationum omnium resolutionem et expressionem mechanicam absolvit, et mathematicam practicam ingenti beneficio sibi aeternum devinxit. Restabat 5 quadratura figurarum omnium arithmeticarum, et mechanica areae cuiusque expressio, sed methodo facilis et universali. Huius ego problematis maximi, si quod aliud in geometria, si ad usum vitae inventa exigantur, detectionem mihi arrogare possum.

Sed hinc videtur sequi aliquid absurdum; nimirum seriem aliquam terminorum inter se asymmetrorum posse exprimi serie terminorum rationalium, homogenea. Exempli 10 causa sinus circuli rectos seu ordinatas nemo negabit esse saepe sinibus versis, sive abscissis asymmetros. Sed credibile est portiones abscissas saepe esse abscissis asymmetras. Hoc tamen loco dicitur eas serie numerorum rationalium explicari. Sed respondendum est primum resolutione in minima facta rationalia ab irrationalibus differe non nisi magnitudine infinite parva; deinde considerandum est terminum cuiuslibet seriei (non infinite 15 parvum) explicari aliis terminis infinitis in dimensiones usque infinite parvas usque extenuatis.



[Fig. 5]

Sit curva  $LD$ , cuius sinus (id est ordinata normalis)  $SL$ , abscissa  $AS$ , tangens  $TL$ , triangulum characteristicum  $GWL$ . Sique fiat ut  $ST$  ad  $SL$ , vel  $GW$  ad  $WL$ , ita 20 recta quaedam constans alterius cuiusdam figurae eiusdem axis sinum respondentem

2 f. dubitem. (1) Stevinus (2) Vieta (a) numerosam aequationum omnium resolutionem primus absolvit (b) mechanicam aequationum omnium resolutionem absolvit (c) numerosam  $L = 4$  mathematicam (1) mechanicam ingenti (2) practicam  $L = 10$  saepe erg.  $L$

(respondentem inquam[.] id est eiusdem abscissae)  $SR$ , portio quaelibet ab altera figura abscissa per sinum eius, aequabitur rectangulo  $SL$  in  $c$ .

Cuius rei demonstratio haec est perfacilis:  $\frac{TS}{SL} = \frac{GW}{WL}$  vel  $\frac{g}{w}$  per constructionem;  
 $= \frac{c}{RS = r}$  ex hypothesi, ergo  $cw = rg$ . Quod rerum harum intelligentibus sufficit ad demonstrationem.

5

Exemplo utamur, si figura sit parabola erit  $ST = 2x$ , posita  $AS = x$ , et  $SL = \sqrt{ax}$ , erit  $\frac{g}{w} = \frac{2x}{\sqrt{ax}} = \frac{c}{r}$ . Ergo  $r = \frac{c\sqrt{ax}}{2x} = y$ , fiet:  $2yx = c\sqrt{ax}$ , vel  $4y^2x^2 = c^2ax$ , vel  $4y^2x = b^3$ . Hyperbola cubica, cuius proinde habetur quadratura. Quare omnium figurarum haberi potest quadratura, quarum sinus sunt ad rectam quandam constantem, ut sunt sinus alterius cuiusdam figurae cognitae ad suam tangentem; seu ratio sinuum trianguli characteristici figurae cognitae.

10

Contra si complementum parabolae sumatur, cuius applicata  $Ls$ , abscissa  $As$ , tunc producta  $st$  ita habetur:  $ax = y^2$ , unde  $ax = 2yp$ , unde fit  $\frac{ax}{2y} = p$ , vel  $\frac{y^2}{2y} = \frac{y}{2}$ . Est ergo  $As = 2ts$ . Sed nec opus erat ista quaeri; sufficit esse  $sL$  ad  $st$ , ut  $g$  ad  $w$ , vel  $\frac{y^2}{a}$  ad  $\frac{y}{2} = \frac{g}{w} = \frac{\cancel{2}x}{\sqrt{ax}} = \frac{\cancel{2}y^2}{ya}$ . Ergo  $\frac{xay}{y^2\sqrt{ax}} = 1$ . Quod est verissimum. Tantum ergo sine novo 15 calculo inverti sufficit superiorem, et duplicem ei valorem accommodari.

12 si (1) supplemen (2) com (3) supplementum (4) complementum  $L$

$\frac{g}{w} = \frac{2r}{\sqrt{ax}} = \frac{c}{r}$ . Ergo  $r = \frac{c\sqrt{ax}}{2x}$ , unde locus hic:  $4x^2y^2 = \underbrace{c^2ax}_{b^3}$ , vel locus:  $xy^2 = a^3$ .

H y p e r b o l a c u b i c a.

$\frac{\underline{\hspace{2cm}}}{c} = \frac{r}{c}$ . Ergo  $r = \frac{2cx}{\sqrt{ax}}$ . Unde locus hic:  $y^2ax = 4c^2x^2$ , vel locus hic:  $y^2 = ax$ .

P a r a b o l a i p s a .

5  $\frac{\underline{\hspace{2cm}}}{a} = \frac{2y}{a} = \frac{c}{r}$ . Ergo  $r = \frac{ca}{2y}$ . Unde locus hic:  $yx = a^2$ . H y p e r b o l a .

$\frac{\underline{\hspace{2cm}}}{c} = \frac{r}{c}$ . Ergo  $r = \frac{2yc}{a}$ , unde locus:  $ax = ya$ . T r i a n g u l u m .

Ergo semper duplex tantum locus,  $\frac{g}{w} = \frac{c}{r}$ , et  $\frac{g}{w} = \frac{r}{c}$ , ita ut semper  $c$  sit differentiae abscissarum proportionalis.

Si figura data sit hyperbola, et axis sit asymptotos, aequatio est:  $a^2 = yx$ . Unde

10  $yl = xy$ . Ergo  $l = x$ , vel  $yx = xl$ , ergo  $l = y$ . Ergo  $\frac{g}{w} = \frac{x}{\underline{a^2}} = \frac{x^2}{a^2}$ . Idemque est

etsi  $y$  assumas, substituto tantum  $y$  in locum  $x$ . Hinc duplex sufficit constructio, loco quadruplicis:

$\frac{g}{w} = \frac{x^2}{a^2} = \frac{c}{r}$ . Ergo  $r = \frac{ca^2}{x^2}$ . Unde locus:  $x^2y = a^3$ . H y p e r b o l a c u b i c a .

$\frac{\underline{\hspace{2cm}}}{a^2} = \frac{y^2}{a^2} = \frac{r}{c}$ . Ergo  $r = \frac{cx^2}{a^2}$ . Unde locus:  $ay = x^2$ . P a r a b o l a .

15 Si pro axe spatii assumatur ipse hyperbolae axis, aut basis ei perpendicularis, aequatio est (sumta hyperbolae specie in qua latus rectum transverso aequale):  $ax + x^2 = y^2$ .

4 Zu P a r a b o l a i p s a : Error ut mox dicetur.

5 Zur linken Seite:  $x = \frac{y^2}{a} \times \frac{y}{2}$  fiet  $\frac{2y}{a}$ .

Zu H y p e r b o l a : Imo error quoniam si  $y$  arithmeticē crescit, tunc,  $r$  erit applicata hyperbolae, sed ipsae  $GW$  quibus applicatur erunt inaequales. Sin  $y$  est  $= \sqrt{ax}$ , fiet  $y = \frac{a^2}{\sqrt{ax}}$ ,  $y^2 = \frac{a^4}{ax}$ , et  $y^2x = a^3$ , ut supra.

6 Zu T r i a n g u l u m , gestr.: Error, ut paulo ante.

Sed ut calculi similis repetitionem vitemus, et circulum (vel ellipsin) et hyperbolam simul complectamur, fiet aequatio:  $2ax \pm x^2 = y^2$ .

Sed antequam huc veniamus, subit animum experiri aliquid quod circa parabolam tentare obliiti sumus, aequatio ibi fuit  $ax = y^2$ . Unde si abscissa est  $x$ , seu cum directrix est axis, fit  $al = 2y^2$ . Ergo  $l = \frac{2y^2}{a}$ , eritque ratio  $\frac{g}{w}$ , vel  $\frac{l}{y} = \frac{al}{2y^2}$ , quod fieri potest 5  
 $= \frac{r}{c}$ , unde fieret  $\frac{alc}{2y^2} = r$ . Sed inde non potest fieri locus, quia sic una tantum habetur incognitarum in aequatione, nisi ea explicetur. Sed si explicetur incidemus in loca iam exposita. Nihil ergo praetermissum fuit.

Ut ergo ad circulum (vel ellipsin) et hyperbolam nunc pergamus, duplex ineundus valor ipsius  $p$ . Primum ex  $x$  abscissa, deinde ex  $y$  abscissa. 10


Ex  $x$  ita:  $2ax \pm x^2 = y^2$ , unde fit  $2ap \pm 2xp = 2y^2$ , vel  $p = \frac{y^2}{a \pm x} = \frac{2ax \pm x^2}{a \pm x}$ . Sed si  $x$  sit abscissa, fiet:  $2ax \pm 2x^2 = 2yp$ , vel  $p = \frac{ax \pm x^2}{y}$ . Iam ut pro  $x$  substituamus eius valorem, considerandum est, esse  $2ax \pm x^2 \pm a^2 = y^2 \pm a^2$ , atque ideo  $a^2 + x^2 \pm 2ax = a^2 \pm y^2$ , ergo 15  
 $x \pm a = \sqrt{a^2 \pm x^2}$ .

---

14–16 NB. Haec dubitatio alio signo exprimenda.

---

5 eritque: Die anschließende Rechnung ist nicht konsequent durchgeführt, die Schlussfolgerung bleibt davon unberührt.



[Fig. 6]

Et si subsistamus intra quadrantem circuli, quia tunc  $x$ , sinus versus, nunquam maior fit quam  $a$ , radius, possumus tuto dicere:  $a \neq x = \sqrt{a^2 + y^2}$  et  $\neq x = \sqrt{a^2 + y^2} - a$ ,  
 vel  $x = \pm \sqrt{a^2 + y^2} \neq a$ . Ergo  $x^2 = + \frac{2a^2 + y^2}{\odot} - 2a\sqrt{a^2 + y^2}$ ,  $x^2 = 2a^2 +$   
 5  $y^2 - 2a\sqrt{a^2 + y^2}$ , ergo  $p = \frac{\pm a\sqrt{a^2 + y^2} \neq a^2 + 2a^2 + y^2 - 2a\sqrt{a^2 + y^2}}{y}$ . Ergo iuxta  
 primum ipsius  $p$  valorem erit:  $\frac{g}{w} = \frac{2ax \neq x^2}{a \neq x, \sqrt{2ax \neq x^2}} = \frac{\sqrt{2ax \neq x^2}}{a \neq x} = \frac{c}{r}$ . Ergo  
 $\frac{ca \neq cx}{\sqrt{2ax \neq x^2}} = r = y$ . Unde locus talis:  $2y^2ax \neq y^2x^2 = c^2a^2 + c^2x^2 \neq 2c^2ax$ . Ergo  
 $y^2 = \frac{c^2a^2 + c^2x^2 \neq 2cax}{2ax \neq x^2}$ , vel  $y = \frac{a - x, \sqrt{c}}{\sinus \left\{ \begin{array}{l} \text{circuli} \\ \text{hyperbolae} \end{array} \right\}}$ .  
 Positoque  $c = a$ , et aequalitate resoluta in proportionem, fiet  $\frac{y}{a} = \frac{a - x \sinus \text{compl.}}{\sin. \text{rect.}}$ ,  
 10 seu in circulo, figura proxime adiecta,  $\frac{CD = r}{BC = a} = \frac{AB = a - x}{AC = \sin. \text{rect.}}$ . Quod est verissimum,  
 et exhibet nobis quadraturam tangentium complementi.

---

1 [Fig. 6]: Die Figur hat Leibniz an einer freien Stelle des Randes ergänzt; sie ist mittels eines Verbindungsstriches mit dem Wort figura in Z. 10 verbunden.

$\frac{y}{p} \sqrt{2ax \pm x^2} \sim \frac{a \pm x}{2ax \pm x^2}$  fiet  $\frac{a \pm x}{\sqrt{2ax \pm x^2}}$ . Unde patet quod hic dicitur idem esse, quod differentias invenire applicatarum, divisa qualibet per eius tangentem productoque per rectam constantem  $c$  vel  $a$  multiplicato.

Iuxta posteriorem valorem ipsius  $p$  erit in circulo

$$\frac{g}{w} = \frac{\pm ay\sqrt{a^2 \mp y^2} \mp a^2 y}{3a^2 - y^2 - 3a\sqrt{a^2 \mp y^2}} = r$$

5

cuius figurae habetur quadratura hoc modo, sed ipsius  $r$  constructio investiganda.

1–3  $\frac{y}{p}$  ... multiplicato. erg.  $L$

---

4 erit in circulo: Bei der Berechnung von  $r$  fasst Leibniz die Doppelvorzeichen nicht richtig zusammen; außerdem hat er nicht völlig zu Ende gerechnet. Richtig sollte es heißen:  $r = \frac{a^2 y - ay\sqrt{a^2 - y^2}}{y^2 - a^2 + a\sqrt{a^2 - y^2}}$ .

## 404. PLAGULA QUARTA

August. 1673

Pars [quarta]

Methodi tangentium inversae seu de functionibus

Si sit figura  $\frac{a^3}{a^2 + y^2} = x$ , fiet  $a^3 = a^2x + y^2x$ , unde fiet ad  $p$  habendam assumta  
 primum  $x$  abscissa:  $-2y^2x = a^2p + y^2p$ , et  $p = \frac{2y^2x}{a^2 + y^2}$ , et quia  $y^2 = \sqrt{\frac{a^3 - a^2x}{x}}$ , fiet  
 $\frac{2xa\sqrt{ax - x^2}}{a^2 + a\sqrt{\frac{a^3 - a^2x}{x}}} = p$ , et quia  $\frac{g}{w} = \frac{p}{y}$ ,  $\frac{g}{w} = \frac{2ax\sqrt{ax - x^2}}{a^2\sqrt{\frac{a^3x - a^2x}{x}} + a} \hat{=} \frac{c}{r}$ , et  
 erit  $r = c\alpha \hat{=} \frac{a\sqrt{\frac{a^3 - a^2x}{x}} + \frac{a^3 - a^2x}{x}}{2\alpha x\sqrt{ax - x^2}} = \frac{ca\sqrt{\frac{a^3 - a^2x}{x}} + \frac{ca^3 - ca^2x}{x}}{2x\sqrt{ax - x^2}}$ , vel  
 $r = y = \frac{a^2\sqrt{\frac{a^3 - a^2x}{x}} + \frac{a^4 - a^3x}{x}}{2x\sqrt{ax - x^2}}$ , vel

3 tertia  $L$  ändert Hrsg. 6  $\frac{2y^2x}{a^2 + y^2}$ , | quod est memorabile, unde positi gestr. | et  $L = 7$  f.  $\frac{c}{r}$ , (1)

vel multiplicata functione per  $x$ ,  $r = \frac{ca^3\sqrt{ax - x^2} + ca^2 \hat{=} a - x}{(2)}$  et erit  $L$

5–700,9 In direkter Fortsetzung von Teil 3 versucht Leibniz weitere Beispiele zu behandeln, kommt aber aufgrund von Rechenfehlern sowie unklarer Bezeichnungsweise kaum zu schlüssigen Ergebnissen.

$$y^2 = \frac{a^4 - \frac{a^3 - a^2 x}{x} + \frac{a^8 + a^6 x^2 - 2a^7 x}{x^2}}{4x^2 - ax - x^2} + \frac{2a^2 \sqrt{\frac{a^3 - a^2 x}{x}} - \frac{a^4 - a^3 x}{x}}{4x^2 - ax - x^2}$$

5

$$\frac{a^3}{a^2 + y^2} = x. \text{ Ergo } \frac{\frac{a^6}{a^4 + y^4 + 2a^2 y^2} = x^2}{\frac{2y^2 x}{a^2 + y^2} = p} = \frac{\frac{a^6}{a^2 + y^2}}{2y^2 x = \frac{2y^2 \cdot a^3}{a^2 + y^2}} = \frac{a^6}{2y^2 a^3} = \frac{a^3}{2y^2}.$$

$$\frac{a^3}{y^2} = x. \text{ Ergo } a^3 = y^2 x. \text{ Unde si fiat: } y^2 x = 2y l x = y^2 x, \text{ fiet } 2l = x, \text{ vel } l = \frac{x}{2} = p.$$

Iam  $\frac{y^2}{x} = \frac{2a^3}{x^2}$ . Unde res sequitur memorabilis in hyperboloeide cubica reductas esse

figuras homogeneas. Quod me credere facit, peculiarem aliquem huius figurae usum esse. 10

8 Dazu am Rande:  $\frac{a\sqrt{\frac{a^3}{x}}}{\frac{x}{2}} = y, \frac{4a^5}{x^3} = y^2$ .

$\frac{a^4}{y^3} = x$ . Ergo  $a^4 = y^3x$ , unde si fiat  $\cancel{y}x = 3y^2lx = y^3x$ , et  $p = \frac{x}{3}$ . Iam  $y = \sqrt[3]{\frac{a^4}{x}}$ ,

et  $\frac{y^2}{p} = \frac{\sqrt[3]{\frac{a^4}{x}}}{\frac{x}{2}} = e = 2\sqrt[3]{\frac{a^8}{x^5}}$ , vel  $e^3 = \frac{a^8}{x^5}$ , unde locus  $y^3x^5 = a^8$ .

Paraboloeis:  $a^2x = y^3$ . Ergo  $a^2p = 3y^3 = 3a^2x$ , ergo  $p = 3x$ .

$y = \sqrt[3]{a^2x}$ , et  $\frac{y^2}{p} = \frac{\sqrt[3]{a^2x^2}}{3x} = e$ . Ergo  $\sqrt[3]{a^4x^2} = 3ex$ , et  $a^4x^2 = 27e^3x^3$ , fietque

5 locus:  $a^4 = y^3x$ .

$ax^2 - x^3 = y^3$ , est momentum [quadratorum] sinuum circuli, ex vertice.  $2axp - 3x^2p = 3y^3$ . Ergo  $p = \frac{3y^3}{2ax - 3x^2} = \frac{3ax^2 - 3x^3}{2ax - 3x^2} = \frac{3ax - 3x^2}{2a - 3x}$ , hoc dividatur  $y = \frac{\sqrt[3]{ax^2 - x^3} \cap 2a - 3x}{3ax - 3x^2} = \frac{ax^2 - x^3 \cap 8a^3 - 36a^2x + 54ax^2 - 27x^3}{3ax - 3x^2}$  [bricht ab]

$\frac{a^2}{\sqrt{ax}} = y$ , fiet  $a^2 = y\sqrt{ax}$ , et  $a^4 = y^2ax$ , et  $a^3 = y^2x$ .

1 Dazu am Rande:  $\frac{ay}{p} = \frac{a \sqrt[3]{\frac{a^4}{x}}}{\frac{x}{2}} = y$ ,  $2a \sqrt[3]{\frac{a^4}{x}} = yx$ . Ergo  $\frac{8a^{\frac{5}{7}}}{x} = y^3x^{\frac{2}{7}}$ .

[sic!]

8

$$\begin{array}{r} 2a - 3x \\ 2a - 3x \\ \hline 4a^2 + 9x^2 - 12ax \\ 2a - 3x \\ \hline 36 \\ 8a^3 + 18x^2a - 24a^2x - 12a^2x - 27x^3 + 36ax^2 \end{array}$$

1  $\cancel{y}\cancel{x} = (1) 2y^2lx = y^3x$ , et  $p = \frac{x}{2}$  (2)  $3y^2lx L$  6 quadratorum erg. Hrsg.

Aequatio curvae quam Cartesius post conicas simplicissimam putat, lib. 2 pag. 37.  
haec affertur:

$$y^3 - 2ay^2 - a^2y + 2a^3 = axy. \quad \text{vel} \quad x = \frac{y^2}{a} - 2y - a + \frac{2a^2}{y}.$$

Sed si hoc est, tantum nascetur ex [compositione] in unum quatuor aliarum linearum,  
ordinatae rectanguli, ordinatae trianguli, ordinatae parabolae, et ordinatae hyperbolae. 5  
Ita conchoeis ex ordinata circuli et hyperbolae ad asymptoton, componitur.


Ait Cartesius lineas altiorum graduum potius a mechanica quam geometria fore re-  
pudiandas, ob difficilem earum descriptionem. Id nimis verum est: etsi enim excellens  
sit earum contemplatio ob pulchritudinem admirandae rerum harmoniae, fatendum est  
tamen usum mechanicum non respondere. Quare illud utile futurum est, modum inves-  
tigare quo linea quaelibet altior, ex ordinatis inferiorum composita intelligi possit. Sed 10  
quoniam descriptiones eiusmodi non fierent nisi per puncta, cogitavi an non vocata in  
subsidiū optica, descriptae separatim inter se iungi possint. Idque duabus datis facile  
fieri potest, si oblique aspiciantur, ut non possit agnoscī inter eas intervallum. Atque 15  
ita etiam in chartam aliam oblique reflecti possunt, où ils passent pour chefs, à present,  
comme les cadets dans un pays estranger ne brisent plus leurs armes. Et ita iam trans-  
ferri possunt in situm perpendicularē, prout inspiciuntur. Et his rursus alia addi figura.  
Ita ut optice sine ullo motu, nec per puncta describi possint.

Statica mea, novae scilicet librae genere adhibito, figura data quaelibet secari pot-  
est in quavis ratione data. Unde sequitur, descripta figura angulorum, posse ope huius 20  
instrumenti angulum secari in quavis ratione data: non per puncta nec arithmeticē; sed  
geometrice, ita ut etiam exhiberi possint huius instrumenti ope partes irrationales inter  
se.

4 comparatione  $L$  ändert Hrsg. 10 est, (1) | efficere streicht Hrsg. |, ut 1 (2) modum  $L$

1 Cartesius: *Geometria*, DGS I S. 37f.  
Büches der *Géométrie*, a. a. O. S. 17.

7 Ait Cartesius: s. insbesondere den Beginn des 2.



[Fig. 1]

Eadem methodo iam facile habentur quotcunque mediae proportionales. Sed quod attinet medias proportionales quotcunque, idem rectius fieri potest figura logarithmorum sive harmonica, id est hyperbola vera, ut angulorum sectio, falsa. Ita quoniam, ut ex 5 inventis a Gregorio a S. Vincentio constat,  $CDef$  sunt ut logarithmi arithmetice proportionalium  $CE$ . Sumta ergo portione eiusmodi spatii hyperbolici  $CDEF$ , statim per staticam in ea exhiberi potest constructio logarithmorum geometrica; sectioque rationis, et inventio quotcunque mediariarum proportionalium.

Potest ergo in eiusdem tabulae orichalcinae una facie describi figura angulorum, 10 seu hyperbola falsa, et in altera figura logarithmorum sive hyperbola vera. Si maior sit tabula plures aliae figurae utiles inscribi possent, quod usum haberet ad plura problemata simul solvenda. Solutio autem plurium problematum simul, usum haberet admirabilem, ad solvenda quaedam problemata, quae alioquin superare videntur vires humanas, neque 15 redigi posse in aequationem. Imo si non realiter at saltem optice plures simul figurae delineari possent in eadem tabula, si aliquid illuminans, simul descenderet, figuramque in ea describens. Ita plura simul solvi possent problemata in illa.

Archimedes videtur staticae usum introduxisse in geometriam, non tantum ob contemplationem centrorum gravitatis, atque inde manantes solidorum ac superficierum revolutione genitorum mensuras; sed et quod eius ope problemata infinita solvi posse vide- 20 rentur sine calculo: exempli causa, manifestum est aream cuiuslibet figurae haberi posse, si prisma habeatur ei aequiponderans; neque opus est, ut alias foret, figuram datam in

21 si (1) cylinder (2) prisma L

---

4f. ex inventis a Gregorio: *Opus geometricum*, 1647, S. 594–597. Auf diese Stelle spielt Leibniz S. 703 Z. 30 noch einmal an.

massam quandam informem atque inde in prisma vel cubum redigere, ut eius amplitudo habeatur. Cum ope ponderum duplicata quodammodo, ac bis habeatur diversarum figurarum; quarum statim datur comparatio.

Sed maxima difficultates in praxi obiectae sunt; primum quod ponderare corpora incommodum, quoties magna sunt; deinde quod ponderatis etiam corporibus, exacta non potest haberi mensura; sed velut cum figurae per puncta describuntur; intervalla negliguntur; quaeriturque additis ablatisque ponderibus donec attingatur vera; quod si more Archimedis immergere corpora liquori, atque ita liquorem ponderare velis; patet cum multis esse difficultatibus conflictandum. Denique ad corpora non nisi homogenea ponderanda adhiberi statica potest. Ac quod duas attinet primam ac postremam, eas nec a me sublatas fateor, nec a quoquam tolli posse arbitror.

Sed et ideo staticae geometricae usum esse quoque debere arbitror; non ad quārumlibet figurarum datarum areas metiendas, cum plerumque neque ponderari possint, neque sint homogeneae; verum ad metiendas atque dividendas figuras quasdam in corporibus quibusdam ad eam rem commodis, a nobis pro arbitrio assumtis, quae deinde pro instrumentis servire possint.

Atque si his limitibus vota nostra includantur, superest tantum media incommoditas; quae vero ope bilancis meae autometrae [superatur], quae sibi ipsi aequipondium definit. Ita ergo instrumenta duo statim elaborari possunt, quorum ope possint anguli ac ratio in data ratione secari, at pro aliis figuris innumeris modulus velut quidam constitui, unde eas proportionaliter dimetiamur. Cum proportionalis ista divisio postea ope opticae fieri possit. Sed etsi figura data non sit modulo similis, modo sit eiusdem speciei, alias praesto est plerumque calculus, quo ad eum redigatur, ut in circulo, et ellipsi, hyperbola circulari et alia quavis.


Quod attinet duo illa instrumenta, quibus anguli ac ratio secentur, fateor utrumque etiam sine statica ope chordarum flexibilium absolvvi posse. Nimirum si arcus circuli et arcus parabolae in rectas extendantur. Etsi quoad arcum parabolae res paulo sit difficilior, quoniam is non quadrilineo hyperbolico, sed ipsi hyperbolae proportionalis est.

Quoniam tamen elegantissima visa est demonstratio figurarum geometricarum quārum altera a Gregorio a S. Vincentio, altera a me inventa est, quarum illa rationi, haec angulo syntomos est; dignissimas putavi quae afferrentur.

1 in (1) quadratum redigere; ut eius area (2) prisma  $L$       14 quasdam (1) in eam rem commodas, a nobis pro arbitrio assumtas (2) in  $L$       18 superatur erg. Hrsg.

Porro data qualibet figura fieri potest figura segmentorum, item figura arcuum, cuius ope tum segmenta eius tum curvae in data ratione secari possint.

Nota: tabulas eiusmodi aquae immergendas posse ex ligno esse, orichalco obducto.



[Fig. 2]

- 5 Duae quaestiones: una de invenienda descriptione curvae ex eius elementis, altera de invenienda figura ex datis differentiis, altera redigi potest in eandem.

Quoniam semper elementum curvae  $GL$  intelligi potest  $Rq.$  ex  $GW^2 + WL^2$  vel  $l = \sqrt{g^2 + w^2}$ , et quia  $g^2$  semper eadem, tunc fiet  $l = \sqrt{\alpha^2 + w^2}$ .

Data ergo v. g.  $\frac{a}{x} = w$ . fiet:  $\sqrt{\alpha^2 + \frac{a^2}{x^2}} = GL$  vel  $l$ . eaque aequatio progressionem

- 10 ipsorum  $GL$  exprimet. Potest et posita  $\alpha = 1$ . exprimi  $\sqrt{1 + \frac{a^2}{x^2}}$ . Sed et  $a$  significare potest 1. Sed et  $a$  posito = 1. erit  $\alpha = \frac{a}{a}$ , ergo = 1. tantum inferioris dimensionis, fietque  $\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}}$ . Quaerenda ergo est descriptio huius curvae.


Contra[:] quaestio de invenienda curvae descriptione ex datis elementis, in alteram reduci potest. Posito enim eius elementa esse  $\frac{\sqrt{ax + x^2}}{a}$ , vel  $\frac{\sqrt{x + x^2}}{1}$ . ut curvae parabol-

---

13 Contra: Die Berechnung des Bogenelements der Parabel und der Reihe der Differenzen ist fehlerhaft. Die bedeutsame Schlussfolgerung bleibt davon unberührt.

cae[,] subtrahenda  $\sqrt{1}$ . vel 1. fiet  $w$  differentia, eaque ergo erit  $\sqrt{\sqrt{x+x^2-a^2}}$  vel  $\sqrt{\sqrt{2-a^2}} \cdot \sqrt{\sqrt{6-a^2}}$ . [etc.]

Hinc intelligi potest, fere totam doctrinam de methodo tangentium inversa revocabilem videri ad quadraturas.



[Fig. 3]

5

Esto figura quaelibet orthogonia  $ABCDA$ , ductisque applicatis quotcunque  $ED$ , ad abscissas  $AE$  arithmetice crescentes, et signatis  $FD$  applicatarum differentiis; manifestum est ductis  $FG$  in  $FD$ , seu ductis differentiis applicatarum in abscissas, momentum hoc differentiarum esse complementum figurae datae ad rectangulum isoparallelum.

Sunto exempli causa differentiae istae:  $\frac{x^2}{a^2}$ , ducantur in  $x$ , fiet  $\frac{x^3}{a^2}$ . Quaeritur progressio ipsarum  $ED$  continue descrescentium, nam, unam ex ipsis pro arbitrio assumtam pono, id est figura talis, cuius summa summae omnium  $\frac{x^3}{a^2}$  complemento sit ad rectan-

2 etc. erg. Hrsg.

gulum factum ex maxima  $AE$  assumta, nempe  $AB$ , in maximam  $ED$  assumtam, nempe  $BE$ .

Si vel hoc solum problema solvi posset, data producta invenire figuram haberetur tetragonismus universalis. Cum enim data sit figura cuius summa quaeritur  $\frac{x^2}{a}$ , ac proinde 5 differentia applicatarum figurae quaerendae  $\frac{x^2}{a^2} = WD$ , et constat esse  $GW = \frac{a}{a} = 1$ , fiet  $\frac{PX}{XD} = \frac{\frac{a}{a}}{\frac{x^2}{a^2}} = \frac{[a^2]}{x^2}$ . Imo ergo erratum, neque enim ita datur [ $PX$ , sed tantum ratio], seu trianguli figurae characteristici natura.

Ita ergo duo habemus, p r i m u m triangulum figurae characteristicum, d e i n d e figuram quae sitae completem. Tentandum an ex his erui possit figura, accedentibus 10 aequationibus, et methodo tangentium Cartesiana, Huddeniana, Slusiana.

Porro rectanguli  $GFD$ , altitudo est  $x = GF$ , latitudo  $\frac{x^2\beta}{a^2}$ , et area  $\frac{x^3\beta}{a^2}$ . Dividatur per  $DF = \beta$ , fiet eius longitudo  $\frac{x^3}{a^2}$ , latitudo  $\beta$ , unitas scilicet constructionis ut dictum est. Quod si iam figurae huius  $\frac{x^3}{a^2}$  quadratura haberi potest, utique caetera videntur haberi, puto tamen non semper. Ut si sit  $\frac{a\beta}{x}$ , ductis omnibus in  $x$ , fiet  $a\beta$ . At a ductam

---

3 f. Über data producta und tetragonismus jeweils: male

6 a  $L$  ändert Hrsg. 6  $\frac{PX}{XD}$ , sed tantum eorum ratio  $L$  ändert Hrsg. 7 f. natura. (1) Ecce ergo problema: (2) Ita  $L$

---

10 methodo tangentium: DESCARTES, *Geometria*, DGS I S. 40–50. HUDDDE, *De reductione aequationum*, DGS I S. 433–439 (insbesondere S. 436) sowie *De maximis et minimis*, DGS I S. 507–516; s. a. Fr. v. SCHOOTEN, *Commentarii*, DGS I S. 255 f. De Sluse veröffentlichte seine Methode zuerst in den *Philosophical Transactions* VII Nr. 90 vom 20./30. Jan. 1672/73, S. 5143–47 und VIII Nr. 95 vom 23. Juni/3. Juli 1673, S. 6059.

in  $x$  vel  $AB$  esse semper quadrabilem constat. Cumque et data sit  $BC$ , ergo datur quadratura omnium  $ED$ , unde et ipsa videntur dari debere. Quod alias examinabimus.

Datis productis invenire applicatas, est invenire seriem, quae ad differentias suas (rationem) habeat datam, datur enim  $PE$ , et  $GW$ , at  $\frac{PE}{GW} = \frac{ED}{WL}$ .

Eodem casu datur  $\frac{PA}{AE}$ , vel  $\frac{PA}{PE} = \frac{AH}{ED}$ . Datur ergo ratio rescissae  $AH$  ad applicatam

$ED$ . Ergo et dimidiae rescissae  $\frac{AH}{2}$  ad applicatam  $ED$ , seu  $\frac{IH}{2ED}$ . Ergo et  $\frac{ED - \frac{IH}{2}}{ED} = 1 - \frac{IH}{2ED}$ . Ergo et ratio applicatarum ad  $ED - \frac{IH}{2}$ , quarum summa semirectangulo sub abscissa et applicata aequatur. Sed ex datis partium rationibus, rationes totorum, vel contra, nemo collegerit cognitis hactenus artibus.

Breviter[:] semper datur  $GW$ , semper datur  $AE$ , hoc loco datur et  $PE$ , ergo datur et  $PA$ . Sed et datur ratio  $AH$  ad  $ED$ , nempe rescissae ad applicatam, item  $\frac{ED}{WL} \left( = \frac{PE}{GW} \right)$  applicatae ad differentiam.

$\frac{a}{a-b} \quad \frac{b}{b-c} \quad \frac{c}{c-d}$ . Ergo datur et  $\frac{a-b}{a}$  etc.  $= 1 - \frac{b}{a}$ . etc. Datur ergo ratio applicatae datae ad sequentem. Unaque ex illis prima scilicet qualibet pro arbitrio assumta, dantur caeterae omnes.

Ergo ex datis productis datur series figurae. Etsi inde aequationem reperire figurae naturam experimen tem, nondum fortasse sit in promtu. Sed illud tamen adhuc excutendum an prima assumi possit pro arbitrio, et hoc loco puto posse.

---

## 2 Zu dari debere: Imo nondum res datur.

9 f. artibus. | De caetero est  $\frac{PE}{ED} = \frac{ED}{EM}$ . datur ergo  $\frac{ED}{EM}$ . item  $\frac{EM}{ED}$ . ergo datur et  $\frac{\frac{PE}{ED}}{\frac{EM}{ED}}$ . ergo et

$\frac{PE}{EM}$ . Absatz. Patet porro ex his (1) data ratione (2) datis productis dari et reductas. gestr. | Breviter L

At si differentiae  $WL$  datae sint, seu quod idem est, si data sint trianguli characteristici latera rectum angulum comprehendentia, quia data  $\frac{GW}{WL}$ , tunc non potest prima applicata assumi pro arbitrio, quia prima est omnium differentiarum summa.

Porro datur et differentia productae et abscissae ad rescissam, seu differentia inter

- 5 has duas rationes[:] productae ad rescissam, et abscissae ad rescissam, seu

$$\frac{PE - AE}{AH} = \frac{PA}{AH} = \frac{GW}{WL} = \frac{PE}{ED} = \frac{PA + AE}{ED} = \frac{ED}{EM}.$$

Porro cum detur  $\frac{PE}{ED}$ , dabitur et  $\frac{ED}{PE}$ , datur et  $\frac{ED}{EM}$ , dabitur ergo et  $\frac{PE}{ED}$ , ergo et  $\frac{PE}{EM}$   
 $\frac{ED}{EM}$

seu  $\frac{PA + AE}{EM}$ .

NB. Si dantur  $WL$ , datur ut paulo ante ostensum  $\frac{PE}{EM} = \frac{ED}{WL} = \frac{a}{\frac{a-b=e}{a^2-b^2}} = \beta$   
 $\frac{2}{2}$

- 10  $\frac{1}{\beta} \frac{\frac{a^2-b^2}{2}}{\frac{a}{a-b}}$ . Ergo ductis omnibus in  $a - b$ , fiet:  
 $\frac{a^3 - ba^2 - ab^2 + b^3}{2a} = \frac{1}{\beta} \cdot \frac{2}{\beta} = \frac{a^2}{2} - \frac{ba}{2} - \frac{b^2}{2} + \frac{b^3}{2a} = ea - b^2 + \frac{b^3}{a}$ .

7  $\frac{PE}{1} = \frac{ED}{WL}$ .

11

$$\begin{aligned} & a - b^2 \\ & a - b \\ & -b^2 \overline{a + b^3} + a^3 \\ & -ba^2 \end{aligned}$$

9–709,3 NB. . . . NB. erg. L

9  $EM = \frac{a^2 - b^2}{2}$ : Dies ist ein Näherungswert; vgl. dazu S. 710 Z. 19.

Haecc aequatio ex aminanda.

Vel quia  $a = b + e$ , fiet:  $\frac{2}{\beta} = eb + e^2 - b^2 + \frac{b^3}{b+e}$ , vel

$$2b + 2e = \cancel{eb}\cancel{\beta} + 2e^2b\beta + \cancel{e^2b}\cancel{\beta} + e^3\beta - \cancel{b^3}\cancel{\beta} - \cancel{b^2e}\cancel{\beta} + \cancel{b^3}\cancel{\beta}. \text{ NB.}$$

$$\begin{array}{ccccccc} a & & b & c & d & a^2 & b^2 \\ a-b & & b-c & c-d & & a^2-b^2 & b^2-c^2 \\ e & & f & g & & c^2-d^2 & d^2 \end{array} \quad 5$$

$$\begin{aligned} a - b \wedge a - b = a^2 + b^2 - 2ab, -a^2 + b^2 &= 2b^2 - 2ab,, \\ [2] \wedge b^2 - ab &= 2 \wedge b^2 - a^2 + ae, \\ &\quad \diagup \\ &\quad a^2 - ae \end{aligned} \quad 10$$

Ergo differentia inter differentiarum quadrata, et differentias quadratorum, est, differentia inter quadratum termini posterioris, et rectangulum terminorum, duplicata, seu est differentia inter quadrata terminorum inversa (seu differentia quadratorum directa a nihilo subtracta), rectangulo termini prioris in differentiam, aucta; summa duplicata.

Esto quadratum differentiae  $e^2$ , differentia inter quadrata terminorum  $a^2 - b^2 = h^2$ , erit  $b^2 - a^2 = 0 - h^2 = 0 - a^2 + b^2 = b^2 - a^2$ , erit ergo  $e^2 - h^2 = 2 \wedge 0 - h^2 + ae$ , seu

$$\begin{array}{c} /\backslash \\ a^2 - b^2 \end{array}$$

#### 7–10 Nebenrechnungen:

[Gültig]

$$\begin{aligned} &+ a - b \\ &- a + b \\ -a^2 + ba &\overline{+ ba - b^2} \quad -a^2 - b^2 + 2ba \\ a^2 - b^2 + 2b^2 - 2b^2 + b^2 &\overline{a - b} = a + b + \frac{b^2 - 2b^2}{a - b} = a + b - \frac{2b^2}{a - b}. [\text{sic!}] \end{aligned}$$

[Gestrichen]

$$\frac{a^2 - b^2 + 2ba - 2ba}{+a - b} = -a + b.$$

8 –2 L ändert Hrsg.

$\frac{e^2 - h^2}{2} = ae - h^2$ , vel  $e^2 - h^2 = 2ae - 2h^2$ , eritque  $e^2 = 2ae - h^2$ . Ac proinde  $e^2 - 2ae = -h^2$ . Ergo  $a^2 + e^2 - 2ae = [a^2 - h^2]$ . Ergo  $\underbrace{e-a}_{\neq a \neq e} = \sqrt{[a^2 - h^2]}$ , ergo  $\neq e = \neq a + \sqrt{[a^2 - h^2]}$ . Sed de his alias.

Nunc observo, data laterum orthogoniorum trianguli characteristici ratione triangulum characteristicum plene dari, quia semper unum eius latus *GW* datur. Cumque detur et *WL*, dabitur et *GL*. Ergo in alio quolibet triangulo, quod characteristico simile est, dato unico latere dabuntur omnia. Ergo triangulum *DNH* penitus dabitur, quia unum eius latus *DN* datum est, datur ergo *HD*, et *NH*. Ergo cum summa omnium *AH* semper aequetur segmento duplicato; ideo summa omnium *HN* semper aequatur trilineo concavo *AXLFA* vel *ANLGA* [duplicato]. Figurae ergo quaesitae etsi adhuc ignotae reperiri potest hoc modo aequivalens. Assumta et pro arbitrio qualibet *RQ* invariabili, dabuntur semper et *RP*, et *PQ*. Ideo patet problema illud alibi a me propositum, data qualibet figura reperire curvam δύτομον, pendere ex illo problemate, datis differentiis reperire summas.

N.B. cum sit  $\frac{GW}{WL} = \frac{DE}{EM}$ , patet esse ut unitas constructionis ad differentias, ita applicatas ad differentias semiqdadratorum, vel ut unitas ad ordinatas, ita differentias ad differentias semiqdadratorum, vel  $\frac{1}{a} = \frac{a-b}{\frac{a^2-b^2}{2}}$ , eritque  $1 = \frac{2a^2-2ba}{a^2-b^2}$ . Sed haec non absolute quidem vera[,], tamen in arithmeticā infinitorum.

---

14f. Datis differentiis invenire summas, et datis reductis invenire figuram, semper eodem reddit.

3+4 a<sup>2</sup> + h<sup>2</sup> L ändert Hrsg. dreimal. 11 duplicato erg. Hrsg.

---

12 qualibet *RQ*: In seiner Handzeichnung hat Leibniz *RQ* auf eine bereits vorhandene Strecke gelegt. Damit *Q* auch auf die Tangente zu liegen kommt, müsste *RQ* näher an die Basis *BC* gelegt werden. 13 alibi a me propositum: vgl. dazu N. 391 S. 621 f. (Scholion zu Prop. 2.).

## 41. EX DATIS TANGENTIBUS INVENIRE FIGURAM

[Herbst 1673]

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 XII 1. Bl. 180–181. 1 Bog. 2°. 4 S. Spätere Ergänzungen und Zusätze in verändertem Duktus seitlich und oben auf Bl. 180 v°, 181 r°, 182 v°.  
Cc 2, Nr. 625

5

Datierungsgründe: In einem Gespräch, das nach der Entstehung des infinitesimalen Dreiecks vermutlich im Sommer 1673 stattfand (s. *LSB* III, 2 S. 933; *LMG* III S. 73), hat Huygens Leibniz die Lektüre der *Géométrie Descartes'* zusammen mit den Kommentaren von Fr. v. Schooten sowie der einschlägigen Studien von de Sluse empfohlen. Eine Frucht dieser Lektüre ist das vorliegende Stück, in welchem Leibniz die Tangentenmethode Descartes' rezipiert. Aufgrund des Wasserzeichens des Papiers ist die Studie nach N. 40 vom August 1673 anzusetzen.


10

Grandis illa quaestio:

ex datis tangentibus invenire figuram sive ordinatas  
etiam replicari potest, ita ut data aliqua aequatione, quaeratur figura cuius tangentium  
tangentes aequationem habeant datam.

15

Regula de tangentibus investigandis breviter rememoranda est:



[Fig. 1]

16 Regula | Slusii gestr. | de L

16 Regula: s. dazu N. 6. Die Streichung des Namens ist darauf zurückzuführen, dass Leibniz — wohl durch Mitteilungen Huygens' — mittlerweile Zweifel an der Priorität von de Sluse bekommen hatte. Vgl. dazu J. E. HOFMANN, *Leibniz in Paris*, 1974, S. 72–74; s. a. Huygens an Oldenburg, 27. Sept. 1672 (*HO* VII N. 1912, S. 228–229 = *OC* IX N. 2066, S. 247–251).

Esto curvae ordinata [AB,] tangens BC. Quaeritur AC, ex data BC. Ante omnia aequatio figurae ordinatarum AB ad abscissas [DA], rationem explicans ita poliatur, ut non nisi duae restent quantitates incognitae: AB = y. et DA = x. Termini incogniti a fractionibus ac surdis liberentur. Aequatio iam hac ratione inventa ita formetur, ut ab uno latere 5 omnes termini ponantur ipsa x, ab altero omnes ipsa y affecti. Quod si idem terminus utroque affectus est, utrobique ponatur, ita quasi alterubi non esset positus. Qui neque y neque x habent omittentur. Hoc facto cuilibet termino praefigatur numerus tot unitatum, quot graduum est potestas quae terminum incognitum eius lateris afficit. Denique in latere ipsius x. unus x mutetur in p = AC. Aequatio ita reformata ipsius p = AC.

10 quantitatatem dabit.

Ipsa y per productam p dividatur erit  $\frac{y}{p} = \frac{b}{a}$ , posito  $\frac{b}{a}$  differentiae ipsarum y,

seu posito ipsas y esse ipsarum b quadratrices. Exempli causa:

$$2ax - x^2 = y^2. \text{ Ergo } 2ap - 2xp = 2y^2. \text{ sive } p = \frac{y^2}{a-x} = \frac{2ax - x^2}{a-x}. \text{ Ergo}$$

$$\frac{y}{p} = \frac{\sqrt{2ax - x^2}}{\sqrt{2ax - x^2}}, \hat{a} - x = \frac{a - x}{\sqrt{2ax - x^2}}.$$

15 Sed nimis longae fuerint hae ambages ex datis differentiis quaerere summas, seu figuram, rectius ducta perpendiculari BE, utemur ipsis AE.

Quaeritur ergo problema:

data AE invenire figuram.

Insistamus in hunc finem methodo Cartesiana, ubi ellipsin proponit in exemplum, et ex 20 AB invenit AE, nos tentabimus postea regressum. Ita autem ille.

Esto DA = y. AB = x. DE = v. EB = s. Ergo AE = v - y, ideoque AE<sup>2</sup> = v<sup>2</sup> - 2vy + y<sup>2</sup>, et EB<sup>2</sup> = s<sup>2</sup> = v<sup>2</sup> - 2vy + y<sup>2</sup> + x<sup>2</sup>. Et quia in ellipsi x<sup>2</sup> = ry -  $\frac{r^2}{q}y^2$ , unde tollendo x<sup>2</sup>, fit:

1 AB, erg. Hrsg. 2 ordinatarum ... rationem explicans erg. L 2 CA L ändert Hrsg.  
6f. Qui ... omittentur. erg. L

---

19 methodo Cartesiana: *Geometria, DGS* I S. 40f. u. 45f. In S. 713 Z. 9 unterläuft Leibniz ein Vorzeichenfehler, der aber S. 713 Z. 11 korrigiert wird. Bei dem Versuch das Problem umzukehren vergisst Leibniz in seiner Schlussgleichung (S. 714 Z. 1) das Glied  $\frac{r^2}{4}$ . Mit dem Fehler wird später (ab S. 716 Z. 24) konsequent weitergerechnet.

$$-\frac{r}{q}y^2 + ry + v^2 = 0,$$

$$+ 1 - 2v - s^2$$

et ut  $y^2$  ab omni alio liberetur fiet:

$$y^2 \frac{+r-2v}{-\frac{r}{q}+1}y \frac{+v^2-s^2}{-\frac{r}{q}+1} = 0.$$

Iam posito  $EB$  esse perpendicularem seu minimam, aequatio proposita duas habebit radices aequales. Ideoque ponendo  $y = e$ . eandem habebit formam aequatio, quam illa quae fit ducendo in se  $y - e$ . Unde  $y^2 - 2ye + e^2$ . Cumque haec aequatio eandem habet formam cum priore, et unus terminus sit idem, erunt reliqui quoque aequales.

5

Ergo  $\frac{+r-2v}{-\frac{r}{q}+1}y = 2ye$ . Ergo  $+r-2v = -\frac{2er}{q} + 2e$ .  $-2v = -\frac{2er}{q} + 2e - r$ . sive

$$2v = \frac{2yr}{q} + r - 2y. \text{ sive } v = \frac{yr}{q} + \frac{r}{2} - y.$$

10

Credo me per errorem invertisse, debet enim esse:  $v = y - \frac{r}{q}y + \frac{r}{2}$ . vel  $+1y + \frac{r}{2}$ .

$$-\frac{r}{q}$$

Iam inverso modo cognita  $v$ , ignotaque  $x$ , quaeritur quomodo inveniri queat  $x$ .

Resumenda aequatio prior:  $s^2 = x^2 + v^2 - 2vy + y^2$ , pro  $v$  ponatur eius aequivalens. Iam

$$v^2 = +1y^2 + r y + \frac{r^2}{4}, \quad \text{et} \quad -2vy = -2y^2 - ry.$$

$$-\frac{2r}{q} - \frac{r^2}{q} + \frac{2r}{q}$$

$$+\frac{r^2}{q^2}$$

15

Ergo fiet:  $s^2 = x^2 - \cancel{y^2} + r y,$

$$\cancel{\frac{2y}{q}} - \frac{r^2}{q}$$

$$+ \frac{r^2}{q^2} - r$$

~~±1~~

$$\cancel{\frac{2}{q}}$$

$$+ \cancel{\frac{2y}{q}}$$

sive

$$s^2 = x^2 + \frac{r^2}{q^2} y^2 - \frac{r^2}{q} y.$$


Et haec aequatio  $s^2 = x^2 + \frac{r^2}{q^2} y^2 - \frac{r^2}{q} y$  non minus determinata est, ac illa qua Cartesius

utebatur supra relata, cum ex  $x$  et  $y$  ipsam  $v$  vel  $s$  quaerebat. Sublata enim  $x$  restabant  
10 in aequatione tres indeterminatae:  $s. v. y.$  Ita nos ex  $v$  et  $y$  datis querentes  $x$  et  $s$ , elisa  
iam  $v$  per aequationem quam de ea habebamus, ad  $y$ , habemus indeterminatas restantes  
 $s. x. y.$


Iam vestigiis Cartesii presse insistemus: verbis ipsius eius fin. pag. 43 et pag. 44  
*Geom. relatis*, mutatis mutandis. Cuius et figuram hic adscribimus:

---

13 vestigiis Cartesii: Im Folgenden zitiert Leibniz bis auf wenige unwesentliche stilistische Änderungen wörtlich die Betrachtungen von S. 43 Z. 2 v. u. bis S. 45 Z. 21 und versucht, sie (s. die Klammereinschübe) auf das umgekehrte Problem zu übertragen, hat aber keine großen Hoffnungen auf Erfolg (s. u. S. 716 Z. 23).



[Fig. 2]



[Fig. 3]

Descripto circulo ex centro  $P$  qui curvam in punctis  $C$  et  $E$  secet ex quibus in  $PA$  demittantur perpendiculares  $CM$ ,  $EQ$ . iunctis radiis  $PC$ ,  $PE$  inter se aequalibus.

Ita ergo ille[:] Postquam ergo invenimus talem aequationem non ea utemur ad cognoscendas quantitates  $x$  vel  $y$ . quae hic datae sunt quia punctum  $C$  (non minus quam  $M$ ) est datum, sed ad inveniendam quantitatem  $v$  vel  $s$ . quae quaesitum punctum  $P$  determinant. Ego contra: non utemur ea ad cognoscendas quantitates  $v$  et  $y$  quae hic datae sunt quia punctum  $P$  (non minus quam  $M$ ) est datum sed ad inveniendam quantitatem  $x$  vel  $s$ . quae quaesitum punctum  $C$  determinant.

In quem finem (pergit Cartesius) considerari debet, si punctum  $P$  (substitue  $C$ ) tale est quale desideratur quod circulus cuius id ipsum est centrum (substitue, quod circulus, cuius centrum est  $P$ ) quique per punctum  $C$  transit tangat ibidem curvam lineam  $CE$  neque eam secet. Sed quod si idem punctum  $P$  proprius aut remotius sumatur a puncto  $A$  (hic substitui etiam, puto potest[:] sed quod si punctum  $C$  aliud a vero assumatur), circulus hic non solum in puncto  $C$ . sed et in alio quodam puncto  $E$  curvam  $CE$  sit secturus.

Deinde considerandum est quoque, quando hic circulus curvam  $CE$  secat, aequatio per quam quantitas  $x$  vel  $y$  vel quaedam alia similis (substitue: per quam quantitas  $v$  vel  $y$  vel quaedam alia similis) quaeritur supponendo  $PA$ , et  $PC$ . seu  $s$ ,  $v$  (quaesitas: substitue  $x$ ,  $s$  seu  $CM$ , seu  $EQ$  et  $AQ$  vel  $AM$ ) cognitas necessario duas contineat radices inaequales. (Hic iam substitutio incipit difficilis reddi, ac cessat inversio, igitur continuabimus tantum exscribere verba autoris.)

5

10

15

20

Nam si e.g. circulus hic secet curvam  $CE$  in punctis  $C$  et  $E$  ac ducatur  $EQ$  parallela ipsi  $CM$  nomina quantitatum indeterminatarum  $x$  et  $y$ , aeque bene convenient lineis  $EQ$  et  $QA$  atque ipsis  $CM$  et  $MA$ . existente  $PE = PC$ . propter circulum. Adeo ut quaerendo lineas  $EQ$  et  $QA$  per  $PE$  et  $PA$  quae tanquam cognitae supponuntur eandem habituri simus aequationem quam si quaererentur  $CM$  et  $MA$  per  $PC$  et  $PA$ . Unde liquido constat ipsius  $x$  vel  $y$  valorem fore duplicem, hoc est aequationem duas admissuram radices quae sint inaequales, quarum quidem una futura est  $CM$  altera  $EQ$ , si fuerit  $x$  quam quaerimus: aut quarum una futura est  $MA$ , altera  $QA$ , si fuerit  $y$  quae quaeritur. (Videtur etiam in nostra inquisitione dici posse, assumto puncto  $C$  vero, tunc valorem ipsius  $EP$ , et  $CP$ . fore aequalem, ac proinde si ope aequationis a nobis inventae, ex data  $x$  et  $y$  quaeratur  $s$ , aequationem habere duas radices aequales.) Verum equidem est, quod cum punctum  $E$  non ad eandem curvae partem reperitur cum punto  $C$  una tantum harum radicum sit vera, altera falsa, sed quo haec puncta  $C$  et  $E$  sibi invicem sunt propiora, eo differentia inter has radices est minor, quae denique omnino aequales futurae sunt, si bina haec puncta in unum punctum cadant, hoc est si circulus qui per  $C$  transit curvam ibidem tangat nec omnino secet:

Praeterea considerandum quod aequatio in qua duae sunt radices aequales necessario eandem formam habeat ac si in seipsam multiplicetur quantitas quam velut incognitam supponimus, multata quantitate cognita sibi aequali: et denique haec ultima summa si non tot dimensiones habeat quot praecedens, rursus per aliam summam totidem quot alteri desunt dimensiones habentem, sic ut separatim aequatio inter singulos unius atque singulos alterius terminos haberri possit.

(Haec iam imitari tentabimus; etsi vix putem hic successurum.[])

$$\text{Aequatio nostra est: } \frac{r^2}{q^2}y^2 - \frac{r^2}{q}y + \frac{x^2}{-s^2} = 0.$$

$$25 \quad \text{Unde fieri potest} \quad y^2 - \frac{\frac{r^2}{q}y}{\frac{r^2}{q^2}} + \frac{\frac{+x^2 - s^2}{r^2}}{\frac{q^2}{q^2}} = 0,$$

$$\text{vel} \quad y^2 - qy + \frac{q^2x^2 - q^2s^2}{r^2} = 0.$$

Conferatur cum aequatione eiusdem formae,  $y^2 - 2ey + e^2 = 0$ , fiet  $q = 2e$ . Quod est

23 etsi (1) difficile sit (2) vix  $L$

absurdum, cum  $q$  sit determinata,  $e$  indeterminata. Malum ergo in eo est quod indeterminatae in se invicem non sunt ductae.

$$\text{Aequatio est } x^2 = s^2 - \frac{r^2}{q^2}y^2 - \frac{r^2}{q}y, \text{ sive } x = \sqrt{s^2 - \frac{r^2}{q^2}y^2 - \frac{r^2}{q}y}.$$

Sumatur alia  $x$  paulo maior priore,  $x + \beta$ , fiet  $x^2 + 2\beta x + \beta^2 = s^2 - \frac{r^2}{q^2}y^2 - \frac{r^2}{q}y$ . Sed nihil hinc. 5

An ergo per  $y$ . fiat:  $\frac{r^2}{q^2}y^2 = s^2 - x^2 - \frac{r^2}{q}y$ , et pro altero  $y$  substituatur  $y + \beta$ , fiet  
 $\frac{r^2}{q^2}y^2 + \frac{2r^2\beta}{q^2}y + \frac{r^2}{q^2}\beta^2 = s^2 - x^2 - \frac{r^2}{q}y$ .

Totum artificium est, ita effingere aequationem, ut aliqua inde sequatur destructio mutua, inde enim nova haberetur aequatio.

Aequatio ipsius  $v$ , nihil aliud nos docet, quam terminum qui in aequatione quaesita ipsum 10  
 $v$  multiplicabit.

E.g. in proposito exemplo, ubi aequatio haec

$$\begin{array}{rcl} y^2 & \frac{+ r - 2v}{-\frac{r}{q} + 1} y & \frac{+ v - s^2}{-\frac{r}{q} + 1} = 0 \\ y^2 & -2ye & + e^2 = 0 \end{array}$$

datur valor ipsius  $v$ , ad  $y$ . Ergo vicissim si caeteris non datis, detur tantum valor ipsius 15  
 $v$  ad  $y$  aequationis illius quaesitae unus terminus quodammodo fingi potest.

$$s^2 - x^2 - \frac{r^2}{q^2}y^2 - \frac{r^2}{q}y = 0.$$

8–16 *Daneben später ergänzt:* Ope geometriae series quoque arithmeticæ sive finitæ sive infinitæ inibuntur. E.g. pro his:  $\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4}$  etc. multum productis, summa haberi potest per appropinquationem scilicet ope quad. hyp.

17 *Neben der Gleichung großes NB.*

3 Aequatio: Hier unterläuft Leibniz ein Übertragungsfehler: bei konsequenter Rechnung müsste  $\frac{r^2}{q}y$  Plus als Vorzeichen haben. Der Fehler vererbt sich weiter.

Cum tres sint quantitates indeterminatae, manifestum est locum esse solidum. Is ergo locus solidus ponatur descriptus. Eligatur iam aliquis locorum planorum hunc solidum componentium, qui residueae problematis conditioni satisfaciat; residua autem problematis conditio est, ut  $s$  hoc modo inventa, sit minima omnium, quae ex puncto  $P$ . quo  $s = \underline{PC}$  rectam pro mensura assumtam, in qua ipsae  $y$  assumuntur, secat, ad loci huius plani terminationem seu curvam  $CE$  duci possint. Sive, ut data positione  $AP$ , indefinita, sumtaque pro arbitrio magnitudine ipsarum  $AM = y$ , et  $PC = s$ . sumatur ipsa  $MC = x$  talis, ut ipsa  $CP$  fiat omnium possibilium minima, id est, ut alia aliave  $x$  assumtis, ipsa  $s$  fiat maior.

10 Nescio an hoc ita dici debeat[:] Habemus aequationem quae nos doceat, data  $x$ , et  $y$ , quanta futura sit  $s$ . Superest alia praeterea conditio, quae nos doceat, ipsam  $x$  talem assumendam, ut si alia  $x$  eodem modo ex alia  $y$  composita assumatur, ipsa  $s$  sit minima quae ad earum terminaciones ex punto  $P$  duci possit. Unde apparet quod est difficillimum, non ipsam  $x$  sed regulam aliquam ipsas  $x$  inveniendi ex datis  $y$  quaeri, quae 15 proposito satisfaciat. Quae regula nec semper aequatio erit.

Non negligenda tamen quae hic de loco solido observata sunt. Forte enim sequitur solidi inventi sectionem quandam per quoddam planum qualiscunque ea sit proposito satisfacere. Quod si demonstrari posset, hinc consequentias alias rursus duceremus, nimirum si data esset aequatio ipsarum  $v$ , eam in aliam quandam transmutaremus eiusmodi 20 naturae, ut ipsarum  $v$ , summa aliquando, haberri possit, ut videmus contingere in certis quibusdam segmentis cycloeidis. Idem forte comminisci liceret semper, quo facto aliquas saltem rectas loci plani quaesiti ex solidi sectione inveniendi haberemus; atque ita rursus posset fortasse ipsum illud planum determinari ope unius eiusmodi rectae inventae aut plurium.

25 Adde aliud artificium; adhibetur alia quaedam figura aliarum  $v$ . ut alicubi vel etiam aliquo demto additoque, semper summa earum summae priorum aequalis sit, atque huius

2 iam (1) aliqua indeterminatarum eiusmodi ut (2) aliquis  $L$  13 possit (1). Sed haec conditio (2) vel ipsam  $x$  talem assumendam (3). Unde  $L$  14 sed | aequationem sive *erg. u. gestr.* | regulam  $L$

---

21 segmentis cycloeidis: vgl. dazu LSB III, 1 N. 29 S. 115 f. sowie HUYGENS, *Horologium oscillatorium*, 1673, S. 69 (*HO* XVIII S. 205); s. a. N. 17 S. 344 Z. 2 – S. 346 Z. 2.

locus solidus itidem describatur: Videndum est an horum duorum, imo quia id quoque comminisci licet, plurium quoque locorum solidorum intersectio communis quaesitum nobis patefaciat. Videndumque an alibi se intersecare possint, sive an aliud habere possint planum commune, quam quaesitum. Et quod si duo possint, certe tria, 4, 5, etc., possumus enim habere eiusmodi loca solida ad propositum facientia quotlibet; unam eandemque intersectionem communem habere non poterunt, nisi unicam. Nimirum: inter aliqua plana cuiuslibet est aliquod quod proposito satisfacit, seu quod continet omnes  $x$  ad rem aptas; ita enim arbitror sequi ex dictis, etsi supersit dubitandi ratio quaedam; nondum enim forte demonstratum est omnes  $x$  ad rem pertinentes in aliquod loci solidi planum cadere, idque axi assumto perpendicularare. Nimirum puncta omnia, quae ipsis  $C$  aequivalere queant, erunt in ipsius solidi superficie. Est ergo locus ad superficiem omnes  $x$ , seu ex punctis in axem demissae perpendicularares aequationi (scilicet seclusa illa conditione, quae in aequationem redigi non potest), satisfaciunt. Sit alia quaedam figura aliarum  $v$ , quarum summa vel semper (e.g. in figura segmentorum si quid ipsis addatur item sufficit convexa concavis comparari), vel aliquo modo pure (ut in fig. segmentorum tota, aut cissoide tota, aliterve), vel semper pure (ut ni fallor certo quodam figurae genere a me inventum) datae aequetur; huius quadratricis puncta  $C$  itidem superficiei solidi cuiusdam alia quadam ratione describendi, continebuntur. Punctum  $C$  quod quae-

5

10

15

---

1–3 *Dazu später ergänzt:* Nota doctrinam serierum convergentium a Iac. Gregorio stabilitam, hoc quoque loco utilem esse posse, ad intersectiones sive per aequationem, sive per numerum exprimendas.

15 item ... comparari *erg. L*

---

19 doctrinam serierum convergentium: vgl. dazu *LSB* VII, 3 N. 20 [Spätes Frühjahr – Sommer 1673] S. 249 f.

sito cuidam, ubi scilicet aliquando aequales sunt duae summae, satisfaciat, erit in harum duarum superficierum intersectione communi.

Sed duae superficies istae se secare possunt multis locis, et quolibet loco intersectio communis erit linea: hic primum ex variis locis excludi poterunt alieni a re praesenti, ope 5 appropinquationum, quodam velut dioristicae genere, sed, ut in ipsa linea intersectionis communi punctum quaesitum plene definiatur, adhibeantur rursus aliae  $v$  (retento scilicet semper eodem axe, et ipsis  $y$  et  $s$ . arithmetice seu continue proportionaliter inter se, et secum 10 ipsis uniformiter crescentibus) sygnatae, quarum scilicet locus solidus eodem plane modo describatur; necesse est hunc locum solidum, rursus priorem in multis locis secare; et quidem, in loco per dioristicen appropinquationum iam definito. Cumque trium superficierum intersectio communis sit punctum, ita tandem punctum habebimus. Et quoniam methodus 15 a me ostensa est, cuilibet figurae quotlibet alias sygnatas exhibendi, hinc ad eandem solutionem infinitis modis pervenire poterit, semperque idem reperietur punctum intersectionis; ut adeo hanc methodum etiam examen sui secum ferre, manifestum sit.

15 Unde sequitur quadraturas esse universaliter loquendo, problemata ad superficiem quemadmodum inventiones rectarum curvis aequalium, vel contra, centra gravitatis, sectiones curvarum in qualibet data ratione. Unde patet etiam logarithmorum constructionem geometricam per loca ad superficiem fieri posse. Unde porro sequitur, eas [curvas] quarum longitudo per rectam curvae aequalem determinatur, sive

---

2 Nach intersectione communi später ergänzt:

Sequi videtur sufficere figuras omnino duas isometros, sive quae aliquando data aequali altitudine sint aequales. Nihilominus enim tertia habebitur determinatio ab ipsa  $y$  determinata. Nimirum planum ad axem duorum locorum solidorum communem perpendicularare ipsam  $y$  abscindat. Punctum quo planum hoc per duorum locorum solidorum intersectionem communem transit, erit quaesitum. Ideo sufficit a nobis adhiberi ipsum circulum, et figuram angulorum, sumto utrobique quadrante, seu figura ad quadrantem aequali, et  $y$  posito = radio.

---

19 rectas L ändert Hrsg.

---

12 sygnatas: zur Terminologie s. a. *LSB* VII, 3 N. 23 [Herbst 1673] S. 264–270.

per fila, amplius [mechanicas censendas]; sed mechanicam debere videri determinationem punctorum appropinquatoriam, et descriptionem figurarum per puncta seu discontinuam.

Interea tamen per accidens evenit, ut saepe numero quadraturae per solas lineas sive aequationes duarum quantitatuum indeterminatarum definiri queant, tunc nimirum quando constans quaedam ratio est tangentium ad abscissas; aut cum pro arbitrio, eiusmodi figuras comminiscimur. 5

Videndum item an diversis eiusmodi aequationibus inter se comparatis, quarum una e. g. ipsam  $x$  explicat cum  $v$ , sunt ordinatae circuli, altera cum ordinatae figurae segmentorum; sumendoque  $y$  arbitrariam talem, ut in uno constitut totum e. g. semicirculum, in altero altitudo sit figurae segmentorum portionis semicirculo aequalis; necesse est ipsam  $x$  esse aequalem utrobique. Atque ita videtur determinari problema, atque alterutra ex duabus indeterminatis  $x$  vel  $y$  elidi. 10

Sed nova tamen videtur nasci difficultas ex eo quod etsi  $x$  diversarum illarum aequationum sint aequales, tamen  $s$  sint inaequales, neque cognitae inter se rationis. Evidem verum est esse cognitam rationem  $v$  ad  $y$ , et  $x = \underline{x}$ , et esse  $s^2 = x^2 + v^2$ , vel  $\underline{s}^2 = x^2 + y^2$ . Ergo 15

$$\left[ \frac{\dot{s}^2}{s^2} \right] = \frac{x^2 + y^2}{x^2 + v^2} = 1 + \frac{v^2}{x^2} - \left[ \frac{v^2}{x^2 + v^2} + \frac{v^2 y^2}{x^2 + v^2} \right].$$

satis apparent non ideo haberi  $\underline{s}^2$  ad  $s^2$ . Frustra ergo  $s$  resolvitur in  $x$  et  $v$ , neque inde aliquid amplius discitur. Unde apparent nondum ex his dari rationem deprimendi haec problemata, et ex superficiariis reddendi linearia. 20

13–20 *Dazu später ergänzt:* Etsi ex duarum istarum aequationum collatione non possit problema reduci ad duas incognitas, quia tamen hoc modo intersectione determinatur penitus punctum aliquod quae situm, geometrice; poterit ea determinatio postea calculo exhiberi, et rectae ex puncto in axem perpendiculariter demissae quae sitae valor, analyticc opinor enuntiari.

1 mechanicam censem L ändert Hrsg. 17  $\frac{s^2}{\underline{s}^2}$  und  $\frac{v^2 - y^2 v^2}{x^2 + v^2}$  L ändert Hrsg.

15  $\underline{v}, \underline{x}$ : Zu dieser Bezeichnung vgl. N. 513 S. 821 Z. 12.

Idem est si quotcunque eiusmodi aequationes congerantur, quia etsi earum omnium  $x$  sint aequales; esse tamen ipsas  $\underline{s}$  iterum novas. Quoniam tamen hinc novam quandam conditionem innotescere patet, hinc mirum non est, si superficierum saltem intersectionibus problema resolvatur. Evidem si plures adhuc aliae accedant aequationes, identicae 5 sunt fateor et ex eodem principio ductae. Utiles sunt tamen, contra quam prima fronte videri possit. Evidem fateor si semel omnes problematis conditiones inclusae sint aequationi, alias omnes esse supervacuas (nisi forte ad reductiones), sed hoc loco non potuimus unquam conditionem problematis residuam plene in aequationem redigere, unde aliquot conditionibus eiusmodi semiplenis utendum est.

10 Superest quaerere modum describendi aliquam superficiem curvam aequatione quādam tres indeterminatas quantitates habente expressam; neque enim id a Cartesio explicatum est. Id optime opinor[:] fingi potest planum quoddam rectae cuiusdam velut axi affixum descendere, atque interim ex aequationis legibus crescere atque decrescere. Sed non est hoc commodum praxi.

15 [Spätere Zusätze]

[Zusatz 1]

Examinandum in numeris quantum intersit terminus maximus seu basis an vero altitudo in aequales partes divisa intelligatur.

Loco reductarum aliae quaedam functiones quoque ad quadraturas inveniendas servantur. Et quas facilius ad numeros transferas.

Si geometrica ad numeros transfers, error est aliquis, sed qui nunquam est maior termino maximo in unitatem, seu intervallum terminorum ducto. Ideoque utile est assumere intervallum terminorum minus unitate, fractionem nempe talem, ut maximus terminus in eum ductus sit tamen valde exiguis. Imo nihil prodest ni fallor haec suppositio, cum 20 omnia eodem proportione reveniant.

5 ductae (1), sed faciliorem tamen usum reddunt; ac aequationem quod alioqui ea obtineri nequeat facilius (2). Utiles  $L$  12 opinor[:] (1) fieri potest fingendo (2) fingi  $L$

Vide quam parum haec duo producta distent a duplis. Haec ultra indaganda, ductis terminis in suas differentias, summaque earum tum cum aliis, tum cum semiquadrato termini maximi.

[Zusatz 2]

$$v = \sqrt{4ay - 4y^2}.$$

15

$$v = \frac{\left[ \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right] a^2}{\sqrt{ay - y^2}}. \quad \text{dupla ordinata figurae angulorum}$$

$v = \frac{[a]y}{\sqrt{ay - y^2}}$  vel  $\frac{[a]\sqrt{y}}{\sqrt{a-y}}$ . [dupla] ordinata figurae segmentorum.

Eligatur  $y$  eiusmodi, ut portio in una quaque figura abscissa sit aequalis, nimirum quadrans, unde figura segmentorum dimidia, licet infinite longa assumenda; imo potius omnis duplæ.

20

$$15 \quad (1) \ x = \sqrt{2ay - y^2} \quad (2) \ v = L \quad 16 \quad (1) \ x = \frac{a^2}{\sqrt{2ay - y^2}} \quad (2) \ v = \frac{2a^2}{\sqrt{ay - y^2}} \quad L \text{ ändert}$$

$$Hrsg. \quad 17 \quad (1) \ x = \frac{ay}{\sqrt{2ay - y^2}} \mid \text{vel} \ \frac{a\sqrt{y}}{\sqrt{2a - y}} \ erg. \mid (2) \ v = \frac{2ay}{\sqrt{ay - y^2}} \ \text{vel} \ \frac{2a\sqrt{y}}{\sqrt{2a - y}} \ \text{ordinata } L$$

ändert Hrsg.

Hinc iam si valores  $v$  in aequationem  $s^2 = x^2 + v^2 - 2vy + y^2$  inserantur,

$$\text{fiet: } s^2 = x^2 + 4ay - \frac{3}{4}y^2 - \sqrt{16ay^3 - 16y^4}.$$

$$\text{vel } s^2 = x^2 + 4ay - 3y^2 - 4y\sqrt{ay - y^2}.$$

$$\text{vel } s^2 - x^2 - 4ay + 3y^2 = [-] 4y\sqrt{ay - y^2}.$$

$$5 \quad \text{vel } \frac{s^2 - x^2}{4y} - a + \frac{3}{4}y = [-]\sqrt{ay - y^2}.$$

$$\text{vel } \frac{s^4 - 2s^2x^2 + x^4}{16y^2} - \frac{-as^2 + ax^2}{2y} + \frac{\frac{3}{16}\frac{s^2}{4}y - \frac{3}{16}\frac{x^2}{4}y}{4y} [2] + a^2 \\ - \frac{3}{2}ay + \frac{9}{16}y^2 = ay - y^2.$$

$$\text{fiet: } \frac{s^4 - 2s^2x^2 + x^4}{16} - \frac{-as^2y + ax^2y}{2} + \left[\frac{3}{8}\right]s^2y^2 - \left[\frac{3}{8}\right]x^2y^2 + a^2y^2 - \left[\frac{5}{2}\right]ay^3 + \frac{25}{16}y^4 = 0.$$

Eodem modo et caetera  $v$  investigari possunt et horum locorum ad superficiem inter-

10 sectio communis dabit punctum, ex qua demissae ad axem  $y$  perpendicularis quadratum dimidium aequabitur semicirculo, modo  $y$  assumatur in omnibus aequalis, ipsa nempe diameter. Id enim ad leges harum constructionum pertinet; ut figureae aequales eiusdem sunt altitudinis, ita ut eadem sit  $y$  ac determinata. Unde illud quoque.

4 f. — erg. Hrsg. zweimal      6 2 erg. Hrsg.      8 +  $\frac{3}{16}s^2y^2 - \frac{3}{16}x^2y^2 + a^2y^2 - \frac{1}{2}ay$  L ändert

Hrsg.

## 42. PRIMA CIRCULI QUADRATURA

[Herbst 1673]

Datierungsgründe: Die beiden Stücke dieser Nummer bildeten zunächst eine Einheit. Dies beweisen die Bogenmarkierungen sowie der kustodengesicherte Textübergang. Später hat Leibniz den Zusammenhang aufgehoben und N. 42<sub>1</sub> nach Umarbeitung des Schlusses, unter Beibehaltung der Markierung (1) dem eigentlichen Haupttext (Druck in einem späteren Band der Reihe VII) Cc 2, Nr. 1233A Bog. (2) u. (4) sowie Cc 2, Nr. 563 = Bog. [(3)] vorangesetzt. Hierbei ist N. 42<sub>1</sub>, wie insbesondere die Nummerierung von Figuren und Theoremen auf Bog. (2) zeigt, durchaus selbstständig geblieben. Die Entdeckung der Kreisreihe selbst ist auf Herbst 1673 anzusetzen. Dies ergibt sich aus dem Wasserzeichen des verwendeten Papiers (belegt: Nov. 1673), der Notation sowie dem vorläufigen Bericht am Jahresende 1673 an Huygens, der ihm daraufhin einschlägige Literatur mitgegeben hat (s. HO XX, S. 388; vgl. auch LSB III, 1 S. LIV–LV). — Weiterhin gibt es dafür ein spätes Selbstzeugnis (Leibniz an Conti, LBG S. 278), in welchem Leibniz als Zeit der Entdeckung der Kreisreihe „ungefähr Ende 1673“ angibt.

5

10

42<sub>1</sub>. REDUCTIO GEOMETRICA

**Überlieferung:** L überarbeitetes Konzept: LH 35 II 1 Bl. 89–90. 1 Bog. 2°. 4 S. Zahlreiche Änderungen und Ergänzungen. Auf Bl. 89 r° ca 7 cm breiter Rand für die Figuren (dort auch das ebenfalls ergänzte Lemma). Bogenmarkierung.  
Cc 2, Nr. 1233A tlw.

15




fig. 1.

19 fig. 1.: Entsprechend dem ursprünglichen Ansatz, s. die Variante, stellt fig. 1 eine Hyperbel dar; sie dient gleichzeitig als Paradigma für die Parabel.

Esto figura 1. FAE. et recta quaedam constans AB. abscissa quaelibet AE, applicata quaelibet EF.

Si iam  $FE^2 = EB \wedge AB$  vel  $AE \wedge AB + AB^2$ . ideo ponendo  $FE = y$ .  $AE = x$ . et  $BA = a$ . fiet aequatio  $y^2 = ax + a^2$ .

- 5 Unde sequitur:  $y^2 - a^2 = ax$ . ac denique  $\frac{y^2 - a^2}{a}$  vel  $\frac{y^2}{a} - a = x$ . Est autem  $x = FG$ . applicata trilinei concavi. Ideo cum summa omnium  $x$  facile iniri possit, habebitur et area  $FGA$ . et figurae FAE quadratura. Unde intelligi potest curvam esse parabolicam.

At si curva sit hyperbolica, et AB sit latus transversum, aequale CD. lateri recto, erit per 21. 1<sup>mi</sup> Conicorum  $EF^2 = AE \wedge BE = BE^2 + AB \wedge AE$ . sive  $y^2 = x^2 + ax$ .

- 10 Ostensum est autem alibi (vid. P. Fab. *Synops.* pag. 80. 184. 293. Tab. 1. fig. 18.) esse aliam quandam rectam constantem quam vobabo  $\frac{a}{\beta}$ , et alias quasdam rectas  $\frac{x}{\delta}$  arithmeticis progressionis incidentes, quibus assumtis, retentoque  $y^2$  applicatae hyperbolae quadrato, haec oriatur aequatio:  $y^2 = \frac{x^2}{\delta^2} - \frac{a^2}{\beta^2}$ .

Conferantur hae duae aequationes, fiet:

$$15 \quad \frac{x^2}{\delta^2} - \frac{a^2}{\beta^2} = x^2 + ax. \text{ sive } \frac{x^2}{\delta^2} - x^2 - ax = \frac{a^2}{\beta^2}.$$

Quaestio hoc loco fieri potest an non tetragonismus circuli ex tetragonismo hyperbolae pendeat et vicissim, ob cognitionem aequationum. Nam ut in circulo  $y^2 = ax - x^2$ . ita in hyperbola  $y^2 = ax + x^2$ .

1 Esto (1) hyperbola FAE. cuius latus rectum CD. transversum AB. (a) altitudo (b) abscissa (2) figura 1. FAE. et recta (a) quaelibet (b) quaedam constans L 3 AB<sup>2</sup>. | per (1) 20. (2) 21. 1<sup>mi</sup> Conicorum erg. u. gestr. | ideo L

---

9 erit: APOLLONIOS, *Conica*, I. 21. S. dazu die Variante zu Z. 3 sowie Fr. v. SCHOOTEN, *Commentarii*, DGS I S. 212 f. 10 vid. P. Fab.: s. N. 1.




fig. 2.

Ducta in circulo fig. 2. chorda  $AB$ , cuius  $\square$  est  $ax$  (posita  $AC = x$ . et  $AD = a.$ ), ducitur  $AE = AC = x.$  perpendicularis ad  $AB.$  iunctaque recta  $BE$  erit applicata hyperbolae ad axem.

Contra ducta  $AF = AC$ . et iuncta  $FC.$  erit  $FC^2 = 2x^2.$  et  $CG = CF.$  erit iuncta  $BG = BE.$  applicata hyperbolae. Nam  $GB^2 = CB^2 + CG^2.$

5

Iam  $CB^2 = ax - x^2.$  et  $CG^2 = 2x^2.$  erit  $GB^2 = ax - x^2 + 2x^2 = ax + x^2.$

Deinde in circulo  $y^2 = a^2 - x^2.$  in hyperbola vero  $y^2 = x^2 - a^2.$

(Nota tamen quod ita crescunt  $x$  in circulo, quando applicatae decrescent, cum in hyperbola simul decrescant.)

Dividantur  $\frac{ax - x^2}{\frac{ax}{\beta} + \frac{x^2}{\delta}}$ . Videndum an eadem semper ratio, utcunque augeatur mi- 10

nuaturve  $x.$  quod non est. Sumatur  $a$  utrobique idem, solo  $x$  positio diverso. Et postea sumatur  $\frac{2xa - 4x^2}{\frac{2xa}{\beta} + 4x^2}$  vel  $\frac{ax - 2x^2}{\frac{ax}{\beta} + 2x^2}.$  Videndum an haec ratio eadem cum priore. At certum

est non esse. Alioquin figurae forent homogeneae.

At ego aliam reperi rationem sane admirabilem demonstrandi quadraturam circuli ex data hyperbolae quadratura et vicissim.

15


10+12 Neben  $\delta$  wäre hier auch  $\beta$  zu streichen gewesen. 15 vicissim: s. N. 44.

Esto in fig. 3. [Figur s. S. 729] circulus centro A. radio AB. quadrans circumferentiae BCD. et ex quolibet puncto in eo assumto C. ducatur tangens CE. donec scilicet radio AB producto occurrat in E. Eadem rectae BF, parallelae AD. occurret in F. Ad rectam EFC agatur ex B normalis. Denique ex C demittatur in AB perpendicularis CH.

In hoc diagrammate manifestum est ante omnia  $BF = CF$ . Addo iam esse etiam  $BG = BH$ . Ducta enim ex B in AC perpendiculari BI. ea utique ipsi EC parallela est (quia utraque est ad eandem AC perpendicularis), ergo  $BG = CI$ . Iam  $CI = BH$ . Ergo et  $BG = BH$ . Quod autem  $CI = BH$ . constat ob circuli uniformitatem, sed 10 et nullo negotio demonstrari potest. Triangula rectangula AIB et AHC similia sunt, ob angulum non rectum BAC communem. Iam  $AC = AB$ . ergo et  $AI = AH$ . Ergo etiam  $AC - AI$  seu  $CI$  erit  $= AB - AH$  seu  $BH$ . Nunc AB vocemus a. et  $BH = BG = CI$  vocemus x. et  $HC = BI$ , y. Iamque investigemus rectam BF. Quod ut fiat compendiosius, considerandum est, triangula FGB et AHC esse similia, et angulum 15  $BAC = \text{angulo } BFG$ . Manifestum enim est angulum  $EBG$  esse = angulo  $BAC$ . at angu-

---

729,1 Zu fig. 3.:



<sup>1</sup> fig. 3.: Zunächst hat Leibniz nur den auf den folgenden Text (bis S. 734 Z. 7) bezogenen Teil von fig. 3. gezeichnet. Erst dann hat er die Figur um den die Zissoide betreffenden Teil ergänzt. S. a. die Erl. zu S. 734 Z. 11.




fig. 3.

---

Lemma: Si per trianguli tres angulos  $A. B. C.$  totidem transeant rectae parallelae  $DA. EB. FC$  et latus aliquod velut  $BC$  producatur, dum  $DA$  parallelae anguli oppositi  $A$  productae si opus est occurrat in  $G$ , rectangulum sub intervallo  $AG$  dicti anguli oppositi  $A$  a puncto occursus  $G$  et  $BH$  intervallo  $EB. FC$  parallelarum duorum reliquorum angulorum  $B. C.$  aequatur triangulo proposito  $ABC$  duplicato.

lo  $EBG$  aequalem esse angulum  $BFG$  patet. Ergo

$$BF : AC :: BG : HC. \text{ ac proinde } BF = \frac{AC \cap BG}{HC} \text{ sive } \frac{ax}{y}.$$

Nunc punctum arcus circuli  $AC$  quodlibet unum post alterum appellemus  $C$ . eodemque plane modo tractari cogitemus, similiterque punctis aliis ad priora respondentibus easdem literas  $H. E. F.$  etc. demus, ac denique omnes ac singulas  $BF$  transferamus in  $HL$ . ac in punctis  $H$  respondentibus ipsi  $BA$  ordine ad perpendiculum applicemus. Oritur figura quaedam curvilinea  $BLLH$ . Cuius ut indagemus naturam, abscissae eius, quae eadem cum circulari est  $BH$ . relinquamus appellationem  $x$ , applicatam  $HL$  appellemus recepto more  $y$ . Atque ideo confusionis vitandae causa priori  $y = HC$ . substituamus eius definitionem, quae est, ex natura circuli:  $\sqrt{2ax - x^2}$ . Ac proinde cum antea dixerimus

$$BF = \frac{ax}{y}. \text{ nunc dicemus } BF = HL = y = \frac{ax}{\sqrt{2ax - x^2}}. \text{ Unde sequitur}$$

$$HL^2 = y^2 = \frac{a^2 x^2}{2ax - x^2}.$$

Nunc inverso modo quasi cognita  $y$  quaeramus ipsam  $x$ . Id est loco figurae  $BLLH$  consideremus  $BLLM$  figurae  $BLLH$  supplementum ad rectangulum  $BL$ ; sumtisque abscissis  $BM$ . quae applicatis  $LH$  prioris figurae aequales sunt, ac proinde  $y$  vocari possunt, quaerantur  $ML = BH = x$ . Ac proinde ut ante  $x$  assumtae sunt progressionis arithmeticæ, et  $y$  quales natura figuræ dare potest, ita nunc contra  $y$  velut cognitis et arithmeticæ progressionis assumtis, quaeratur  $x$ .

Quod antequam fiat obiter annoتو, figuram  $BLLH$  esse convexam, et  $BLLM$  concavam.

Nam ut confusio vitetur literarum, maior  $LH$  appelletur  $OP$ . et minor  $LH$  appelletur  $SR$ . Iamque ducta recta  $OB$ . quae ipsi  $SR$  productæ si opus est, occurrat in puncto  $N$ . aio istam  $SR$  esse maiorem quam  $NR$ . ac proinde non esse opus ut  $SR$  producatur ad occursum, quod ita demonstro[:]

Cum sit  $BR : [BP] :: NR : OP$ . ratio ista  $\left[ \frac{BP}{BR} \right]$  appelletur  $\beta$ . ac  $OP$  divisa per  $\beta$  dabit

$NR$ , quae an maior minorve sit quam  $SR$  ita ex calculo patebit:

$$OP = \frac{ax}{\sqrt{2ax - x^2}}. \text{ quae divisa per } \beta \text{ dabit } NR = \frac{ax}{\sqrt{2\beta^2 ax - \beta^2 x^2}}. \text{ At } SR \text{ habebimus}$$

24 BO sowie  $\frac{BR}{BO}$  L ändert Hrsg.

$$\text{ex } OP \text{ si in } SR \text{ pro } [BP] = x. \text{ substituamus } BR = \frac{x}{\beta}, \text{ fiet } SR = \frac{\frac{ax}{\beta}}{\sqrt{\frac{2ax}{\beta} - \frac{x^2}{\beta^2}}} =$$

$\frac{ax}{\sqrt{2\beta ax - x^2}}$ . Restat ergo ut videamus utrum maius sit:  $2\beta^2 ax - \beta^2 x^2$ , an vero  $2\beta ax - x^2$ .

Et vero cum  $\beta$  sit numerus maior unitate, et  $a$  maior quam  $x$ . ideo  $a$  appellabo  $\gamma x$ . fiet:  $2\beta^2 \gamma x^2 - \beta^2 x^2$ , item  $2\beta \gamma x^2 - x^2$ , divisus omnibus per  $x^2$ , fiet:  $2\beta^2 \gamma - \beta^2$ . item  $2\beta \gamma - 1$ .

5 Quorum utrum altero maius sit nova quaestio est.

Ac primum ponamus  $\beta = \gamma$ . id est  $[BR : BP :: BP : a]$ . fiet  $2\gamma^3 - \gamma^2$ . item  $2\gamma^2 - 1$ . Manifestum est  $2\gamma^3 - \gamma^2 - \gamma^2 + 1 = 2\gamma^3 + 1 - 3\gamma^2$ . [esse maius quam 0.] Et vero si  $\gamma = \beta$  est 2 aut maior quam 2. (Imo et si paulo minor, sed haec subtilius hoc loco determinare nihil attinet.)

10 Sin  $\beta = \gamma + \delta$ . tunc  $2\beta^2 \gamma - \beta^2$ . item  $2\beta \gamma - 1$ . ita poterunt enuntiari:  $2\gamma^3 + \delta^2 \gamma + 2\delta \gamma^2 - \gamma^2 - \delta^2 - 2\gamma \delta$ . item  $2\gamma^2 + 2\delta \gamma - 1$ . Ergo videndum an sit maior quam 0, haec quantitas:

$$2\gamma^3 + \cancel{\delta^2 \gamma} + 2\delta \gamma^2 - \cancel{2\delta \gamma} + 1 - 3\gamma^2 - \cancel{\delta^2} - \cancel{2\delta \gamma}.$$

$\theta$

Manifestum est  $\delta^2$  esse minus quam  $\delta^2 \gamma$ . et differentiam esse  $\theta$ . Tandem manifestum est

15  $2\gamma^3$  esse maiorem quam  $3\gamma^2$  si  $\gamma$  sit 2 aut maior (vel etiam paulo minor) quo casu et  $2\delta \gamma^2$  maior vel aequalis  $4\delta \gamma$ .

His ergo casibus  $SR$  maior quam  $NR$ .

Si  $\gamma$  est maior quam  $\beta$ . erit  $\beta = \gamma - \delta$ . et  $2\beta^2 \gamma - \beta^2$ . item  $2\beta \gamma - 1$ . ita poterunt enuntiari:  $2\gamma^3 + \delta^2 \gamma - 2\delta \gamma^2 - \gamma^2 - \delta^2 + 2\gamma \delta$ . item  $2\gamma^2 - 2\delta \gamma - 1$ . Videndum ergo an sit maior quam

---


$$15 \quad \frac{5}{4} \quad \frac{25}{16} \hatwedge 3 = \frac{75}{16}. \quad \frac{125}{64} \hatwedge 2 = \frac{250}{64}.$$

1 BO L ändert Hrsg.      6 BR : BO :: BO : a L ändert Hrsg.      7 esse maius quam 0. erg.  
Hrsg.

---

10–733,5 Die zweite und die dritte Abschätzung sind nicht fehlerfrei. Bei der 2. Abschätzung vernachlässigt Leibniz bei den Gliedern  $\delta^2 \gamma$  und  $2\delta \gamma^2$  den zusätzlichen Faktor 2, was aber lediglich eine Vergrößerung bedeutet. Bei der 3. Abschätzung kommt zu diesen noch ein wesentlicher Übertragungsfehler hinzu, so dass die 3. Abschätzung nur vermeintlich gelingt.

0 haec quantitas:

$$2\gamma^3 + \cancel{\frac{\delta^2\gamma}{\theta}} + 2\cancel{\delta} + 1 - 3\gamma^2 - \cancel{\frac{\delta^2}{\theta}} - 2\cancel{\delta\gamma}.$$

Unde rursus intelligitur, si  $\gamma$  sit maior quam 2,  $SR$  esse maiorem quam  $NR$ .

Generaliter ergo dici potest, si  $\frac{a}{x}$  maior quam 2. erit  $\frac{SR}{NR}$  maior quam 1. 5

At si  $BH$  maior fiat dimidia  $AB$ . contingere tandem necesse est, ut figura ex convexa concava fiat. Punctum autem flexus contrarii exacte definire, hoc loco nihil attinet.

Haec obiter tantum attulisse iuvabit, ut appareat rem eo redire, ut quaerantur duae rectae  $SR$  et  $NR$  facili calculo, dividendo basin figurae  $PO$  per  $\beta$ . posita  $\beta$  ratione altitudinis figurae  $BP$  ad abscissam datam  $BR$ . quo pacto habebitur  $NR$ ; ac in eadem  $PO$ , pro  $x$  substituendo  $\frac{x}{\beta}$  habebitur  $SR$ . Suppono autem ipsam  $PO$ . aequatione quadam omnia figurae puncta ad altitudinem  $BP$  referente, cognitam. Inventae  $SR$  et  $NR$  comparentur, facileque constabit ex regulis, quae de determinatione, et limitibus aequationum extant, utra alia quoque casu maior sit minorve. Nam si perpetuus est vel excessus vel defectus, figura concava aut convexa est, sin aliquis limitibus continetur, duobus pluribusve flexibus contrariis figura constabit. 10  
15

Ac nunc quidem ad aequationem nostram

$$y = \frac{ax}{\sqrt{2ax - x^2}}.$$

redeamus. Ac nunc quidem ipsas  $x$ . seu  $LM$ . applicatas trilinei concavi  $BLLM$ , quae-remus. Nimirum eliminata surditate, fiet:  $y^2 = \frac{a^2x^2}{2ax - x^2}$ . et reformata fractione habe-20  
25 bimus:  $2y^2ax - y^2x^2 = a^2x^2$ , divisisque omnibus per  $x$ . erit:  $2y^2a - y^2x = a^2x$ . sive  $2y^2a = a^2x + 2y^2x$ , ac denique

$$\frac{2y^2a}{a^2 + 2y^2} = x.$$

---

13 constabit ex regulis: vgl. dazu Fl. DEBEAUNE, *De limitibus aequationum*, DGS II S. 117–152.  
 20f. habebimus: Leibniz hat anstelle von  $y^2x^2$  irrtümlich  $2y^2x^2$ . Er rechnet mit dem falschen Wert konsequent bis zum Schluss des Stücks weiter. Im Laufe der Überarbeitung werden lediglich die beiden ersten Formeln bereinigt und der Fehler am Rande, s. S. 737 Z. 1, zusätzlich vermerkt.

Ergo progressio elementorum  $ML$  figuram  $BLLM$  componentium ab asymmetria liberata est, sunt enim eius applicatae  $x$  inter se invicem ut numerus ad numerum; et infinita serie numerorum rationalium exacte possunt exhiberi.

Sed ne quis operam in figura hac nova pervestiganda nos lusisse putet: ostendendum

5 nunc est idem beneficium in circulum inde redundare. Quam in rem praeclarum invenimus theorema, quod nunc breviter exponere ac demonstrare operaे pretium est.

Aio igitur figuram  $BLLH$  aequari segmento circuli  $BCCB$  duplicato.

Cuius demonstrationem habeo pulcrum admodum, sed quae generalior est, quam opus sit in rem praesentem; suffecerit ergo veritatem theorematis nostri, quanquam obliquo  
10 nonnihil itinere obtinuisse.

Quam in rem figura cissoeidis  $BKTTZ$  ubilibet terminata, aut etiam longitudine infinita semicirculo generatori  $BDK$  ita imposita intelligatur, ut basis cissoeidis cum diametro circuli eadem sit  $BK$ , asymptotos autem cissoeidis ad basin perpendicularis utcunque producta  $BZ$ , semicirculi extremum  $B$  tangat. Applicatae autem cissoeidis, asymptoto  
15 parallelae, sive rectae ex punctis curvae cissoeidis,  $T$ , in diametrum demissae,  $TQ$ , transferantur in ipsam asymptoton, ibique inde a basi assumtae intelligentur, ut  $BZ$ . Iamque recta  $KTV$  ex altero semicirculi extremo  $K$  per  $T$  usque ad asymptoton producatur, cui occurrat in  $V$ .

Constat ex natura cissoeidis, hanc rectam  $KTV$ , arcum semi-circuli  $ABC$  in punto  
20 aliquo  $C$  ita secare, ut  $VT$  sit aequalis ipsi  $KC$ . Unde sequitur,  $CH$ . sinum in diametrum  $BAK$  demissum aequari ipsi  $VZ$ .

1 componentium (1) surditate liberat (2) ab asymmetria  $L$  11 rem (1) inspiciatur figura cissoeidis (alibi a me delineata)  $AIKC$  (a), eiusque applicatae cuilibet ad circulum perpendiculari in asymptoto  $CF$  (extremum C semicirculi generatoris | eandem cum cissoe erg. u. gestr. | ABC tangente) | inde a C erg. | assumtae, addatur  $KH$  (aa) aequalis  $ED$  sinui circuli, ad asymptoton parallelo, ex punto E, quo in (bb) vel  $ED$  sinus circuli demissus in diametrum  $AC$  ex circumferentiae circuli punto E, quo recta ex punto cissoeidis I in extremum (b). Cuius asymptotos utcunque producta sit  $CF$ , (aa) basis, (bb) et cissoeis ipsa quae circulo (2) figura  $L$  21 ipsi (1)  $KH$ . | ac proinde si perpetuo ad applicatam (a) cycloë (b) cissoeidis sinus respondens adiciatur, inde fieri BV. gestr. | (2)  $VZ$ .  $L$

1 asymmetria: zur Terminologie vgl. Fl. DEBEAUNE, *De natura aequationum*, DGS II S. 115.

11 Zur Variante: Die in der Variante angesprochene Figur ist Fig. 4 von N. 34. Leibniz hat zunächst diese Figur benutzt, dann aber gemerkt, dass er damit nicht weiterkommt; er hat daraufhin fig. 3. entsprechend erweitert und im stehengebliebenen Text Z. 11–21 die Bezeichnungen angepasst.

Exempli causa cum sit  $\gamma\theta = \alpha K$  erit etiam  $\gamma\delta = \alpha\beta$ . Quoniam triangula  $\gamma\delta\theta$  et  $\alpha\beta K$  similia sunt. Igitur si rectae  $BZ$ , verbi gratia  $B\delta$  addatur sinus  $CH$ , v.g.  $\alpha\beta$ . (aequalis intervallo  $ZV$ , v.g.  $\delta\gamma$ ) fiet inde recta  $BV$ , v.g.  $B\gamma$ . At vero recta  $BV$ . verbi gratia  $B\lambda$ , quam tangentem falsam appellare soleo, quod scilicet secans, quae ei occurrit  $KV$ , v.g.  $K\lambda$ . non ex centro  $A$ , sed opposita circuli extremitate, educitur; est nostrae  $BF$ , initio propositae, verbi gratia ipsius  $B\mu$  dupla. Quod ita demonstro:

$BF$  est  $= FC$ , verbi gratia  $B\mu$  est  $= \mu\xi$ , nam utraque circulum tangit, quare  $A\mu$  arcum  $B\xi$  bisecat. Quare  $BF$  sive  $HL$ , v.g.  $B\mu$  sive  $OP$  vel in t e r v a l l u m puncti in circumferentia designata, a tangente alterius puncti, in ipsiusmet puncti prioris tangente assumptum: est t a n g e n s c a n o n i c u s arcus inter duo puncta intercepti dimidiati.

T a n g e n t e m autem c a n o n i c u m id est canonis mathematici calculo comprehensum, appello, ut a tangente quolibet, utcunque limitato, aut producto discernam, eum scilicet, qui cum radio et s e c a n t e aliquo (quem eodem iure c a n o n i c u m voco) triangulum rectangulum constituit. Idque commodius videtur, quam nomina usu recepta cum magno geometra Francisco Vieta prorsus immutare.

I n t e r v a l l u m quoque inter lineam et lineam vel lineam et punctum intelligi potest vel simpliciter, quo casu est perpendicularis intercepta, vel ita ut in alia recta assumi cogitetur, cuius tunc portio est. Sed haec obiter.

Hinc vero, ut pergamus, sequitur rectam  $A\mu$  esse rectae  $K\lambda$  parallelam, sive angulum  $BA\mu$  esse angulo  $BK\lambda$  aequalem. Est enim angulus  $BA\mu$  dimidius anguli  $BA\xi$ . at angulus  $BK\lambda$ . qui est ad circumferentiam, est etiam dimidius anguli  $BA\xi$  qui est ad centrum, super arcu eodem [B\xi]. Cum ergo anguli  $BA\mu$  et  $BK\lambda$  sint aequales, erunt triangula  $\mu BA$  et  $\lambda BK$  similia, cumque latus  $BK$  sit duplum lateris homologi  $BA$ , etiam recta  $B\lambda$  erit dupla rectae  $B\mu$ . sive tangens canonicus semiarcus dati, erit tangens canonicus falsus arcus dati dimidiatus.

Eaedem demonstrationes vim habent, etsi punctum unum ab altero plus quam quadrante distet, id est etsi arcus  $BC$  sit maior quadrante, ut si punctum  $C$  sit  $\alpha$ , sinus  $\alpha\beta$ , tangens  $\alpha\varphi$ , distantia eius seu perpendicularis ex punto  $B$  in tangentem  $B\pi$ . Quam dico aequalem esse  $B\beta$  abscissae, nam  $B\varphi = \alpha\varphi$ . et ob arcus circuli uniformitatem, perinde est, sive perpendiculararem ducas ex una extremitate arcus  $B$  in alterius extremitatis  $\alpha$  tangentem  $\alpha\varphi$ , quae perpendicularis est  $B\pi$ , sive ex altera extremitate  $\alpha$

3 f.  $B\lambda$ , (1) quam cissoeidis falsae, sive sinu circuli auctae applicatam (2) quam  $L$  9 puncti,  
| plus quam quadrante non distantis, gestr. | in ipsiusmet  $L$  11 f. id est ... comprehensum erg.  $L$   
15 cum (1) summo g (2) magno  $L$  22  $B\mu L$  ändert Hrsq. 26–736,5 Eadem demonstrationes ...  
accommodari posse. erg.  $L$

ad alterius extremitatis  $B$  tangentem  $B\varphi$  perpendiculararem ducas, quae est abscissae  $B\beta$  aequalis.

Porro cum etiam angulus  $BA\alpha$  sit anguli  $BK\alpha$  duplus, manifestum est, ut verbis parcam, eandem prorsus demonstrationem, quam supra dedimus, arcui quadrante maiori 5 accommodari posse.

Ex his ita demonstratis deduco, summam omnium  $BF$  bis sumtam figuram  $BLLH$  duplicatam a cissoeidis parte respondentem, sive eundem arcum circuli generatoris  $BC$ . v. g.  $B\xi$  habente, spatio scilicet trilineo  $KT\omega QK$  differre summa sinuum  $CH$ , sive spatio circulari  $BCCH$ . exempli gratia  $BC\xi PB$ .

- 10 At vero constat, ostensum est ab eximiis nostri temporis geometris, spatium illud cissoeideale aequari triplo segmento  $BC\xi B$  arcus generantis  $BC\xi$ , trianguli segmento subtensi  $B\xi P$  area prius ab illis detracta. Hinc sequitur summam omnium  $BV$  (seu  $2 BF$ ) aequari quadruplo, et  $BF$  duplo segmento  $BC\xi B$ .

$$\text{Nam } KT\omega QK + BC\xi PB = 2 BLLH.$$

$$15 \quad \begin{array}{ccc} \diagup & & \diagdown \\ 3 BC\xi B - B\xi P & & BC\xi B + B\xi P \end{array}$$

$$\text{Ergo } BLLH = 2 BC\xi B.$$

Fateor equidem potius ex theoremate nostro mensuram cissoeidis demonstrari debere, imo alibi demonstratum esse, sed malui tamen nunc quidem hanc rationem inire.

- 20 Cum ergo iam ostensum sit summam omnium  $LH$ . seu figuram  $BLLHB$  aequari duplici segmento  $BCCB$ . at vero dudum supra sit demonstratum, differentiam figurae  $BLLH$ . a rectangulo  $BL$ . quod vocemus  $b^2$  seu trilineum  $BLLMB$ , esse summam omnium  $x = \frac{2y^2a}{a^2 + 2y^2}$ . sequitur segmentum circuli duplicatum esse  $b^2 -$  summ. omn.  $\frac{2y^2a}{a^2 + 2y^2}$ . ac proinde segmentum esse

6 deduco, (1) figuram omnium  $BF$ , sive figuram  $BLLH$  (a) aequari cycloidi ab eodem circuli (b) a cissoide eundem circu (2) summam  $L$  10 ab (1) eximio geometra Ioh. Wallisio (2) eximiis  $L$  19 imo ... esse erg.  $L$

10 ostensum est: vgl. dazu J. WALLIS, *Mechanica*, 1670–71, S. 531–533, 754–759 (WO I S. 904 bis 910).

$$= \frac{b^2}{2} - \text{summ. omn. } \frac{y^2 a}{a^2 + 2y^2}.$$

eiusque, aut potius figurae ei aequalis, elementa crescere in ea semper ratione quae est numeri ad numerum.

Quae progrediendi ratio ut numeris explicitur, debet  $a$  supponi = numero infinito, at  $y = 1$ . vel 2. vel 3. vel 4. etc. cum reprezentet ipsas abscissas seu  $BM$  arithmeticæ crescentes. Sed ut in numeris finitis series representetur, ponatur  $a$  vel radius  $BA$  divisus in centum partes aequales, qualibus ipsae  $BM$  abscissæ uniformiter crescunt. Quod si tabulam ad usum condere vellemus, posset  $BA$  divisa cogitari in partes 1 000 000. Nunc vero posita, ut dixi  $a = 100$ , et  $y = 1$ . vel 2. vel 3. vel 4. etc. series haec erit omnium

$$\frac{y^2 a}{a^2 + 2y^2} [:]$$

$$\frac{1}{102} \quad \frac{4}{108} \quad \frac{9}{118} \quad \frac{16}{132} \quad \frac{25}{150} \quad \frac{36}{172} \quad \frac{49}{198} \quad \frac{64}{228} \quad \frac{81}{262} \quad \frac{100}{300} \quad \text{etc.}$$

quae ducta in 100 dabat:

$$\frac{100}{102} \quad \frac{400}{108} \quad \frac{900}{118} \quad \frac{1600}{132} \quad \frac{2500}{150} \quad \frac{3600}{172} \quad \frac{4900}{198} \quad \left[ \frac{6400}{228} \right] \quad \frac{8100}{262} \quad \frac{100,00}{300} \quad \text{etc.}$$

summam omnium  $\frac{y^2 a}{a^2 + 2y^2}$ .

Nunc intelligatur recta  $BF$ . vel ei respondens ab altera parte  $BM$ . dividi in partes aequales infinitas  $FF$ . vel  $MM$ . et in diametro  $BK$  designentur totidem respondentes  $HH$  (etsi inter se inaequales), ductis scilicet  $FC$  tangentibus et  $CH$  sinibus. Iungantur

5

10

15

1 NB. error calculi in sequentibus: non erat dicendum  $\frac{y^2 a}{a^2 + 2y^2}$ , sed  $\frac{2y^2 a}{a^2 + y^2}$ .

13  $\frac{6400}{228}$  erg. Hrsg.      15 (1) Ut si (2) Nunc intelligatur diameter  $BK$ . divisa in partes aequales (a) infinitas (b) quantitate sive finitas sive infinitas (c) sive finitas, sive infinitas (d) numero infinitas  $BH$ .  $HH$ .  $HH$ . etc. ut v. g.  $BH$ . vel  $RP$ . | vel  $\rho\beta$  erg. | et ex punctis divisionis applicatae perpendicularares seu sinus  $HC$ . usque ad circumferentiam eductae intelligantur | ut in punctis  $C$ . occurrant erg. | v. g.  $P\xi$ .  $\beta\alpha$ . Denique ducantur totidem  $BC$ . (3) Nunc  $L$

9 series haec: Bei konsequenter Rechnen müsste in den Nennern der folgenden Brüche 10 002, 10 008, 10 018 etc. stehen.

quaelibet proxima puncta  $C$  per rectas  $CC$ , qualis recta est v. g.  $\psi\xi$ . Recta  $CC$  producatur, dum occurrat ipsi  $BV$  in  $F$ , v. g.  $\xi\psi$  producta incidat in  $V$ . et cum  $HH$ , v. g.  $RP$ . sit infinite parva,  $FC$ , v. g.  $V\psi$  circulum tanget: dixi triangulum, duabus  $BC$  proximis, et una  $CC$  comprehensum duplicatum, aequari rectangulo  $HH \wedge BF$ , v. g. triangulum 5  $B\psi\xi$  duplicatum aequari rectangulo  $RBM$ , idemque de aliis omnibus triangulis ac rectangulis respondentibus dici posse, unde manifestum est, qua ratione series numerorum rationalium huc queat applicari. Nam triangula  $BCC$ , sive elementa segmentorum per triangula  $BCC$  continue adiecta in alia segmenta crescentium sunt inter se, ut numeri rationales. Quod ostendo, nam cum in rectangulo  $MH$  semper  $BM$ , y. quippe arithmetice crescentes seu figurae  $BMMH$ , et  $LM$ , quippe  $x = \frac{2y^2a}{a^2 + 2y^2}$ , sint rationales, erunt 10 et rectangula comprehensa, quantitates rationales a quibus si series infinita numerorum rationalium subtrahatur, erit et residuum rationale. Residuum autem  $BLLH$  segmento aequale est. Quare quantitas segmentorum circuli infinita serie numerorum rationalium explicari potest. Et triangula  $BCC$  ex hac constructione orta latitudinis infinite parvae, sive segmentorum continue crescentium elementa erunt inter se velut numerus ad 15 numerum.

Quod ut facilius exhibeatur calculo, consideranda sunt duo, a l t e r u m quod dimicimus, semper rectangulum  $LHH$ , seu  $LH \wedge HH$ , v. g.  $SR \wedge RB$  (vel  $OP \wedge PR$ ), esse

7–17 applicari. (1) Sed quoniam elegans admodum atque utilis haec consideratio est, placet eam distincte exequi. (a) Esto (b) Ponatur  $MM = 1$ . erit  $BM = y = 1$ . vel 2. vel 3. vel 4. etc. |  $ML = BH$  semper est  $\frac{2y^2a}{a^2 + 2y^2}$ . erg. | At a. perpetuo constans aequalis est numero infinito. Posita iam  $BH$ , hoc loco  $BR$ . infinite parva seu  $= HH$ . manifestum est triangulum  $BCC$ . inter  $B$ . et  $\psi$ . cadere nullum, eiusque valorem proinde esse 0. seu nullum. Eodem modo positio  $BM = y$ . esse infinite parvam, seu  $= MM = 1$ . erit  $ML$ , seu  $BH$ , hoc loco  $BR$  vel  $MS = \frac{2a}{a^2 + 2}$ , quae applicata  $MS$ . ducta in portionem altitudinis, cui applicatur aequalis 1. seu unitatem constructionis (neque enim aliter applicatae velut lineae in calculum spatiorum venire possent, nisi hoc modo, ut ridiculo utar verbo, rectangularisarentur), dabit idem  $\frac{2a}{a^2 + 2}$ , ut proinde imposterum ea multiplicatio subticeri possit. Rectangulum autem  $MLH$  erit hoc loco,  $y$  esse infinite parvam  $= MM = 1$ . etiam:  $\frac{2a}{a^2 + 2}$ , et cum subtracto (2) | Nam . . . numerum. | Quod calculo ostendam. Minima  $BM$  esto  $= 1$ . erit minimum rectangulum  $\frac{2y^2a}{2y^2 + a^2}$ . quod si calculatur  $MM = 1$ . gestr. | erg. | Quod  $L$

triangulo duplicato  $BCC$ , v. g.  $B\psi\xi$ , aequale; a l t e r u m , quod nunc admonendum est, rectangulum eiusmodi  $LHH$  v. g.  $SR \cap RB$  (aut  $OP \cap PR$ ), fieri ex  $BM = y = LH$ . v. g.  $SR$  (vel  $OP$  arithmetic progressionem crescentibus, ut 1. 2. 3. 4. etc.) ducto in  $HH$ , v. g.  $BR$ , differentiam inter ipsam  $x = BH = ML$  assumtam, v. g.  $BR$  et inter praecedentem, quae erit 0. assumatur pro  $x$ , ipsa recta  $RB$ , nempe omnium  $x$  prima, unde differentia inter  $RB$  et 0 tunc erit ipsa  $RB$ . Quod si recta assumta  $BH = ML = x$ . sit alia a prima, velut si sit  $BP$ . tunc  $HH$  erit hoc loco  $RP$ , differentia inter  $BR$ , nempe  $x$  sive  $BH$  vel  $ML$  praecedentem, et  $BP$ , nempe  $x$  sive  $BH$ , aut  $ML$ , praesentem sive assumtam. Hinc facilis redditur calculus, tantum enim, computata ipsarum  $x = \frac{2y^2a}{2y^2 + a^2}$ , serie, prout scilicet

terminus  $y$  continue alius atque alius arithmetic progressionem assumitur; sumenda sunt earum differentiae, et in ipsas  $y$  numeros scilicet progressionis arithmeticae ducendae, et habebuntur duplicatae areae triangulorum  $BCC$  (v. g.  $B\psi\xi$ ) ex quibus segmenta circuli conflantur ac quibus velut elementis (applicatarum loco) crescunt.

$$\begin{array}{cccccc} BM. & y & = & & & \\ & 1 & & 2 & & \\ ML. & x & = & & & \\ & \frac{2a}{a^2 + 2} & & \frac{8a}{a^2 + 8} & & \frac{18a}{a^2 + 18} & & \frac{32a}{a^2 + 32} & & \frac{50a}{a^2 + 50} \\ & & & & & & & & & & & \end{array} \quad \begin{array}{c} 15 \\ 10 \\ 5 \\ 15 \end{array}$$

$\nabla^{la} BCC$

$$\begin{array}{cccccc} 8 - 2, \wedge \frac{5}{3} = 10 & & 18 - 8, \wedge 3 & & & \\ \hline & & & & & \\ \frac{2a}{a^2 + 2} \Big| & \frac{10a^3}{a^4 + 10a^2 + 16} & \Big| & \frac{30a^3}{a^4 + 26a^2 + 144} & \Big| & \frac{56a^3}{a^4 + 50a^2 + 576} \Big| & \frac{90a^3}{a^4 + 82a^2 + 1600} \\ \cdot & \swarrow & \cdot & \swarrow & \cdot & \swarrow & \cdot \\ \cdot & a^2 + 2, \wedge a^2 + 8 & \cdot & a^2 + 8 \wedge a^2 + 18 & \cdot & a^2 + 8 \wedge a^2 + 18 & \cdot \\ \cdot & \swarrow & \cdot & \swarrow & \cdot & \swarrow & \cdot \\ \cdot & a^4 + 8a^2 + 2a^2 + 2 \wedge 8 & \cdot & a^4 + 18a^2 + 8a^2 + 18 \wedge 8 & \cdot & a^4 + 18a^2 + 8a^2 + 18 \wedge 8 & \cdot \\ \text{Segmenta } BCCB & \underbrace{\hspace{10em}}_{\cdot} & \underbrace{\hspace{10em}}_{\cdot} & \underbrace{\hspace{10em}}_{\cdot} & \underbrace{\hspace{10em}}_{\cdot} & \underbrace{\hspace{10em}}_{\cdot} & \underbrace{\hspace{10em}}_{\cdot} \end{array} \quad \begin{array}{c} 20 \\ 25 \end{array}$$

12 duplicatae erg. L

18  $\nabla^{la} BCC$ : Bei konsequenter Rechnung hätten die Werte für die Teildreiecke (abgesehen von dem falschen Wert für das zweite Teildreieck) noch durch 2 geteilt werden müssen.

Posita ergo unitate, linea infinite parva, et  $a$  numero infinito, series qualem cepi in infinitum continuata segmenti cuiuslibet circularis, ex quibus maximum est semicirculus, mensuram dabit. Sed quoniam nec series infinitae absolvit, nec numeri infiniti exprimi possunt; ideo ut ista quam sunt pulchra demonstratu, tam fiant usu expedita, docere 5 operae pretium est, quomodo hinc duci possint appropinquationes ad veram circuli mensuram omnibus hactenus inventis commodiores. Quod adeo verum est, ut ausim dicere, nihil inde a temporibus Archimedis maioris ad cyclometriam momenti repertum. Tantum ergo numerus  $a$ , infiniti loco assumendus est maximus, ita enim, quanto ille assumetur maior, tanto exactius mensura circuli eiusve partium exhibita referet veram. Deinde arte 10 quadam, quam mox exponam series hoc loco exposita in aliam commutanda est, quae nos continuandi opere absolvat.

Ars autem illa in eo consistit, ut elementa segmentorum, ad elementa hyperbolae revocemus, quod hactenus potuit nemo; quoniam elementa hyperbolae rationalibus numeris exacte exprimi possunt, quod huc usque frustra in circulo tentatum est.

15 Sed ut haec praestemus resumenda est aequatio nostra naturam progressionis segmentorum exhibens,  $x = \frac{2y^2a}{a^2 + 2y^2}$ . Potest autem in numeratore huius fractionis,  $2y^2a$ , omitti  $a$ , cum enim  $a$  sit perpetuo eadem, summa per eam multiplicari potest, ut nihil opus sit repeti sigillatim, fiet ergo  $\frac{x}{a} = \frac{2y^2}{2y^2 + a^2}$ . eam vero quantitatem aio aequalem esse huic:  $1 - \frac{a^2}{a^2 + 2y^2}$ . Nam  $1 - \frac{a^2}{a^2 + 2y^2}$  est aequalis huic:  $\frac{a^2 + 2y^2 - a^2}{a^2 + 2y^2}$ , quae est  $= \frac{2y^2}{2y^2 + a^2}$ .

20 Ergo  $1 - \frac{x}{a} = \frac{a^2}{a^2 + 2y^2}$ . Quare superest ut summam tantum omnium  $\frac{a^2}{a^2 + 2y^2}$  inveniamus.

739,19–24 Nebenrechnungen:

$$\begin{array}{rccccc}
 8a^3 + 16a - 2a^3 - 16a & & & 32 \\
 10a^3 & [sic!] & & 18 \\
 & 16 & 14 & \overline{256} & 18 & 32 \\
 & 9 & 4 & 32 & 5 & 5 \\
 \hline
 144 & 56 & 576 & 90 & 1600
 \end{array}$$

Quam in rem considerandum est, si qua sit aequatio, talis  $\frac{a^2}{a+y} = \text{applicatae}$ , posita  $y$  abscissa continue crescente,  $a$  vero recta supposita constante, figuram ex his applicatis conflatam esse hyperbolicam. Nos ut in nostra aequatione a  $2y^2$  binarium multiplican-

tem amoliamur, pro  $\frac{a^2}{a^2+2y^2}$  faciemus  $\frac{\frac{a^2}{2}}{\frac{a^2}{2}+y^2}$ . Unde licebit substituere  $\frac{b^2}{b^2+y^2}$ , modo

scilicet meminisse velimus tunc  $b^2$  aequivalere  $\frac{a^2}{2}$ , seu pro  $b$  intelligendum  $\frac{a}{\sqrt{2}}$ . Quod si 5

ergo aequatio sit  $\frac{b^2}{b+y}$ . posita  $b$  recta constante; spatium, ut dixi hyperbolicum erit.

Sed non opus est ut hyperbolam quaeramus cum hyperboloeis cubica locus sit omnium

$\frac{a^3}{a^2+2y^2} = x$ . Erit enim  $a^3 = a^2x + 2y^2x$ . Quae aequatio ut reducatur ad simpliciorem,

methodo quam ad exemplum regulae in conicis aequationibus reducendis a summo viro

Ioh. Wittio traditae in altiori hac expertus sum, fiat  $y^2 = z^2 - \frac{a^2}{2}$ , et erit  $a^3 = a^2x + 10$

$2z^2x - \frac{2a^2x}{2}$ . sive  $a^3 = 2z^2x$ . quam hyperboloidis cubicae formulam esse manifestum est, cuius datur quadratura. Quod si huc usque nihil erratum est, pro tetragonismo mechanico quaesito, habebimus verum.

---

7–13 Zum ergänzten Schlussabschnitt in anderem Duktus: Error

6–13 erit. | Nunc ut ad *gestr.*; Sed non ... habebimus verum. *erg.* | L

---

9 exemplum regulae: s. J. de WITT, *Elementa curvarum linearum*, DGS II S. 304–306.

## 422. SOLUTIO ANALYTICA

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 XII 2 Bl. 161–162. 1 Bog. 2°. 3 S. Gestrichene Bogenmarkierung. Auf Bl. 162 r° neben der Hauptrechnung verschiedene Zusätze in anderem Duktus. — Auf Bl. 162 v° Gesprächsaufzeichnung: Leibniz u. Ozanam mit nachträglichen Notizen von Leibniz; weitere zugehörige Notizen auf Bl. 161 r° u. Bl. 161 v° sowie auf LH 35 XII 2 Bl. 160 v° (vgl. dazu N. 48).  
Cc 2, Nr. 561 tlw.

Ut ad comparationem spatii circularis et hyperbolici vel hyperboloidis veniamus,  
animadvertisendum est, quod  $b + y \cap y - b$  vel  $b + y \cap b - y = [y^2 - b^2$  vel  $b^2 - y^2]$ . Nam

$$\begin{array}{rcl} b + y & \text{et} & b + y \\ y - b & & b - y \\ \hline -b^2 - by & & b^2 + yb - y^2 = b^2 - y^2. \\ +by + y^2 & & \end{array}$$

Ergo si applicata hyperbolica  $\frac{b^2}{b+y}$  multiplicetur per  $\frac{a}{b-y}$ , fiet:  $\frac{b^2a}{b^2-y^2}$ .

$$15 \quad \text{Iam } \frac{b^2a}{b^2-y^2} - \frac{b^2a}{b^2+y^2} = \frac{b^4a + y^2b^2a - b^4a + y^2b^2a}{b^2-y^2 \cap b^2+y^2} = \frac{2y^2b^2a}{b^4-y^4} = z.$$

Ergo  $\frac{b^4 - y^4}{y^2b^2} = \frac{a}{z}$ . [Ergo]  $\frac{b^4}{y^2b^2} - \frac{y^4}{y^2b^2} = \frac{b^2}{y^2} - \frac{y^2}{b^2} = \frac{a}{z}$ . Multiplicatis omnibus per  $b^2$ ,  
fiet:  $\frac{b^4}{y^2} - y^2 = \frac{ab^2}{z}$ , rursusque multiplicatis omnibus per  $y^2$ , fiet  $b^4 - y^4 = \frac{ab^2y^2}{z}$ , ac

multiplicatis omnibus per  $z$ , fiet:  $b^4z - y^4z = ab^2y^2$ , sive  $z = \frac{ab^2y^2}{b^4 - y^4}$     $b^4z = ab^2y^2 + y^4z$ .

Si  $\frac{b^2a}{b^2+y^2} = x$ . erit  $\frac{b^2+y^2}{b^2} = \frac{a}{x}$ . et  $b^2 + y^2 = \frac{ab^2}{x}$ .

8 (1) Nunc ut ad comparationem (a) circuli (b) spatii circularis et hyperbolici | vel hyperboloidis  
erg. | veniamus, considerandum est = ursprünglicher Beginn (2) Ut L 9 quod (1)  $b + y \cap b - y =$   
 $b^2 + y^2$ . (2)  $b + y \cap y - b$  vel  $b + y \cap b - y = | b^2 + y^2$  vel  $y^2 - b^2$  ändert Hrsg.]. Nam L 12+14  $b^2 - y^2$ .

(1) Ergo si applicata hyperbolica:  $\frac{b^2}{b+y}$ , dividatur per  $y - b$  productum erit (2) Ergo L 16 Ergo  
gestr. L, erg. Hrsg.

$$\frac{b^2 + y^2}{b^2 - y^2} \quad \frac{b^2 - y^2}{b + y} = b - y. \quad b^2 + y^2 \cap b^2 - y^2 = b^4 - y^4. \quad \frac{\frac{b^2 a}{b^2 - y^2}}{\frac{b^2 a}{b^2 + y^2}} = \frac{b^2 + y^2}{b^2 - y^2}.$$

$\frac{b^2 - y^2}{b^2 + y^2}$ . Iam  $\frac{b^2}{b^2 + y^2} = 1 - \frac{y^2}{b^2 + y^2}$ . Ergo  $\frac{b^2 - y^2}{b^2 + y^2} = 1 - \frac{2y^2}{b^2 + y^2}$ . Ergo  $2 - \frac{2y^2}{b^2 + y^2}$

sive  $\frac{b^2 - y^2}{b^2 + y^2} + 1 = \frac{2b^2}{b^2 + y^2}$  sive  $\frac{b^2 - y^2}{b^2 + y^2} = \frac{2b^2}{b^2 + y^2} - 1$ .

$$\frac{b^2 + y^2}{b + y} = b + y - \frac{2by}{b + y}.$$

$\frac{2by}{b + y} = \frac{b}{b + y} \cap 2y$ . Iam ostensum  $\frac{b}{b + y} = 1 - \frac{y}{b + y}$ . Ergo  $\frac{2by}{b + y} = 2y - \frac{2y^2}{b + y}$ . Ergo 5

$$\frac{b^2 + y^2}{b + y} = b + y - 2y + \frac{2y^2}{b + y} = b - y + \frac{2y^2}{b + y}.$$

$$\frac{2y^2}{y + b} = \frac{2y^2 + 2by - 2by}{y + b} = 2y - \frac{2by}{y + b}.$$

Ostensum est  $\frac{2by}{b + y} = 2y - \frac{2y^2}{b + y}$ . Eodem iure idem  $= 2b - \frac{2b^2}{b + y}$ . Ergo  $2y - \frac{2y^2}{b + y} =$

$2b - \frac{2b^2}{b + y}$ . sive  $y + \frac{b^2}{b + y} = b + \frac{y^2}{b + y}$ .

$$\frac{2y^2}{b + y} = x. \text{ daret } 2y^2 = bx + yx. \text{ erit } y = z + \frac{b}{2}. \text{ fiet:}$$
 10

3 Unter  $\frac{2b^2}{b^2 + y^2}$  umrahmt und gestrichen:  $2 - \frac{2y^2}{b^2 + y^2}$ . Ergo  $\frac{b^2 - y^2}{b^2 + y^2} = 1 - \frac{2y^2}{b^2 + y^2}$ ,

habuimus.

10  $+yx. | vel y^2 = \frac{bx + yx}{2}$ . sive  $y = \sqrt{\frac{bx + yx}{2}}$ . sive  $2y^2 - bx + gestr. | erit L$

10 fiet: Die folgenden Betrachtungen sind fehlerhaft. Leibniz erkennt dies und beendet sie S. 745 Z. 6 mit „Imo potius“.


$$\begin{array}{c}
 \cancel{2z^2} + \cancel{\frac{b^2}{4}} + \cancel{\frac{bx}{2}} - \cancel{\frac{xy}{2}} = \cancel{\frac{bx}{2}} \\
 \cancel{2y^2} + \cancel{\frac{b^2}{4}} + by - xy + \cancel{\frac{xy}{2}} = \frac{bx}{2} \\
 \frac{7}{4}b^2
 \end{array}$$

$\frac{7b^2}{4} = bx + xy - by$ . locus est hyperbole, vid. de Wit pag. 281. ubi simile exemplum.

5 Resumta ergo  $\frac{b^2}{b^2 + y^2} = 1 - \frac{x}{a}$ . et multiplicata per  $b+y$  utroque aequationis termino

$$\begin{aligned}
 & \text{fiet: } \frac{b^2}{b-y+\frac{2y^2}{b+y}} = b+y - \frac{bx-yx}{a} \\
 & \frac{a^3}{a^2+2y^2} = x.
 \end{aligned}$$

Ergo  $a^3 = a^2x + 2y^2x$ . vel  $\frac{a^3}{x} - a^2 = 2y^2$ . Extrahenda ergo radix ex  $\frac{a^3}{x} - a^2$ . Iam  $\frac{a^2}{x}$  applicatam parabolae (!) appellemus  $v$ . fietque  $v-a, \sqrt{a}, \sqrt{v} = s$ .



10

[Fig. 1]

Ponatur  $y = z - \frac{a}{2}$ . Ergo  $2y, yx = 2yzx - 2yax$ . Ergo  $a^3 = 2yzx - yax + a^2x$ .

8  $y^2 = z^2 - a^2$ .

11  $z = y + \frac{a}{2}$ .  $z^2 = y^2 + \frac{a^2}{4} + 2ya$ .


4 vid.: de WITT, *Elementa linearum curvarum*, DGS II, S. 281.

$$\begin{aligned}
 a^3 + yax &= 2yzx + a^2x. \\
 \wedge &\quad \wedge \\
 a^3 + 2zax - \cancel{\frac{a^2x}{2}} &= 2z^2x - \cancel{ax} + \cancel{\frac{2a^2x}{2}} + \frac{a^2x}{2}. \\
 \wedge &\quad \wedge \\
 a^3 + \cancel{2yax} + \cancel{a^2x} &= \cancel{2yax} + y^2x + \cancel{\frac{a^2x}{4}} + \frac{3a^2x}{4}.
 \end{aligned}
 \tag{5}$$

Imo potius.

Ut reducatur haec aequatio, si fieri potest:  $a^3 = a^2x + 2y^2x$ . fiat:  $y^2 = z^2 - \frac{a^2}{2}$ . et fiet:  $a^3 = a^2x + 2z^2x - a^2x$ . seu  $a^3 = 2z^2x$ . Unde intelligitur locum quae situm esse hyperboloidem cubicam.

Notabilis est haec reducendi methodus, quam ad exemplum regulae a summo viro 10 Ioh. Wittio in aequationibus conicis reducendis traditae, in hac altiori sum expertus.



[Fig. 2]

[Fig. 3]

$$a^3 = a^2 + 2y^2, \wedge x. \quad a^2 = \frac{a^2 + 2y^2}{a} \wedge x. \quad a^2 = ax + \frac{2y^2x}{a}. \quad \frac{a^2}{a + \frac{2y^2}{a}} = x.$$

$y^2 = 2a - x^2$ . Ponatur  $x = z + 2a$ , fiet  $x^2 = zx + 2ax$ . Ergo  $y^2 = 2ax - zx + 2ax$ .

8 seu (1)  $\frac{a^3}{x} = 2z^2$ . Nunc reducenda iterum  $z^2 = y^2 + \frac{a^2}{2}$ . (2)  $a^3 L$  11+13 expertus. (1)  
Ponatur  $y = z - \frac{a}{Rq 2}$ , fiet  $a^3 = a^2x - 2$  (2)  $a^3 L$

10 ad exemplum: de WITT, *Elementa linearum curvarum* I. II, DGS II, S. 242–340; insbesondere S. 255, 280 f., 304–306.

fiet:  $y^2 = 0 - zx$ . Quod est absurdum. Ponendum ergo potius  $2a - z = x$ . fiet  $x \wedge x = 2ax - zx = x^2$ . atque ideo  $y^2 = 2ax - 2ax + zx = y^2 = zx$ . Quod verissimum et notable est, est enim arcus circuli locus mediarum proportionalium inter duas incognitas, seu continue variabiles.

- 5 Atque haec quidem occasionem praebent cogitandi de reducendis locis, in quibus nulla est linea cognita, ad locos in quibus aliqua est. Ut hoc loco, uti  $y^2 = zx$ , reducamus ad aliquam aequationem in quam recta quaedam cognita sive invariabilis ingrediatur, faciemus:  $a = x + z$ . vel  $z = a - x$ . fiet  $y^2 = ax - x^2$ . Unde sequitur circulum esse locum duarum mediarum proportionalium. Sciendum est autem ex duabus illis, quarum
- 10 media proportionalis quaeritur, semper alteram crescere alteram decrescere, et quidem uniformiter, unde recta aequalis utrisque statui potest.

- Quodsi quaerantur duae mediae proportionales, ut  $y^3 = z^2x$ . ponatur rursus  $a = z + x$ . seu  $z = a - x$ . et fiet  $y^3 = x^3 - 2ax^2 + a^2x$ . Quae non potest ultra reduci, nam quoniam scilicet altera incognitarum quantitatum,  $y$ . est in se tantum ducta, non etiam in alteram 15 incognitam. Et si quis reducere vellet, ad aequationem solas incognitas continentem deviniret.

Ita exhibere possumus omnes figuras, quae sunt loca mediarum proportionalium, sive radicum quadratarum, cubicarum, quadrato-quadraticarum, ex rectangulis planis, solidis altiorumque dimensionum, quae duae tantum rectae ingrediuntur.

- 20 Notabile est vero etsi hae figurae sint ipsarum mediarum proportionalium, seu radicum loca; esse tamen alias curvas, plerumque uno gradu simpliciores, quibus ex rectangulo aliquo solido, aut altiore radices extrahi queant; ita duarum mediarum proportionalium locus est aequationis  $y^3 = x^3 - 2ax^2 + a^2x$ . et tamen possunt duae mediae proportionales inveniri loco aequationis simplicioris per parabolam, hyperbolam, ellipsin. Quod et Cartesius recte observavit, et ni fallor curvae illae gradu continue crescentes quas instrumento ex regulis mobilibus composito describere ingeniose docet. Illae ipsae sunt, quas hoc loco 25 expono.

8 faciemus: (1)  $z = a + x$ . cum enim ambae cogitentur. (2)  $a L 12 f. z + x$ . | seu  $z = a - x$ . erg. | et fiet (1)  $y^3 = a^2x + x^3 - 2ax^2$ . Quae aequatio ut contrahatur (2)  $y^3 L 15$  ad (1) locum (2) aequationem  $L 18$  rectangulis, (1) prismatis (2) parallelepipedis, aliis (3) planis  $L 23$  aequationis erg.  $L$

---

25 ni fallor: DESCARTES, *Geometria*, DGS I, S. 67–69 sowie S. 19–23.

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\alpha^2}{a^2 + y^2} - \frac{1}{a^2 + y^2} = \frac{a^2 + \beta y^2}{a^2 + y^2} = 1 + \frac{\beta - 1}{a^2 + y^2} \wedge y^2 \\ \frac{a^2 + 2y^2}{a^2 + 2y^2} - \frac{1}{a^2 + 2y^2} \\ \text{Pro 2. vel 3. vel 4. etc. pone } \beta. \end{array} \right\}$$

Ergo  $\frac{a^2 + \beta y^2}{a^2 + y^2} = \chi + \beta - \frac{\beta a^2}{a^2 + y^2} - \chi + \frac{a^2}{a^2 + y^2}$ .

$$\frac{9}{9+a^2} = \frac{9+a^2-a^2}{9+a^2} = 1 - \frac{a^2}{a^2+9}.$$

$$\frac{9}{9+1} = \frac{9}{10} = \frac{9+1-1}{9+1} = 1 - \frac{1}{10}. \quad \frac{11}{11+1} = \frac{11}{12} = \frac{11+1-1}{11+1} = 1 - \frac{1}{12}.$$

$$\frac{9}{9+1} \overline{\times} \frac{11}{11+1} \quad \frac{99+9-99+11}{9+1 \wedge 11+1} = \frac{11-9}{9+1 \wedge 11+1}.$$

$$\frac{1}{1000,000+1} \overline{\times} \frac{4}{1000,000+4} \quad \frac{4000,000+\cancel{4}-1000,000+\cancel{4}}{1,000 [bricht ab]}$$

28

36	21	756
.....	.....	.....
11	6	66
.....	.....	.....
25	15	375
.....	.....	.....
9	5	45
.....	.....	.....
16	10	160
.....	.....	.....
7	4	28
.....	.....	.....
9	6	54
.....	.....	.....
5	3	15
.....	.....	.....
4	3	12
.....	.....	.....
3	2	6
.....	.....	.....
1	1	1
.....	.....	.....
0	0	0

5

10

15

20

7 f. Leibniz rechnet so, dass er ein positives Resultat erhält. Die größeren Minuszeichen haben zusätzlich Klammerfunktion.

$$\frac{6a^2\beta^2}{a^4 + 5a^2\beta^2 + 4\beta^4} \times \frac{15a^2\beta^2}{a^4 + 13a^2\beta^2 + 36\beta^4}$$

$$\begin{array}{cccc}
 & 78 & 216 & 75 & 60 \\
 & \diagup \wedge & \diagup \wedge & \diagup \wedge & \diagup \wedge \\
 6a^6\beta^2 + 6 & \wedge 13 & a^4\beta^4 + 6 & \wedge 36 & a^2\beta^6 + 15a^6\beta^2 + 15 & \wedge 5 & a^4\beta^4 + 15 & \wedge 4a^2\beta^6 \\
 \vdots & \vdots & & & & & & \\
 21a^6\beta^2 & 152a^4\beta^4 & & & & & & [Rechnung bricht ab]
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 & \frac{1\beta^2}{a^2 + \beta^2} \quad \stackrel{+}{\times} \quad \frac{4\beta^2}{a^2 + 4\beta^2} = \frac{a^2\beta^2 + \overbrace{4\beta^4 + 4\beta^4}^{5} + 4a^2\beta^2}{a^4 + 5a^2\beta^2 + 4\beta^4} \quad \stackrel{+}{\times} \quad \frac{9\beta^2}{a^2 + 9\beta^2} \\
 10 &= \frac{9\beta^2a^4 + 45a^2\beta^4 + 36\beta^6 | + | 5a^4\beta^2 + 8a^2\beta^4 + 45a^2\beta^4 + 72\beta^6}{a^6 + 5a^4\beta^2 + 4a^2\beta^4 | + | 9\beta^2a^4 + 45a^2\beta^4 + 36\beta^6} \text{ seu} \\
 & \frac{14a^4\beta^2 + 98a^2\beta^4 + 108\beta^6}{a^6 + 14a^4\beta^2 + 49a^2\beta^4 + 36\beta^6} \stackrel{+}{\times} \frac{16\beta^2}{a^2 + 16\beta^2} \\
 & \quad \wedge \\
 & \quad \frac{224}{16\beta^2a^6 + 14} \stackrel{\wedge}{=} 16a^4\beta^4 + 784a^2\beta^6 + 576\beta^8 | + | [Rechnung \ bricht \ ab]
 \end{aligned}$$

11–14 Nebenrechnungen:

$$\begin{array}{r}
 & 16 & 49 & 36 \\
 & 14 & 16 & 16 \\
 45 & \overline{64} & \overline{294} & \overline{216} \\
 53 & 16 & 49 & 36 \\
 \hline
 98 & 224 & 784 & 576
 \end{array}$$

1–6 In den Zählern sollte es anstelle von  $6a^2\beta^2$  vielmehr  $5a^2\beta^2$  und anstelle von  $15a^2\beta^2$ , wie ursprünglich richtig,  $13a^2\beta^2$  heißen. Anstelle von  $152a^4\beta^4$  sollte  $153a^4\beta^4$  stehen.

$$\frac{y^2}{y^2 + a^2} = \frac{y^2 + a^2 - a^2}{y^2 + a^2} \int = 1 - \frac{a^2}{a^2 + y^2}.$$

$$\begin{aligned} \frac{a^2}{y^2 + a^2} &= \frac{\cancel{y^2} + \cancel{a^2} - \cancel{a^2}}{\cancel{y^2} + \cancel{a^2}} \int \frac{a^2}{y^2} - \frac{a^4}{y^4 + a^2 y^2} \\ &= \frac{a^4 + \frac{a^6 y^2}{y^4} - \frac{a^6 y^2}{y^4}}{y^4 + a^2 y^2} = \int \frac{a^4}{y^4} - \frac{a^6}{y^6 + a^2 y^4} \text{ etc.} \\ &= +\frac{a^2}{y^2} - \frac{a^4}{y^4} + \frac{a^6}{y^6} - \frac{a^8}{y^8} \text{ etc.} = \frac{a^2}{a^2 + y^2}. \end{aligned}$$

At vero  $\frac{y^2}{y^2 + a^2} = 1 - \frac{a^2}{a^2 + y^2} = \text{ut sequitur.}$

5

$$\begin{aligned} \frac{y^2}{a^2 + y^2} &= \frac{\cancel{y^2} + \frac{y^4 \cancel{a^2}}{a^2} - \frac{y^4 \cancel{a^2}}{a^2}}{\cancel{a^2} + y^2} = \frac{y^2}{a^2} - \frac{y^4}{a^4 + y^2 a^2} \\ &= \frac{y^4 + \frac{y^6}{a^2} - \frac{y^6}{a^2}}{a^4 + y^2 a^2} = \frac{y^4}{a^4} - \frac{y^6}{a^6 + y^2 a^4} \\ &= \frac{y^6 + \frac{y^8 a^4}{a^6} - \frac{y^8}{a^2}}{a^6 + y^2 a^4} = \frac{y^6}{a^6} - \frac{y^8}{a^8 + y^2 a^6} \text{ etc.} \end{aligned}$$

ergo  $\frac{y^2}{a^2 + y^2} = \frac{y^2}{a^2} - \frac{y^4}{a^4} + \frac{y^6}{a^6} - \frac{y^8}{a^8} \text{ etc.}$

Est autem  $y = \beta, 2\beta, 3\beta, \text{ etc. omittaturque } a \text{ velut } = 1.$  Maxima  $y = \frac{a}{\gamma}.$

10

$$y \left\{ \begin{array}{l} \beta \\ 2\beta \\ 3\beta \\ 4\beta \end{array} \right. \left\{ \begin{array}{cccc} \beta^2 & \beta^4 & \beta^6 & \beta^8 \\ 4\beta^2 & 16\beta^4 & 64\beta^6 & 256\beta^8 \\ 9\beta^2 (-) & 81\beta^4 (+) & 729\beta^6 (-) & 6561\beta^8 \\ 16\beta^2 & 256\beta^4 & 4096\beta^6 & 65536\beta^8 \\ \text{etc.} & \text{etc.} & \text{etc.} & \text{etc.} \end{array} \right\} \text{ etc.}$$

15

$$\frac{a^3}{3\gamma^3} - \frac{a^5}{5\gamma^5} + \frac{a^7}{7\gamma^7} - \frac{a^9}{9\gamma^9}.$$

Multiplicatis omnibus per  $a$ , fiet:

$$\begin{array}{ccccccccc} \frac{a^2}{3\gamma} & - & \frac{a^2}{5\gamma} & + & \frac{a^2}{7\gamma} & - & \frac{a^2}{9\gamma} & [+ \frac{a^2}{11\gamma} & - \frac{a^2}{13\gamma} + \frac{a^2}{15\gamma} - \frac{a^2}{17\gamma}] \text{ etc.} \\ \frac{2a^2}{15} & & \frac{2a^2}{63} & & \frac{2a^2}{143} & & & \left[ \frac{2a^2}{255} \right] \\ \frac{a^2}{3\beta} & & \frac{a^2}{7\beta} & & \frac{a^2}{11\beta} & & & \end{array}$$

749,12–750,4 Nebenrechnungen (tlw. fortlaufd.):

$$\begin{array}{ccccccccc} 16 & 256 & 4096 & 729 & 13 & 16 & \frac{2a^2}{15} \asymp \frac{2a^2}{16} = \frac{2a^2}{240} \\ 16 & 16 & 16 & 9 & 11 & 15 & \\ \hline 96 & 1536 & 24576 & 6561 & 13 & 80 & \\ 16 & 256 & 4096 & & 13 & 16 & \\ \hline 256 & 4096 & 65536 & & 143 & 240 & \end{array}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{3\gamma^3} &\asymp \frac{1}{7\gamma^7} + \frac{1}{11\gamma^{11}} \\ \frac{1}{3000} &+ \frac{1}{70,000,000} + \frac{1}{11000000000000} \text{ fiet 11 [Rechnung bricht ab]} \end{aligned}$$

2f. Darüber: Nota hyperboloeidis cubicae.

2f.  $+\frac{a^2}{11\gamma} \dots -\frac{a^2}{17\gamma}$  sowie  $\frac{2a^2}{255}$  erg. Hrsg.

749,10–751,5 Wegen der Streichungen bzw. Vernachlässigung der Exponenten von  $\gamma$  in den S. 749 Z. 17 und S. 751 Z. 4 sind die Ergebnisse nicht mehr textkonform. Diese unzulässigen Vereinfachungen wirken sich aufgrund der neuen Setzungen S. 751 Z. 6 nicht auf das Hauptergebnis  $\odot$  aus. In der Nebenrechnung unterläuft Leibniz ein Flüchtigkeitsfehler: er hätte mit 17 anstelle von 16 und mit  $a^2$  anstelle von  $2a^2$  rechnen müssen.

Ut has duas summas comparemus, pro  $\frac{a^2}{3\gamma}$  dicendum  $\frac{a^2}{2\gamma+1\gamma}$ . pro  $\frac{a^2}{5\gamma} = \frac{a^2}{3\gamma+2\gamma}$ . pro

$$\frac{a^2}{7\gamma} = \frac{a^2}{4\gamma+3\gamma} \quad [\text{Text bricht ab}]$$

Si fuisset  $\frac{y}{a+y}$ , ut in hyperbola, habuissesemus, multiplicatis omnibus per  $a$ :

$$\begin{array}{cccccc} \frac{a^3}{2\gamma a} & - & \frac{a^4}{3\gamma a^2} & + & \frac{a^5}{4\gamma a^3} & - & \frac{a^6}{5\gamma a^4} \quad \text{etc.} \\ \text{seu} & & \frac{a^2}{2\gamma} & - & \frac{a^2}{3\gamma} & + & \frac{a^2}{4\gamma} & - & \frac{a^2}{5\gamma} \end{array}$$

5

Sed posito  $a = 1$ . et maxima  $y = b$ . erunt producta omnium

$$\frac{y^2 a}{a^2 + y^2} = \frac{1}{3}b^3 - \frac{1}{5}b^5 + \frac{1}{7}b^7 - \frac{1}{9}b^9 \quad \text{etc.} \quad \odot$$

Posito iam  $\frac{y}{a+y}$ , in hyperbola, fiet:

$$\frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{3}b^3 + \frac{1}{4}b^4 - \frac{1}{5}b^5$$

a quo si subtrahatur  $\odot$  restabit:

$$\frac{1}{2}b^2 - \frac{2}{3}b^3 + \frac{1}{4}b^4 + \frac{1}{6}b^6 - \frac{2}{7}b^7 + \frac{1}{8}b^8 + \frac{1}{10}b^{10}$$

vel potius ob  $\frac{a}{a+y}$  fiet

$$1 - \frac{1}{2}b^2 + \frac{1}{3}b^3 - \frac{1}{4}b^4 + \frac{1}{5}b^5$$

10

6  $y = b$ . | minor quam a *gestr.* | erunt  $L$

13+752,3 Anstelle von 1 müsste genauer  $b$  stehen.

a quo si subtrahatur:

$$\frac{1}{3}b^3 - \frac{1}{5}b^5 + \frac{1}{7}b^7 - \frac{1}{9}b^9 \text{ etc. vel } \odot \text{ restabit:}$$

$$1 - \frac{1}{2}b^2 - \frac{1}{4}b^4 + \frac{2}{5}b^5 - \frac{1}{6}b^6 - \frac{1}{8}b^8 + \frac{2}{9}b^9 \text{ etc.}$$

[Zusätze]

$$\begin{array}{ccccc}
 \frac{1}{3} & \frac{1}{8} & \frac{1}{15} & \frac{1}{24} & \frac{1}{35} \\
 \frac{1}{4} & \frac{1}{9} & \frac{1}{16} & \frac{1}{25} & \frac{1}{36} \\
 \hline
 \frac{1}{3+1} & \frac{1}{8+1} & \frac{1}{15+1} & \frac{1}{24+1} & \left[ \frac{1}{35+1} \right] \\
 \frac{1}{4-1} & \frac{1}{9-4} & \frac{1}{16-9} & \frac{1}{25-16} & \frac{1}{36-25}
 \end{array}$$

$$\frac{1}{4-1} + \frac{1}{9-4} = \frac{9-\cancel{4}+\cancel{4}-1}{36-16-9+4} \mid \frac{8}{15}$$

$$\frac{1}{9-4} + \frac{1}{16-9} = \frac{16-4}{144-81-64+36} \mid \frac{12}{35}$$

$$\frac{1}{9-4} = \frac{1-\frac{4}{9}+\frac{4}{9}}{9-4} = \frac{1}{9} + \frac{4}{81-36}.$$

10 Nebenrechnung (tlw. fortlfd.):

$$\begin{array}{ccc}
 81 & 144 & 180 \\
 64 & 36 & 145 \\
 \hline
 145 & 180 & 35
 \end{array}$$

7  $\frac{1}{35+1}$  erg. Hrsg.

$$\begin{array}{rcl}
 \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \frac{1}{8} & \text{etc.} & \frac{1}{3} \quad \frac{1}{5} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{1}{9} \\
 \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{6+4}{24} \mid \frac{10}{24} & \overset{2}{\cancel{\mid}} \quad \frac{5}{24} & \frac{1}{3} \times \frac{1}{5} = \frac{5+3}{15} \quad \frac{8}{15} \mid \overset{2}{\cancel{\mid}} \quad \frac{4}{15} \\
 \frac{1}{6} \times \frac{1}{8} = \frac{8+6=14}{48} & \overset{2}{\cancel{\mid}} \quad \frac{7}{48} & \frac{1}{5} \times \frac{1}{7} = \frac{7+5}{35} \quad \frac{12}{35} \mid \overset{2}{\cancel{\mid}} \quad \frac{6}{35} \\
 \frac{4}{15} + \frac{5}{24} + \frac{6}{35} + \frac{7}{48} \text{ etc. auferatur} & \frac{1}{15} + \frac{1}{24} + \frac{1}{35} + \frac{1}{48} \text{ fiet } & \frac{1}{5} \quad \frac{1}{6} \quad \frac{1}{7} \quad \frac{1}{8} \text{ etc.}
 \end{array}$$

$\frac{ya^2}{y^2 - \beta^2} = x$ . Datur autem  $\frac{a^3}{y^2 - \beta^2} = x$ . Ergo  $\frac{a^2}{y^2 - \beta^2} = \frac{x}{a}$ . quae posita  $y$  certa 5  
 magnitudinis linea ipsi  $\frac{a^2}{y^2}$  aequaliter. Quorum cylinder  $\frac{ya^2}{y^2}$ , fiet  $\frac{a^2}{y}$  momento omnium  
 $xa$ .

43. DIFFERENTIAE FIGURAE CIRCULO HOMOGENEAE RATIONALIS  
 [Herbst 1673]

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 II 1 Bl. 284. 1/5 S. auf Bl. 284 r° oben. Überschrift ergänzt.

— Auf dem übrigen Blatt, mittels Trennstrich abgesetzt N. 44.

5 Cc 2, Nr. 608 tlw.

Datierungsgründe: Von den beiden Stücken auf dem Bogen wurde N. 43 zuerst niedergeschrieben und dürfte kurz vor N. 44 entstanden sein. Die Verwendung des Begriffs *functio* im Titel von N. 44 sowie das Wasserzeichen des Papiers bedingen eine Abfertigung nach N. 40 vom August 1673.

Differentiae figurae circulo homogeneae rationalis

$$10 \quad \frac{a^3}{a^2 + y^2} - \frac{a^3}{a^2 + y^2 + 1 + 2y} = \cancel{a^3} + \cancel{y^2 a^3} + a^3 + 2ya^3 - \cancel{a^3} - \cancel{y^2 a^3}$$

$$\frac{2ya^4}{a^4 + 2a^2y^2 + y^4} = x, \text{ vel } 2ya^4 = a^4x + 2a^2y^2x + y^4x, \text{ vel } \frac{2y}{x}a^4 = a^4 + 2a^2y^2 + y^4,$$

$$\text{vel } a^2\sqrt{\frac{2y}{x}} = a^2 + y^2.$$

Haec figura est quadrabilis. Ergo et figura cuius differentiae sunt

$$\frac{a^4}{a^4 + 2a^2y^2 + y^4},$$

15 seu cuius differentiae sunt quadratis seu momento ipsarum  $\frac{a^2}{a^2 + y^2}$  homogeneae, est quadrabilis. Eius enim figurae complementum aequipolleit differentiis in abscissas  $y$  ductis, seu


$$\frac{ya^4}{a^4 + 2a^2y^2 + y^4}.$$

44. VARIA CIRCA FUNCTIONES TANG. INVERS. QUAD. CIRC. ET  
HYPERB. EX SE INVICEM  
[Herbst 1673]

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 II 1 Bl. 284. 1 $\frac{4}{5}$  S. auf Bl. 284v<sup>o</sup> und Bl. 284r<sup>o</sup> unterer Teil. Überschrift ergänzt. — Auf Bl. 284r<sup>o</sup> oben, mittels Trennstreich abgesetzt N. 43.  
Cc 2, Nr. 608 tlw., 614

Datierungsgründe: s. N. 43.

Varia circa functiones tang. invers.  
Quad. circ. et hyperb. ex se invicem  
et alias figuras ex ipsis



[Fig. 1]

Figura proposita esto parabola, cuius vertex  $A$ . abscissa ex quo  $AE = x$ , applicata  $ED = y = \sqrt{ax}$ , posito  $a$  latere recto, et posita  $EE$  infinitesima seu unitate constructionis = 1. Tunc differentia inter duas applicatas proximas non nisi ipsa  $EE$  distantes erit  $\sqrt{ax+a} - \sqrt{ax}$ . Quod si figura aliqua cogitetur differentiis applicatarum parabolae homogenea, eius applicatae erunt:  $a\sqrt{ax+a} - a\sqrt{ax} = y$ , vel utroque quadrato:


$ax + a + ax - 2\sqrt{a^2x^2 + a^2x} = \frac{y^2}{a^2}$ , seu  $2ax + a - \frac{y^2}{a^2} = 2\sqrt{a^2x^2 + a^2x}$ , et utraque parte quadrata

$$4a^2x^2 + 4a^2x - \frac{4xy^2}{a} + a^2 - \frac{2y^2}{a^2} + \frac{y^4}{a^2} = 4a^2x^2 + 4a^2x,$$

vel  ~~$4a^4x^2 + 4a^4x - 4xy^2a + a^4 - 2y^2a + y^4 - 4a^4x^2 - 4a^4x = 0$~~ , fiet:  $4xy^2a = a^4 + y^4$ ,

5 vel  $4x = \frac{a^4 + y^4}{y^2a} = \frac{a^3}{y^2} + \frac{y^2}{a}$ , vel  $\frac{4x}{a} = \frac{a^4 + y^4}{y^2a^2}$ .

Ecce ordinatas ad basin figurae, cuius ordinatae ad axem sunt homogeneae differentiis parabolae.



[Fig. 2]

Applicatae hyperbolae sunt:  $\frac{a^2}{x}$ , differentiae[:]  $\frac{a^2}{x} - \frac{a^2}{x+1} = \frac{a^2x + a^2 - a^2x}{x^2 + x} = \frac{a^2}{x^2}$ .

10 Datis differentiis  $\frac{a^2}{x^2}$  inverso modo quaeritur figura cuius sint eae differentiae.

Posito ergo  $GW = 1$ , et  $WL = \frac{a^2}{x^2}$ , erit  $\frac{GW}{WL} = \frac{1}{\frac{a^2}{x^2}} = \frac{x^2}{a^2} = \frac{PE}{ED} = \frac{ED}{EM}$ , ergo  $\frac{ED}{PE}$  erit

6 f. Ecce ... parabolae. erg. L

3 Anstelle von  $\frac{y^4}{a^2}$  müsste es  $\frac{y^4}{a^4}$  heißen; der Fehler pflanzt sich weiter fort.

$$\frac{a^2}{x^2}, \text{ ergo } \frac{\frac{ED}{PE}}{\frac{ED}{EM}} \text{ erit: } \frac{\frac{a^2}{x^2}}{\frac{1}{\frac{1}{EM}}} = \frac{EM}{PE} = \frac{a^4}{x^4}.$$

Iam dudum constat esse  $PE = \frac{ED}{WL} = \frac{y + \frac{a^2}{x^2}}{\frac{a^2}{x^2}} = \frac{yx^2}{a^2} + 1$ , posito scilicet  $y$  esse ordinatam

figurae quaesitae, nam  $\frac{PE}{GW}$  vel  $\frac{PE}{1} = \frac{ED}{WL}$ .

Praeterea alibi a me demonstratum est,  $EM$  esse = differentiam inter semiquadrata duarum figurae quaesitae ordinatarum, seu inter semiquadratum de  $y + \frac{a^2}{x^2}$  et semiquadratum

de  $y$ , seu inter  $\frac{y^2 + \frac{a^4}{x^4} + \frac{2ya^2}{x^2}}{2}$  et  $\frac{y^2}{2} = \frac{a^4}{2x^4} + \frac{ya^2}{x^2}$ , ergo  $\frac{PE}{EM}$  erit:

$$\frac{\frac{yx^2}{a^2} + \frac{(1)}{a^2}}{\boxed{\frac{a^4}{2x^4} + \frac{ya^2}{x^2}}} = \left[ \frac{x^4}{a^4} \right], \text{ sive reiectis inutilibus: } \frac{\frac{yx^2}{a^2}}{\frac{ya^2}{x^2}} = \left[ \frac{x^4}{a^4} \right].$$

Unde patet aequationem esse identicam ac verissima quidem esse assumta, sed unde nihil novi detegatur.

Applicata circuli  $\sqrt{2ax - x^2}$ , alia  $\sqrt{2ax + 2a - x^2 - 1 + 2x}$ , differentia inter eas est: 10  
 $= \frac{y}{a}$ . Ergo

7 Nebenrechnung, umrahmt:

$$\text{sive } \frac{\frac{yx^2 + a^2}{a^2}}{\frac{a^4x^2 + 2ya^2x^4}{2x^6}} \text{ sive } \frac{\frac{2yx^8 + 2a^2x^6}{a^6x^2 + 2ya^4x^4}}{\frac{a^4}{x^4}}$$

2 Iam (1) aliunde (2) dudum  $L$       7  $\frac{a^4}{x^4}$   $L$  ändert Hrsg. zweimal

4–6 Das ergibt sich z. B. ohne weiteres aus N. 27 S. 499 Z. 1–12 .      10–758,7 Die Rechnungen dieses Abschnitts sind fehlerhaft; sie werden ergebnislos abgebrochen.

$$\frac{y^2}{a^2} = 2ax - x^2 + 2\overset{\odot}{ax} + 2a - x^2 - 1 + 2x \\ - \sqrt{4a^2x^2 + 4a^2x - 2ax^3 - 2ax + 4ax^2} | - 2ax^3 - 2ax^2 + x^4 + x^2 - 2x^3,$$

seu  $a^2 \odot - y^2 = \mathbb{D}a^2$ , et utraque parte in se ducta, fiet

$$\begin{aligned} & \cancel{4a^2x^2} - \cancel{8ax^3} + \cancel{16a^2x^2} + \cancel{24a^2x} - \cancel{4ax^3} - \cancel{8ax} + \cancel{8ax^2}, + \cancel{x^4} - \cancel{\frac{8ax^3}{4ax^2}} - \cancel{4ax^2} + \cancel{2x^4} \\ & + \cancel{2x^2} - \cancel{8ax^3}, + \cancel{4ax^2} + \cancel{8ax} - \cancel{4ax^3} - \cancel{4ax} + \cancel{8ax^2}, + 4a^2 - \cancel{4ax^2} - 4a + \cancel{8ax}, + \cancel{x^4} \\ & + \cancel{2x^2} - \cancel{4x^3}, + 1 \langle -4x + 4x^2 \rangle \\ [=] & -16ax^3 + 16a^2x^2 + 24a^2x + 8ax^2 + 4x^4 + 4x^2 - 8x^3 + 4a^2 - 4a \quad [bricht ab] \end{aligned}$$

Differentiae alia etiam via brevius haberi possunt, cum enim sit  $PE = p = \frac{ED = y}{WL}$ ,

erit  $WL = \frac{ED}{PE}$ . Cumque in circulo aequatio sit  $2ax + x^2 = y^2$ , erit  $PE$  sic habenda:

$$10 \quad 2ap + 2xp = 2y^2, \text{ seu } PE = p = \frac{2y^2}{2ap + 2xp} = \frac{y^2}{a+x} = \frac{2ax + x^2}{a+x} = PE,$$

et  $ED = \sqrt{2ax + x^2}$ , ergo  $WL$  erit =

$$\begin{aligned} & \frac{\sqrt{2ax + x^2} \wedge a+x}{\sqrt{2ax + x^2} \wedge \sqrt{2ax + x^2}} = \frac{a+x}{\sqrt{2ax + x^2}} = \frac{a+x \wedge a+x}{2a+x \wedge x} = \frac{a^2 + 2ax + x^2}{2ax + x^2} \\ & = \frac{a^2}{2ax + x^2} + 1 = WL. \end{aligned}$$

Habetur ergo quadratura figurae:  $\frac{a^3}{2ax + x^2} = \frac{a^3}{2a+x \wedge x}$ .

15 Iam alibi a me demonstratum est, differentias, in distantias a vertice, hoc loco  $x$ , ducas complemento figurae aequari. Ergo  $\frac{a^3 \wedge x}{2a+x \wedge x} = \frac{a^3}{2a+x}$ , cylinder figurae  $\frac{a^2}{2a+x}$ ,

---

12 Über dem dritten Ausdruck, umrahmt: Hic incipit error. Zusätzlich am Rande ein großes NB.

#### 14 Error


---

8 Differentiae ... haberi possunt: Die Rechnungen der folgenden Abschnitte bis zum Ende des Stücks hin sind fehlerhaft und werden schließlich nicht mehr weitergeführt. Auf verschiedene dieser Fehler weist Leibniz selbst hin, hält jedoch an der falschen Grundannahme von Z. 9 fest.

addito semper  $x$  aequatur trilineo concavo circulari, seu portionis circularis, sinu verso, recto, et arcu contentae; complemento ad rectangulum isoparallelum, sub sinu verso nimirum et recto comprehensum.

Huius figurae quadruplum ordinatam habet:  $\frac{4a^2}{2a+x}$ , positoque  $b = 2a$ , fiet ordinata

$\frac{b^2}{b+x}$ , at hanc constat esse ordinatam hyperbolae asymptoto parallelam, cuius quadratum constans est  $b^2$ .



[Fig. 3]

Ergo posito hyperbolam describi, latere recto et transverso aequalibus, cuius semilatus transversum  $CD$ , et semiquadratum eius  $\frac{CD^2}{2}$ , cuius latus  $BD = b = 2a$ , ita ut

*CD* sit  $\sqrt{8a^2}$ ; posito inquam hyperbolam describi latere recto et transverso aequalibus  $= [2]\sqrt{8a^2}$ , manifestum est eius ordinatas ad asymptoton *CE*, ipsa *BD*  $= 2a = b$  minores

ut  $EF$ , esse  $\frac{b^2}{b+x} = \frac{4a^2}{2a+x}$ , posita ipsam  $x = BE$  arithmeticè crescentem, esse aequalē sinui verso portionis circularis datae, et  $a$  radio circuli dati  $AB$ ; his inquam positis (assumendo  $EB$  ita parvam ne sit maior ipso radio  $AB = a$ ) huius hyperbolici spatii  $FEBDF$  quarta pars ipsis  $x$  seu semiquadrato ipsius  $BE$  aucta erit portionis circularis  $BEHB$  ad rectangulum  $BH$  complemento, nempe trilineo  $BGH$  aequalis.

1 addito semper x erg. L      11 2 erg. Hrsg.      15 ipsis x seu semiquadrato ipsis BE aucta erg.  
*L*

Habetur ergo non tantum quadratura circuli, ex data quadratura hyperbolae, sed et nunc indiscriminatim quadratura hyperbolae ex data circuli quadratura, vel contra, differentiis quadrabilibus inter earum portiones inventis.

Longe ergo praestat hoc inventum alteri, ubi quadratura hyperbolae in se reflexa

opus erat ad dimensionem circuli habendam.

Ac iam nunc videndum an aliqua inde duci lux possit, collata utraque dimensione, quod suo loco experiemur.

Saltem id nobis praestat inventum duplex, ut mutua harmonia confirmata a calculi erroribus immunia esse intelligantur.

10 Imo falsa sunt ista unde a loco quem et notavi in margine per NB., error autem ex eo, quod differentiarum  $\frac{a+x}{\sqrt{2ax+x^2}}$  quadrata assumsi pro ipsis. Rectiora sunt quae signo  $\odot$  notata.

$\odot$

$\frac{a^2}{\sqrt{2ax+x^2}} = y$ . Ergo  $a^4 = 2axy^2 + x^2y^2$ , vel:  $a^2 + \frac{a^4}{y^2} = 2ax + x^2 + a^2$ . Ergo  $\sqrt{a^2 + \frac{a^4}{y^2}} =$

15  $x + a$ , et  $\frac{xa}{\sqrt{2ax+x^2}} = \frac{a}{\sqrt{\frac{2a}{x} + 1}}$ ,  $\frac{a^2}{\frac{2a}{x} + 1} = y^2$ , unde fit:  $a^2 x = 2ay^2$ , seu hyperbola.

Ergo  $\frac{a^2}{\sqrt{2ax+x^2}}$  pendet ex quadratura hyperbolae; vel contra quadratura hyperbolae ex illa.

Seu[:]  $\sqrt{a^2 + \frac{a^4}{y^2}} = a + x$ , vel  $\sqrt{\frac{y^2 + a^2}{y^2}} \sim a = a + x$ ,

---

1–3 Dahinter, interlinear: Imo prior vera, haec falsa.

2 et (1) vicissim (2) nunc indiscriminatim  $L$       15  $x + a$  (1), vel sic:  $a^4 + a^2y^2 = 2$  (2), et (a)  
 $\frac{xa}{\sqrt{2ax+x^2}}$ , est figura segmentorum, atque ideo pendet a quadratura circuli. Ergo  $\frac{a^2}{\sqrt{2ax+x^2}}$  pendet  
ab eadem. (b)  $\frac{xa}{\sqrt{2ax+x^2}} L$

$$\text{vel } \sqrt{\frac{y^2 + a^2}{a+y}} \wedge \frac{a}{y} = a+x,$$

$$\text{vel } a+y \wedge a-y, \wedge \frac{a^2}{y^2} = a+x \wedge a+x.$$

$$\begin{array}{c} /\backslash \\ z \\ \cancel{z=2y} \end{array} \quad \begin{array}{c} /\backslash \\ x \\ x \end{array}$$

$$a^2 + y^2 \wedge \frac{a^2}{y^2} = x^2, \text{ vel } a^4 + y^2 a^2 = x^2 y^2, \text{ vel } a^4 = x^2 y^2 - y^2 a^2, \text{ vel } \frac{a^4}{y^2} = x^2 - a^2.$$

$$\sqrt{a^2 + \frac{a^2}{y^2}} = x, \text{ vel } a^2 y^2 + a^4 = x^2 y^2. \text{ vel } \frac{y^4}{4} + a^2 y^2 + a^4 = x^2 y^2 + \frac{y^4}{4}.$$

Ergo (!)  $a^2 + y^2 = \sqrt{x^2 y^2 + \frac{y^4}{4}}$ , vel  $\frac{a^2}{y} + y = \sqrt{x^2 + y^2}$ . Ecce figuram cuius chordae sunt applicatae spatii hyperbolici applicatis rectanguli auctae. Divisisque omnibus per

$y$ , fiet:  $\frac{a^2}{y^2} + 1 = \sqrt{\frac{x^2}{y^2} + 1}$ , vel omnibus in se ductis  $\frac{a^4}{y^4} + \frac{2a^2}{y^2} + \chi = \frac{x^2}{y^2} + \chi$ , fietque:

$\frac{a^4}{y^2} + 2a^2 = x^2$ . Ergo quadrata omnium  $x^2$  quadrari possunt.

Cumque sit et  $\frac{a^4}{x^2 - a^2} = y^2$ , consideretur et  $y = \frac{x^2 a}{x^2 - a^2}$ , nam hac cognita cognoscitur et prior. Ergo  $x^2 y - a^2 y = x^2 a$ , seu  $x^2 y - x^2 a = a^2 y$ , fietque  $x^2 = \frac{a^2 y}{y - a}$ . Sed haec nunc ut aliena mittamus.

5

10

45. DE QUADRATURA CIRCULI ET HYPERBOLAE ET ALIIS CURVIS  
INDE PENDENTIBUS

[Herbst 1673]

**Überlieferung:** *L* Konzept: LH 35 V 6 Bl. 12–13. 1 Bog. 2°. 2 S. auf Bl. 12r° u. 13v°.

5 3 Zusätze außerhalb des Haupttextes. Überschrift, deren 2. Teil sich auf *LSB VII, 3 N. 22* bezieht, erg. — Auf dem übrigen Bogen *LSB VII, 3 N. 22*.  
Cc 2, Nr. 1237, 1238

- Datierungsgründe: Das Stück ist, wie der direkte Bezug zu Beginn von Teil 1 und Teil 2 sowie die Fortsetzung der Figurenzählung zeigen, eine selbständige Fortsetzung der bisher frühesten bekannten
- 10 Studie zur Kreisreihe (Cc 2, Nr. 563 u. 1233A Bog. 2–4), die auf den Herbst 1673 zu datieren ist, und dürfte kurz nach dieser Studie entstanden sein. Es ist etwas später als N. 44 anzusetzen, da die dort nicht zum Tragen gekommene falsche Zerlegung  $a^2 + y^2 = (a+y)(a-y)$  hier ausgiebig verwendet wird. Außerdem bilden die Wasserzeichen der verwendeten Papiere ein Paar.

15 De quadratura circuli et hyperb. et  
aliis curvis inde pendentibus, et utrum duae  
illae a se invicem quod hic asseritur.  
Item progressionis harmonicae differentiae.

---

14–17 Über dem Titel:

$$\frac{x^3}{a} = y^2. \quad x + 1 \wedge x + 1 \wedge x + 1 = x^2 + 2x + 1 \wedge x + 1 = \cancel{x^3 + 3x^2 + 3x + 1} - \cancel{x^3} = \frac{3x^2}{a}.$$

Applicatae parabolae quadraticeae sunt reductae applicatae cubicae compositae.




fig. 4.

1 fig. 4. erg. Hrsg. nach LH 35 II 1 Bl. 87v<sup>o</sup> (= Cc 2, Nr. 1233A Bog. 2)

1 fig. 4: Die Kurve  $\delta\delta\delta$  ist in der Handzeichnung eine Parabel; sie dient Leibniz als Paradigma für die anderen aus der Figur abgeleiteten Kurven.

## [Teil 1]

Inspice figuram 4<sup>ta</sup>m *Dissertationis de arithmeticō circuli tetragonismo* figuramque

$A\delta SW$ . Ostensum est, posito  $AE = x$ , et  $E\delta = y$ , fore  $y = \frac{xa}{\sqrt{2ax - x^2}}$ , vel  $\sqrt{\frac{x^2 a^2}{2ax - x^2}} =$

$\sqrt{\frac{xa^2}{2a - x}}$ , et aequatio figurae erit  $2ay^2 = xa^2 + xy^2$ , seu  $x = \Delta\delta = \frac{2ay^2}{a^2 + y^2}$ , posita

- 5  $A\Delta = y$ . Divisisque omnibus per  $2a$ , fiet  $\frac{y^2}{a^2 + y^2}$ .

Ante omnia autem tangentem curvae nostrae investigare operae pretium est, et primum posita  $x$  abscissa, fiet  $4ay^2 - 2xy^2 = la^2 + ly^2$ , fietque

$$l = \frac{4a - 2x}{a^2 + y^2} \cap y^2 = \frac{4a - 2x}{a^2 + 2ax - x^2} \cap 2ax - x^2.$$

Sed quoniam summa omnium  $l$ , in differentias ipsarum  $y$ , id est ipsi  $AT$  seu  $y$  velut

- 10 abscissae, applicatarum, aequatur figurae, ideo potius in aequatione  $\frac{4a - 2x}{a^2 + y^2} \cap y^2$ , pro  $x$  substituamus eius valorem, fiet:

$$l = \frac{4a - \frac{4ay^2}{a^2 + y^2} \cap y^2}{a^2 + y^2}, \text{ vel } l = \frac{4ay^2}{a^2 + y^2} - \frac{4ay^4}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4},$$

et iam  $\frac{4ay^2}{a^2 + y^2}$  pendet ex q. circ. ergo et  $\frac{4ay^4}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4}$ .

Figura ex his composita aequatur figurae  $A\delta STA$  complemento figurae segmentorum, vel

9–765,1 *Daneben am Rande:*

Nota si istius  $\frac{ya}{a^2 + y^2}$  summae quadratura pendet a quadratura huius  $\frac{y^2}{a^2 + y^2}$ .  
 $ya^2 = a^2x + y^2x$ ,  $ya^2 - y^2x = a^2x$ ,  $y \cap a^2 - xy = a^2x$ .

13 et iam ...  $\frac{4ay^4}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4}$ . erg. L

8  $2ax - x^2$ : Leibniz setzt hier irrtümlich den Kreis ein, der Fehler wirkt sich nicht weiter aus.

$$l = \frac{4a^3y^2 + \cancel{4ay^4} - \cancel{4ay^4}}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4} = \frac{4a^3y^2}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4}.$$

Divisisque omnibus per  $2a$ , fiet  $\frac{2a^2y^2}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4}$ , quaeratur  $\frac{a^4}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4}$ , item

$\frac{y^4}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4}$ . His omnibus inter se iunctis fiet  $\frac{a^4 + 2y^2a^2 + y^4}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4} = 1$ , et iunctae omnes eiusmodi applicatae his aequationibus homogeneae rectangulum complebunt.

Iam  $\frac{2a^2y^2}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4}$  pendet ex quadratura circuli,  $\frac{y^4}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4}$  etiam ex ea pendet. 5

Idem ita in aliam formam commutari potest, si ponatur  $a^2 + y^2 = z^2$ , vel  $y^2 = z^2 - a^2$ , et  $y^4 = z^4 - 2z^2a^2 + a^4$ , fiet

$$\frac{y^4}{z^4} = \frac{z^4 - 2z^2a^2 + a^4}{z^4} = 1 - 2\frac{a^2}{z^2} + \frac{a^4}{z^4},$$

ergo haec figura  $\frac{y^4}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4}$  aequalis istis simul, restat figura  $\frac{a^4}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4} = \frac{a^4}{z^4}$ ,

sed  $z = \sqrt{a^2 + y^2}$ . Porro  $\frac{a^2}{z^2} = \frac{a^2}{a^2 + y^2}$  etiam pendet ex quadratura circuli, restat ergo 10

tantum  $\frac{a^4}{z^4}$ , quae etiam pendet ex circuli quadratura, ut vel hinc patet.

#### 2–4 Daneben am Rande:

Fortasse imposterum utilis erit etiam tabula pro logarithmis logarithmorum ipsis numeris logarithmicis sumtis pro naturalibus.

5 f.  $\frac{y^4}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4}$  (1), erit  $a$  (2) | etiam ... Idem erg. | ita  $L$  9  $\frac{y^4}{a^4 + 2y^2a^2 + y^4}$  (1)  
quadrari potest (2) aequalis  $L$




fig. 5.




fig. 6.

Porro notandum est  $a^2 + y^2$ , aequari  $a + y \wedge a - y$ , appellato ergo  $a + y = m$ , et  $a - y = n$ , erit  $m - n = 2y$ , et  $mn = z^2$ .

$$a + 1 \wedge a - 1 \quad a + 2 \wedge a - 2 \quad = a^2 + ya - ya + y^2$$

$$\frac{a^3}{m \wedge n} = p, \text{ vel } \frac{a^3}{a + y, \wedge a - y} = p. \text{ Ergo } \frac{a^3}{n} = pm, \text{ vel } \frac{a^3}{m} = pn, \text{ seu } \frac{a^3}{a + y} =$$

- 5  $pa - py$ . Ergo  $p$  in  $m$ , seu applicatarum  $p$  momentum ex axe librationis  $BC$  est cylinder hyperbolae, at si  $BD = DE = a$ , momentum applicatarum ex  $EF$  axe librationis est etiam cylinder hyperbolicus sed alio modo assumptus.

- Hinc intelligitur et  $EF$  esse infinitam sive asymptoton, quoniam  $a - y$ , seu  $n$ , ibi fit infinite parva, divisore autem infinite parvo, dividendus fit infinite magnus. Priore modo  
10 cum momentum ex  $BC$ , tunc asymptotos hyperbolae momento homogeneae est in  $BC$ , posteriore modo cum momentum est ex  $EF$ , tunc et hyperbolae asymptotos est in  $EF$ .

---

1 Error est[:]  $a + y, \wedge a - y$  dat  $a^2 - y^2$ .

4f. Contra  $\frac{a^3}{n} = pm$ , seu  $\frac{a^3}{a - y} = pa + py$ , ergo differentia inter istos duos cylindros hyperbolicos est  $2py$ , seu momentum ex  $DL$  duplicatum.

---

1 Porro: Leibniz hat erst im Nachhinein gemerkt, dass seine Zerlegung von  $a^2 + y^2$  falsch ist. Der Fehler beeinflusst sämtliche Überlegungen bis zum Ende von Teil 1.

Ex his sequitur data quadratura hyperbolae utriusque, dari rectam ipsi  $[EF]$  vel  $BC$  parallelam, quae  $DEF$  statice bisecat, seu per centrum gravitatis eius transit: ea ponatur esse  $GH$ . Notam enim eam esse ex datis, patet. Nam distantiae axis aequilibrii  $GH$ , ab axe librationis  $BC$  vel  $EF$ , sunt ut momenta.

Posita enim ipsa figura, seu tota area =  $\aleph^2$ , tunc momentum eius ex  $EF$ , erit  $\aleph^2 \cap EG$ , et ex  $BC$ , erit  $\aleph^2 \cap BG$ , ergo momenta erunt ut distantiae. Momentum ergo ratio nota est, ex posita hyperbolae quadratura, et distantiarum, ergo et axis aequilibrii  $GH$ . Iam momentum figurae ex  $DL$ , erit  $\aleph^2 \cap DG$ , at idem = cyl. hyp.  $\frac{a^3}{n}$  demto  $\aleph^2 \cap BD$ , seu  $\aleph^2 \cap a$ , ergo  $\aleph^2 \cap DG + \aleph^2 \cap BD (= a)$ , vel  $BG \cap \aleph^2$ , seu cylinder figurae sub  $BG =$  cylindro hyperbolico seu omnibus  $\frac{a^3}{a-y}$ . Quod erat inveniendum.

Ecce quadratura, circuli ex data hyperbolae quadratura, non contra. Et certe credibilius, si unquam hanc priorem inventum iri.

Quando  $y$  nunquam assurgit ad  $a$ , ut quando resecta minor radio, cylinder hyperbolicus est finitae longitudinis.

Similis indagatio fieri potest momento sumto ex  $EF$  quae conferenda.

5

10

15

[Teil 2]

Inspice fig. 4 *Diss. de circuli per rescissas dimensione*, in ea omnes  $ED = y =$  resectis  $= \frac{xa}{\sqrt{2ax - x^2}}$ . Ergo omnes  $x$  vel  $\Delta\delta = \frac{2ay^2}{a^2 + y^2}$  pendent ex q. circ.

Quadrata omnium  $ED$  sunt  $\frac{x^2 a^2}{2ax - x^2} = \frac{xa^2}{2a - x} = ya$ . Unde fit aequatio  $xa = 2ay - xy$  vel  $xa + xy = 2ay$ , unde fit  $x = \frac{2ay}{a+y}$ , ergo homogenea est haec figura momento

hyperbolici cuiusdam spatii ultra vel cis  $a = DL$  (vid. fig. 6. hic) sumti ut  $LDMNL$  vel  $LDPQL$ , ex ipsa  $DL$ . Iam momentum posterioris  $LDPQL$  ex  $DL$ , a momento ex  $BC$  asymptoto, quod est  $a$  in  $DP$ , differt cylindro ipsius  $LDPQL$ . Posterior autem  $LDPQ$

respondet ipsi  $\frac{2a^2y}{a+y}$  ut  $LDMNL$  ipsi  $\frac{xa^2}{2a-x}$  quae ab  $a^2$  differt ipsi  $\frac{a^3}{2a-x}$  atque ideo etiam cylindro hyperbolici spatii. Ergo quadrata omnium  $ED$  pendent semper ex q. hyp.

20

25

1 EC L ändert Hrsg.

At quadrata omnium  $\Delta\delta$  (fig. dict. 4.) seu  $\frac{y^4}{1+2y^2+y^4}$  pendent ex q. circ. ut ostensum est, sed et quadrata omnium  $\delta\gamma$  (dict. fig. 4.) quae sunt

$$\frac{1}{1+2y^2+y^4} \left( \frac{4a^6}{a^4+2y^2a^2+y^4} \right) \text{ quoniam } \delta\gamma \text{ sunt } \frac{2a^3}{a^2+y^2}.$$

Si  $\Delta\delta$  in  $A\Delta$  distantias a vertice ducantur fiet:  $\frac{2ay^3}{a^2+y^2}$ , momento eorum ex  $AW$

- 5 quod perinde ex quadratura hyperbolae pendet, eodem modo  $\gamma\delta$  in distantias ab  $S$ , in dicta fig. 4.

Fit  $\frac{ya^3}{y^2+a^2} = x$ . Ergo figura homogenea  $ya^2 = y^2x + a^2x$ , vel  $ya^2 - yyx = a^2x$ , vel

$$y = \frac{x}{a^2 - yx}.$$

$$ya - y^2 \frac{x}{a} = ax. \text{ Ergo } ya - y^2 \frac{x}{a} - \frac{a^2}{2} \left( \frac{a^3}{2x} \right) = ax - \frac{a^3}{2x}, \text{ vel: } \frac{a^3}{4x} - ax = \frac{a^3}{4x} + y^2 \frac{x}{a} - ya,$$

- 10 sive  $\sqrt{\frac{a^3}{4x} - ax} = \pm y\sqrt{\frac{x}{a}} \not\equiv \frac{a}{2\sqrt{\frac{x}{a}}}$  quod ipsis in se multiplicatis patet, fit enim  $y^2 \frac{x}{a} +$

$$\frac{a^2}{4} \left( \frac{a^3}{4x} \right) - ya, \text{ ergo}$$

$$y = \frac{\sqrt{\frac{a^3}{4x} - ax} \not\equiv \frac{a}{2\sqrt{\frac{x}{a}}}}{\pm \sqrt{\frac{x}{a}}} = \sqrt{\not\equiv \frac{a^4}{4x^2} \not\equiv a^2 + \frac{a^2}{x}}.$$

Ecce rursus hyperbolicum spatium, restat ergo  $\sqrt{\not\equiv \frac{a^4}{4x^2} \not\equiv a^2}$  inquirendum, ponatur  $= y$ ,

fiet  $y^2 = \not\equiv \frac{a^4}{4x^2} \not\equiv a^2$ , sive  $4y^2x^2 = \not\equiv a^4 \not\equiv a^2x^2$  vel  $4y^2x^2 \not\equiv a^2x^2 = \not\equiv a^4$ , fit

12 Auf der rechten Seite der Beziehung müsste es genauer  $\not\equiv \sqrt{\frac{a^4}{4x^2} - a^2}$  heißen. Die Vorzeichen-

problematik kommt wegen der späteren Festlegungen nicht zum Tragen. 14 Anstelle von  $\not\equiv a^2x^2$  müsste es  $\not\equiv 4a^2x^2$  heißen. Leibniz rechnet mit dem Versehen konsequent bis S. 769 Z. 10 weiter.

$$\frac{\pm a^4}{4y^2 \mp a^2} = x^2, \quad \text{sive sic potius } x = \frac{a^2 \wedge \sqrt{\pm 1}}{\sqrt{4y^2 \mp a^2}}.$$

NB. hic methodum extrahendi radicem ex dubiis.

Item quod non sit opus signis aliis dubitationis praeter  $\neq$  et  $\mp$  ne ad eos quidem casus ubi ignoratur utrum alteri praeponendum cum sit unum ex illis + alterum -. Posito hic  $\neq$

seu signum ipsius  $\frac{a^4}{4x^2}$  significare +, et hoc loco constare puto  $\neq$  esse + in  $\sqrt{\mp \frac{a^4}{4x^2} \mp a^2}$ , 5

et  $\mp$  esse -, quia  $x$  hoc loco semper minor quam  $a$ .

Iam  $\sqrt{4y^2 + a^2} = z^2$ , seu  $4y^2 + a^2 = z^2$ , ista  $\sqrt{4y^2 + a^2}$  applicata est hyperbolae. Hinc

puto si priora iungantur sequi istam  $\frac{a^2}{\sqrt{4y^2 + a^2}}$  pendere ex quadratura hyperbolae, sive si

$\frac{x}{a} = \frac{a}{\sqrt{4y^2 + a^2}}$ , sive si  $a$  media proportionalis inter applicatam hyperbolae et applicatam

alterius figurae. 10

Nota de aequationibus in se replicatis v. g.  $ya^2 - yyx = a^2x$ , vel  $y = \frac{a^2x}{a^2 - yx}$ , unde fit

$$y = \frac{a^2x}{\frac{a^4 - a^2yx - [a^2x^2]}{a^2 - yx}} = y = \frac{a^4x - a^2yx^2}{a^4 - a^2yx - [a^2x^2]}.$$

Tentandum an hinc duci queat approximatio.

$$\frac{a^3}{y^2 + a^2} = x. \quad \text{Ergo } a^3 = y^2x + a^2x, \quad \text{vel } \frac{a^3}{x} - a^2 = y^2. \quad 15$$

Ecce momentum supplementi figurae 5<sup>tae</sup>.

$$\text{Et } y = \sqrt{\frac{a^3}{x} - a^2}, \quad \text{et } yx = \sqrt{a^3x - a^2x^2}, \quad \text{vel } \frac{yx}{a} = \sqrt{ax - x^2}.$$

Ecce momentum omnium  $q$  (vid. fig. 5.) praecise aequale portionis circularis cylindro. Conferendae inter se haec duae figurae altera segmentis altera sinibus homogenea.

1 Daneben am Rande: NB.

13 1. Formel:  $a^2x^3$  L ändert Hrsg.; 2. Formel:  $ax^3$  L ändert Hrsg.

## 46. DE CURVIS VEL FIGURIS SYNTOMOIS

[Herbst 1673]

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 XIII 3 Bl. 243. L-förmiges Randstück (Außenmaße 18 bzw. 24 cm; Breite jeweils 6–7 cm; Innenkante teils gerissen, teils geschnitten; Reste abgetrennten Textes an der Innenseite) eines Bl. 2°, beidseitig beschrieben.

Cc 2, Nr. 00

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist für den Zeitraum August 1673 bis Juni 1674 belegt; es ist identisch mit dem Wasserzeichen von *LSB VII, 3 N. 26, S. 300–314*. Überdies bestehen enge Bezüge zu dem nächst der Notiz von S. 300 als erstes auf den Bogen geschriebenen und mittels Trennstrichs vom übrigen Text abgesetzten Teil 4, S. 312–314. Aus inhaltlichen Gründen dürfte N. 46 vor Teil 4 entstanden sein. Daraus ergibt sich die mutmaßliche Datierung. — Weiterhin bestehen Bezüge zu dem späteren Stück *LSB VII, 3 N. 3811, S. 475–483* (insbesondere S. 479–481) vom Oktober 1674.

$\frac{\sqrt{ax + x^2}}{a}$ ,  $\square = \frac{ax + x^2}{a^2} = \frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2}$ , subtrahatur ab ea 1, fiet  $\sqrt{\frac{ax + x^2 - a^2}{a^2}}$ . Iam figurae huius  $\sqrt{\frac{ax + x^2 - a^2}{a^2}}$  summa, si iniri potest, summarum istarum series dabit 15 figuram cuius curva hyperbolae syntomos. Fiat autem  $\sqrt{ax + x^2 - a^2} = y$ . Ergo  $y^2 = ax + x^2 - a^2$ . et  $a^2 + \frac{a^2}{4} + y^2 = ax + x^2 + \frac{a^2}{4}$ . Ergo  $\sqrt{\frac{5a}{4} + y^2} = \left[\frac{a}{2}\right] + x$ . rescindatur  $\left[\frac{a}{2}\right]$ , fiet  $\frac{5a^2}{4} + y^2 = x^2$ . Ecce ipsam hyperbolam hoc modo sibi syntomon seu spatio suo. Et hinc probe notandum, hic per exigyas mutatiunculas fieri posse varias figuras syntomos, ut modo parabolicam curvam, modo hyperbolicam hyperbolae esse syntomon.

20 Pro circulo[:] ut habeamus curvam cuius elementa crescent ut sinus circuli, pri-  
mum, ipsa curvae elementa crescent sic:  $\frac{\sqrt{2ax - x^2}}{a} = \sqrt{\frac{2ax - x^2}{a^2}}$ , ab horum quadrato

13 (1)  $\sqrt{\frac{ax - \frac{x^2}{4}}{a}}$  quadretur, fiet (2)  $\frac{\sqrt{ax + x^2}}{a}$  L 13  $+ \frac{x^2}{a^2}$ , (1) hinc habetur modus inveniendi  
(a) figuram quam propo (b) curvam quae eadem cum hyperbola (2) subtrahatur L 14 summa (1)  
iniri potest, ergo (2), si L 15 syntomos. (1) Eodem modo quaeram curvam (a) circu (b) circuli  
sinibus syntomon;  $ax - x^2$ , (2) Fiat L 16 et (1) posito  $+ = -$  vel  $2a^2$  (2)  $a^2$  L 16 f. a L ändert  
*Hrsg. zweimal*

$\frac{2ax - x^2}{a^2}$  subtrahatur quadratum unitatis:  $\frac{a^2}{a^2}$ , residui radix:  $\sqrt{\frac{2ax - x^2 - a^2}{a^2}}$  est series differentiarum figurae quae circulo syntomos; eae differentiae ergo:  $\frac{\pm a \mp x}{a} = \pm 1 \mp \frac{x}{a}$ .  
Harum ergo summa circulo syntomos.

Iam:  $1 + 1 + 1 + 1$  etc. et  $1 + 2 + 3 + 4$  etc., summae semper  $\frac{x^2}{2}$ . Habemus ergo curvam parabolicam sinibus circuli syntomon, at eadem etiam hyperbolae syntomos; hinc rursus nova videtur methodus oriri, circa circuli et hyperbolae comparationem. 5

$\pm x \mp \frac{x^2}{2}$ . Iam  $\pm \frac{x}{a} \mp \frac{x^2}{2a^2} = \frac{y}{a}$ , vel  $2ax - x^2 = 2ya$ , fiet  $2ax - x^2 - a^2 = 2ya - a^2$ , ergo  $a - x$ , vel  $x - a = \sqrt{2ya - a^2}$ , seu  $z = \sqrt{na}$ .

An forte curva parabola basi secta videtur circulo, ab axe secta hyperbolae syntomos. Quod foret maximi momenti. 10

$\sqrt{ax + a} - \sqrt{ax} = \frac{y}{a}$ . Ergo  $\frac{y^2}{a^2} = ax + a + ax - 2\sqrt{a^2x^2 + a^2x}$ . Ergo  $2ax + a - \frac{y^2}{a^2} = 2\sqrt{a^2x^2 + a^2x}$ , ambobus quadratis:

$$4a^2x^2 + 4a^2x - \frac{4y^2x}{a} + a^2 - \frac{2y^2}{a} + \frac{y^4}{a^4} = 4a^2x^2 + 4a^2x.$$

Et rejectis nimis parvis, fit:  $-\frac{4y^2x}{a} + x^2 = 0$ . seu  $\frac{4y^2}{a} = x$ . seu  $4y^2 = ax$ . seu  $y = \frac{\sqrt{ax}}{2}$ .

Unde sequitur differentias applicatarum parabolae ad axem esse ipsismet dimidiatis homogeneas quae est memorabilis proprietas; ad tangentes. 15

Iam quia  $y^2 = \frac{ax}{4}$ . huic addatur  $a^2$ , fiet:  $\sqrt{\frac{ax}{4a^2} + \frac{a^2}{a^2}}$  latus curvae parabolicae ad axem relatae.

#### 9f. Späterer Zusatz: est error

2 quae circulo syntomos gestr. u. wieder gültig gemacht L 6f. comparationem. | Ergo summa ista ax gestr. |  $\neq x \neq \frac{x^2}{2} L$  8f.  $\sqrt{na}$ . (1) Ergo curva parab. (a) aequaliter divisa per (b) per (2) An L

2 ergo: Die folgende Radizierung ist unzulässig; dies wirkt sich bis Z. 8 aus. 14 fit: Anstelle von  $x^2$  müsste es  $a^2$  heißen; Leibniz rechnet mit dem Fehler konsequent bis zum Schluss des Stückes weiter.

Contra  $\frac{y^2 + 2y + 1 - y^2}{a} = \frac{x}{a}$ . Ergo  $\frac{2y}{a} = \frac{x}{a}$ . seu  $2y = x$ . Ergo differentiae applicatarum trilinei parabolici sunt triangulo homogeneae. Earum quadratum  $\frac{4y^2}{a^2} = \frac{x^2}{a^2}$ . addatur  $\frac{a^2}{a^2} = 1$ . fiet  $\sqrt{\frac{4y^2 + a^2}{a^2}}$  latus eiusdem curvae parabolicae, sed ad basin relatae.

Ponatur ea differentia esse:  $1 - \frac{y}{a}$ . erit eius  $\square = \frac{a^2 + y^2 - 2ya}{a^2}$ , vel:  $2ya - y^2 = a^2$ ,

5 addatur  $a^2$ , fiet  $\frac{\sqrt{2ya - y^2}}{a}$ . Ecce ergo applicatam circuli. Confirmatio paulo ante demonstratorum.

## 47. DE HYPERBOLAE RESECTA

[Herbst 1673]


**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 II 1 Bl. 321–322. 1 Bog. 2°. 4 S. Zahlreiche Korrekturen u. Ergänzungen sowie nachträgliche Bemerkungen am Rande. Leichte Beschädigungen an den Außenrändern, Abschabungen u. Tintenfraß. Dadurch stellenweise geringfügiger, aber größtenteils behebbarer Textverlust.

5  
Cc 2, Nr. 560

Datierungsgründe: Das Wasserzeichen des Papiers ist für November 1673 belegt. Bezüge in Notation bzw. Terminologie bestehen zu N. 51<sub>3</sub> (datiert: Ende 1673) und zu LSB VII, 3 N. 24 vom Herbst 1673. Inhaltlich setzt das Stück die auf Herbst 1673 zu datierende Kreisquadratur voraus.

10

[Teil 1]



[Fig. 1]

Esto curva hyperbolica ABC. cuius vertex A. centrum E. asymptoti EC. ED. diameter EAF. latus transversum OA. semilatus transversum AE. eique aequale semilatus rectum AG. ordinata ad diametrum FB. ex punto curvae ordinata ad curvam BH. abscissa ex diametro AF. et ex asymptota HE.

15

Positaque  $HI = HE$ . erit  $IB$  tangens quae producatur, dum occurrat diametro conjugatae in  $L$ . et ipsi diametro in  $M$ . erit resecta  $AL$ . et intervallum tangentis a centro in asymptota  $IE$ . at intervallum eiusdem a vertice in diametro erit  $AM$ . perpendicularis ex vertice in asymptoton  $AN$ .  $PB$  secans curvam ad angulos rectos.

5 Iam ut ad calculum accedamus, constat[:]

$$(1) \quad IH = HE.$$

$$(2) \quad GA = EA. \text{ ex hypothesi, ideo } AN = EN.$$

$$(3) \quad \square BHE = AN^2 = a^2.$$

$$(4) \quad \square OFA = FB^2.$$

$$10 \quad (5) \quad \nabla MFB :: \nabla^{lo} MAL.$$

$$(6) \quad \text{Ergo per 5. resecta } AL = \frac{FB \wedge AM}{FM} = \frac{FB \wedge LM}{BM} = \\ (\text{per 4.}) \sqrt{OFA} \wedge \frac{LM}{BM} = \sqrt{OFA} \wedge \frac{AM}{FM}.$$

$$(7) \quad \text{Et quia } OF = OA + AF. \text{ et } OA = 2AE. \text{ et } AE = \sqrt{2AN^2} = \sqrt{2a^2}.$$

$$(8) \quad \text{et posito } FA = x. \text{ et } FB = y. \text{ et } AO = b.$$

$$15 \quad (9) \quad \text{ideo erit } AO = b = 2\sqrt{2a^2} = \sqrt{8a^2}.$$

$$(10) \quad \text{et } FB^2 = y^2 = b + x, \wedge x = bx + x^2 = \sqrt{8a^2x^2 + x^2}.$$

$$\text{Et } y^2 + \frac{b^2}{4} = x^2 + \frac{b^2}{4} + bx. \text{ Ergo } \sqrt{y^2 + \frac{b^2}{4}} = x + \frac{b}{2}. \text{ et } \sqrt{y^2 + \frac{b^2}{4}} - \frac{b}{2} = x.$$

$$\text{abie quoque } \frac{b}{2} \text{ quod semper idem potest dici: } y^2 + \frac{b^2}{4} = t^2. \text{ si } t = x - \frac{b}{2}.$$

$$(11) \quad \text{Posito item } EH = w. HB = z.$$

$$20 \quad (12) \quad \text{erit per 3. } wz = a^2, \text{ et } HB = z = \frac{a^2}{w}.$$

$$(13) \quad \text{Est autem } FP = \frac{AG \wedge FE}{AE}. \text{ per ea quae habet Auzutus apud Schoten. in lib. 2.}$$

---

6 HE. | ex natura hyperbolae in univ. *gestr.* | (2) GA =  $L$  17f. Et ...  $x - \frac{b}{2}$ . erg.  $L$

---

5–778,8 Im Folgenden versucht Leibniz mehrmals die resecta zu bestimmen, scheitert aber aufgrund von Rechenfehlern und ungeeigneten Substitutionen. Dies gilt auch für das als richtig angesehene Schlussergebnis.

Cartes *Geom.* p. 245. Et quia hoc loco  $AG = AE$ . erit  $FP = \frac{AE \wedge FE}{AE} = FE$ ,  
sive  $FP = x + \frac{b}{2}$ .

(14) Et ob angulos rectos  $PBM$  et  $BFM$ . erit  $FB^2 = FM \wedge FP$ . ergo

$$FM = \frac{FB^2}{FP} = \frac{bx + x^2}{x + \frac{b}{2}}.$$

$$(15) \quad \text{Et } AM = \frac{bx + x^2}{x + \frac{b}{2}} - x = \frac{bx + x^2 - x^2 - \frac{bx}{2}}{x + \frac{b}{2}} = \frac{\frac{bx}{2}}{x + \frac{b}{2}} = \frac{bx}{2x + b}. \quad 5$$

(16) Et ideo per 15. iuncta 6. erit  $AL$  resecta

$$AL = \underbrace{\sqrt{bx + x^2} \wedge AM}_{FB} \frac{\cancel{bx} + \cancel{x^2}}{\cancel{2x} + \cancel{b}} \wedge FM \frac{\cancel{bx} + \cancel{x^2}}{\cancel{2x} + \cancel{b}}. \text{ sive } AL = \frac{\sqrt{b^3x + b^2x^2}}{2b + 2x}. \text{ et}$$

$$AL^2 = \frac{b^3x + b^2x^2}{4b^2 + 4x^2 + 8bx} \text{ et } \frac{4AL^2}{b^2} = \frac{bx + x^2}{b^2 + x^2 + 2bx}.$$

$$\text{Ponatur } \frac{4AL^2}{b} = m, \text{ fiet: } \frac{mb^2 + mx^2 + 2mbx}{b} = bx + x^2,$$

$$mb^2 + mx^2 + 2mbx = b^2x + x^2b.$$

!            !            !

Pro  $x$  ponatur  $m + f$ . habebimus

9 In Höhe der Lesart am Rande:

$$\begin{array}{ccc} & 2 & 2 \\ 5 & & 7 & 9 \\ & 2 & 2 \\ \frac{7}{12} & & \frac{9}{16} & \frac{11}{20} \end{array}$$

9 f.  $bx + x^2$ , (1) fiat  $f = b + x$ , habebimus:  $\frac{mbf + 2mbx}{b} = fx$ . (a) et pro  $f + x$  sumto g. habebimus  
(b) et pro  $f + x$  sumto g. fiet (c) seu  $\frac{mb + 2mb}{b}$  (d)  $mbf + mfx$  (autem)  $= bx + x^2$  (2) Ponamus  $f = b + x$ .  
habebimus:  $\frac{mb^2 + mx^2 + 2mbx}{b} = fx$  (3)  $mb^2 L$

$$\cancel{mb^2} + mx^2 + \cancel{2mbx} = \cancel{b^2m} + f^2m \quad | + x^2b = x\cancel{mb} + fxb.$$

/ \quad / \ \ / \quad / \\
 x - f \quad x - m \quad x - f \quad m + f \\
 x^3 - x^2f

5 Potius pro  $x = f - 2b[:]$

$$\frac{mb^2}{x} + mx + \cancel{2mb} = \cancel{b^2} + xb. \quad \frac{mb^2}{x} + mf = bf - b^2.$$

/ \quad / \\
 f - 2b \quad bf - \cancel{b^2} \\
 mf - \cancel{2mb}

10 Pro  $bf - b^2$ , ponatur  $cf$ . scilicet  $c$  posita constante fiet  $\frac{mb^2}{x} + mf = cf$ . sive  $mb^2 + mfx = cfx$ , vel  $mb^2 = cfx - mfx$ . Ponendoque  $fx = g^2$ , fiet  $mb^2 = cg^2 - mg^2$ . sive denique  $c - m$  posita  $h$ , fiet:  $mb^2 = hg^2$ , et  $hg^2 = y^3$ , ut nunc literis Cartesianis enuntiemus, [bricht ab]

Alia methodo tentemus idem, ut appareat veritas:

15

$$\frac{mb^2}{x} + mx + 2mb = \underbrace{b^2 + xb}_{ib}. \quad \text{posito } i = b + x.$$

$$\frac{mb^2}{x} + mx = \underbrace{ib - 2mb}_{lb}. \quad \text{posito } l = \underbrace{i - 2m}_{b + x - 2m}.$$

10 Error[:]  $c$  ita non est constans, potius  $b - f = g$ . fiet  $= gb$ . (!) fiet:  $mb^2 + mfx = gbx$ .

5 f.  $x = f - 2b[:]$  (1)  $\frac{mb^2}{x} + mx + \cancel{2mb} = \cancel{b^2} + xb. \quad \frac{mb^2}{x} = 0 - b^2$ . seu  $b^2 + \frac{mb^2}{x} = 0$ .

/ \quad / \\
 f - 2b \quad \cancel{gb} - \cancel{b^2} \\
 \cancel{mb} - \cancel{2mb}

sive [bricht ab] ergo error in calculo, nam  $x$  sumi  $f - 2b$  nil prohibet et tamen sequitur absurdum. (2)

$\frac{mb^2}{x} L$  12–14 enuntiemus, | fiet:  $xa^2 - y^3$  gestr. | Alia  $L$

Iamque habebimus  $mb^2 + mx^2 = lbx$ . Ponamus  $b^2 + x^2 = n^2$ . fiet  $mn^2 = lbx$ , fiet

$$\begin{array}{c} \diagup \\ b + x - 2m \end{array}$$

$$mn^2 = b^2x + bx^2 - 2mbx.$$

$$b^2x + x^2b - 2mbx = mn^2 = p^2. \quad n^2 = b^2 + x^2.$$

$$n^2x + n^2b - 2mbx = mn^2. \quad x + b = i.$$

$$n^2i - 2mbx = mn^2. \text{ seu } n^2i - mn^2 = 2mbx. \quad i - m = q. \text{ fiet } qn^2 = 2mbx. \quad y^2 = 2x^2a.$$

5

$$\frac{mb^2}{x} + mx + 2mb = p^2 + xb. \quad x = f - 2b.$$

$$\begin{array}{ccc} \diagup & & \diagup \\ f - 2b & & f - 2b \\ mf - 2mb & & bf - 2b^2 \end{array}$$

$$\frac{mb^2}{x} + mf = bf - b^2. \quad \text{sive}$$

$$\frac{mb^2}{x} = bf - mf - b^2. \quad \text{Et posito } n = b - m, \text{ fiet}$$

$$\frac{mb^2}{x} = nf - b^2. \quad \text{vel}$$

$$mb^2 = nf - b^2 - b^2x.$$

$$\begin{array}{ccc} \diagup & & \diagup \\ b - n & & x + 2b \\ b^3 - b^2n & & nx^2 + 2nxb \\ & \diagup & \\ & g^2 - b^2 & \\ & ng^2 - nb^2 & \end{array}$$

$$b^3 - b^2n = nx^2 + 2nxb. \quad b^3 - bbn - 2xbn = nx^2. \text{ posito } b + 2x = h, \text{ fiet } b^3 - hbn = nx^2.$$

10

15

1 (1) Iam  $\frac{mb}{x}$  posito n. erit  $\frac{mb^2}{x} = nb$ . fietque  $mx = lb - nb$ . (2) Iamque  $L = 19 nx^2$ . (1) Iam  $\frac{b^3}{n} - b^2 - x^2 - xb = 0$ . (2) posito  $L$

$$\text{Resecta } AL = \frac{FB \cap AM}{FM}. \quad FB = \sqrt{bx + x^2}. \quad AM = \frac{bx}{2x+b}. \quad FM = \frac{bx + x^2}{x + \frac{b}{2}}.$$

$$\frac{AM}{FM} = \frac{bx}{2x+b} \times \frac{bx + x^2}{\frac{b}{2} + x} = \frac{2b}{2x+b} \times \frac{b+x}{b+2x} = \frac{2b}{b+2x}.$$

Ergo  $AL = \sqrt{bx + x^2} \cap \frac{2b}{2x+b}$ . et ordinata ducta in  $\frac{2b^2}{2x+b}$ , seu  $\sqrt{bx + x^2} \cap \frac{2b^2}{2x+b}$  seu ordinatae hyp. ad diam. in ordinatas alterius hyp. ad asympt. dabit cylindrum resectae.

5 Ergo

$$AL^2 = bx + x^2 \cap \frac{4b^2}{4x^2 + b^2 + 4xb} = m^2.$$

Ergo fiet aequatio figurae haec:

$$4m^2x^2 + m^2b^2 + 4m^2xb = 4b^3x + 4b^2x^2.$$

Invenimus ut dixi aequationem resectarum hyperbolae ex diametro coniugata esse

10 hanc: posita abscissa hyperbolae  $x$ . latere recto  $b$ . resecta autem posita  $m$ .

$$4m^2x^2 + m^2b^2 + 4m^2xb = 4b^2x^2 + 4b^3x.$$

$$xb + x^2$$

$$m^2b^2 + \underbrace{x^2 + xb}_{[z^2]} \cap 4m^2 = \underbrace{x^2 + xb}_{[z^2]} \cap 4b^2.$$

11 Ergänzung:  $x = f - \frac{b}{2}$ . Ergo  $f^2 + \frac{b^2}{4} - fb = x^2$ . et  $xb = bf - \frac{b^2}{2}$ . Ergo  $x^2 + xb = f^2 - \frac{b^2}{2}$ . fiet  ~~$m^2b^2$~~  +  $4m^2f^2 - \frac{4m^2b^2}{2} = 4b^2f^2 - 2b^4$ .

12 Resecta AL ...  $4b^3x + 4b^2x^2$ . erg. L 11 f.  $4b^3x$ . |  $b+x = r$ ,  $xr$  bricht ab, streicht Hrsg. |  $xb$  L


13  $z^2$  gestr., erg. Hrsg. 13–779,1  $4b^2$  (1) fiet:  $m^2b^2 + 4m^2z^2 = 4b^2z^2$ . Et ponendo  $4z^2 + b^2 = w^2$ ,

(2) si (a)  $b+x = (b)$  sit  $m^2 = -\frac{b^2}{4} - xb + t^2$ . ergo  $4m^2x^2$  erit  $m^2b^2 + 4m^2xb + t^2$ . et habebimus:

$$m^2t^2 = 4b^2x^2 + 4b^3x. \text{ vel } \frac{m^2t^2}{b^2} = 4x^2 + 4bx. \text{ (aa) vel } m^2 = (bb) \text{ vel fiat (3) eritque L}$$

9–779,8 Mit Invenimus beginnt Bl. 321 v°. Leibniz überträgt das Ergebnis von Bl. 321 r° hierher und rechnet damit konsequent weiter. Jedoch ist in der Ergänzung ein neuer Fehler enthalten.

eritque  $m^2 = \frac{4b^2 z^2}{b^2 + 4z^2}$ . et  $z^2 = \frac{m^2 b^2}{4b^2 - 4m^2}$ .



[Fig. 2]


Et si tam omnium  $m^2$ , quam omnium  $z^2$  centrum gravitatis haberi potest, habebitur momentum eius figurae ab utroque latere.

Vera haec, sed mutant locum.

5

At si ex  $a^3 = a^2 x + y^2 x$ , ponendo  $a^2 + y^2 = z^2$ , facias  $a^3 = z^2 x$ , fient applicatae  $x$  aequales cubo parametri, non per abscissae [ $y^2$ ] quadratum diviso, sed diviso per quadratum abscissae alio quadrato auctum.

[Teil 2]



[Fig. 3]

10

$$1 \quad b^2 + 4z^2 \wedge m^2 = 4b^2 z^2. \quad m^2 + \frac{4m^2 z^2}{b^2} = 4z^2.$$

3f. habebitur (1) centrum gravitatis figurae (2) momentum  $L \quad 7 \quad x^2 L \text{ ändert Hrsg.} \quad 7\text{f. diviso}$   
per (1) cuiusdam radicis ex (2) quadratum abscissae  $L$

10 [Fig. 3]: Der Figur liegt paradigmatisch für ein allgemeines Kurvenstück ein Parabelbogen mit je  $x$  und  $y$  als unabhängiger Variablen zugrunde. Das Gleiche gilt für die Fig. der Ergänzung auf S. 782.

Aequatio figurae sit  $y^2a = y^2x + a^2x$ .

Ergo  $y^2a - y^2x = a^2x$ . Ergo  $y^2 = \frac{a^2x}{a-x}$ . Ergo  $\frac{y^2}{a^2} = \frac{x}{a-x}$ .

Iam  $\frac{x}{a-x} = 1 - \frac{a}{a-x}$ , quibus ductis in  $a$ , fiet  $a - \frac{a^2}{a-x} = \frac{y^2}{a}$ , et rursus ductis omnibus in  $a$ , fiet  $a^2 - \frac{a^3}{a-x} = y^2$ .

- 5 Ergo ad summam omnium  $y^2$  habendam opus est cylindro hyperbolae, nam  $\frac{a^2}{a-x}$  vel saltem  $\frac{\gamma \wedge a^2}{a-x}$  applicata hyperbolae est. Ergo momentum figurae  $AECD$  ex axe  $AD$  pendet ex quadratura hyperbolae.
- At ductis omnibus  $x$  in  $y$ . habetur momentum omnium  $x$  ex eodem axe  $AD$ , seu momentum figurae  $AECB$  ex axe  $AD$ . complementi figurae  $AECD$ . Ergo summa rectangulorum
- 10  $yx$  etiam ex quadratura hyperbolae habetur.

Iam cum sit  $x = \frac{y^2a}{y^2 + a^2}$ . erit  $xy = \frac{y^3a}{y^2 + a^2}$ . Ergo si qua sit figura huius aequationis:  $\frac{y^3}{y^2 + a^2} = x$ , vel  $y^3 = y^2x + a^2x$ . ea pendet ex quadratura hyperbolae, cum haec nostra initio posita:  $\frac{y^2a}{a^2 + y^2} = x$ , vel haec  $\frac{a^3}{a^2 + y^2}$ , pendeat ex quadratura circuli.

Sed ut ad primam aequationem  $y^2a = y^2x + a^2x$ . redeamus[:] His ita positis ducto

11–13 *Daneben großes NB.*

14  $+y^2x = a^3$ . fiat  $a = b - y$ . erit  $a^2 = b^2 + y^2 - 2by$ . et  $a^2x = b^2x + y^2x - 2byx$ . fiet:  $b^2x + y^2x - 2byx + y^2x = a^3$ . sive  $b^2x + 2y^2x - 2byx = a^3$ .

1 Aequatio: Im Folgenden bezeichnet Leibniz den Parameter der betreffenden Kurve mit  $a$ . Gleichzeitig dient  $a$  als Dimensionsgröße, um von Fall zu Fall Dimensionsgleichheit herzustellen. Die Variablen  $x$  und  $y$  werden ohne nähere Unterscheidung gleichberechtigt behandelt; außerdem werden sie bei Neuansätzen und Zerlegungen unverändert weiter verwendet. 3 Iam: Auf der rechten Seite sollten die Vorzeichen umgekehrt sein. Das Versehen hat keine Auswirkungen auf die folgende Quadraturaussage.  
13 pendeat: N. 421 S. 740 Z. 15–21 .

*y* in  $a - x$ , fiet  $ay - yx$ . Et quia  $y = \sqrt{\frac{a^2x}{a-x}}$ . hoc ducto in  $a - x$ , vel in  $\sqrt{a^2 + x^2 - 2ax}$  fiet  $ay - yx = \sqrt{\frac{a^2x \cdot a - x \cdot a - x}{a - x}}$ . sive  $ay - yx = \sqrt{a^3x - a^2x^2}$ . Quorum summa erit momentum figurae  $AEC$ D ex basi  $CD$ . pendetque ex summa omnium  $x^2$ . ut mox dicam. Interim figura huic rectangulorum progressioni homogenea, est  $\frac{\sqrt{a^3x - a^2x^2}}{a} = y$ . sive eius aequatio:  $\sqrt{a^3x - a^2x^2} = ya$ . et  $a^3x - a^2x^2 = y^2a^2$ . sive  $ax - x^2 = y^2$ . Unde patet ipsum circulum seu sinuum aream esse figuram homogeneam momento huius figurae  $AEC$ D ex basi  $CD$ .

Sed ut ad primam aequationem  $y^2a = y^2x + a^2x$  initio propositam, redeamus[:] Cum hoc modo sit  $\frac{y^2a}{y^2 + a^2} = x$ . erit  $\frac{y^4a^2}{y^4 + a^4 + 2y^2a^2} = x^2$ . Quae proinde semiquadratorum ab  $x$  summa, a cylindro rectanguli  $AC$  ablata, relinquit momentum figurae  $AEC$ D, ex basi summae sinuum homogeneum.

Caeterum ut his  $x$  figuram quaeramus homogeneam ponendum est:  $\frac{y^4a}{y^4 + a^4 + 2y^2a^2} = x$ .

$$\left( = 1 - \frac{a^4 + 2ya^3}{y^4 + a^4 + 2y^2a^2} \cdot \right) y^4a = y^4x + a^4x + 2y^2a^2x.$$

Sed si ponatur  $\frac{a^5 + 2y^2a^3}{y^4 + a^4 + 2y^2a^2}$  aequatio separari potest in duas ob binomium numeratorem, quae omnia pendent ex tetrag. circ. et fiet primum  $\odot \frac{a^5}{y^4 + a^4 + 2y^2a^2} = x$ . Ergo

---


$$a^2x. \text{ si } a - x = f. \text{ fiet } y^2x = a^2f. \text{ fiet: } y^2a - y^2f = a^2f. \text{ Ergo } y^2 = \frac{a^2f}{a - f}.$$

$$\begin{array}{c} / \\ a - f \end{array}$$

5–7 Unde reperta iam alia methodo exhibendi figuram rationalem homogeneam circulo poterimus priorem per resectas dissimulare; modo ex praesente idem demonstremus.

6 seu sinuum aream erg.  $L$       9 proinde (1) quadratorum (2) semiquadratorum  $L$       15 quae ... circ. erg.  $L$

$$\frac{a^4}{y^4 + a^4 + 2y^2a^2} = \frac{x}{a} \text{ et } \frac{a^2}{y^2 + a^2} = \sqrt{\frac{x}{a}} \text{ et } \frac{a^3}{y^2 + a^2} = \sqrt{xa}.$$


Cum prima aequatio fuerit  $\frac{y^2a}{y^2 + a^2} = x$ , fiat  $\frac{ya^2}{y^2 + a^2} = \frac{xa}{y}$ . Excogitanda est alia, cuius momentum seu  $y$  in  $x$ . sit huic aequationi homogeneum. Si ergo aequatio ea sit:

$$\frac{ya^2}{y^2 + a^2} = x, \text{ momentum omnium ex vertice, seu } xy \text{ erit } \frac{y^2a^2}{y^2 + a^2} = xy, \text{ homogenea}$$

5 aequatio huic  $\frac{y^2a}{y^2 + a^2} = x$ .

Ergo figurae huius momentum ex vertice  $\frac{ya^2}{y^2 + a^2} = x$ . necesse est ex quadraturam circuli dependere, nam homogenea eius ex ea dependet; et vicissim hac figura quadrata circuli quadratura habebitur: fiet ergo  $ya^2 = y^2x + a^2x$ .

2–5 Hierzu späterer Zusatz:



$$x \sqcap \frac{ya}{y^2 + a^2}, \quad xy \sqcap \frac{y^2a}{y^2 + a^2}, \quad y^2 + a^2 \sqcap \frac{ya}{x}.$$

Unde  $y^2 - \frac{a^2}{x}y + \frac{a^4}{[4]x^2} \sqcap \frac{a^4}{[4]x^2} - a^2$ .

unde  $y - \frac{a^2}{[2]x} \sqcap \sqrt{\frac{a^4}{[4]x^2} - a^2}$ . ductisque omnibus in  $x$ .

6f. Darüber: Error

1f.  $\sqrt{xa}$ . | Ergo posita figura quadam aequationis huius  $\odot$ . chordarum eius a summo ad exitum baseos seu curvam ductarum summa, pendet a quadratura circuli, seu figura resectarum circuli. Mensura autem eiusmodi chordarum est utilis ad trochoeidies curvae revolutione genitas mensurandas. Ita figurae resectarum circuli chordae sunt  $x^2 + a^2$  gestr. | (1) Quod si ab initio data sit haec aequatio:  $\frac{y^2}{a} = \frac{a^2x}{a - x}$ .


(2) Cum L 11f. 2 bzw. 4 erg. Hrsg.

2–785,6 Die in diesen Abschnitten enthaltenen Überlegungen sind nicht immer exakt genug durchgeführt, insbesondere beachtet Leibniz die gegenseitige Abhängigkeit von analytischer Rechnung und geometrischer Darstellung nur ungenau.


At datur omnium  $yx$ , seu omnium  $x$  momenti ex vertice summa datis omnibus  $x^2$ . Est autem  $\frac{ya^2}{y^2 + a^2} = x$ . Ergo  $\frac{y^2 a^6}{y^4 + a^4 + 2y^2 a^2} = x^2$ . Quorum si summa posset haberi, rursus tetragonismus haberetur.

Figura illis homogenea est  $\frac{y^2a^5}{y^4 + a^4 + 2y^2a^2} = x = 1 - \frac{2y^4a^3 + 2a^7}{y^4 + a^4 + 2y^2a^2}$ . quae omnia a circuli quadratura pendent.

Paulo ante:  $\frac{ya^2}{y^2 + a^2} = x$ . Ergo  $\frac{y}{y^2 + a^2} = \frac{x}{a^2}$ . Ergo et invertendo  $\frac{y^2 + a^2}{y} = \frac{a^2}{x}$ . et  
 $y + \frac{a^2}{y} = \frac{a^2}{x}$ . Et  $y = \frac{a^2}{x} - \frac{a^2}{y}$ , et  $y^2 = \frac{a^2 y}{x} - a^2$ . huic figurae homogenea est  $\frac{y^2}{a} = \frac{ay}{x} - \frac{a^2}{a}$ .  
fiet  $\frac{y^2 x}{a} = ay - ax$ , vel  $\frac{y^2}{a} + a = \frac{ay}{x}$ . Et si  $\frac{ay}{x} = z$ . erit  $\frac{y^2}{a} + a = z$ .



[Fig. 4]



[Fig. 5]

4 f. *Dazu interlinear: error*

6  $\frac{a^2}{x}$  | = y + a +  $\frac{a^2}{x}$ . streicht Hrsg. | et L

- Sit curva eius naturae, ut posita  $AC = x$ . et  $CD = y$ . ipsius  $y$  quadratum per  $a = FG$ . latus rectum divisum, sive rectangulum  $HD$ . latus  $HF = \frac{y^2}{a}$ . posito  $HDG$  angulo recto, seu  $FD^2 = HFG$ . aequetur  $\frac{ay}{x} - a$ . Ut ergo habeatur  $\frac{ay}{x}$  primum habenda est media proportionalis inter  $a$  et  $y$ . Posito scilicet  $FG = a$ . et ei addito  $FR$  fiet  $RG$ ; et sumto eius medio  $I$ , si circulus  $IRG$  describatur, erit  $FL$  media proportionalis eiusque  $\square = FL^2 = ay$ . Quod quadratum  $FL^2$  ut dividatur per  $x$ . ducatur  $LM =$  et parallela  $FH$ . et abscindatur  $MN = AC = x$ . et si  $\langle in \rangle N$  perpendiculariter erigatur  $NP$ . ductaque  $MP$  et perpendiculari ad  $MP$ , versus rectam  $ML$ . nempe  $PQ$ . [debet recta  $LQ$  esse  $= FG = a$ .  $NQ - LQ$  aequalis esse ipsi  $FH$ .] et  $NQ$  erit  $\frac{ay}{x} = z$ . et aequatio fiet:  $\frac{y^2}{a} + a = z$ .
- 10 vel  $\frac{y^2}{a} = z - a$ . Et  $z - a = NL$ . posito  $w$  fiet  $y^2 = wa$ . Ergo  $z - a = NL = w$ . posito  $= CS$ . seu applicato ad  $C$ . eodem ubique fieri intellecto, curva  $STD$  erit parabolica, cuius si altitudo  $CD$  et ordinata  $CS$ . latus rectum sit  $LQ$ .
- Quodsi parabolae  $STD$  addatur rectangulum  $DCV$ . posita  $CV = LQ = a$ . erit  $VCS = NQ = \frac{ay}{x}$ . et patet locum omnium  $\frac{ay}{\langle x \rangle}$  esse parabolicum.
- 15 Quodsi locus omnium  $\frac{ay}{x}$  sit curva parabolica, et omnium  $y$  recta, qualis erit locus omnium  $x \langle ad \rangle z = \langle \frac{ay}{x} \rangle$ ? Erit  $x = \frac{ay}{z}$ , id est invenienda est quae sit ad  $a$ . ut  $y$  est ad  $x$ , qualis in  $\langle fig. 2. \rangle$  est  $E\Psi$ . Et ut talis figura describatur, imaginanda constans para-

8f. nempe  $PQ$ . |debet recta ... ipsi  $FH$ . gestr., erg. Hrsgr.| (1) Porro cum  $NQ = \frac{ay}{x} = z$ . si omnes  $NQ$ . applicentur  $\langle ad \rangle CD$ . locus erit  $(a)$  triangulum.  $(b)$  ob aequationem parabola. Nam  $(aa)$  si ab  $\frac{y^2}{a} + a = z$  abiciatur  $a$ . recta quod  $\langle$  non mutat  $\rangle$  locum, fiet  $(bb)$  fiat  $\frac{y^2}{a} = z - a$ . et  $z - a = w$ , fiet  $\frac{y^2}{a} = w$ . et  $y^2 = wa$ . Ergo locus omnium  $NQ$  ad  $CD$ , in  $C$ . applicatarum erit parabola. (2) Porro cum  $z = \frac{y^2}{a} + a = HG$ . si omnes  $HG$  applicentur ad  $CD$ . ut posito  $CS = HG$ . locus seu curva  $DTS$  erit parabola. Nam fiat  $\frac{y^2}{a} = z - a$ . et  $z - a = w = NL$ , fiet  $\frac{y^2}{a} = w$ . et  $y^2 = wa$ . Ergo locus omnium  $NL = FH$ . ad  $CD$ , in  $C$ . applicatarum erit parabola. (3) Iam quia  $z = (4)$  et  $NQ L = 11f.$  cuius ... sit  $LQ$ . erg.  $L$

bola, eiusque extremis  $S$ . semper chorda tensa applicanda quae quanto magis descendis producatur. Sitque  $CSF$  mobilis indefinita ad angulos invariabiles in  $CD$ . quae manu descendente in chorda deprimitur. Sit et alia indefinita  $\Psi\Phi$  in ea fixa ipsi  $CD$  immobili parallela cuius cum chorda  $SD$  intersectiones describent curvam quaesitam. Et haec methodus reducendi loca utilis est ad faciles curvarum in plano descriptiones, suppositis scilicet aliis inferioris gradus iam descriptis.

Imo NB. fig. 2. ista nonnihil corrigenda, deberet enim  $\Psi$  semper cadere in  $SC$ . Nota interim obiter tractari debere etiam de locis linearum non ad rectas, sed curvas ordinatim, id est parallele inter se, applicatarum. Omnia  $\Psi$  puto cadent in lineam rectam, ideo si angulus  $SCD$  fieret obliquus, angulus  $S\Psi\Psi$  posset fieri rectus.

5

10

## [Teil 3]

Invenimus aequationem resectae hyperbolicae hanc:

$$4m^2x^2 + m^2b^2 + 4m^2xb = 4b^3x + 4b^2x^2.$$

seu

$$m^2b^2 + \underbrace{x^2 + xb, \hat{\wedge} 4m^2}_{=} = \underbrace{x^2 + xb, \hat{\wedge} 4b^2}_{=}$$

Positoque  $x = f - \frac{b}{2}$ . fiet  $x^2 = f^2 + \frac{b^2}{4} - fb$ . et  $xb = bf - \frac{b^2}{2}$ . Ergo  $x^2 + xb = f^2 + \frac{b^2}{4} - \frac{b^2}{2} + bf - bf$ . seu  $x^2 + xb = f^2 - \frac{b^2}{4}$ .

Ergo  $\cancel{m^2b^2} + 4m^2f^2 - \cancel{b^2m^2} = 4b^2f^2 - b^4$ .

Ergo aequatio figurae rescissae hyperbolae est

$$4m^2f^2 = 4b^2f^2 - b^4. \text{ sive } 4x^2y^2 = 4a^2y^2 - a^4.$$

Quam ultra reduci posse non puto, nisi mutata linea recta ad quam referantur.

20

12 Darüber: NB. ⟨Multi⟩plicari potest fractio aliqua per quadratum, si simul numerator multiplicetur, et nominator dividatur per radicem.


$L$  2 angulos (1) rectos (2) invariabiles  $L$  3 ea (1) ad angulos rectos (2) fixa  $L$  7 fig. 2. erg.  
L 20 recta erg.  $L$

12 Invenimus: Hiermit beginnt Bl. 322 v°. Leibniz nimmt das (unrichtige) Ergebnis der Gegenseite (s. o. S. 778 Z. 8) wieder auf.

Ergo  $4x^2y^2 + a^4 = 4a^2y^2$ . Ergo  $a^4 = 4a^2y^2 - 4x^2y^2$ . Ergo


$$\frac{a^4}{4a^2 - 4x^2} = y^2. \text{ et } x^2 = \frac{4a^2y^2 - a^4}{4y^2}.$$

Porro  $\sqrt{4x^2y^2} = 2xy = \sqrt{4a^2y^2 - a^4}$ . sive  $\frac{2xy}{a} = \sqrt{4y^2 - a^2}$ . et  $\frac{2x}{a} = \sqrt{\frac{4y^2 - a^2}{y^2}} = \sqrt{4 - \frac{a^2}{y^2}}$ , sive  $\frac{4x^2}{a^2} = 4 - \frac{a^2}{y^2}$ .  $\frac{4x^2}{a^2} + \frac{a^2}{y^2} = 4$ . Ergo  $\frac{4x^2y^2 + a^4}{a^2y^2} = 4$ .



5

[Fig. 6]



[Fig. 7]

Sed ut redeam ad priora[:] dixi esse  $\frac{2xy}{a} \sqrt{4y^2 - a^2}$ .

Unde apparet summae omnium  $xy$  homogeneam esse lineam hyperbolicam, in qua  $x = \sqrt{y^2 - a^2}$ . sive  $x^2 = y^2 - a^2$ .

Quadrata omnium  $x^2$  aequantur  $a^2$  [−]  $\frac{a^4}{4y^2}$ . ideo in summam redigi possunt quia  $\frac{a^3}{y^2}$  est

- 10 quantitas applicatae hyperboloidis cubicae, cuius datur quadratura. Ergo et momenti complementi  $ADCA$  ex  $AD$ .

Quadrata omnium  $y^2 = \frac{a^4}{4a^2 - 4x^2}$  = momento fig.  $ABCA$  ex  $AB$ .

Omnia  $x$  ducta in suas  $y$  abscissas =  $\frac{\sqrt{4y^2 - a^2}, a}{2}$  seu momentum complementi ex  $AB$ .

- 15 Quod cum detur ex data hyperbolae quadratura, etiam omnia  $y^2$ . momentum figurae ipsius ex  $AB$ , dabitur.

Datur autem et area figurae totius ex quadratura hyperbolae, cuius segmento aequatur.

9 + L ändert Hrsg.

5 [Fig. 7]: Leibniz hat die Figur zunächst allgemein gezeichnet, die speziellen Maßbestimmungen sind erst später hinzugekommen.

Positis iam  $AB = BC = a$ . quaeramus iam quadrata et momenta ipsarum  $a - x$  et  $a - y$ .

Quadrata autem omnium  $a - x$  sunt  $a^2 + x^2 - 2ax$ . opus ergo tam  $a^2$  cognito, tam omnibus  $x^2$  cognitis, tam quadratura figurae, ad quadrata omnium  $a - x$ . seu momentum figurae  $ABCA$  ex  $BC$ .<sup>5</sup>

Quadrata vero omnium:  $a - y$  sunt  $a^2 + y^2 - 2ay$ . opus est ad hoc momentum complementi ex  $CD$  cognoscendum tantum quadratura figurae.

Tandem multiplicentur  $a - y$   $\wedge$   $a - x$ . fiet:  $a^2 - ax - ay + yx$ . Et quia  $yx$  non nisi alio  $y$  iam praecognito explicari potest, ideo assumta  $y$  vel  $a - y$  pro cognita, summa omnium  $ay$  erit  $\nabla^{\text{lum}}$  et summa omnium  $ax$  erit complementi figurae cylinder. Cumque summa omnium  $yx$  pendeat ex quadratura hyperbolae, ideo momentum quoque omnium  $a - x$  ex  $CD$ . seu figurae  $ABCA$  ex  $CD$ . ex quadratura hyperbolae pendebit.<sup>10</sup>

Illud interea sufficit nobis didicisse figuram cuius applicata sit  $\frac{a^3}{a^2 - x^2}$  pendere ex quadratura hyperbolae.

At vero  $\frac{a^3}{a^2 + x^2}$  pendere ex quadratura circuli alibi ostensum est.<sup>15</sup>

Subtrahatur alterum ab altero, fiet  $\frac{a^5 - a^3x^2 + a^5 + a^3x^2}{a^4 + x^4} = \frac{2a^5}{a^4 + x^4}$ . Sed sciendum est istud  $x$  in uno crescere, in altero decrescere, positoque incrementa unius esse

9 f. *Daneben großes NB.*

16 Zu fiet am Rande: Si  $- \frac{a^3}{a^2 + x^2} + \frac{a^3}{a^2 - x^2}$ , fiet:  $\frac{a^5 + a^3x^2 - a^5 + a^3x^2}{a^4 - x^4} = \frac{2a^3x^2}{a^4 - x^4} = y$ .

19 Si (1)  $\frac{a^2 + x^2 - a^2 + x^2}{a^3} = \frac{1}{y} = \frac{2x^2}{a^3}$ . ergo  $y = \frac{a^3}{2x^2}$ . (2)  $\frac{a^3}{a^2 + x^2} - \frac{a^3}{a^2 - x^2}$ , fiet:  
 $\frac{a^5 - x^2a^3 - a^5 - x^2a^3}{a^4 + x^4} = (3) - \frac{a^3}{a^2 + x^2} L$


15 alibi: s. o. Erl. zu S. 780 Z. 13. 16 Subtrahatur: Die folgende Betrachtung ist verfehlt. Leibniz bemerkt dies in S. 788 Z. 7 selbst. Zunächst glaubt er, eine Verbesserung des Nenners in Z. 16 (er ändert dort zweimal  $a^4 + x^4$  in  $a^4 - x^4$ ) würde genügen, erkennt dann, dass dies nicht ausreicht, und berechnet die gesuchte Differenz in der Anmerkung zu Z. 16 neu.

aequalia decrementis alterius, erit terminus ex eiusmodi contrariis  $x$  conflatus semper idem. Subtractio autem duorum terminorum  $x$  contrarium habentium non est facienda simpliciter, sed notandum aliquid relinqu quod et determinari potest. Hinc cum circulus sit:  $ax - x^2 = y^2$ . et hyperbola  $ax + x^2$ . hactenus utrobique crescit: Imo NB. utile est 5 consulto, inversas iungere figuram, praesertim ubi  $x$  dividit, ita enim divisor fiet perpetuo constans. Ita posito in  $\frac{a^5 - a^3x + a^5 + a^3x}{a^4 + x^4}$  aliud ex  $x$  augeri aliud minui continue eadem quantitate, erit  $x^4$  semper eadem. Imo male et falso.

	$6 \wedge 0$	$10 \wedge 0$	0	
10	$5 \wedge 1 = 5$	$9 \wedge 1$	9	9
			2	
	$4 \wedge 2 = 8$	$8 \wedge 2$	16	7
			2	
15	$3 \wedge 3 = 6$ (!)	$7 \wedge 3$	21	5
			3	
		$6 \wedge 4$	24	9
		$5 \wedge 5$	15 (!)	9
20				
		$4 \wedge 6$	24	3
		$3 \wedge 7$	21	

---

2f.



$$\frac{\bullet}{y} = \frac{y - y}{z}$$

ut in hyp.

$$\frac{x}{a^2} = \frac{\frac{a^2}{x} - \frac{a^2}{x+1}}{\xi}.$$

---

23 Die Figur ist durch Tintenfraß geschädigt, es konnten daher nicht alle Punktbezeichnungen ermittelt werden.

Nam ut ex schemate patet, reapse crescit decrescetque productum ex duobus uniformiter sed contrarie variantibus, sed ita, ut differentiae eorum uniformiter crescent fiantque numeri quasi triangulares.

Haec iam observatio usum habere potest ingentem. Ponatur ut in figura, eadem figura sibi inverso apponi, patet summam esse figurae duplum, et inde aliquando lux ad novas series inveniendas haberi potest. 5

Fiat enim  $\frac{a^2}{x}$  applicata figurae, sumta  $x$  ex altitudine, erit  $\frac{a^2}{a-x}$  altitudo figurae, sumta  $x$  ex basi. Addantur  $\frac{a^2}{x} + \frac{a^2}{a-x}$  fit  $\frac{a^3 [-] a^2x + a^2x}{ax - x^2} = y$ . posito scilicet  $x$  in priori sumi pro  $AF$ , in posteriori pro  $FB$ . ita enim  $x$  ubi puncto notatum est decrescit et in  $x^2$  crescit pariter et decrescit. 10

8 + L ändert Hrsg.

## 48. DE CALCULO REDUCTARUM NECNON MOMENTORUM

[Herbst 1673]

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 XII 2 Bl. 159–160. 1 Bog. 2°. 3 S. — Auf Bl. 160 v°


Notizen in Zusammenhang mit dem Gespräch Leibniz u. Ozanam, LH 35 XII 2 Bl. 162 v°

(vgl. dazu N. 42<sub>2</sub>).

Cc 2, Nr. 561 tlw.

5

Datierungsgründe: Das Stück nimmt mehrfach direkten Bezug auf N. 47, dürfte also kurz danach entstanden sein.



[Fig. 1]

10 Esto figura ABCDA, cuius complementum ad rectangulum AC, sit AECDA. et aliqua complementi applicata FD, abscissa AF = y. et FD = x. Esto ea natura figurae, ut sit  $y^2a = y^2x + a^2x$ . Et  $x = \frac{y^2a}{a^2 + y^2}$ . at  $y^2 = \frac{a^2x}{a - x}$ .

---

10 Esto figura: Leibniz legt der Figur einen allgemeinen Kurvenbogen zugrunde.

Summa omnium  $x$ . seu area figurae pendet ex quadratura circuli, et summa omnium  $y^2$ , vel  $GD^2$ , seu momentum figurae  $ABCPA$  ex  $AB$  duplicatum pendet ex quadratura hyperbolae, ut alibi ostendi.

Idem  $x = a - \frac{a^3}{a^2 + y^2}$ , vel  $a - x = \frac{a^3}{a^2 + y^2}$ . Atque ita ordinatae  $HD$ , si appellentur nunc  $z$ . et  $BH$  maneant  $y$ , erit  $z = \frac{a^3}{a^2 + y^2}$ . Summa omnium  $x^2$ , pendet ex quadratura circuli, ut alibi ostendi. 5

Posita  $\beta$  infinitesima, subtrahantur a se invicem duo  $y^2$  proxima.

$$\frac{a^2x + a^2\beta}{a - x - \beta} - \frac{a^2x}{a - x} \text{ fiet } \frac{\cancel{a^2x} + a^3\beta - \cancel{a^2x^2} - \cancel{a^2\beta x} - \cancel{a^2x} + \cancel{a^2x^2} + \cancel{a^2x\beta}}{a^2 - \cancel{x}a - \cancel{\beta}a - \cancel{x}a + x^2 + \cancel{y}\beta} = 2e.$$

$$\text{fiet } \frac{a^3}{a^2 + x^2 - 2xa} = 2e. \text{ posita } e = GI. \text{ intervallo tangentis.} \quad 10$$

Ergo  $\frac{a^4}{a^2 + x^2 - 2xa} = 2ea = w^2$ . Ergo  $w = \frac{a^2}{a - x}$ . Ergo  $w$  applicata est hyperbolae quae est  $\frac{b^2}{a - x}$ . vel  $\frac{\gamma a^2}{a - x}$ , et cylinder omnium  $2e$  qui quadrari potest, aequatur quadratis ordinatarum hyperbolae ad asymptotam.

Dividatur  $y^2$  per  $e$ , fiet  $\frac{a^2x}{a - x} \times \frac{a^3}{2a^2 + 2x^2 - 4xa}$ , fiet  $\frac{2a^4x + 2a^2x^3 - 4a^3x^2}{a^4 - a^3x} = GL$ . Sed quia  $GL$  non ad  $x$ . sive  $AG$ , sed ad  $y$ . sive  $AF$  applicanda est, ideo pro  $x$  substituatur 15

7 Posita ... proxima. erg.  $L$       11 f. hyperbolae | quae est  $\frac{b^2}{a - x}$ . vel  $\frac{\gamma a^2}{a - x}$  erg. |, et cylinder omnium  $2e$  | qui quadrari potest erg. |, aequatur  $L$

3 alibi ostendi: s. N. 47, S. 780 Z. 6 f.      6 alibi ostendi: s. N. 45 Teil 1.

eius valor. Et quia  $x = \frac{y^2 a}{a^2 + y^2}$ , eo substituto fiet:

$$GL = \frac{2a^5 \frac{y^2}{a^2 + y^2} + 2a^5 \frac{y^6}{y^6 + 3y^4a^2 + 2y^2a^4 + a^6} - 4a^5 \frac{y^4}{y^4 + 2y^2a^2 + a^4}}{a^4 - a^4 \frac{y^2}{a^2 + y^2}}.$$

cuius figurae summa pendet ex circuli quadratura, seu ex quadratura figurae propositae ABCDA.

Nunc figuram propositam ponamus esse resectarum hyperbolae, erit aequatio eius  
 $4x^2y^2 + a^4 - 4a^2y^2 = 0$ . ut alibi ostendimus, ergo  $a^4 = 4a^2y^2 - 4x^2y^2$ . Ergo  $y^2 = \frac{a^4}{4a^2 - 4x^2}$ .  
 et  $4x^2y^2 = 4a^2y^2 - a^4$ . Ergo  $x^2 = \frac{4a^2y^2 - a^4}{4y^2}$ .

1 f. Nebenrechnungen:

$$\begin{array}{r} a^2 + y^2 \\ \hline a^2 + y^2 \\ \hline a^4 + y^4 + 2a^2y^2 \\ \hline a^2 + y^2 \\ \hline y^6 + 2a^2y^4 + a^6 + 2y^2a^4 \\ \hline 3 \end{array}$$

$$x^3 = \frac{y^6 a^3}{y^6 + 3y^4a^2 + 2y^2a^4 + a^6}$$

7 Dazu spätere Ergänzung:  $= a^2 - \frac{a^4}{4y^2} - a^2 + \frac{a^4}{4y^2 + 4\beta^2 + 8\beta y}$  fiet:  $\frac{2a^4y}{16y^4}$ , vel  $\frac{2a^4}{16y^3}$ .

1 fiet: In der Nebenrechnung vergisst Leibniz jeweils den Summanden  $y^2a^4$ . Der Fehler geht in die Hauptrechnung ein. 5 erit aequatio: Leibniz übernimmt den (unrichtigen) Wert aus N. 47, S. 785 Z. 19 und rechnet damit konsequent weiter. 16 Leibniz rechnet fortlaufend. Im Nenner des 2. Bruches stand zunächst irrtümlich  $2\beta y$ . Mit diesem Wert hat Leibniz konsequent weitergerechnet, dann das Versehen bemerkt, aber nur beim ersten Vorkommen verbessert.

Quaeratur  $x^2 - x^2$ , duorum  $x$  proximorum, fiet

$$\frac{4a^2y^2 + 4a^2b^2 + 8a^2by - a^4}{4y^2 + 4b^2 + 8yb} + \frac{-4a^2y^2 + a^4}{4y^2} \text{ sive}$$

$$\frac{\cancel{16a^2y^4} + \cancel{16a^2b^2y^2} + 32a^2by^3 - \cancel{4y^2a^4} - \cancel{16a^2y^4} - \cancel{16b^2a^2y^2} - 32y^3a^2b + \cancel{4y^2a^4} + [4b^2a^4] + 8yba^4}{16y^4 + \cancel{16b^2y^2} + [32y^3b]}$$

fiet  $\frac{8ya^4}{16y^4} - \frac{ya^4}{2y^4}$  seu  $\frac{a^4}{2y^3} = GI$ . si permutatis  $x$  et  $y$ . ponatur  $AG = y$ . et  $GD = x$ .

$$\frac{a^2}{x} + \frac{a^2}{x+b} = \frac{a^2x + a^2b + a^2x}{x^2 + xb} \text{ unde fiet, } \frac{2a^{[2]}x}{x^2} = \frac{2a^{[2]}}{x}.$$

5

Ac proinde intelligi potest non dari in his regressum, ac posse quidem statim differentias datis differentibus, at non series differentiarum, datis differentis inveniri.

Quid tamen si faciamus:  $\frac{a^2}{x} + \frac{a^2}{x-b}$ , hoc nihil profuerit, nam res eodem reddit.

Et ratio est, quoniam cum summae tantum, non differentiae indagentur, nihil tollitur, atque ideo denique abiectis iis quae termino  $b$  affecta sunt, res reddit ad priora.

10

1–4 Inter calculandum omitti possunt termini quos non ingreditur  $b$ . et quos ingreditur  $b^2$  aut altior potestas.

Imo interdum, ut exemplis sequentibus patet ingredi potest altior  $b$  potestas. Scilicet si statim ab initio intret. At abicienda sunt potestates eius minima primum proveniente altiores.

$$2 \quad y + b, \wedge \square = y^2 + b^2 + 2yb.$$

3 Zähler: (1)  $4b^2a^4$  (2)  $8b^2a^4$  L ändert Hrsg.; Nenner:  ~~$4y^3b$~~  L ändert Hrsg. 4 fiet (1)


$$\frac{32a^2y^3 + 8ya^4}{16y^4} - \frac{4a^2y^3 + ya^4}{2y^4} \text{ seu } \frac{2a^2}{y} + \frac{a^4}{2y^3} = GI. \text{ si permutatis } x \text{ et } y. \text{ ponatur } AG = y. \text{ et } GD = x.$$

Cuius figurae quadratura rursus ex quadratura tam hyperbolae quam hyperboloidis  $\frac{a^4}{y^3}$  pendet. Hoc

loco vero nova ratione habetur, atque ita duplum habemus hyperbolae tetragonismum; (2)  $\frac{8ya^4}{16y^4} L$

5 Exponenten erg. Hrsg.

4 GI: genauer müsste es  $\frac{1}{2}GI$  heißen.



[Fig. 2]

Hyperbola  $ABC$ . asymptoti  $DE, DF$ . Et  $x = \frac{a^2}{y}$ . et  $y = \frac{a^2}{x}$ . Spatium quinquilineum  $BEDFAB$ .

Habetur momentum omnium  $y$  ex  $DF$ , sunt enim  $\frac{a^4}{2x^2}$ , item omnium  $x$  ex  $DE$ , sunt


5 enim  $\frac{a^4}{2y^2}$ . Quorum series homogena seriei applicatarum ad asymptotum hyperboloeidis cubicae,  $\frac{a^3}{y^2}$  vel  $\frac{a^3}{x^2}$ .

Rectangulum  $xy$  est  $\frac{a^2 y}{y} = a^2$ . vel  $\frac{a^2 x}{x} = a^2$ .


---

6  $\frac{a^3}{y^2}$  vel  $\frac{a^3}{x^2}$ : Leibniz übersieht hier, dass die quadratische — von ihm als hyperboloeis cubica bezeichnete — im Gegensatz zur gewöhnlichen Hyperbel nicht symmetrisch bezüglich  $x$  und  $y$  ist. Dementsprechend legt Leibniz den Fig. 3 und 4 eine gewöhnliche Hyperbel zugrunde.

Unde sequitur hyperboloeidis cubicae quadratura. Quod ita ostendo:



[Fig. 3]



[Fig. 4]

$$\frac{a^2}{x+\beta} - \frac{a^2}{x} = a^2x - a^2x + \frac{\beta a^2}{x^2}. \text{ homogenea huic } \frac{a^3}{x^2}. \text{ Hinc intelligi potest quantita-}$$

tem curvae haberi posse, quae hyperboloeidibus cubicis homogenea est, et ita summas eiusmodi etiam subtractione linearum non tantum quadratorum haberi posse.

Nota ut solida figuris ita et lineae curvae figuris homogeneae sunt. Et in eo consistit Heuratii methodus quadrandi curvas, quibus sunt homogeneae lineae quadrabiles.

5

$$a^2 - x^2 = y^2. \text{ Ergo } a^2 - x^2 - \beta^2 + 2\beta x. - a^2 + x^2 \text{ restat } 2x.$$

1 quadratura. (1) | Posito enim  $DF = f$ . etiam  $DE = e$ . erg. | (a) duplum (b) dimidium enim omnium  $xy = \frac{fa^2}{2}$  (c) duplum enim omnium  $xy$  (aa) modo ad  $f$ . modo ad  $e$ ; (bb) =  $f^2a^2$ . seu  $2a^2f$ . quadratis omnium  $x$  (aaa) ad basin (bbb) ad  $DE$ . et | 2ae erg. | omnium  $y$  ad  $DF$ . applicatis aequatur. Ergo si ABC sit curva hyperboloeidis cubicae, (aaaa) summa (bbbb) area spatii quinquilinei foret (2) Quod L

1 ostendo: Neben und unterhalb der Fig. 3 und 4 hat Leibniz reichlich Platz für die zugehörige Rechnung gelassen, diese dann aber nicht mehr ausgeführt. 3 Leibniz ändert die Reihenfolge, um eine positive Größe zu erhalten. Vgl. dazu auch S. 798 Z. 9. 7 methodus: H. van HEURAET, *Epistola de transmutatione curvarum linearum in rectas, DGS I*, S. 517–520. 8–796,3 bei der Berechnung der Subnormalen vernachlässigt Leibniz jeweils den Exponenten von  $y$ . Auch der Zahlenfaktor bei  $x^2$  wird nicht mitpotenziert.

$a^3 - x^3 = y^3$ . Ergo  $y^2 = \frac{a^3 - x^3}{y}$ . Iam  $x + \beta$ . cubice dat  $x^3 + 3x^2\beta + 3x\beta^2 + \beta^3$ ,

fiet ergo  $\frac{3x^2}{y}$ . et posito pro  $y \sqrt[3]{a^3 - x^3}$ , fiet:  $\frac{3x^2}{\sqrt[3]{a^3 - x^3}} = y$ , sive  $\frac{3x^6}{a^3 - x^3} = y^3$ , sive

$$y^3 a^3 - x^3 y^3 = 3x^6.$$

$$\sqrt{a^2 - x^2 - \beta^2 + 2\beta x}, -\sqrt{a^2 - x^2} = \gamma. \text{ sive si } \gamma a = y, \text{ erit:}$$

$$5 \quad \sqrt{a^4 - x^2 a^2 - \beta^2 a^2 + 2\beta x a^2} - \sqrt{a^4 - x^2 a^2} = y.$$

Ergo

$$2a^2 - 2x^2 - \beta^2 + 2\beta x - 2\sqrt{a^4 - x^2 a^2 - \beta^2 a^2 + 2\beta x a^2 - a^2 x^2 + x^4 + \beta^2 x^2 - 2\beta x^3} = \gamma^2.$$

Ergo

$$2a^2 - 2x^2 - \beta^2 + 2\beta x - \gamma^2 = 2\sqrt{a^4 - x^2 a^2 - \beta^2 a^2 + 2\beta x a^2 - a^2 x^2 + x^4 + \beta^2 x^2 - 2\beta x^3}.$$

$$10 \quad 4a^4 - 8x^2 a^2 - 4\beta^2 a^2 + 8\beta^2 \beta x + 4x^4 + 4x^2 \beta^2 - 8x^3 \beta + \beta^4 - 4\beta^3 x + 4\beta^2 x^2 + \gamma^4 - 4a^2 \gamma^2 + 4x^2 \gamma^2 + 2\beta^2 \gamma^2 [-] 4\beta x \gamma^2 = 4a^4 - 4x^2 a^2 - 4\beta^2 a^2 + 8\beta x a^2 - 4x^2 \beta^2 + 4x^4 [+ 4\beta^2 x^3 - 8\beta x^5].$$

$$\text{Ergo } \cancel{\beta^4} - \cancel{4\beta^3 x} + 4\beta^2 x^2 + \cancel{x^4} - 4a^2 \gamma^2 + 4x^2 \gamma^2 + \cancel{2\beta^2 \gamma^2} [-] \cancel{4\beta x \gamma^2} = 0. \text{ sive } 4x^2 +$$

$$4x^2 \gamma^2 = 4a^2 \gamma^2, \text{ sive } \cancel{4x^2} + \cancel{4a^2 \gamma^2} - \cancel{4x^2 \gamma^2}, \text{ sive } \gamma^2 = \frac{x^2}{a^2 - x^2}. \text{ sive } \gamma = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}, \text{ sive}$$

$$\gamma a = y = \frac{xa}{\sqrt{a^2 - x^2}}. \text{ id est resecta circuli, cum ita sit } \frac{y}{a} = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}. \text{ et alibi a me}$$


$$15 \quad \text{demonstratum sit resectam esse ad radium, ut sinus versus } x \text{ ad rectum } \sqrt{a^2 - x^2}.$$

$$2 \frac{3x^2}{y}. | \text{Ecce | rursus gestr. | quadraturam (1) hyperbolae (2) parabolae gestr. | et } L \quad 11f.$$

Vorzeichen ändert Hrsg.      12 = 0. | Quod si  $\beta$ . et  $\gamma$ . ponantur non infinite parvae gestr. | sive  $L$

---

14 resecta circuli: Genauer müsste es dann im Nenner  $\sqrt{2ax - x^2}$  heißen. Leibniz bemerkt den Irrtum S. 797 Z. 4–7.      14f. alibi a me demonstratum: in Cc 2, Nr. 1233A [Bog. 2] = LH 35 II 1 Bl. 87 v° oben, Theorema II.



[Fig. 5]

At vero figura segmentorum segmento circuli aequalis est, quod si ergo calculus iste sibi constat, habetur tetragonismus. Ergo  $\frac{\sqrt{a^4 - x^2 a^2}}{2}$  figurae resectarum, et  $\frac{\sqrt{a^4 - x^2 a^2}}{4}$  segmenti circuli area est. Sed errorem necesse est latere in calculo, posito enim  $x = a$ . ut in quadrante, fieret  $\frac{\sqrt{a^4 - a^4}}{4}$  quod absurdum.

5

Imo contra. Rectissimus est calculus, nam  $x$  ex ipso centro computatur, et continue crescit, et quando fit  $= a$ . evanescit quantitas. Sed hoc modo  $\gamma$  non est rescissa.

Resumamus calculus:

$$\begin{aligned} & \cancel{4a^4} - \cancel{8a^2x^2} - \cancel{4a^2\beta^2} + \cancel{8a^2\beta x} - 4a^2\gamma^2 + \cancel{4x^4} + \cancel{4x^2\beta^2} - \cancel{8x^3\beta} + 4x^2\gamma^2 + \beta^4 - 4\beta^3x + \\ & [2]\beta^2\gamma^2 + 4\beta^2x^2 - 4\beta x\gamma^2 + \gamma^4 = \cancel{4a^4} - \cancel{4a^2x^2} - \cancel{4\beta^2a^2} + \cancel{8\beta x a^2} - \cancel{4a^2x^2} + \cancel{4x^4} + \cancel{4\beta^2x^2} - \cancel{8\beta x^3}. \end{aligned} \quad 10$$

$$\text{Ergo } -4a^2\gamma^2 + 4x^2\gamma^2 + \cancel{\beta^4} - \cancel{4\beta^3x} + [2]\cancel{\beta^2\gamma^2} + 4\beta^2x^2 - \cancel{4\beta x\gamma^2} + \cancel{\gamma^4} = 0.$$

Abiciantur ea quae duabus dimensionibus quantitatuum assignabilium minora sunt, sive in quibus tres sunt aut ultra inassignabilium potestates, ut  $\beta^4$ , item  $\beta^3x$ , item  $\beta^2\gamma^2$ , item  $\beta x\gamma^2$ , item  $\gamma^4$ , restat  $-4a^2\gamma^2 + 4x^2\gamma^2 + 4\beta^2x^2 = 0$ . sive  $x^2\gamma^2 + x^2\beta^2 = a^2\gamma^2$ ,

$$\text{vel } a^2\gamma^2 - x^2\gamma^2 = x^2\beta^2, \text{ vel } \gamma^2 = \frac{x^2}{a^2 - x^2}, \text{ sive } \gamma = \frac{x}{\sqrt{a^2 - x^2}}. \text{ Et posito } \gamma a = y, \text{ fiet} \quad 15$$

$$y = \frac{xa}{\sqrt{a^2 - x^2}}.$$

Ergo posita  $x$  minima  $= \beta$ , fiet  $y = \frac{a}{a}$ . et posita  $x$  maxima, ita ut non nisi inassignabiliter differat ab  $a$ . erit  $y = a^2$ . ac proinde infinite longa, sive asymptotos.

6 f. Imo ... rescissa. erg. L 10 f. 2 erg. Hrsg.

Caeterum  $y$  hoc loco resecta non est, quia  $x$  est non sinus versus, sed complementum eius ad radium. Ergo sinu verso posito  $x$ . pro  $x$  nostra, substituendum erit  $a - x$ , fiet:

$$y = \frac{a^2 - xa}{\sqrt{a^2 - a^2 - x^2 + 2ax}}. \text{ sive } y = \frac{a^2 - xa}{\sqrt{2ax - x^2}}.$$

Et figura ex ipsis  $y$  hoc modo conflat quadrari aliunde potest, cum aequetur sectori 5 duplicito demto segmento duplicito.

Nunc et figurae angulorum tangentes investigemus:

$$y^2 = \frac{a^4}{2ax - x^2}. \text{ Fiet: } \frac{a^4}{2ax + 2a\beta - \underbrace{x^2 - \beta^2}_{[-] 2\beta x} - \frac{a^4}{2ax - x^2}}, \text{ inverte}$$

10 unde fiet:

$$\frac{2a^5x + 2a^5\beta - a^4x^2 - a^4\beta^2 [-] 2a^4\beta x - 2a^5x [+] a^4x^2}{4a^2x^2 + 4a^2x\beta - 2ax^3 - 2a\beta x^2 [-] 4ax^2\beta - 2ax^3 - 2a\beta x^2 + x^4 + \beta^2x^2 + 2\beta x^3 - 4ax^3}$$

fiet:  $\frac{2a^5 [-] 2a^4x}{4a^2x^2 - 4ax^3 + x^4} = y$ . Talis ergo figura quadrari potest.

Resumamus  $\frac{a^2}{\sqrt{[2]ax - x^2}}$ , et ergo  $y^2 = \frac{a^4}{2ax - x^2}$ . Ergo  $2y^2ax - y^2x^2 = a^4$ . Ergo

15  $a^4 - 2y^2ax = y^2x^2$ . Ergo  $x^2 = \frac{a^4}{y^2} - 2ax$ .

Ergo duorum  $x^2$  proximorum differentia:  $\frac{a^4}{y^2} - 2ax - \frac{a^4}{y^2 + \beta^2 + 2y\beta} + 2ax$ , fiet:

16 Nota reiectionem termini  $ax$ , quasi non adisset.

7–13 Vorzeichen ändert Hrsg. 11  $+2ax^2\beta L$  ändert Hrsg. 14 Resumamus | figuram priorem,

(1)  $\frac{x^2}{\sqrt{a^2 - x^2}}$ , et ergo  $y^2 = \frac{x^2}{\sqrt{ax - x^2}}$  (2)  $\frac{a^2}{\sqrt{ax - x^2}}$ , ändert Hrsg. | et  $L$

14–799,1 Die Berechnung von  $x^2$  enthält einen Vorzeichenfehler, die Bildung der Ableitung ist unzulässig.

$$\frac{\cancel{y^4} \cancel{y^2} + \cancel{y^4} \cancel{\beta^2} + 2a^4 y \beta - \cancel{y^4} \cancel{y^2}}{\cancel{y^4} + \cancel{y^2} \cancel{\beta^2} + 2\cancel{y^3} \cancel{\beta}} = \frac{2a^4 y}{y^4} = \frac{2a^4}{y^3}.$$

Eodem modo resecta hyperbolae dat reductam  $\frac{a^4}{2y^3}$ , vide supra sub fine paginae  
quae retrovertendo occurrit.

$\frac{a^3}{Rq xa} - \frac{a^3}{Rq xa + \beta a} = y$ . Ergo  $= \frac{Rq \beta a^7}{xa}$  vel si dividatur per  $Rq a$ . fiet  $\frac{Rq a^4}{xa}$ , vel  
 $\frac{a^2}{xa}$ , vel  $\frac{a}{x}$ .

5

Sed sciendum hoc modo, ut haberi possit geometrice  $Rq a$ , intelligendum esse  $a =$  non  
lineae sed rectangulo cuidam constanti v. g.  $ac$ .

Imo forte, error in calculo nam  $\frac{a^2 Rq \sqrt{xa + \beta a} - a^2 Rq xa}{x a} = y$ . Ergo  
 $\frac{a^6, \sqrt{xa + \beta a} + xa - 2\sqrt{x^2 a^2 + \beta a^2 x}}{x^2 a^2} = y^2$ .

Quod si irrationalitatem eliminare volemus, haud dubie in  $x^2$  divisorem et hyperboloei- 10  
dem velut cubicam rursus incidemus.

---

2 supra: s. o. S. 792 Z. 7. (In Wirklichkeit berechnet Leibniz wie oben S. 793 Z. 4 den doppelten Wert.) 10 haud dubie: Genauer ergibt sich eine Kurve der Gestalt  $y^2 x^3 = A^5$ .

## 49. AD FIGURAM SEGMENTORUM

[Herbst 1673]

**Überlieferung:** L Konzept: LH 35 II 1 Bl. 93–94. 1 Bog. 2°. 2 S. auf Bl. 93 v° und 94 r°. —  
Auf dem übrigen Bogen LSB VII,3 N. 23 S. 264–270.

5

Cc 2, Nr. 559

Datierungsgründe: Das Stück nimmt Bezug auf N. 47, liegt also etwas später als dieses.

In omni figura constat ex alibi a me demonstratis, applicatam divisam per productam dare differentiam applicatarum.

Esto applicata  $y$ . producta  $p$ . erit differentia applicatae datae a proxime maiore =  $\frac{y}{p}$ .

10 In hyperbola, cum applicata  $y$  sit  $= \sqrt{ax + x^2}$ , erit  $y^2 = ax + x^2$ , et ut habeatur producta fiet:  $2y^2 = ap + 2xp$ , vel  $\frac{2ax + 2x^2}{a + 2x} = p$ , et  $\frac{y}{p} = \frac{\sqrt{ax + x^2}}{2ax + 2x^2} \sim a + 2x$ , vel  $\frac{2y}{p} = \frac{1}{\sqrt{ax + x^2}} \sim a + 2x = \frac{a + 2x}{\sqrt{ax + x^2}}$ .

Ergo figurae huius, in qua aequatio est:  $\frac{a^2 + 2xa}{\sqrt{ax + x^2}} = y$ , quadratura haberri potest.

Quam ut per partes examinemus patet  $\frac{a^2}{\sqrt{ax + x^2}} = y$ , dare  $\frac{a^4}{ax + x^2} = y^2$ , unde fit:

15  $a^4 = axy^2 + x^2y^2$ , vel  $\frac{a^4}{y^2} = ax + x^2$ , vel  $\frac{a^4}{y^2} + \frac{a^2}{4} = ax + x^2 + \frac{a^2}{4}$ , vel  $\sqrt{\frac{a^4}{y^2} + \frac{a^2}{4}} = \left[\frac{a}{2}\right] + x$ .

10 Idem plane in circulo alibi.

14 Est homogenea curvae hyperb.

15 a L ändert Hrsg.

7 ex alibi a me demonstratis: s. N. 40 S. 660 Z. 5 f. 17 in circulo alibi: z. B. N. 40 S. 697 Z. 1–3.

Sumta iam aequatione hac:  $\sqrt{\frac{a^4}{y^2} + \frac{a^2}{4}} = x$  (omisso  $\left[\frac{a}{2}\right]$ , quia constante vel posito  $\left[\frac{a}{2}\right] + x = x$ ), potest rursus dici:  $\frac{a^4}{y^2} + \frac{a^2}{4} = x^2$ , sive  $\frac{a^2}{y} = \sqrt{x^2 - \frac{a^2}{4}}$ , vel  $\frac{y}{a^2} = \frac{1}{\sqrt{x^2 - \frac{a^2}{4}}}$ , vel  $y = \frac{a^2}{\sqrt{x^2 - \frac{a^2}{4}}}$ , unde  $y^2 = \frac{a^4}{x^2 - \frac{a^2}{4}}$ , vel  $x^2y^2 - y^2\frac{a^2}{4} = a^4$ , vel  $x^2 = \frac{a^4}{y^2} + \frac{a^2}{4}$ , vel  $x = \sqrt{\frac{a^4}{y^2} + \frac{a^2}{4}}$ .

Ergo in hanc tandem figuram superior aequatio reducitur:  $\frac{a}{\sqrt{ax + x^2}} = y$ .<sup>5</sup>

Iam altera:  $\frac{zxa}{\sqrt{ax + x^2}} = y$ , dabit  $\frac{x^2a^2}{ax + x^2} = y^2$ , sive  $\frac{xa^2}{a+x} = y^2$ , ac proinde  $xa^2 = y^2a + xy^2$ . Ergo  $xa^2 - xy^2 = y^2a$ , vel  $x = \frac{y^2a}{a^2 - y^2}$ , unde  $\frac{y^2}{a - \frac{y^2}{a}} = x$ , vel  $ay^2 = xa^2 - xy^2$ , vel ob  $\frac{y^2}{a^2 - y^2} = \frac{x}{a} = +1 - \frac{a^2}{a^2 - y^2}$ .

---

5 Idem in circulo faciendum.

7 Est figura segmentorum.

1 f. (omisso a, quia constante | vel posito a + x = x erg.) L ändert Hrsg.

---

8  $\frac{x}{a}$ : In der hinteren Beziehung müssten die Vorzeichen der beiden Glieder vertauscht sein.

Iam  $\frac{a^3}{a^2 - y^2} = x$  ni fallor alibi ostensum ex quadratura hyperbolae pendere: vel  $a^2x - y^2x = a^3$ , vel  $a^2x - a^3 = y^2x$ , vel  $a^2 - \frac{a^3}{x} = y^2$ . vel  $1 - \frac{1}{x} = y^2$ , vel  $y = \sqrt{1 - \frac{1}{x}} = \sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}}$ .

Ut productam huius figurae habeamus, fiet:  $a^2x - y^2x = 2y^2x$ , ac proinde  $a^2p - y^2p =$

$$5 \quad p \qquad p$$

$2y^2x$ , vel  $p = \frac{2y^2x}{a^2 - y^2}$ , et pro  $y^2$  substituto aequivalente, fiet:

$$\frac{2a^2x - a^3}{a^2 - a^2 + \frac{a^3}{x}} = \frac{2a^2x^2 - a^3x}{a^3} = \frac{2x^2}{a} - x.$$

Iam fiat ut  $p$  ad  $y$ , seu ut  $\frac{2x^2}{a} - x$  ad  $\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}}$ , ita  $p - x$  ad  $z$ . vel  $\frac{2x^2}{a} - 2x$  ad  $z$ . fietque

$$\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}} \sim \frac{\frac{2x^2}{a} - 2x}{\frac{2x^2}{a} - x} = \sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}} \sim 1 - \frac{x}{\frac{2x^2}{a} - x},$$

$$1 \quad \frac{a^3}{a^2 + y^2} = x. \quad a^3 = a^2x + y^2x.$$

$$\left. \begin{array}{l} \sqrt{\frac{a^3}{x} - a^2} = y \\ \sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}} = y \end{array} \right\} \begin{array}{ll} \text{circ.} & \text{Ergo in circ. } x \text{ est minor,} \\ \text{pro} & \text{in hyp. hoc loco maior} \\ \text{hyperb.} & \text{quam } a. \end{array}$$

10 (1) Idem in circulo (2)  $\frac{a^3}{a^2 + y^2} L$

1 alibi ostensum: s. N. 47 S. 787 Z. 13 f.

7 In dem ersten Ausdruck müsste es im Zähler statt  $-a^3$  vielmehr  $-2a^3$  heißen. Leibniz rechnet mit dem Fehler konsequent bis S. 803 Z. 11 weiter.

$$\text{vel } \sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}} - \frac{\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}}}{\frac{2x}{a} - 1}, \text{ vel } \sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}} - \frac{a\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}}}{2x - a}.$$

Atque horum summa aequalis segmento duplicato summae omnium  $\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}}$ . Ergo dimidiata illorum summa aequalis segmento huius, ergo summa differentiarum inter  $\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}}$ , et  $\frac{\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}} - \frac{a\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}}}{2x - a}}{2}$ , aequalis semper triangulo post absectum segmentum residuo, vel

$$\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}} - \frac{\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}}}{2} + \frac{a\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}}}{2x - a} \quad \text{quadrabiles.}$$

Ergo si  $\frac{\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}} + \frac{a\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}}}{2x - a}}{2}$  est =  $y$ , erit summa omnium  $y$  quadrabilis.

Alterutra ergo horum quadrata etiam altera quadrata erit.

Inquiramus tantum in  $\frac{a\sqrt{a^2 - \frac{a^3}{x}}}{2x - a} = y$ , fiet  $\frac{a^2 \wedge a^2 - \frac{a^3}{x}}{4x^2 + a^2 - 4xa} = y^2$ , vel  $a^4x - a^5 = 4x^3y^2 + a^2xy^2 - 4x^2ay^2$ , sed haec nimis prolixa.

Per partes ergo, erit:  $\frac{a^4}{4x^2 + a^2 - 4xa} = \frac{a^2}{2x - a}$ , quae est applicata hyperbolae, et  $\frac{a^4 \wedge \frac{a}{x}}{x}$   
[bricht ab]

10  $-4x^2ay^2$ , (1) consideremus primum:  $\frac{a^4}{x}$  (2) sed  $L$

---

11 erit: Leibniz fasst die Zerlegung quadratisch auf und zieht sofort die Wurzel, ohne das Ganze genauer hinzuschreiben.

Sumamus  $\frac{a^3}{a^2 - y^2} = x$ , fiet:  $a^3 = a^2x - y^2x$ , sive  $2yp\cancel{x} = a^2\cancel{x} - y^2\cancel{x}$ . eritque  $p = \frac{a^2}{2y} - \frac{y}{2}$ . Iam fiat ut  $x$  ad  $p$ , ita  $z$  ad  $p - y$ ,  $\frac{x}{p} = \frac{z}{p-y}$ , ergo  $z = \frac{px - xy}{p}$ , et quia  $x = \frac{a^3}{a^2 - y^2}$ , fiet  $x - \frac{ya^3}{a^2 - y^2, \cancel{a^2} - \frac{y}{2}} = x - \frac{2y^2a^3}{a^4 - 2ya^2 + y^4}$ .

Caeterum hic in genere notandum est, quod antea non observaveram[:]

5 Quoniam semper est  $\frac{x}{p} = \frac{z}{p-y}$ , fore  $z = x - \frac{xy}{p}$ , et quia  $\frac{z}{2} = \frac{x - \frac{xy}{p}}{2}$  summa aequatur segmento figurae, ergo summa ipsarum  $x - \frac{p}{2} =$  triangulo, sive  $x - \frac{x}{2} + \frac{xy}{2p} =$  triangulo  $= \frac{x}{2} + \frac{xy}{2p}$ .

Ergo in omni figura si sit  $y$  abscissa,  $x$  applicata,  $p$  producta, semper summa omnium  $\frac{x}{2} + \frac{xy}{2p}$  erit quadrabilis.

10 Atque hac methodo habetur approximatio generalis pro figuris omnibus quodammodo metiendis. Istud excedens enim  $\frac{xy}{2p}$ , rursus eodem modo, quasi  $x$  esset, tractari potest, et rursus eius dimidium, cum alio quodam adiecto quadrabile habebitur; quod adiectum, eodem item modo tractandum; atque ita quamdui libuerit, quod si iam unum horum aliquando quadrabile habeatur; aut etiam quadrabile fingatur, vel quando 15 diu satis continuatio facta est, negligatur; caetera omnia quadrata intelligentur, possunt haec referri ad inscripta et circumscrippta.

1 Figura segmentorum hyperb.

3 Nebenrechnung:  $\frac{a^4}{2y} - \frac{ya^2}{2} - \frac{a^2y}{2} + \frac{y^3}{2} = \frac{a^4 - 2ya^2 + y^4}{2y}$ .

1  $-y^2x$ ,  $|y^2 = a^2 - \frac{a^3}{x}$  gestr. | (1) sive  $2y^2x = a^2p - y^2p$ , vel  $p = \frac{2y^2x}{a^2 - y^2}$ , et quia  $y^2 = (2)$  sive  $L$

5f. summa und summa ipsarum erg.  $L$  11 Istud (1) superfluum (2) excedens  $L$  13 libuerit, (1) omnium  $\frac{x}{2}$  cum ultimo superfluo summa, ipsi primo  $x$  ae (2) quod si  $L$

Forte et ex aliquot prioribus series sequentium sine calculo facile inveniri atque ea summandi modus haberi potest.

Contra ubi notae iam figurarum quadratura, ut in paraboloidibus et hyperboloidibus, aliisque hinc viceversa ex data figurae quadratura habetur infinitarum eiusmodi serierum summa.

Caeterum in paraboloidibus et hyperboloidibus id non opus, ubi eadem semper manet figurae species. At in aliis innumeris figuris quadrabilibus, quae mea methodo quadrantur, idem utiliter experiri licet.

5

Redeo ad aliam quam supra incepi approximationem generalem.

Ante omnia supra demonstratum est, semper  $\frac{ay}{p}$  summarri posse, posita  $y$  applicata, 10  
 $p$  producta,  $a$  constante.

Ita si sit  $a^2 = yx$ , fiet  $yx = yp$ , et  $x = p$ , fietque  $\frac{y}{p} = \frac{x}{p} = \frac{a^2}{x^2}[:]$  et in parabola:

$ax = y^2$ , seu  $ap = 2y^2 = 2ax$ , ergo  $p = 2x$ , ergo  $\frac{a\sqrt{ax}}{2x} = y$ , quadrabile: sive  $\frac{a^3x}{4x^2} =$

$y^2$ , sive  $\frac{a^3}{4x} = y^2[:]$  ecce rursus hyperbolam cubicam  $ax = y^2$ . Unde  $ax = 2yp$ , ergo

$\frac{ax}{2y} = p = \frac{\cancel{a}\frac{y^2}{\cancel{a}}}{2y} = p = \frac{y}{2}$ . Iam  $\frac{y^2a}{2ay} = \frac{y}{2}$ . Ecce hic differentiae productis 15  
 homogeneae.

$a^2 = xy$ , et  $p = x$ , et posito  $x = 1$ , fiet  $a^2 = y$ , atque inde ordiri possumus:  $\frac{y}{p} = \frac{a^2}{1}$ ,  
 et posito  $x = 2 = p$ , fiet:  $\frac{a^2}{2}$ , et postea  $\frac{a^2}{1}$ , et postea  $\frac{a^2}{2}$ , et ita porro,  
 $\frac{2}{3}$                      $\frac{2}{3}$   
 $\frac{3}{4}$                      $\frac{3}{4}$  20

atque ita fiet:  $\frac{a^2}{1} \quad \frac{a^2}{2} \quad \frac{a^2}{6} \quad \frac{a^2}{24} \quad \text{etc.}$

12 Genauer müsste es  $yx = -yp$  und  $x = -p$  heißen. Leibniz vernachlässigt das Vorzeichen, da er  $p$  als einfache Strecke ansieht.

Imo potius:

sunt  $p$ : 1. 2. 3. 4. 5. 6. etc. et

$y$  p r i m u m est  $\frac{a^2}{1}$ , ergo differentia eius a 2<sup>do</sup> erit  $\frac{a^2}{2}$ . Ergo

$y$  s e c u n d u m erit  $\frac{a^2}{2}$ , eius differentia a tertio erit  $\frac{a^2}{6}$ , ergo

5  $y$  t e r t i u m erit  $\frac{a^2}{3}$ , cuius differentia a quarto erit  $\frac{a^2}{12}$ , ergo

q u a r t u m erit  $\frac{a^2}{4}$  etc.

Quod supra de approximationibus per continua triangula, id sic illustrabitur.

Ponatur prima applicata  $y$ , applicata primae figurae segmentorum  $\frac{y}{2}$ ,

$\underbrace{\frac{y}{2} + \frac{\beta}{2}}$  applicata secundae figurae segmentorum,  
 $= bx$

10 applicata tertiae figurae segmentorum:  $\underbrace{\frac{\beta}{4} + \frac{\gamma}{2}}$   
 $cx =$  earum summae

et applicata quartae figurae segmentorum erit:  $\underbrace{\frac{\gamma}{4} + \frac{\delta}{2}}$ , et quintae =  $\underbrace{\frac{\delta}{4} + \frac{\epsilon}{2}}$ .

Hinc posito summam omnium  $\frac{\epsilon}{2}$  vel inveniri, vel potius quod est universalius tuto negligi

posse[,] fiet summa omnium  $\frac{\delta}{4} = ex$ , et  $2ex =$  summ.  $\frac{\delta}{2}$ , et

$dx - 2ex$  erit = summae omnium  $\frac{\gamma}{4}$ , et

15  $cx - 2dx + 4ex =$  summae omnium  $\frac{\beta}{4}$ , et

$bx - 2ex + 4dx - 8ex$ , aequatur summae omnium  $\frac{y}{2}$ .

12–16 Ecce rursus modum de figuris in alias resolvendis.

13 et  $2ex =$  summ.  $\frac{\delta}{2}$ , erg.  $L$

Ecce methodum inveniendi appropinquationes universalem, et exactam methodo ⟨per⟩ polygona, inscripta vel circumscripta, si universaliter rem aestimes, longe commodiorem. Est autem ipsa  $b$ , vel  $c$ , vel  $d$ , vel  $e$  semper applicata maxima figurae segmentorum assumtae, seu cuius abscissa est maxima  $x$ , vel altitudo figurae quadrrandae.

50. CURVA QUAM P. BERTHET OSANNAE PROPOSUERAT  
 [Herbst 1673]

Überlieferung: L Konzept: LH 35 VIII 30 Bl. 107–108. 1 Bog. 2°. — A: Bl. 108 v° oberer Rand 4 Z. verworfene, fragmentarische Notiz. — B: Bl. 107 r° oben 1/3 S. u. Bl. 108 v° 1 S. Überschrift erg. Rest des Bogens leer. Textfolge: Bl. 107 r° = Teil 1; Bl. 108 v° = Teil 2–4. Teil 1 stammt von Ozanam, alles Übrige von Leibniz; die einzelnen Teile sind jeweils deutlich im Duktus voneinander unterschieden.  
 Cc 2, Nr. 1112

Datierungsgründe: Die Datierung ergibt sich aus dem Schreiben von Leibniz an Bertet von Anfang 10 Nov. 1675 (= LSB III, 1 N. 68 S. 308–310). Es beginnt mit dem auf das vorliegende Stück bezogenen Satz: „Il y a plus de 2 ans que Mons. Osannam me parla d'une ligne que vous aviez imaginée.“

A.

Annotat Hugenius pag. 80. curvam cuius evolutione hyperbola (circularis) describitur, eius naturam fore, ut cubus ab  $x^2 - y^2 - a^2$  sit  $= 27x^2y^2a^2$ .

$$15 \quad x^2 - y^2 - a^2. \square = x^4 - 2x^2y^2 - 2x^2a^2, +y^4 + 2y^2a^2 + a^4, \wedge x^2 - y^2 - a^2. \\ x - \sqrt{x + \frac{x^2}{a}} = [\text{Formel bricht ab}]$$

B.


Curva quam P. Berthet Osannae proposuerat  
 Osanna mihi  
 cuius tangentem, aream et alia dedi.

[Teil 1]

[Ozanam]

---

13 Annotat Hugenius: *Horologium oscillatorium*, 1673, Teil 3 Satz 10 S. 79–81 (HO XVIII S. 220 bis 225). Die Notiz ist als Erstes auf den Bogen geschrieben worden. Offenbar wollte Leibniz das Huygens'sche Ergebnis weiter untersuchen, hat dieses Vorhaben aber nicht ausgeführt und den Bogen anderweitig verwendet. In Leibniz' Handexemplar finden sich an der betreffenden Stelle Tintenspuren sowie eine Marginalie; vgl. dazu N. 2.



[Fig. 1 (Ozanam)]


$$AC, AB :: AB, DF$$

$$KP \propto AI \quad LO \propto AH \quad MN \propto AG$$

$$DR \propto AD$$

5

[Teil 2]



[Fig. 2, tlw. Blindzeichnung]

Sit arcus circuli  $ABC$ . sumtisque in eo punctis quotlibet  $B$ . ex centro  $D$  ductus radius  $DB$ , producatur, eousque dum portio extra circumferentiam producta  $BE$ , aequetur arcui  $AB$ . tandem per omnia puncta  $E$ , transire intelligatur curva cochleiformis  $AEF$ .

- Modus hanc curvam describendi hic est: sit linea rigida  $DF$  indefinite producta ex centro  $D$  ac circa illud centrum mobilis; inde filum arcui circuli  $ABC$  rigido, circumplacatum intelligatur, quod in  $C$  si placet fixum in  $A$  liberum sit. Ac linea rigida  $DF$  in  $DC$  constituta, filum ita semper aperiatur, ut ipsi  $DF$  regulae coincidat, eamque ipsa sui apertura ab  $A$  versus  $C$  propellat, stylus filo in  $A$  alligatus in plano curvam  $AEF$  describet.
- 10 Idem efficitur, si duo sint motores, unus qui lineam rigidam circumagat, alter qui filum ad lineam rigidam quantum potest extendat.

- Huius curvae ut inveniamus tangentes, intelligantur ductae circuli chordae infinite parvae,  $AB$ ,  $BB$ , etc.  $BC$ . atque his paralleliae a radio producto in radium productum ducantur rectae infinite quoque parvae  $EG$ . Iam ex ipsis  $BB$  una aliqua, ut  $\textcircled{B}\textcircled{B}$  intelligatur producta ut libet versus  $A$  in  $F$ , ipsa  $\textcircled{B}F$  tangens erit circuli Iam ponatur  $F\textcircled{E}$  tangens curvae cochleiformis, ergo triangula  $F\textcircled{B}\textcircled{E}$  et  $\textcircled{E}\textcircled{C}\textcircled{E}$  erunt similia quia  $\textcircled{E}\textcircled{G}$  et  $F\textcircled{B}$  paralleliae. Ergo ut est  $\textcircled{E}\textcircled{G}$  ad  $\textcircled{G}\textcircled{E}$  ita est  $\textcircled{E}\textcircled{B}$  ad  $\textcircled{B}F$  quaesitam. Est autem  $\textcircled{G}\textcircled{E}$  seu  $\textcircled{B}\textcircled{B}$  ad  $\textcircled{G}\textcircled{E}$  ut  $DB$  vel  $DA$  ad  $DG$ . Ergo etiam  $\textcircled{B}\textcircled{E}$  ad  $\textcircled{B}F$  erit ut  $DA$  ad  $DG$ .
- 20 Regulam ergo tangentium ad hanc curvam ducendarum habemus hanc, puncto in ea dato ut  $\textcircled{E}$ , inde ducatur ad  $D$  centrum circuli generatoris recta  $\textcircled{E}D$  quae arcum circuli datum secat in  $\textcircled{B}$ , ductoque circuli tangente  $\textcircled{B}F$ , si fiat ut  $\textcircled{E}D$  radius arcu circuli

12 intelligantur (1) ductae circuli chordae (2) ducta circuli velut polygoni infinitanguli, latera (3)  
 ductae  $L$  14 Iam (1) sumta ex chordis  $BB$  una  $\textcircled{B}\textcircled{B}$  (2) ex  $L$  15 versus  $A$  (1) | usque in  $F$  erg. | quae  
 utique tangens (2) in  $F$   $L$  15 circuli. (1) Manifestum est | si  $F\textcircled{E}$  sit tangens curvae cochleiformis  
 erg. | triangula  $F\textcircled{B}\textcircled{E}$  et  $\textcircled{E}\textcircled{G}\textcircled{E}$  esse (2) Iam  $L$  17 quia ... paralleliae erg.  $L$  17 ut est  $\textcircled{E}\textcircled{G}$   
 | data gestr. | ad  $\textcircled{G}\textcircled{E}$  ita est  $\textcircled{E}\textcircled{B}$  | data gestr. | ad  $L$  18 seu  $\textcircled{B}\textcircled{B}$  erg.  $L$  18–20  $G\textcircled{E}$  ut  
 (1)  $D\textcircled{G}$  ad  $DA$  (2)  $DB$  vel  $DA$  ad  $DG$ . | Ergo ... ad  $DG$ . erg. | Regulam  $L$  22 ut (1)  $EB$  ad (2)  $DA$   
 ad (3) radius circuli ad  $\textcircled{E}D$  radium producta auctum, ita (4)  $\textcircled{E}D$  radius  $L$

4–9 Neben dem Text hat Leibniz begonnen, einen entsprechenden Mechanismus zu entwerfen, den Versuch aber sofort abgebrochen. — Zur mechanischen Erzeugung der Kurve s. a. LSB III, 1 S. 308 f.

extenso auctus ad  $D\textcircled{B}$  radium ita  $\textcircled{B}F$  ad  $\textcircled{E}\textcircled{B}$  circulum extensum[,] erit iuncta  $F\textcircled{E}$  curvae tangens.

Quando autem tangens est ipsi  $DC$  parallela, punctum contactus erit figurae vertex.


Ut ipsius curvae longitudinem indagemus ducenda est perpendicularis ex  $\textcircled{E}$  in  $D\textcircled{G}[,]$  patet triangulum  $\textcircled{E}\textcircled{G}H$  semper esse simile quaecunque sint puncta  $E$  et  $G$ . quia angulus  $EGD$  vel  $EGH$  semper idem, et angulus  $EHG$  etiam semper idem quia rectus. Cumque  $EG$  semper crescent arithmeticamente proportione, etiam  $EH$  et  $HG$  semper arithmeticamente crescent. Ex omnibus autem  $EH$ , primum est  $AH$ , cuius magnitudinem investigabimus si aream trianguli  $ADB$  quod vocemus  $z^2$ . dividamus per semiradium  $\frac{a}{2}$ ,

fiet  $\frac{z^2}{\frac{a}{2}} = \frac{2z^2}{a}$ . Et sequens ita habebitur, ut  $a$  ad  $a + 1$ , ita  $\frac{2z^2}{a}$  ad sequentem, fiet:  $\frac{2z^2}{a} + \frac{2z^2\beta}{a^2}$  posito  $\beta$  esse unitatem. Ergo differentiae omnium  $EH$  arithmeticamente crescentium erunt  $\frac{2z^2}{a^2}$ . Iam si subtrahatur  $\square AH$  a  $\square^{to} AB$ , fiet  $\sqrt{1 - \frac{4z^4}{a^2}}$  et ut  $a$  ad  $a + 1$  ita  $\sqrt{1 - \frac{4z^4}{a^2}}$  ad sequentem.

$$a^2 + 2a + 1, \text{ inde } \sqrt{\frac{a^2 - 4z^4 + 2a - \frac{8z^4}{a} + 1 - \frac{4z^4}{a^2}}{a^2}}$$

vel:  $\sqrt{1 - \frac{4z^4}{a^2} - \frac{8z^4}{a^3} - \frac{4z^4}{a^4} + \frac{2}{a} + \frac{1}{a^2}}$

11–13 Daneben:



1 ita (1)  $\textcircled{B}\textcircled{E}$  producta ad (2)  $\textcircled{B}F$  ad  $L$     3 Quando ... vertex. erg.  $L$     4 indagemus (1) cogitandum est latus  $AB$ , vel  $BB$  aequale ipsi  $\textcircled{G}\textcircled{E}$  esse non latus inscriptum seu chordam sed circumscriptum seu ta (2) ducenda  $L$     6 vel  $EGH$  erg.  $L$     13 f. sequentem (1) | id est nicht gestr. |

$$1 - \frac{4z^4}{a^2} + \frac{1}{a} - \frac{4z^4}{a^3}. (a) \text{ Et differ } (b) \text{ dabit scilicet quadr. BH. (2)} . a^2 L$$

cuius differentia a  $\sqrt{1 - \frac{4z^4}{a^2}}$  semper eadem cum per eam sequentes  $AH$  arithmeticè crescent: Tantum ergo per numeros naturales continue multiplicanda est. Tandem additis  $EH$ ,  $HG$  quadratis habebitur quadr. (E) cuius radices sunt elementa curvae.

## [Teil 3]

5 Aequatio huius figurae naturam explicans ita investigabitur. Ex punctis  $E$  dimittantur ordinatae ad  $DC$ , nempe  $EM$ . et ex punctis  $B$ , sinus  $BL$ . et  $DL$  positis  $= x$ . et  $BL = y$ ., quia  $DB = a$ . eidem semper erit  $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ . et eodem modo  $EM$  posito  $v$ , et  $DM$  posito  $\xi$ , fiet  $v^2 = DE^2 - DM^2$ , et quia  $DE$  est  $= a + \beta$ , posito  $\beta$  esse arcum  $AB$  respondentem, fiet:  $DE^2 = a^2 + \beta^2 + 2a\beta$ . fietque aequatio haec[:]

$$10 \quad v \text{ vel } ME = \sqrt{a^2 + \beta^2 + 2a\beta - \xi^2}.$$

vel brevius  $MN$  simu circuli in rectam  $ME$  incidente, vocato  $z$ , eius quadratum  $z^2$ , erit aequale  $a^2 - \xi^2$ , vel  $DN^2 - DM^2$ , ergo[:]

$$ME \text{ erit} = \sqrt{z^2 + \beta^2 + 2a\beta}.$$


Ergo haberi quoque possunt quadrata omnium  $ME$ , sive solidum figurae circa axem  $DG$ , 15 revolutione genitum.

Definiendum ex his punctum, ubi maxima figurae latitudo.



$a$	$b$	$(1)$	$ab$
$a + \alpha$	$b + \beta$	$(2)$	$ab + a\beta + ab + \alpha\beta$
$a + 2\alpha$	$b + 2\beta$	$(3)$	$ab + 2a\beta + 2a\beta + 4\alpha\beta$

20



[Fig. 3]

22 A erg. Hrsg.

Maxima curvae altitudo est, ubi tangens  $FE$  basi parallela est. Producatur  $FB$  in  $R$ . ubi occurrat basi, triangula  $EBF$  et  $DBR$  similia sunt. Ergo:

$$\frac{EB}{BF} \text{ sive } \frac{AD}{AD + BE} \sqcap \frac{AD}{BR}.$$

Ergo cum tangens complementi aequatur arcui et radio simul, radius productus occurrit curvae vertici.

---

1 Maxima curvae altitudo: Teil 4 steht in direktem Zusammenhang mit dem Schreiben an Bertet (s. *LSB* III, 1 S. 310) und dürfte daher im November 1675 entstanden sein.

## 51. DE ELEMENTIS FIGURARUM.

[Herbst] – Ende 1673

Die in dieser Nummer zusammengefassten Teilstücke stehen in lockerem sachlichen Zusammenhang; sie befinden sich alle auf dem gleichen Bogen.

5 Die Notiz N. 51<sub>1</sub> ist unter dem Eindruck der Sendung Oldenburgs vom 20. IV. 1673 (= *LSB* III, 1 N. 13) entstanden, die Leibniz noch im selben Monat erhalten, aber erst nach und nach durchgearbeitet hat. Sie zeigt einen anderen Duktus als die übrigen Teilstücke und ist als erste auf den Bogen geschrieben worden.

10 In dem Konzept N. 51<sub>2</sub> beginnt Leibniz eine Konstruktionsaufgabe zu behandeln. Eine verwandte Fragestellung tritt in N. 51<sub>3</sub> auf, so dass N. 51<sub>2</sub> als Vorstudie dafür angesehen werden darf, außerdem ist der Duktus dem von N. 51<sub>3</sub> sehr ähnlich.

Das Hauptstück N. 51<sub>3</sub> ist datiert.

Das Wasserzeichen des Bogens ist ab August 1673 belegt.

Daraus ergibt sich die Datierung.

15 51<sub>1</sub>. DE ARTE DIGNOSCENDI FIGURARUM NATURAM

[Herbst 1673]

**Überlieferung:** *L* Notiz: LH 35 XIII 3 Bl. 250–251. 1 Bog. 2°. 1/3 S. auf Bl. 251 v° oben.

Auf dem übrigen Bogen N. 51<sub>2</sub> u. 51<sub>3</sub>.

Cc 2, Nr. 607 tlw.

20 Opus est arte quadam dignoscendi ex figura quadam oblata, quaenam sit natura eius. Hoc optime fiet, si directrice adhibita tabulae innumeris quadratis plenaee applicetur, numerus quadratorum, ordinatam dabit, progressio numerorum aequationem figurae, saltem circiter. Unde tabulas fieri utile erit, quae numerorum seriebus explicit figurarum naturas, a latere recto appellato 1. (sed 1. infinito), v. g.

25 
$$x = \frac{y^2}{a}.$$
 fiet: 1. 4. 9. 16. et ita porro.

Sed saepe non statim ex numeris dignosci potest, ex qua nascuntur aequatione series, quoniam sunt aequationes quaedam valde compositae. Hinc quae Collinius de interpolationibus.

27 Collinius: s. dazu *LSB* III, 1 S. 58 f. u. 68 sowie *LSB* VII, 3 N. 21 S. 252.

Nota: si figura ipsa quadrato imponi non potest, poterit imago eius repraesentatione optica. Operaे pretium est hoc modo exacte definiri figuram doliorum vinariorum, aliorumque quorum usus publice introductus est, ut exacta eorum mensurandorum ratio stabiliatur. Adde quae Andersonus ni fallor textor, in diario Anglico de figuris geometricis cum vasis comparatis. Ita examinandae volutae quae in architectura veterum reperiuntur, qualis est Ionica, de qua disputatur, ut ad earum veram constructionem accedatur; idem de aliis architecturae ductibus, columnarumque formis. Iam hac arte examinari possunt figurae physicae, ut motus projectorum, aliaque innumera; ut figura vera lentium naturalium, quas oculo indidit natura, ubi quidam nescio quid hyperbolicum sibi observare videntur.

5

10

51<sub>2</sub>. DE CERTO PROBLEMATE GEOMETRICO


[Herbst 1673]

Überlieferung: *L* fragmentarisches Konzept: LH 35 XIII 3 Bl. 250–251. 1 Bog. 2°. 2/5 S.  
auf Bl. 250 v°. Rest der Seite leer. Auf dem übrigen Bogen N. 51<sub>1</sub> u. 51<sub>3</sub>.  
Cc 2, Nr. 607 tlw.

15

---

4 Adde: s. die Besprechungen von R. ANDERSON, *Stereometrical propositions*, 1668, und Ders., *Gaging promoted. An appendix to Stereometrical propositions*, 1669, in den *Philosophical Transactions* Bd III Nr. 39 vom 21. Sept./1. Okt. 1668, S. 785–787 und Bd IV, Nr. 47 vom 10./20. Mai 1669, S. 960.



[Fig. 1, tlw. Blindzeichnung]

- Datis duabus normis rigidis, altera immobili  $ABC$  cuius crus  $AB$  horizonti parallellum, alterum crus  $BC$  ei perpendiculare, altera vero mobili  $DEF$  ex cuius angulo  $E$  perpendiculum  $[EG]$  mobile, filo dependeat: mobilem ita collocare ut si unum crus  $DE$ ,  
 5 rectam  $AB$  secat alicubi in  $L$ , alterumque crus  $EF$  rectam  $BC$  secat in  $M$ , tunc  $MB$  sit ipsi  $GH$  distantiae ponderis ex filo  $EG$  pendentis ab horizontali  $GH$  aequalis.

- Manifestum est rectam  $EG$  esse constantem ac datam  $a$ , de caetero rectam  $BH$  appellemus  $x$  et  $EH$   $y$ , erit  $GH = MB = y - a$ . Ob triangula similia  $EGM$ ,  $LHE$ , manifestum est esse  $LH = \frac{ya}{x}$ . sive  $\frac{LH}{a} = \frac{y}{x}$ .
- 10 Cumque nulla alia conditio in problemate praescripta sit patet  $y$  et  $x$  pro arbitrio sumi posse (Ideo et  $MB$  pro arbitrio sumetur, pendet enim ex  $y$ , quia  $= y - a$ .), tantumque

2–4  $ABC$  (1) , altera vero mobili  $DEF$ , ita ut  $AB$  sit horizonti parallela, cuius unum (a) latus (b) crus (2) | cuius ... perpendiculare erg. | , altera vero mobili  $DEF$  | ex cuius ... perpendiculum |  $EF$  ändert Hrsg. | mobile ... unum erg. | crus  $L$  5 secat | alicubi erg. | in  $L$ , (1) alterumque vero (2) | tunc erg. u. gestr. | alterumque crus  $L$  7f.  $BH$  | =  $HB$  erg., streicht Hrsg. | appellemus  $L$  11 (Ideo ...  $y - a$ ) erg.  $L$

1 [Fig. 1]: In seiner Handzeichnung hat Leibniz zunächst den Punkt  $e$  (und die zugehörigen Linien) ganz dicht beim Punkt  $E$  gezeichnet; er hat dann aber bemerkt, dass die Zeichnung unübersichtlich wird, und  $e$  weiter von  $E$  abgerückt.

fieri debere  $LH$  ad  $a$  ut est  $y$  ad  $x$ . vel sumtis pro arbitrio punctis  $M$  et  $E$ . iunctaque  $EM$ , inde erectam et perpendicularem ad  $EM$  daturam punctum  $L$  quaesitum.

Sed quid si aliqua circumstantia addita, nonnihil augeatur problematis difficultas. Nimirum punctum  $L$  sumendum esse tale, ut si postea aliud eius loco sumatur ultra citraque, ut distantiae ab  $L$  utcunque exiguae, eodemque modo intelligantur ductae  $le$ , et  $em$ . et  $eg = EG$ , et  $mB = gh$ , ut inquam, tunc punctum  $E$  sit citra rectam  $em$ , et punctum  $e$  citra rectam  $ME$ , productam si opus est, seu ut recta  $HE$  sit minor recta  $HP$ . et  $he$  minor recta  $hp$ . posita  $p$  cadere in  $EM$ , et  $P$  in  $em$ , productas si opus est.

5

51<sub>3</sub>. DE INVENIENDA CURVA EX ELEMENTIS SUIS.

Ende 1673

10

**Überlieferung:**  $L$  Konzept: LH 35 XIII 3 Bl. 250–251. 1 Bog. 2°. 1 1/2 S. und 1 Sp. Durch Kustoden gesicherte Reihenfolge: Bl. 250 r°, Bl. 251 v° unten (ab S. 821 Z. 9), Bl. 251 r° (ab S. 823 Z. 5). Überschrift u. Datum ergänzt. Auf dem übrigen Bogen N. 51<sub>1</sub> u. 51<sub>2</sub>. Cc 2, Nr. 607 tlw.

1673 fin. 15


De invenienda curva cuius data est elementorum  
progressio, deque aliis circa functiones.

Problema geometriae practicae a me inventum est admirabile. Data specie cuiuslibet figurae planae, curvae aut solidae praeparare instrumentum aliquod sive baculum, sine ullo calculo, cuius ope portio quaedam eiusdem figurae positione data, ac in materia ipsa designata, mensurari, cum alia qualibet comparari, et portio ab ea in data ratione abscindi possit.

20

Modus hic est. Data specie figura datur utique et aequatio eius, datur ergo et aequatio curvae ei homogeneae, quare et modus describendi curvam ei homogeneam.

1 f. Vel . . . quaesitum. erg.  $L$  3 addita erg.  $L$  6  $mB = gh$ , (1) at (2) neque (3) | ut inquam, tunc erg. | punctum  $L$  18 Data (1) qualibet curva (2) specie  $L$



(fig. 1.)

(fig. 2.)

(fig. 3.)

Qua descripta, instrumento ad eam rem apto; ponatur curva homogenea descripta esse  $ABC$ .

5 Esto filum quoddam  $DE$  vel chorda praeparata, quae omnibus aequae figuris adhiberi potest, divisa in partes v.g. 1000 aequales, quantum scilicet ad praxin sufficere posse iudicatur. Ex punctis divisionis  $F$ .  $F$ . exeant totidem baculi rigidi,  $FG$ , sed in  $F$  chordae filo alligatus quilibet, ut scilicet sint circa eam flexiles.

Haec chorda curvae in tabula descriptae  $ABC$  superimponatur, ita ut ei congruat, et ne rursus exeat, collae cuiusdam genere fieri potest, item si curva intelligatur impressa 10 tabulae planae ex materia factae, quae modo mollis modo dura esse potest, in fossae modum.

Tabula plana in eo situ iam locetur, ut planum sit horizonti perpendicularare, et recta  $AH$  quaelibet quae scilicet directrix est ad quam omnia curvae puncta referuntur sit horizonti parallela.


15 Manifestum est baculos omnes ob gravitatem naturalem fore horizonti perpendicularares et parallelos inter se, atque ita pro ordinatis haberi posse, quibus portiones altitudinis portionibus curvae aequalibus respondentes designentur.

Potest iam alias quidam baculus in usum scilicet figurae ad mensurandum propositae praeparandus applicari in  $AH$ , longitudinis quanta est figurae mensuranda altitudo,

2 homogenea erg.  $L$  7f. flexiles. (1) Sed omnes infixi sunt baculo alio rigido. Hi eos transverse secant, ut maneant semper (2) Haec 10 planae ... factae erg.  $L$  12 plana erg.  $L$

eidem scilicet axi vel directrici comparatae. Et posito baculum illum ex ipsa applicatione notis quibusdam sive maculis distingui; ita iam instrumentum erit praeparatum. Cuius ope eiusdem figurae abscindi poterunt, quando lubuerit, partes quotlibet maxima certitudine, quod alioquin aut difficillimo calculo, aut incertissima divinatione faciendum esset. Praeparatus semel baculus v.g. pro hyperbola, poterit servire omni hyperbolae simili, ope instrumenti proportionum; vel augmentis, ac diminuentis, in primis si id sit opticum. Sed et poterit alii v.g. hyperbolae licet dissimili adhiberi exiguo calculo adhibito, quo regula statim semel in universum praescribi potest, quomodo baculus pro una figurae eiusdem seu eandem aequationem habentis specie paratus, serviat omnibus.

Explicanda tantum ratio est, inveniendi figuram curvae, cuius elementorum progressio aequatione data est, seu modum illam describendi.



(fig. 4.)

Quod ut fiat inspice figuram 4. ubi curva  $ABC$  et duae quaelibet parallelae  $DA$ ,  $EC$ . curvae occurrentes, et quaelibet curvae tangens producatur utrinque dum occurrat utriusque, ut  $FBG$  tangens curvam in  $B$ .

Aio figuram, cuius ordinatae sint omnes  $FG$ , ad  $FAI$ , applicatae in locis  $H$ , ubi perpendiculariter ordinatae respondentes  $HB$  applicatae sint, esse curvae datae homogeneam, et syntomon, seu aequiseabilem.

At dato loco omnium  $FG$  invenire curvam  $ABC$  non paulo difficilior quaestio est, pertinetque ad magna illa problemata de invenienda curva ex datis functionum locis.

Imo erravi,  $FG$  applicanda non in  $H$ , sed in  $L$ . Nam ob triangula similia  $FPG$ , et  $NMB$ . erit  $PG$  in  $NB$  aequalis  $FG$  in  $MB$ . Et cum  $PG$  sit semper eadem, erit

5

10

15

20

superficies cylindrica, cuius basis  $ABC$ , altitudo  $PG = IC$  aequalis figurae omnium  $FG$  perpendiculariter applicatarum in  $L$ .

Ex his patet data curva  $ABC$  non esse difficile invenire figuram seu locum omnium  $FG$ . At contra data figura invenire curvam, patet problema esse satis difficile.

5 Esto e.g.  $FG$  ordinata parabolae,  $\frac{y^2}{a}$ .  $PG$  esto  $a$ . Patet  $MB$  posita = 1. fore

$LC = QG$ . applicatam trianguli, atque ideo notam, ac proinde cum sit  $\frac{FG}{NB} = \frac{PG}{MB}$ , fore

$$NB = \frac{MB \cap FG}{PG} = \frac{1 \cap \frac{y^2}{a}}{a} = \frac{y^2}{a^2}.$$

Eodem modo et  $NG$  facile habetur, quoniam  $\frac{NG}{QG} = \frac{FG}{PG}$ . vel

$$NG = \frac{FG \cap QG}{PG} = \frac{y^3}{a^2}.$$

10 posita  $QG = LC$  abscissa, =  $y$ .

Habita iam  $NG$  et  $QG$  utique habetur  $NQ$  ob angulum  $NQG$  rectum. Deest tantum recta  $QL = GC$ .

Porro cum detur  $NG = BG$ . dabitur et  $FB$ , ac proinde et  $HB = IL = a - y$ . Imo habetur et  $FH$ .

15 Iam ut  $NL$  inveniamus fiat  $LM = x$  ad  $LR = l$ , ut est  $x + NM$  ad  $l + MB = 1$ . Ipsam  $NM$ , quippe notam vocabo  $\gamma$ , erit  $\frac{x + \gamma}{l + 1} = \frac{x}{l}$ .

$$\text{Ergo } \frac{x}{l+1} = \frac{x}{l} - \frac{\gamma}{l+1}, \text{ seu } \frac{\gamma}{l+1} = \frac{x}{l} - \frac{x}{l+1}, \text{ seu } x = \frac{\gamma}{l+1}.$$

Caeterum cum reliqua problematis solutio difficillima sit, et ex analysi indivisibilium pendeat, eam hoc loco absolvere inutile est, cum alibi methodum exposuerim generalem,

20 problemata eiusmodi de c u r v a r u m f u n c t i o n i b u s , absolvendi.

5 esto a. (1) NB appelletur  $y$ . et  $MB$  vocetur  $\beta$ . (2) Patet  $L$  13 f. Imo ... FH. erg.  $L$

---

17 seu: genauer müsste es  $x = \gamma l$  heißen. 20 de c u r v a r u m f u n c t i o n i b u s : Anspielung auf N. 40.

Unum tantum annotandum est[:] data descriptione curvae  $ABC$  dari semper quadraturam omnium  $NQ$ . aequantur enim triangulo  $CNL$  duplicato cum summa omnium  $CG$  vel  $LQ$  segmento  $NBCN$  duplicato aequetur.

Posito  $FG$  esse applicatam hyperbolae  $= \sqrt{4x^2 + a^2}$  curva  $ABC$  erit parabolica.  
 $NG = \frac{\sqrt{4y^2 + a^2} \cap y}{a} = \frac{\sqrt{4y^3 + a^2 y^2}}{a}$ . (!) addatur eius  $\square = \frac{4y^3 + a^2 y^2}{a^2}$  ad  $y^2$ , fiet  
 $\sqrt{\frac{4y^3}{a} + 2y^2} = NQ$ . Figura ergo cuius haec aequatio est, quadrari potest.

Eadem methodo credo investigari posse quadraturam aliorum paraboloidum aequationis compositae ut  $\sqrt{\frac{y^4}{a^2} + \frac{y^3}{a}} = x$ . unde fit  $\frac{y^4}{a^2} + \frac{y^3}{a} = x^2$ . sive  $x^2 a^2 = y^4 + y^3 a$ .

Fig. 4.

$IL = x$ .  $NQ = n$ .  $NL = y$ .  $QL = y - n$ . eiusque dimidium  $SL = SQ = \frac{y - n}{2}$ , et  
 $SN = n + \frac{y - n}{2} = \frac{n + y}{2} = SQ + QN$ .

Iam facta  $\frac{\overset{\cdot\cdot}{xy} + \beta \overset{\cdot\cdot}{y}}{\mathbf{Z}} - \frac{\overset{\cdot\cdot}{xy}}{\mathbf{Z}} = \frac{\overset{\cdot\cdot}{y} + n}{\mathbf{Z}}$  vel  $\underset{1}{\overset{\cdot\cdot}{y}} \cap x + \beta = \underset{\beta}{\overset{\cdot\cdot}{y}} \cap x + 1 + n$ . Ergo  $\underset{\cdot\cdot}{y} - y = \frac{n}{x + 1}$ .

Quod et ex figura patet quia  $\frac{GQ = CL}{QN} = \frac{BM = 1 = \beta}{MN = \underset{\cdot\cdot}{y} - y}$ . Ergo  $\underset{\cdot\cdot}{y} - y = \frac{n = QN \cap 1}{CL = x}$ .

Unde iam theorema memorabile ducimus: ipsam  $n$  per abscissam divisam dare differentias applicatarum, ac proinde figuram omnem cui homogeneae sunt  $n$  per abscissas  $x$  divisae, esse quadrabilem. Ergo hac methodo rursus tot habentur novae quadraturaे quo sunt figure datae, seu quo sunt variae  $NQ$ .

2 duplicato erg.  $L$     12 facta (1) ny (2)  $\frac{xy}{2}$  (3)  $\frac{x y}{2} - (4) \frac{\overset{\cdot\cdot}{xy} + \beta \overset{\cdot\cdot}{y}}{\mathbf{Z}} L$     13 Quod ...  $\frac{n = QN \cap 1}{CL = x}$ .  
erg.  $L$

---

1 annotandum est: von dem Dreieck  $CNL$  ist noch ein Segment  $NBCN$  abzuziehen.    6  $NQ$ :  
bei konsequenter Rechnung würde sich  $\frac{2}{a} y^2$  ergeben.    12 Iam facta:  $\underset{\cdot\cdot}{y}$  bezeichnet den Funktionswert  
an der Stelle  $x + dx$ .

Quod si figura reperiri posset, cuius  $n$ , esset  $a$ . seu recta quaedam constans, haberetur quadratura hyperbolae, forent enim differentiae  $\frac{a}{x}$ . Quare ad veram hyperbolae quadraturam habendam solvendum est hoc problema:

figuram reperire eius naturae, ut si ex puncto aliquo  $C$  in axe  $CI$  sumto perpendicularis erigatur  $CE$ , et ex quolibet puncto in curva sumto ducatur tum  $NL$  ordinata ad axem ipsi  $CE$  parallela, tum tangens  $NG$  quae rectae  $CE$  occurrat in  $G$ , et inde abscindat rectam  $GC$ , cui si aequalis sumatur ordinatae portio  $QL$ , residua  $NQ$  sit semper aequalis uniusdemque rectae datae  $T$ .

Hoc problema certe videtur facilius, videtur saltem, quam si ita proponeretur, quadrare hyperbolam, aut figuram invenire, cuius applicatarum differentiae sint homogeneae applicatis spatii hyperbolici ad asymptoton, vel figuram invenire, in qua producta sit ad applicatam ut recta quaedam constans ad applicatam ad hyperbolae asymptoton.


Eadem methodo procedendum est in aliis figuris quae ad quadrandum proponuntur. Nimirum figura generalis eosque ductis lineis transformanda est, donec lineae quaedam ducantur, et in triangulum characteristicum simile ingrediuntur, aut si non lineae, rectangula, cubi, etc. ex quibus applicatae figurae propositae facile nascantur, ut hoc loco  $x$ . unde tantum figura quaeritur in qua  $NQ$  sit  $a$ .

$$\frac{a^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} = y. \quad \text{Ergo} \quad \frac{a^4}{a^2 + x^2} = -y^2. \quad \text{Ergo} \quad a^4 = a^2 y^2 + x^2 y^2. \quad \text{Ergo} \quad \frac{a^4}{y^2} + a^2 = x^2. \\ - \qquad \qquad \qquad =$$

1 cuius (1) segmenta (2)  $n$ , esset (a) hyperbola cubica: (b) a. seu  $L = 4$  naturae, (1) ut sumto in axe eius (a) utcunque producto RI, puncto C, ex quo (b) CI, puncto C, ubi curva axem attingit, (2) ut si ex CI (3) ut si ex puncto C in axe CI sumto, ubi curva CNA axem CI attingit (4) ut  $L = 5$  sumto (1) tangens ducatur quae (2) ducatur  $L = 18 \mid \frac{a^3}{a^2 + x^2} \left| \begin{array}{l} \text{streicht Hrsg.} \\ \frac{a^2}{\sqrt{a^2 + x^2}} \end{array} \right. L = 18 = x^2$

$$= a^4 + a^2 \wedge y^2 + \frac{y^4}{4} = \text{gestr.} \mid L$$

18 Die analytische Beziehung in Z. 18 ist mit einem Vorzeichenfehler behaftet; ihr geometrisches Pendant hingegen ist korrekt und gilt unabhängig von dem in der Figur gezeichneten Spezialfall allgemein. — Die Betrachtung wird nicht weiter fortgesetzt, dadurch bleiben einige Elemente der Figur unerklärt.



(fig. 5.)

Ergo si in figura 5. adiecta sit  $ABC$  quadrans circuli, et ad punctum  $B$  tangens  $BD$ . secans  $ED$ . et  $EC$  radius, vel  $EB$ , vel  $EA$ . iuncta  $DC$  erit  $x$ . et quia  $DF = ED$ . posito  $FG =$  et parallela ad  $EB$  erit  $DG = DC = x$ .

Adde pag. versae finem ibique inspice fig. 4.

5

Ut iam problema illud de differentiis hyperbolae homogeneis solvere saltem tentemus,

esto  $NQ = a$ .  $CL = GQ = x$ .  $NL = y$ .  $GC = QL = y - a$ . Et quia  $\frac{GQ}{NQ}$  seu

$\frac{x}{a} = \frac{LR = p}{NL = y}$ . erit  $p = \frac{yx}{a} = LR$ . Ductaque ex curva perpendiculari  $NW$  [esto  $LW$ ] =  $e$ .

Quoniam  $NL = y$ , media proportionalis inter  $p$  et  $e$ , fiet  $\frac{y^2}{p} = e = \frac{y^2}{\frac{yx}{a}} = \frac{ya}{x}$ .

et  $WN = w = \sqrt{NL^2 + LW^2} = \sqrt{e^2 + y^2} = \sqrt{\frac{y^2 a^2}{x^2} + y^2}$ .

10

et  $w^2 = \frac{y^2 a^2}{x^2} + y^2$ . vel  $w^2 x^2 = y^2 a^2 + y^2 x^2$ , vel  $w^2 x^2 - y^2 \frac{a^2}{x^2} = 0$ .

in qua aequatione duae sunt verae radices aequales. Sed duae sunt quoque quantitates

1–4 fig. 5 sowie Ergo si . . . = x. erg. L 8 esto LW erg. Hrsg. 12 verae gestr. u. wieder erg.  
L

incognitae vel indeterminatae, nec altera in alterius locum substitui potest, cum aequatio illa, quae relationem ipsius  $x$  ad  $y$  exprimat, quaeratur.

$$ZN^2 \quad NM$$

$$\frac{x^2}{2} \quad \frac{a}{\varphi}$$

$\frac{x^2}{2} = \frac{xa}{\varphi}$ . quae si applicata ad ipsam unitatem constructionis intelligantur, fiet

5  $\frac{x^2}{2} \quad \frac{a}{2} = \frac{ax^2}{4}$  momentum trianguli  $CBNZC$  ex  $CZ$ . Momentum vero rectanguli  $CLNZ$ , fiet  $\frac{x^2y}{2}$ . posita  $\varphi$  maxima  $= CL$ . a qua si auferatur momentum figurae ipsius  $CLNBC$  restabit utique momentum trilinei quod supra. Momentum autem figurae habebitur,

$$\text{ductis } NL = y, \text{ in } x, \text{ fiet } \frac{CL^2y}{4} - \text{summa omnium } \frac{xy}{2} = \frac{aCL^2}{4}.$$

At figuram talem invenire difficillimum haud dubie problema est, non minus quam  
10 propositum, quodque etiam pendet ex hyperbolae quadratura. Et memorabilia sunt eiusmodi problemata, quoniam iis similia nunquam hactenus proposita sunt.

Sed si  $y$  per suum valorem exprimamus, vereor ne aequatio fiat eiusdem cum eodem,  
tentandum tamen[:]

$$y = \frac{y-a}{2} + \text{differentia inter } \frac{xy}{2} \text{ et } \frac{\dot{y}-y}{2} \text{ per } x \text{ seu } \frac{yx - ax + x^2y - x^2\dot{y} + \dot{y}}{2}. \text{ Ergo}$$

15  $\frac{a\cancel{x^2}}{4} - \cancel{x^2} \cancel{y} = \text{summa omnium } \underbrace{yx - ax + x^2y - x^2\dot{y} + \dot{y}}_{2xy - ax}.$

Atque ita habemus problemata quae in quadraturis fundantur, seu quae magnitudine  
quorundam spatiorum locum determinant, uti communia magnitudine rectarum.

Differentiae in abscissas ductae, conflant spatium ut  $NZCBN$ . Id ergo spatium hoc  
loco aequatur  $a$  in  $CL$  ducto, cum rectangulum  $QMB$  (quia  $QN$  et  $QM$  non differunt)

$$3 \ ZN^2 \quad NM \ erg. L \quad 6 \ \text{posita } \varphi \text{ maxima} = CL. \ erg. L \quad 8 \ CL^2 \ y; \varphi \text{ variab. } y; a \ CL^2 \ erg. L$$

4  $\varphi$  ist die laufende Variable mit der oberen Grenze  $x$ . 14f. Ergo: bei konsequentem Rechnen müssten die Vorzeichen auf der linken Seite vertauscht werden.  $\varphi$  und  $\cancel{y}$  bezeichnen hier die oberen Grenzen.

aequetur rectangulo  $ZNM$ . Ergo ipsa  $ZC$  in partes aequales infinitas divisa, natura figurae complementi haec est, ut area eius semper aequetur rectae datae  $a = NQ = 1$ , in applicatam  $ZN$  ductae.

$$\frac{a}{a} + b = ba, \text{ vel } a + ba = ba^2, \text{ vel } 1 + b = b,$$

$$\text{vel } 1 = ba - b, \text{ vel } b = \frac{1}{a-1}.$$

5

Ergo terminus huius seriei primus est (1). secundus  $\left(\frac{1}{a-1}\right)$ . tertius  $c$ , et erit

$$1 + \frac{1}{a-1} + c = ca. \quad 1 + \frac{1}{a-1} = ca - c. \quad \text{Ergo}$$

$$\frac{1 + \frac{1}{a-1}}{a-1} = c.$$

Fit ergo series applicatarum haec:

$$\textcircled{1} \quad \left( \frac{1}{a} \right) \quad \left( \frac{1}{a} + \frac{1}{a^2} \right) \quad \left( \frac{1}{a} + \frac{2}{a^2} + \frac{1}{a^3} \right)$$

10

Nam pro  $a-1$  puto substitui tuto posse  $a$  simpliciter, repetitis semper prioribus omnibus et per  $a$  divisis.

Imo male.

1 ZNM. (1) applicatae ergo complementi huius NZCBN, ipsi ZC paralleliae, seu complementa ipsarum NL ad basin, sunt: differentiae inter duo ax proxima, ea autem (a) est  $ax + a - ax$  (b) est a si sci  
 (2) Ergo  $L - 2$  complementi erg.  $L$



V E R Z E I C H N I S S E



## PERSONENVERZEICHNIS

Verfasser bzw. Mitverfasser von hier abgedruckten Stücken werden mit der betreffenden Stücknummer genannt, ebenso Personen, auf die sich ein ganzes Stück bezieht. Diese Nummerneintragungen sind zur Unterscheidung von den Seitenangaben mit einem Stern versehen. Im übrigen wird nach Seiten zitiert. Bei Autoren ist zusätzlich das Schriftenverzeichnis heranzuziehen. Variierende Namensformen werden nur genannt, wenn sie stärker voneinander abweichen. Kursivdruck weist auf den Petitteil hin.

- |  |   |
|--|---|
| <p>A n d e r s o n , Robert † nach 1696: S. <b>815</b>.<br/>     A n g e l i , Stefano degli † 1697: S. <b>279</b>. <b>574</b>. <b>575</b>.<br/>     A o u z o u t , Adrien † 1691: S. <b>774</b>.<br/>     A p o l l o n i u s v. Perga 3./2. Jh. v. Chr.: S. <b>290</b>.<br/> <b>594</b>. <b>597</b>. <b>601</b>. <b>726</b>.<br/>     A r c h i m e d e s † 212 v. Chr.: S. <b>52</b>. <b>73</b>. <b>165</b>. <b>189</b>.<br/> <b>191</b>. <b>192</b>. <b>217</b>. <b>221</b>. <b>229</b>. <b>290</b>. <b>334</b>. <b>336</b>. <b>574</b>. <b>594</b>.<br/> <b>597</b>. <b>620</b>. <b>702</b>. <b>703</b>. <b>740</b>.<br/>     A r i s t o t e l e s † 322 v. Chr.: S. <b>290</b>.<br/>     A r n a u l d , Antoine † 1694: S. <b>440</b>.<br/>     A y n s c o m (Aynscombe), François-Xavier S. J.<br/>     † 1660: S. <b>549</b>.<br/>     B e r t e t (Berthet), Jean S. J. † 1682: N. <b>50</b>*.<br/>     B o i n e b u r g , Joh. Chr., Freiherr von † 1672:<br/>     S. <b>58</b>.<br/>     B o u l l i a u (Bullialdus), Ismael † 1694: S. <b>440</b>.<br/>     B r o u n c k e r , William, Viscount † 1684: S. <b>596</b>.<br/>     B u o t , Jacques † nach 1677: S. <b>114</b>.<br/>     C a r c a v i , Pierre de † 1684: S. <b>440</b>.<br/>     C a r d i n a e l , Sybrandt Hansz. † 1647: S. <b>229</b>.<br/>     C a v a l i e r i (Cavalerius), Bonaventura † 1647:<br/>     S. <b>4</b>. <b>11</b>. <b>60</b>. <b>229</b>. <b>594</b>.<br/>     C o l l i n s , John † 1683: S. <b>229</b>. <b>267</b>. <b>325</b>. <b>493</b>.<br/> <b>814</b>.<br/>     C o n t i , Antonio † 1749: S. <b>725</b>.<br/>     D a l e n c é , Joachim † 1707: S. <b>440</b>.<br/>     D e m o k r i t † um 380 v. Chr.: S. <b>290</b>.<br/>     D e s c a r t e s (Cartesius), René † 1650: S. <b>290</b>.<br/> <b>307</b>. <b>490</b>. <b>549</b>. <b>569</b>. <b>573</b>. <b>585</b>. <b>586</b>. <b>590</b>. <b>594</b>. <b>595</b>.<br/> <b>701</b>. <b>706</b>. <b>711</b>. <b>712</b>. <b>714</b>. <b>715</b>. <b>746</b>. <b>776</b>.<br/>     D e t t o n v i l l e , A. [Pseud.] s. Pascal.<br/>     D i o p h a n t 3. Jh.: S. <b>691</b>.</p> | <p>E u k l i d 3. Jh. v. Chr.: S. <b>191</b>. <b>594</b>.<br/>     F a b r i , Honoré S. J. † 1688: N. <b>1</b>*. S. <b>60</b>. <b>89</b>. <b>91</b>.<br/> <b>103</b>. <b>109</b>. <b>167</b>. <b>170</b>. <b>183</b>. <b>568</b>. <b>620</b>.<br/>     F a i l l e , Jean-Charles de la S. J. † 1654: S. <b>52</b>.<br/>     F o g e l , Martin † 1675: S. <b>57</b>.<br/>     F r é n i c l e de Bessy, Bernard † 1675: S. <b>255</b>.<br/>     G a l i l e i , Galileo † 1642: S. <b>105</b>.<br/>     G a l l o i s , Jean † 1707: S. <b>440</b>.<br/>     G r a d i č , Stjepan † 1683: S. <b>51</b>.<br/>     G r e g o r i u s a s S. Vincentio s. Saint-Vincent.<br/>     G r e g o r y (Gregorius Scotus), James † 1675:<br/>     S. <b>92</b>. <b>259</b>. <b>260</b>. <b>325</b>. <b>338</b>. <b>340</b>. <b>402</b>. <b>405</b>. <b>417</b>.<br/> <b>719</b>.<br/>     G u l d i n , Paul S. J. † 1643: S. <b>59</b>. <b>106</b>. <b>107</b>. <b>160</b>.<br/> <b>162</b>. <b>231</b>. <b>272</b>. <b>340</b>. <b>594</b>.<br/>     H e u r a e t , Hendrik van † 1660: S. <b>158</b>. <b>159</b>. <b>278</b>.<br/> <b>337</b>. <b>595</b>. <b>795</b>.<br/>     H i p p o k r a t e s v. Chios 5. Jh. v. Chr.: S. <b>542</b>.<br/>     H o b b e s , Thomas † 1679: S. <b>58</b>.<br/>     H u d d e , Jan † 1704: S. <b>585</b>. <b>586</b>. <b>590</b>. <b>591</b>. <b>706</b>.<br/>     H u e t , Pierre-Daniel † 1721: S. <b>440</b>.<br/>     H u y g e n s (Hugenius), Christiaan † 1695: N. <b>2</b>*.<br/> <b>91</b>*. <b>11</b>*. S. <b>3</b>. <b>14</b>. <b>70</b>. <b>73</b>f. <b>106</b>. <b>108</b>. <b>114</b>. <b>145</b>.<br/> <b>159</b>. <b>162</b>. <b>185</b>. <b>209</b>. <b>211</b>. <b>213</b>. <b>215</b>. <b>220</b>. <b>223</b>. <b>229</b>.<br/> <b>231</b>. <b>260</b>. <b>337</b>. <b>338</b>. <b>340</b>. <b>346</b>. <b>415</b>. <b>440</b>. <b>509</b>. <b>515</b>.<br/> <b>519</b>. <b>530</b>. <b>534</b>. <b>539</b>. <b>575</b>. <b>591</b>. <b>595</b>. <b>615</b>. <b>623</b>. <b>672</b>.<br/> <b>711</b>.<br/>     K i n n e r , Gottfried Aloys v. Löwenthurn 17. Jh.:<br/>     S. <b>549</b>.<br/>     L a F o n t a i n e (Musiker) 17. Jh.: S. <b>421</b>.</p> |
|--|---|

- Lalouvère (La Loubère, Lalovera), Antoine de S. J. † 1664: S. 620.
- Léotaud, Vincent S. J. † 1672: S. 229.
- Magini, Giov. Antonio † 1617: S. 176. 229.
- Mercator, Nicolaus † 1687: N. 31\*. S. 493. 595.
- Mersenne, Marin O. M. † 1648: S. 51. 208. 549. 595.
- Meynier, Honorat de † 1638: S. 548.
- Mydorge, Claude † 1647: S. 519.
- Nitzsch, Friedrich † 1702: S. 57.
- Nonancourt, François de 17. Jh.: S. 549.
- Oldenburg, Heinrich † 1677: S. 346. 440. 711.
- Oznam (Osanna), Jacques † 1717: N. 50\*. S. 742. 790.
- Pascal, Blaise † 1662: N. 10\*. 12\*. 19\*. S. 95. 96. 112. 209–211. 231. 334. 358. 377. 397. 534. 574. 620. 632.
- Pell, John † 1685: S. 394 f.
- Percijn (Persyn), Nicolaes Hubertsz. van 16./17. Jh.: S. 307.
- Proclus, Diadochus † 485: S. 607.
- Regnault, François 17. Jh.: S. 167. 170. 171. 172. 173.
- Ricci, Michelangelo † 1682: N. 32\*.
- Roberval, Gilles Personne de † 1675: S. 208. 549. 574. 595.
- Saint-Vincent, Grégoire de S. J. † 1667: S. 162. 229. 259. 304. 325. 337. 548. 549. 550. 581. 622. 673. 702. 703.
- Sarasa, Alphonse Antoine de S. J. † 1667: S. 548. 581. 622.
- Schooten (Schotenijs), Frans van d. J. † 1660: S. 307. 308. 394. 415. 504. 532. 534. 585. 711. 774.
- Sluse (Slusius), René François Walter de † 1685: N. 6\*. S. 91. 271. 594. 677. 678. 706. 711.
- Stevin, Simon † 1620: S. 692.
- Sybrandt, Hansz. s. Cardinael.
- Tacquet, André S. J. † 1660: S. 279.
- Thévenot, Melchisédech, † 1692: S. 440.
- Thomasius, Jakob † 1684: S. 440.
- Torricelli, Evangelista † 1647: S. 52. 208. 337. 620.
- Valerio, Luca † 1618: S. 52.
- Viète (Vieta), François † 1603: S. 594. 692. 735.
- Wallis, John † 1703: S. 271. 278. 304. 337. 568. 574. 575. 621. 632. 641. 661. 662. 736.
- Witt (Wittius), Johan de † 1672: S. 741. 744. 745.
- Wren, Christopher † 1723: S. 95. 574. 595.

## SCHRIFTENVERZEICHNIS

Das Schriftenverzeichnis (SV.) enthält die im Text und in den Apparaten angeführte Literatur; es ist zweigeteilt. Autoren, die Leibniz grundsätzlich zugänglich waren, sind einschließlich ihrer modernen Ausgaben im ersten Teil verzeichnet. Neuere Literatur erscheint im zweiten Teil. Unter LEIBNIZ wird neben seinen eigenen Schriften zusätzlich die für diesen Band relevante Leibniz-Korrespondenz erfasst. Noch nicht edierte Leibniz-Stücke sind im Handschriftenverzeichnis Teil 3 zu finden. — Jeder Autor und Sachtitel erhält eine Leitnummer, die Reihenfolge der Einzelwerke ist chronologisch. Verzeichnet wird nach Nummern und Seiten, wobei erstere zur Unterscheidung zusätzlich mit einem Stern ausgezeichnet sind. Nummernangaben erfolgen dann, wenn ein ganzes Stück einen bestimmten Titel zuzuordnen ist. Werke mit eigenhändigen Eintragungen von Leibniz sind mit dem Zusatz [Marg.] versehen. Für die Erwähnung von Autorennamen ist auch das Personenverzeichnis mitheranzuziehen. Kursiv gedruckte Seitenangaben weisen auf den Petitteil hin.

### SCHRIFTEN DER LEIBNIZZEIT

1. *Acta Eruditorum*. Leipzig 1682 ff.: Jan. 1705: S. 5.
2. ANDERSON, R.  
1. *Stereometrical propositions*. London 1668: S. 815.  
Rez.: *Philosophical Transactions* Bd III Nr. 39 vom 21. Sept./1. Okt. 1668 S. 785 bis 787: S. 815.  
2. *Gaging promoted. An appendix to stereometrical propositions*. London 1669: S. 815.  
Rez.: *Philosophical Transactions* Bd IV Nr. 47 vom 10./20. Mai 1669, S. 960: S. 815.
3. ANGELI, St. degli, *De infinitorum spiralium spatiorum mensura, opusculum geometricum*. Venedig 1660: S. 574.
4. APOLLONIUS v. Perga, *Conica*: S. 50. 726.
5. ARCHIMEDES  
1. *De lineis spiralibus*: S. 217. 221.  
2. *Dimensio circuli*: S. 189. 334.  
3. *Quadratura parabolae*: S. 336.
6. AYNSCOM, Fr.-X., *Expositio ac deductio geometrica quadraturarum circuli R. P. Gregorii a S. Vincentio*. Antwerpen 1656: S. 549. 550.
- BARTHOLINUS, E. [Hrsg.] s. SV. N. 16,2.
7. BROUNCKER, W., *The squaring of the hyperbola, by an infinite series of rational numbers, together with its demonstration*. In: *Philosophical Transactions*, Bd III Nr. 34 vom 23. April/3. Mai 1668, S. 645–649: S. 596.
8. CARDINAEL, S. H., *Hondert geometrische questien met hare solutien*. Amsterdam [1612]: S. 229.
9. CAVALIERI, B.  
1. *Directorium generale uranometricum*. Bologna 1632: S. 229.  
2. *Exercitationes geometricae sex*. Bologna 1647: S. 60.
- CLERSELIER, Cl. de [Hrsg.] s. SV. N. 11,2.
10. DEBEAUNE, Fl., *De aequationum natura, constitutione et limitibus, opuscula duo*. Hrsg. E. Bartholinus. In: SV. N. 16,2 Tl II S. 49–152: S. 733.  
– DEPREZ, G. [Hrsg.] s. SV. N. 33,9.
11. DESCARTES, R.  
1. *La géometrie*. Leiden 1637 u. ö. [auch in DO VI S. 367–485]; lat. Fassung u. d. T. *Geometria* hrsg. von Fr. v. Schooten in SV. N. 16,1 S. 1–118; 2. Ausg. in SV. N. 16,2 Tl I S. 1–106

- [Marg.]: S. **307. 415. 585. 595. 701. 706. 711. 712. 714. 722.**
2. *Lettres*. [Hrsg. Cl. de Clerselier]. 3 Bde. Paris 1657–67; lat. Fassung u. d. T. *Epistolae*. Amsterdam 1668–82: S. **595**.
  - DETTONVILLE, A. [Pseud.] s. Pascal.
  12. EUKLID, *Elemente*: S. **88. 191. 597. 619.**
  13. FABRI, H.,
    1. *Opusculum geometricum de linea sinuum et cycloide, auctore Antimo Farbio* [Honoré Fabri]. Rom 1659: S. **16. 103. 183. 222.**
    2. *Synopsis optica*. Lyon 1667 [Marg.]: S. **440.**
    3. *Synopsis geometrica cui accessere tria opuscula, nimirum; De linea sinuum et cycloide; De maximis et minimis, centuria; et Synopsis trigonometriae planae*. Lyon 1669 [Marg.]: N. 1\*. S. **60f. 89. 103. 109. 167. 170. 183. 222. 291. 348. 570. 726.**
  14. FAILLE, J.-Ch. de la, *Theoremata de centro gravitatis partium circuli et ellipsis*. Antwerpen 1632: S. **52.**
  15. GALILEI, G., *Discorsi e dimostrazioni matematiche*. Leiden 1638; Nachdr.: Brüssel 1966; [auch in *GO* VIII S. 39–318 u. *GO* I S. 187 bis 208]: S. **105.**
  16. *Geometria*
    1. *Geometria*, a Renato Des Cartes anno 1637 gallice edita; nunc autem cum notis Florimondi de Beaune ... in linguam latinam versa et commentariis illustrata, opera atque studio Francisci a Schooten. Leiden 1649. [Darin: DESCARTES, R., SV. N. 11,1; DEBEAUNE, Fl., *In geometriam Renati des Cartes notae breves*, S. 119–161; SCHOOTEN, Fr. v., SV. N. 40,1; Ders., *Additamentum*. S. 295 bis 336.]
    2. *Geometria*, a Renato Des Cartes anno 1637 gallice edita, postea autem una cum notis Florimondi de Beaune ... in latinam linguam versa et commentariis illustrata opera atque studio Francisci a Schooten ... Nunc demum
  - ab eodem diligenter recognita, locupletioribus commentariis instructa, multisque egregiis accessionibus ... exornata. 2 Tle. Amsterdam 1659–61 [Marg.]: S. **532. 584. 585.**
  - [In Tl I: DESCARTES, R., SV. N. 11,1; DEBEAUNE, Fl., *In geometriam Renati des Cartes notae breves*, S. 107–142; SCHOOTEN, Fr. v., SV. N. 40,1; Ders., *Appendix de cubicarum aequationum resolutione*. 2. Aufl., S. 345–368; HUDDE, J., SV. N. 21; HEURAET, H. v., SV. N. 19. In Tl II: SCHOOTEN, Fr. v., *Principia matheseos universalis, seu introductio ad geometriæ methodum Renati des Cartes*. Hrsg. E. Bartholinus. 2. Aufl., S. 1–48; Ders., SV. N. 40,2; DEBEAUNE, Fl., SV. N. 10; WITT, J. de, SV. N. 46.]
  - Gregorius, a S. Vincentio s. SAINT-VINCENT.
  17. GREGORY, J.
    1. *Vera circuli et hyperbolae quadratura*. Padua 1667; Nachdr. ebd. 1668 [Marg.]: S. **260.**
    - Rez.: *Philosophical Transactions* Bd III, Nr. 33 vom 16./26. März 1667/68, S. 641 bis 644: S. **229.**
    2. *Geometriæ pars universalis*. Padua 1668 [Marg.]: S. **325.**
    - Rez.: *Philosophical Transactions* Bd III, Nr. 35 vom 18./28. Mai 1668, S. 685–688: S. **325.**
    3. *Exercitationes geometricæ*. London 1668 [Marg.]: S. **14. 48. 92. 259. 260. 338. 340. 402. 417.**
  18. GULDIN, P., [Centrobarycia.] *De centro gravitatis trium specierum quantitatis continuæ [libri IV]*. 2 Bde. Wien 1635–1641: S. **106. 160. 272. 333.**
  19. HEURAET, H. v., *Epistola de transmutatione curvarum linearum in rectas*. In SV. N. 16,2 Tl I S. 517–520 [Marg.]: S. **337. 795.**
  20. HOBBES, T., *Opera philosophica*. Amsterdam 1668: S. **58.**
  21. HUDDE, J., *Epistolae duae, quarum altera de aequationum reductione, altera de maximis et minimis agit*. In SV. N. 16,2 Tl I S. 401–516 [Marg.]: S. **585. 706.**

22. HUYGENS, Chr.
1. *Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli ex dato portionum gravitatis centro, quibus subiuncta est ἐξέτασις cyclometriae cl. viri Gregorii a S. Vincentio.* Leiden 1651; [auch in *HO* XI S. 281–337]: S. 340. 673.
  2. *De circuli magnitudine inventa.* Leiden 1654; [auch in *HO* XII S. 113–181]: S. 14.
  3. *Horologium oscillatorium sive de motu pendulorum ad horologia aptato demonstrationes geometricae.* Paris 1673 [Marg.]; Nachdr. London 1966; [auch in *HO* XVIII S. 69–365 u. XVI S. 315–318]: N. 2\*. 9\*. 11\*. S. 73. 75. 77. 107. 108. 145. 158. 209. 211. 213. 215. 220. 223. 337. 338. 436. 509. 515. 519. 530. 539. 595. 615. 623. 672. 718.
23. KINNER, G. A. von Löwenthurn, *Elucidatio geometrica problematis Austriaci.* Prag 1653: S. 549.
24. LEIBNIZ, G. W.  
Schriften:
1. *Vorarbeiten zur Theoria motus abstracti.* Erste Fassung. Frühjahr 1670 – Winter 1670/71(?). Ms. [Gedr.: *LSB* VI, 2 N. 385 S. 176–186]: S. 57.
  2. *Aus und zu Galileis Discorsi.* Herbst 1672 bis Winter 1672/73. Ms. [Gedr.: *LSB* VI, 3 N. 11 S. 163–168]: S. 105.
  3. *Trigonometria.* Ende 1672 – Anfang 1673(?). Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 2 S. 4]: S. 409.
  4. *Data basi, altitudine et summa laterum invenire triangulum.* Ende 1672 – Anfang 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 4 S. 31–36]: S. 19.
  5. *Mathematica.* Ende 1672 – Frühjahr 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 106 S. 653–674]: S. 14. 19. 89.
  6. *De figuris similibus.* Frühjahr 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 61 S. 60–70]: S. 90.
  7. *De sectore circuli.* Frühjahr 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 64 S. 79–83]: S. 83.
  8. *De progressionibus intervallorum tangentium a vertice.* April – Mai 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 3 N. 17 S. 202–227]: S. 89. 421.
  9. *De geometria seu potius algebra mechanica.* Frühjahr – Sommer 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 8 S. 104–108]: S. 19.
  10. *Characteristica geometrica. De lineis et angulis.* Frühjahr – Sommer 1673(?). Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 1 N. 9 S. 104–119]: S. 5.
  11. *De arithmeticis infinitorum perficienda.* Frühjahr – Sommer 1673(?). Ms. [Gedr.: *LSB* VI, 3 N. 41 S. 407–409]: S. 678.
  12. *De locis intersectionum opa serierum.* Spätes Frühjahr–Sommer 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 3 N. 20 S. 249f.]: S. 719.
  13. *De methodi quadraturarum usu in seriesbus.* Aug. – Sept. 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 3 N. 21 S. 251–254]: S. 814.
  14. *Progressionis harmonicae differentiae,* Herbst 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 3 N. 22 S. 255–263]: S. 762.
  15. *Progressio figurae segmentorum circuli aut ei sygnatae.* Herbst 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 3 N. 23 S. 264–270]: S. 720. 800.
  16. *De serie differentiae inter segmentum quadrantis et eius fulcrum.* Herbst 1673. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 3 N. 24 S. 271–281]: S. 773.
  17. *De appropinquatione circuli per seriem I.* Ende 1673 – Mitte 1674. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 3 N. 26 S. 300–314]: S. 770.
  18. *De serierum summis et de quadraturis pars nona.* Oktober 1674. Ms. [Gedr.: *LSB* VII, 3 N. 3811 S. 475–483]: S. 770.
  19. *De quadratura arithmeticis circuli ellipsoes et hyperbolae cuius corollarium est trigonometria sine tabulis.* Ende 1675 – Herbst 1676. Ms. Hrsg. E. Knobloch. Göttingen 1993 [= Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Mathematisch-physikalische Klasse. Dritte Folge N. 43]: S. 574.
  20. *Isaaci Newtoni tractatus duo, de speciebus et magnitudine figurarum curvilineararum.* In: *Acta Eruditorum*, Jan. 1705. S. 30–36: S. 3.

- B r i e f e :
- 21. Leibniz an Fogel, 24. Jan. 1671. [Gedr.: *LSB* II, 1 N. 38 S. 77–78 (1. Aufl.), S. 126–128 (2. Aufl.)]: S. 57.
  - 22. Oldenburg an Leibniz, Sendung vom 20. April 1673; Auszug von Leibniz, Frühjahr 1675. [Gedr. u. a. in: *LSB* III, 1 N. 13 S. 49 bis 79; ohne Auszug mit engl. Übers. in *OC* IX S. 549–570]: S. 267. 493. 814.
  - 23. Leibniz für Huygens(?), Sommer 1674. [Gedr.: *LSB* III, 1 N. 29 S. 114–117]: S. 346. 594. 672. 718.
  - 24. Leibniz an Oldenburg, 15. Juli 1674. [Gedr. u. a. in: *LSB* III, 1 N. 30 S. 118–121, mit engl. Übers. in: *OC* XI S. 42–47]: S. 346. 672.
  - 25. Leibniz für Huygens, Okt. 1674. [Gedr.: *LSB* III, 1 N. 39 S. 141–169]: S. 592.
  - 26. Leibniz an Tschirnhaus, Ende Dez. 1679. [Gedr. u. a. in: *LSB* III, 2 N. 372 S. 921–941]: S. 711.
  - 27. Leibniz an Jacob Bernoulli, April 1703. [Gedr.: *LMG* III S. 66–73]: S. 711.
  - 28. Leibniz an Conti, 9. April 1716. [Gedr. u. a. in: *LBG* S. 274–282]: S. 725.
  - 25. LEOTAUD, V., *Examen circuli quadraturae*. Lyon 1654: S. 229.
  - 26. MAGINI, G. A., *Primum mobile duodecim libris contentum ... ac praeterea magnus trigonometricus Canon ... ac magna primi mobilis Tabula*. Bologna 1609: S. 176. 229.
  - 27. MERCATOR, N., *Logarithmotechnia ... Huic etiam iungitur M. A. Ricci Exercitatio geometrica de maximis et minimis*. London 1668 [Marg.]; Nachdr.: Hildesheim 1975: N. 31\*. S. 595.  
Rez. s. SV. N. 45,3.
  - 28. MERSENNE, M., *Novarum observationum physico-mathematicarum tomus III*. Paris 1647: S. 51. 549.
  - 29. MEYNIER, H. de, *Les nouvelles inventions de fortifier les places*. Paris 1626: S. 548.
  - 30. MONCONYS, B., *Journal des voyages*. Hrsg. G. de Monconys sieur de Liergues. 3 Tle. Lyon 1665–1666: S. 167.
  - MONCONYS, G. de [Hrsg.] s. SV. N. 30.
  - 31. MYDORGE, Cl., *Prodromi catoptricorum et dioptricorum sive conicorum operis ... libri primus et secundus*. Paris 1631. — *Libri quatuor priores*. ebd. 1639 u. ö.: S. 519.
  - 32. NONANCOURT, Fr. de, *Euclides logisticus*. Löwen 1652 [Marg.]: S. 549.
  - 33. PASCAL, Bl.
    - 1. [Anonym] *Histoire de la roulette*. [Paris 1658]; lat. Fassung u. d. T. *Historia trochoidis*. [Paris] 1658; [auch in *PO* VIII S. 181–223]: S. 137.
    - 2. *Lettres de A. Dettonville* [Bl. Pascal] contenant quelques-unes de ses inventions de géométrie. Paris 1658–59; Nachdr. London 1966; [auch in *PO* Bde VIII–IX]: S. 366. 597.
    - 3. *Lettre à Monsieur de Carcavy*. In SV. N. 33,2; [auch in *PO* VIII S. 325–384]: N. 10<sub>1</sub>\*. S. 96. 145. 146. 156. 209. 287. 322.
    - 4. *Traité des trilignes rectangles et de leurs onglets*. In SV. N. 33,2; [auch in *PO* IX S. 3–45]: N. 19\*. S. 96. 155. 210. 211. 334.
    - 5. *Propriétéz des sommes simples, triangulaires, et pyramidales*. In SV. N. 33,2; [auch in *PO* IX S. 46–59]: S. 187.
    - 6. *Traité des sinus du quart de cercle. Traité des arcs de cercle*. In SV. N. 33,2; [auch in *PO* IX S. 60–104]: N. 10<sub>2</sub>\*. 12\*. S. 112. 115. 210. 222. 397. 583.
    - 7. *Traité général, de la roulette*. In SV. N. 33,2; [auch in *PO* IX S. 116–133]: S. 147. 397.
    - 8. *Lettre à Monsieur Huguens de Zulichem*. In SV. Nr. 33,2; [auch in *PO* IX S. 187–201]: S. 534.
    - 9. *Traité du triangle arithmétique avec quelques autres petits traitez sur la mesme matière*. Hrsg. G. Deprez. Paris 1665 [Marg.]; [auch in *PO* III S. 433–593, 341–367, 311 bis 339]: S. 632.
    - 34. PELL, J., *Controversiae de vera circuli mensura anno 1644 exortae inter Christianum*

- Severini, Longomontanum ... et Ioannem Pellium ... pars prima* [mehr nicht ersch.]. Amsterdam 1647: S. 394.
35. *Philosophical Transactions*. London 1665 ff.:
  - 16./26. März 1667/1668: S. 229.
  - 23. April/3. Mai 1668: S. 596.
  - 18./28. Mai 1668: S. 325.
  - 17./27. August 1668: S. 271. 304. 337.
  - 21. Sept./1. Okt. 1668: S. 815.
  - 11./21. Jan. 1668/1669: S. 279.
  - 25. März/4. April 1669: S. 91. 271.
  - 10./20. Mai 1669: S. 815.
  - 25. März/4. April 1672: S. 661.
  - 14./24. Oktober 1672: S. 278. 337.
  - 20./30. Januar 1672/1673: S. 70. 706.
  - 23. Juni/3. Juli 1673: S. 706.
36. PROCLUS, D., *In primum Euclidis elementorum librum commentarii*: S. 607.
37. RICCI, M., *Exercitatio geometrica de maximis et minimis*. Rom 1666. Nachdr. zus. mit N. MERCATOR, *Logarithmotechnia*. London 1668 [Marg.] u. Hildesheim 1975: N. 32\*.
38. SAINT-VINCENT, Gr. de, *Opus geometricum quadraturae circuli et sectionum coni decem libris comprehensum*. Antwerpen 1647 [Marg.]: S. 162. 229. 325. 329. 337. 548–550. 702.
39. SARASA, A. A. de, *Solutio problematis a R. P. Marino Mersenne Minimo propositi*. Antwerpen 1649 [Marg.]: S. 51. 548. 549. 581. 622.
40. SCHOOTEN, Fr. v.
  1. *In geometriam Renati Des Cartes commentarii*. In SV. N. 16,1 S. 162–294. 2. Aufl. in SV. N. 16,2 Tl I S. 143–344 [Marg.]: S. 307. 415. 504. 509. 532. 585. 706. 711. 726. 774.
  2. *Tractatus de concinnandis demonstrationibus geometricis ex calculo algebraico*. Hrsg. P. v. Schooten. In SV. N. 16,2 Tl II S. 341–420: S. 394.
  3. [Hrsg.] s. SV. N. 16,1; 16,2; 46.
- SCHOOTEN, P. v. [Hrsg.] s. SV. N. 40,2.
41. SLUSE, R. Fr. W. de
  1. *Mesolabum seu duae mediae proportionales inter extremas datas ... exhibitae*. Lüttich 1659. 2. Aufl. ebd. 1668 [Marg.]: S. 91. 271.
- Rez.: *Philosophical Transactions* Bd IV Nr. 45 vom 25. März/4. April 1669, S. 903 bis 909: S. 91. 271.
2. *An extract of a letter from the excellent Renatus Franciscus Slusius ... to the publisher ... concerning his new and easie method of drawing tangents to all geometrical curves*. In: *Philosophical Transactions* Bd VII Nr. 90 vom 20./30. Jan. 1672/1673 S. 5143–5147; Nachtrag a. a. O. Bd VIII Nr. 95 vom 23. Juni/3. Juli 1673 S. 6059: N. 6\*. S. 706.
42. STATIUS, P. Papinius, *Thebais*: S. 203.
- SYBRANDT, Hansz. s. CARDINAEL.
43. TACQUET, A., *Opera mathematica*. Antwerpen 1669 u. 1707: S. 279.
- Rez.: *Philosophical Transactions* Bd III N. 43 vom 11./21. Jan. 1668/69, S. 869–876: S. 279.
44. TORRICELLI, Ev., *De dimensione parabolae*. In: *Opera geometrica*. Florenz 1644. Tl II S. 17–84; [auch in TO I,1 S. 102–162]: S. 336. 337.
45. WALLIS, J.
  1. *Arithmetica infinitorum*. Oxford 1656. In: *Operum mathematicorum pars altera*; [auch in WO I S. 355–478]: S. 550. 574. 632.
  2. *Tractatus duo, prior de cycloide ... posterior ... de cissoidae*. Oxford 1659 [Marg.]; [auch in WO I S. 489–569]: S. 360.
  3. *Logarithmotechnia Nicolai Mercatoris: discoursed of in a letter ... to the Lord Viscount Brouncker ...* In: *Philosophical Transactions* Bd 3 N. 38 vom 17./27. Aug. 1668, S. 753–759: S. 337.
  4. *Mechanica: sive de motu, tractatus geometricus*. 3 Tle. London 1670–1671; [auch in WO I S. 570–1063]: S. 61. 360. 574. 575. 621. 632. 736.
  5. *Epitome binae methodi tangentium*. In: *Philosophical Transactions* Bd VII N. 81 vom 25. März/4. April 1672, S. 4010–4016: S. 360.

*661.*

6. *Nonnulla de centro gravitatis hyperbolae.*  
In: *Philosophical Transactions* Bd VII N. 87  
vom 14./24. Okt. 1672, S. 5074f.; [auch in

*WO* I S. 928f.]: S. *278. 337.*

46. WITT, J. de, *Elementa curvarum linearum.*  
Hrsg. Fr. v. Schooten. In: SV. N. 16,2 Tl II  
S. 153–340: S. *502. 741. 744. 745.*

NEUERE LITERATUR

47. CHILD, J. M., *The early mathematical manuscripts of Leibniz*. Chicago u. London 1920: S. **114**.
48. FELLMANN, E. A., *Die mathematischen Werke von Honoratus Fabry*. In: *Physis* I (1959) S. 5 bis 54: S. **3. 170. 570**.
49. GERHARDT, C. I., *Leibniz und Pascal*. In: *Sitzungsberichte der Kgl. Preuß. Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, 1891, S. 1053–1068: S. **114**.
50. HOFMANN, J. E., *Leibniz in Paris. 1672–1676. His growth to mathematical maturity*. Cambridge 1974: S. **70. 377. 632. 711**.
51. KNOBLOCH, E., *Übersicht über die unveröffentlichten mathematischen Arbeiten von Leibniz (1672–1676)*. In: *Leibniz à Paris (1672–1676)*. Symposion à Chantilly du 14 au 18 Nov. 1976. Bd I S. 3–43 = *Studia Leibnitiana Supplementa* Bd XVII. Wiesbaden 1978; russ. u. d. T. *Rukopisi Lejbnica 1672–1676 gg.* In: *Istoriko-matematičeskie Issledovaniya* 24 (1979) S. 258 bis 309: S. **685**.
52. MAHNKE, D., *Neue Einblicke in die Entdeckungsgeschichte der höheren Analysis*. In: *Abhandlungen der Preuß. Akademie der Wissenschaften. Phys.-math. Klasse*, Jahrgang 1925, Nr. 1. Berlin 1926: S. **115. 358. 495. 620. 656**.
53. PASINI, E., *La nozione di infinitesimo in Leibniz: tra matematica e metafisica*. Diss. Turin 1985/1986: S. **256**.

## SACHVERZEICHNIS

Die Grundsprache des vorliegenden Sachverzeichnisses ist deutsch. Leibniz' termini technici erscheinen in Kursivschrift. Zu Leibniz' Terminologie s. a. die Einleitung, insbesondere S. XVIII–XXII. Deren Reichhaltigkeit und Ausdifferenzierung spielt im vorliegenden Band eine entscheidende Rolle, was bei der Aufnahme von Sachwörtern zu berücksichtigen war. Die Sachworte sind alphabetisch geordnet. Verzeichnet wird nach Nummern und Seiten, wobei erstere zur besseren Unterscheidung zusätzlich mit einem Stern versehen sind. Nummernangaben erfolgen dann, wenn ein ganzes Stück einem bestimmten Sachwort zuzuordnen ist. Kursiv gedruckte Seitenangaben beziehen sich auf Herausgebertext.

<i>abscissa</i>	<i>perfectior</i> : S. 140.
Definition: S. 609.	
<i>Achse</i> s. <i>axis. latus erectum. latus orthogonium.</i>	
<i>actus evolutionis</i> : S. 215.	
ähnlich s. Dreiecke, ähnliche.	
<i>aequadivisus, aequidivisus</i> : S. 131. 222. 392. 397. 486.	
<i>aequatio, aequationes</i>	
<i>analytica</i> : S. 70.	
<i>collatae</i> : S. 122.	
<i>compositae</i> : S. 814. 821.	
<i>elementalis, elementaris</i> : S. 306 f.	
<i>essentialis</i> : S. 582.	
<i>fundamentalis</i> : S. 305.	
<i>geometriae</i> : S. 135.	
<i>graduum infinitorum</i> : S. 141.	
<i>identica</i> : S. 757.	
<i>irreducibilis</i> : S. 352.	
<i>parabolica</i> : S. 192.	
<i>plane irregulares et intractabiles</i> : S. 630.	
<i>equipollere</i> : S. 196. 586. 754.	
<i>aggregatum</i> : S. 37. 91. 263. 596. 627. 630. 633. 678.	
Algebra: S. 140. 306.	
Beweismethode: S. 306.	
Unvollkommenheit: S. 351. 595.	
<i>aliquota inassignabilis</i> : S. 310.	
analysis: S. 5. 6. 17 f. 100. 140. 223. 234. 307. 308. 316. 336–338. 348. 352. 489. 496. 497. 519. 582. 614.	
<i>analyseos</i> : S. 688.	
<i>indivisibilium</i> : S. 530 f. 820.	
per <i>indivisia</i> : S. 539.	
	<i>analytice</i> : S. 539. 614. 691. 721.
	<i>angulus</i>
	<i>aperturae</i> : S. 222.
	<i>bisectus</i> : S. 95.
	<i>contingentiae</i> : S. 679.
	<i>descriptionis</i> : S. 533–535.
	<i>inclinationis</i> : S. 146.
	<i>infinite parvus</i> : S. 396.
	<i>linearis</i> : S. 5.
	<i>non rectus</i> : S. 512. 728.
	<i>obliquus</i> : S. 437. 785.
	<i>rectus</i> : S. 5. 8. 136. 138. 146. 393. 410. 415. 512. 556. 584. 644. 708. 774 f. 785. 811. 820.
	<i>semirectus</i> : S. 96. 209. 231.
	s. a. <i>sectio angulorum</i> .
	<i>annularia</i> : S. 278 f. 354.
	s. a. <i>figura annularis. solidum annulare cycloides</i> .
	<i>annulus</i> : S. 18. 290. 552.
	<i>hyperbolicus</i> : S. 277 f.
	<i>parabolicus</i> : S. 277 f.
	$\ddot{\alpha}\pi\epsilon\tau\varphi\omega$ : S. 607.
	<i>apex scientiae humanae</i> : S. 688.
	<i>apotoma</i> : S. 325.
	<i>applicata</i>
	Definition: S. 144. 609.
	<i>appropinquatio</i> : S. 582. 717. 720. 740. 807.
	<i>approximatio</i> : S. 176. 255. 430. 494. 546. 582. 595 f. 686. 691. 769. 804–806.
	Architektur
	<i>antike</i> : S. 815.

s. a. Festungsbau.	
<i>arcus</i>	
<i>infinite parvus</i> : S. 510.	
<i>recurvatus</i> : S. 212.	
<i>area inassignabilis</i> : S. 332.	
<i>arithmetica</i> : S. 135. 607.	
<i>continuorum</i> : S. 262 f. 265.	
<i>figurata</i> : S. 691.	
<i>infinitorum</i> : S. 83. 140. 144. 146 f. 151. 157. 237. 241. 247. 249. 253. 262–264. 356. 487 f. 530 f. 596 f. 614. 633. 710.	
<i>continuorum</i> : S. 263.	
<i>simplex</i> : S. 710.	
<i>omnis</i> : S. 147.	
<i>pura</i> : S. 263. 265.	
<i>serierum</i> : S. 596.	
<i>summarum</i> : S. 546.	
<i>surdarum</i> : S. 597.	
Arithmetik: S. 135. 607. 710.	
des Unendlichen	
Paradoxien: S. 262.	
Rechenregeln: S. 249.	
Schwierigkeiten: S. 263 f.	
Vervollkommnung: S. 146. 596. 614.	
s. a. <i>arithmetica infinitorum</i> .	
Grundbegriffe: S. 607.	
s. a. <i>arithmetica</i> .	
<i>ars</i>	
<i>algebrae</i> : S. 630.	
<i>analyseos</i> : S. 529.	
<i>analytica</i> : S. 51. 307.	
<i>combinatoria</i> : S. 436. 596. 597.	
<i>humana</i> : S. 487. 595.	
<i>summa</i> : S. 169.	
<i>asymptota, asymptotos</i> : S. 50. 271. 325. 337. 340. 342 f. 355. 389. 391 f. 395–397. 399. 401. 403. 432. 434. 489–493. 577. 581. 601 f. 616. 622. 644 f. 650 f. 653. 687. 688. 690. 694. 701. 734. 759. 766. 767. 773 f. 791. 794. 797. 822.	
<i>ἀπομον</i> : S. 607.	
<i>ἀποτον</i> : S. 15.	
<i>avantgarde</i> : S. 548.	
<i>axis</i>	
<i>aequilibrii</i> : S. 278. 333. 335 f. 343. 552. 767.	
	<i>circumvolutionis</i> : S. 171.
	<i>coniugatus, coniungatus</i> : S. 342. 355. 593.
	<i>librationis</i> : S. 372. 433. 510 f. 567. 620. 635. 766 f.
	<i>revolutionis</i> : S. 167. 278. 552.
	<i>rotationis</i> : S. 277 f.
	s. a. <i>latus erectum</i> .
	<i>basis</i>
	<i>rectilinea</i> : S. 139.
	<i>seu horizonti parallela</i> : S. 168.
	s. a. <i>latus horizontale. latus orthogonium</i> .
	Bertetsche Kurve: N. 50*.
	Bildungsgesetz: S. 810.
	Bogenelement: S. 811 f.
	Extremwert: S. 812.
	Fadenkonstruktion: S. 810.
	Gleichung: S. 812.
	Rotationskörper: S. 812 f.
	Tangente: S. 810 f.
	Bewegung: S. 630. 701. 810.
	<i>geradlinige</i> : S. 6 f. 9. 14. 89.
	<i>gleichförmige</i> : S. 7 f. 17.
	<i>kontinuierliche</i> : S. 95.
	<i>Kreisbewegung</i> : S. 8.
	<i>Wurfbahn</i> : S. 815.
	zusammengesetzte: S. 329. 574.
	s. a. <i>motus</i> .
	Beweis, Beweise
	Methode: S. 306.
	Widerspruchsbeweis: S. 607.
	s. a. <i>demonstratio</i> .
	Binom: S. 259. 422. 595. 670. 672. 686. 781.
	Division durch: N. 25*. S. 259.
	<i>bisecare, bisectio</i> s. Teilung, Zweiteilung.
	Bogenteilung: S. 63. 95. 139. 148. 160. 182. 213. 336 f. 344. 413.
	Methode: S. 139.
	Bruch, Brüche: S. 71. 128. 130. 261. 265. 275. 422. 493 f. 569. 611. 625. 627. 649 f. 672. 691. 712. 722. 733. 740. 785.
	Multiplikation und Division: S. 275.
	unendlich kleiner: S. 265. 494.
	s. a. <i>fractio. numerus fractus</i> .
	<i>calculus</i>
	<i>applicatarum</i> : S. 664.

- centrorum*: S. 637.  
*centrorum gravitatis*: S. 353.  
*compendiosus*: S. 282.  
*inassignabilium infinitorum*: S. 316.  
*indivisibilium*: S. 569.  
*infinitorum*: S. 284. 531.  
*quadratricis geometriae*: S. 569.
- canon*  
*aequationum*: S. 688.  
*mathematicus*: S. 582. 735.  
*vulgaris*: S. 316.
- centrobaryca*: S. 162. 210. 275.  
*s. a. figura centrobaryca*.
- centrum*  
*aequilibrii*: S. 115. 117. 133. 291. 373.  
*areae*: S. 106.  
*curvae, curvarum*: S. 106 f. 211. 354.  
*evolutionis*: S. 215. 222.  
*figurae*: S. 64. 94.  
*gravitatis*: N. 9\*. 17\*. S. 6. 37. 52. 59–63. 115  
 bis 117. 122–124. 132 f. 137 f. 145 f. 156. 160.  
 179. 182. 204. 209 f. 227. 230–233. 251–253.  
 272 f. 275 f. 278. 282. 290 f. 293 f. 303. 308. 323.  
 325 f. 366. 370–372. 375. 403. 430. 433. 488.  
 514. 519. 552. 574. 600 f. 605. 634 f. 636 f. 702.  
 720. 767. 779.  
*oscillationis*: S. 37. 96.
- chorda*  
*assignabilis*: S. 75.  
*flexibilis*: S. 703.  
*inassignabilis*: S. 339. 527 f. 533–535. 543.  
*indivisibilis*: S. 521 f.  
*infinite parva*: S. 73. 810.
- chordae ad ordinatas*: S. 147 f. 222. 271. 359.
- circulus generator, genitor*: S. 30. 74. 159 f. 169.  
 211. 217. 218. 271. 344. 431. 440. 442. 533–535.  
 577. 736. 810.
- circumgyratio*: S. 139.
- circumvolutio*: S. 59. 171. 278.
- cissoeis s. Zissoide*.
- clepsydra parabolica*: S. 325. 325.
- cochlea*: S. 583.
- commensurabilis*: S. 128. 190 f. 196–199. 203. 205.  
 627.
- compendium*: S. 118.  
*ratiocinationis*: S. 77.  
*rationis humanae*: S. 308.
- compositio*  
*aequationum*: S. 546.  
*motuum*: S. 329. 574.  
*rationum*: S. 35. 549.
- compressio*: S. 169.
- conchoeis*  
*communis*: S. 406.  
*falsa*: S. 427 f. 430 f. 433–435. 438–440. 444. 451.  
 460. 479. 577.  
*suppletoria*: S. 406.  
*vera*: S. 434 f. 444.  
*s. a. Konchoide*.
- confirmatio methodi*: S. 189.
- conoides, conoies, conoides, conois*: S. 17 f. 59 f.  
 107 f. 210. 229–231. 233. 251–253. 271. 278. 326.  
 329. 336 f. 391. 427. 472. 537. 574.
- consequentia admiranda*: S. 335. 606.
- consideratio*  
*elegans atque utilis*: S. 738.  
*elegantissima*: S. 127.
- consilium naturae*: S. 191.
- constructio*  
*geometrica*: S. 359. 670. 702. 720.  
*in infinitum dividens*: S. 359.
- construere theorema*: S. 126.
- contemplatio*  
*profundior de infinito et inassignabilibus*:  
 S. 315.  
*profundior indivisibilium atque infiniti*: S. 265.
- continuum*: S. 492.
- conus s. Kegel*.
- conversio rigorosa*: S. 129.
- corpus*: S. 6. 316. 434. 703.  
*coniforme seu turbinatum*: S. 199.  
*polygonum*: S. 167.  
*regulare*: S. 167.
- crassities infinite parva*: S. 169.
- cuneus*  
*abscissus*: S. 96. 100 f. 145 f. 209. 228. 230 f.  
*Hugenianus*: S. 162.  
*semiquadrantalis*: S. 273.
- curva*

- commutabilis*: S. 515.  
*cuius natura investiganda*: S. 223.  
*decrescens seu evanescens*: S. 61.  
*evoluta*: S. 74. 143 f. 339 f. 519. 539.  
*evolutione descripta*: S. 141. 144. 215 f. 222 f. 339. 519. 808.  
*geometrica*: S. 36. 141. 256. 515.  
*homogenea*: S. 519. 795. 817 f.  
 $\delta\mu\tau\omega\mu\varsigma$ : S. 710.  
*mechanica*: S. 720 f.  
*omnis generis*: S. 70. 139.  
*quadrabilis*: S. 515.  
*rectificabilis*: S. 515. 539.  
*syntomas*: N. 46\*. s. a. *figura*. Kurve. *linea*.  
*cycloëis*, *cycloïs*  
*contracta*: S. 360. 541 f. 574.  
*protracta*: S. 360. 542. 574.  
s. a. Zykloide.  
*cyclometria*: S. 391. 740.
- definitio*  
*accommodata*: S. 307.  
*elementalis*, *elementaris*: S. 306 f.  
*fundamentalis*: S. 306.  
*mechanica*: S. 93.  
*primaria*: S. 306.  
Definition, Definitionen: S. 138 f. 305–307.  
s. a. *definitio*.
- demonstratio*  
*geometrica*: S. 48.  
*per impossibile*: S. 607.  
*perfecta absolutaque*: S. 237.  
*universalis*: S. 181.  
*describere mechanice*: S. 58.
- differentia*, *differentiae*  
*assignabilis*: S. 318. 671.  
*homogeneae*: S. 822.  
*inassignabilis*: S. 359. 671.  
*infinite parva*: S. 263. 317.  
*minima*: S. 311–314.  
*minor qualibet assignabili*: S. 318.  
*minor qualibet data*: S. 181.
- Differentialgleichung s. Tangentenmethode, inverse.
- Differenz, Differenzen  
höherer Ordnung: S. 84. 323.  
von Ordinaten: S. 12 f. 18. 37. 87. 313–318. 322 bis 331. 347 f. 398. 494. 660. 667. 675 f. 678. 689. 704–708. 710. 712. 764. 800. 821.  
Zuwächse: S. 246. 319. 345. 493. 542. 787 f.  
s. a. *differentia*.
- Differenzenfolge, Differenzenreihe: S. 81–84. 86 f. 132. 151. 238. 247 f. 261. 269. 293. 297–300. 303. 311–314. 318. 320. 322 f. 327–330. 343. 347. 400. 762.  
s. a. Differenzenschema.
- Differenzenschema: S. 270. 288. 289. 303.  
*dignitas*: S. 52–54. 91.  
Definition (Ricci): S. 52.  
*dimensio infinite parva*: S. 692.  
Dimension: S. 74. 93. 133. 135. 137. 241. 259. 261. 295. 299. 301. 316. 434. 606 f. 625. 627. 634. 639. 649 f. 716. 746. 780.  
höhere: S. 93. 399. 497. 675. 746.  
imaginäre: S. 606. 627.  
reale: S. 93.  
vierte: S. 93. 137. 347. 399. 606. 627.
- Dioptrik*: S. 58.  
*dioristice*: S. 720.  
*distantia*  
*infinite parva*: S. 576. 651. 657.  
*subcentrica*: S. 209.
- Division  
durch Größen < 1: S. 275.
- divisor*  
*infinite parvus*: S. 317. 766.  
*subinfinituplus*: S. 318.
- doctrina*: S. 52. 59.  
*de evolutionibus*: S. 141.  
*de intervallis tangentium*: S. 519.  
*de linearum dimensionibus*: S. 666.  
*de methodo tangentium inversa*: S. 705.  
*ductuum*: S. 435.  
*infiniti atque indivisibilium*: S. 265.  
*serierum*: S. 147.  
*serierum convergentium*: S. 719.  
*ungularum*: S. 271.
- dolia vinaria*: S. 815.  
Drehellipsoid s. Sphäroid.

- Dreieck, Dreiecke  
 ähnliche: N. 26\*. 27\*. S. 16. 157. 349. 377. 382.  
 384f. 387. 393. 396f. 399. 407. 410. 413f. 417f.  
 497–499. 502–506. 512f. 518. 520–523. 526.  
 528. 531–533. 537. 542. 555–557. 562. 576.  
 597. 602. 610. 613. 621. 651f. 657. 665–669.  
 710. 728. 735. 774. 810f. 813. 816. 819f. 822.  
 arithmetisches: S. 632.  
 charakteristisches: N. 27\*. 28\*. 29\*. S. 377. 415.  
 417. 417. 538f. 542f. 562. 597. 597. 610. 613.  
 692f. 704. 706–708. 710. 819–822.  
 Fläche: S. 191.  
 Moment: S. 558f. 824.  
 gleichschenkliges: S. 214. 572.  
 gleichseitiges: S. 159. 385.  
 Höhenschnittpunkt: S. 409. 409.  
 infinitesimales: S. 32. 73. 73. 156. 536. 597.  
 711.  
 Konstruktion: S. 7.  
 Problem  
 Dreieck aus Grundlinie und Summe der Seiten  
 bestimmen: S. 19.  
 rechtwinkliges: S. 57. 85. 90. 196. 227f. 236. 251.  
 260. 324. 387. 393. 396. 417. 437. 441. 506. 512.  
 526. 562. 564. 597. 651. 728. 735.  
 Summation der Differenzen der Kathetenquadrate: S. 85f.  
 Umfang  
 Moment: S. 370.  
 s. a. *quasi triangulum. triangulum.*  
 Dreiseit: S. 11–13. 19. 111. 123. 133. 136. 145f. 179.  
 190. 209–211. 230. 233. 323. 333f. 336. 336. 338.  
 344–348. 505. 631f. 638. 736. 759. 824.  
 ebenes: S. 124. 139.  
 körperliches: S. 138f.  
 konkaves: S. 205. 338. 344. 485. 496f. 499. 609.  
 611. 613f. 630f. 635–637. 710. 726. 733.  
 konvexes: S. 205. 338. 371. 374f.  
 Moment: S. 372. 372. 374f. 374. 635. 637f. 824.  
 rechtwinkliges: S. 136. 138. 334–336. 339. 465.  
 Satz (Pascal): S. 211.  
 Schwerpunkt: S. 336. 336. 372. 372. 374. 374.  
 Rotationskörper  
 Sätze (Pascal): S. 210.
- s. a. *trilinearis. trilineum.*  
*ductio:* S. 300.  
*ductus:* N. 22\*. 26\*. S. 181. 184. 470. 476. 515. 550.  
 565. 568. 579. 582. 671.  
*circularis:* S. 431. 449f. 455. 594.  
*conchoeidalis:* S. 450.  
*conchoeido-circularis:* S. 447.  
*curvilineorum:* S. 425.  
*cycloparabolicus:* S. 391.  
*hyperbolico-circularis:* S. 396.  
*hyperbolico-parabolicus:* S. 439.  
*hyperbolicus:* S. 439. 446f. 451. 464.  
*parabolico-circularis:* S. 431.  
*parabolico-parabolicus:* S. 430.  
*parabolicus:* S. 427. 431.  
*portionis conchoeidalis:* S. 445.  
*quadrantis:* S. 400–402. 404. 408.  
*rectarum:* S. 594.  
*semicirculi:* S. 383.  
*sinuum:* S. 400f.  
*spatii conchoeidalis:* S. 454.  
*spatii hyperbolici:* S. 391. 401. 435.  
*trianguli:* S. 397.  
*trilinei circularis concavi:* S. 401f. 404. 408.
- Ebene  
 Definition: S. 5.  
 Konstruktion: S. 7.  
 s. a. *planum.*
- Einheit  
 infinitesimale: S. 135. 212. 215. 221. 233. 247.  
 262. 265. 285f. 298f. 301f. 316–318. 330. 339.  
 359. 362. 392. 398. 441. 527f. 532–534. 607.  
 663. 706. 710. 738. 740. 755. 811. 824.  
 s. a. *unitas.*
- Ellipse: N. 11\*. S. 5–7. 14–16. 18. 20f. 47. 52. 58. 63.  
 95. 99–101. 106. 142f. 187. 225–228. 252. 360.  
 440. 506. 514. 518. 574. 584. 596f. 622. 664. 664.  
 691. 703. 746.
- Bogen: S. 106f. 142f. 225. 227f. 252.  
 Bogenelement: S. 543f.  
 Moment: S. 95f. 503f.  
 Regel: S. 143.  
 Schwerpunkt: S. 211. 227. 230. 338.
- Brennpunkte: S. 543.  
 Dreieck, charakteristisches: N. 28\*.

- Dreiseit, konkaves  
Schwerpunkt: S. 338.
- Durchmesser: S. 101. 143. 166. 170.
- Eigenschaft: S. 225. 502. 506. 584–586.
- Extremwerte: S. 101. 143. 166. 587.
- Fläche: S. 171.  
Moment: S. 514.  
Schwerpunkt: S. 338. 340.
- Gleichung: S. 543. 571. 586–589. 652. 695.
- inverse Tangentenrechnung: S. 586–591.
- Normale: S. 440 f. 503–506. 507 f. 585.
- Ordinate: S. 441. 586 f.  
Differenz: S. 543.
- parabolische: S. 101.
- Polygon, einbeschriebenes: S. 226 f.
- Quadrant: S. 14. 16. 18. 211. 232. 338. 429. 502.  
538 f. 567. 568. 696. 823.
- Quadratur: S. 106. 338. 340. 504 f.  
Zusammenhang mit Kreisquadratur: S. 439.
- Rektifikation: S. 142. 227 f. 338. 439. 505. 534.
- Rollkurve: S. 519. 539.
- Segment: S. 99 f. 142.  
Schwerpunkt: S. 100.
- Sehne: S. 226 f. 252.
- Sekante: S. 504 f.
- Subnormale: S. 584. 586–590.
- Tangente: S. 441. 502–505. 531. 587.
- Tangentenrechnung: S. 543. 585 f. 695. 712–714.
- Teilung: S. 227.
- Umfang: S. 95 f. 98 f. 143. 226.
- Zentrum: S. 95. 98. 166.
- Zylinder: S. 99. 167. 228. 509.  
s. a. *ellipsis*. Sphäroid.
- ellipsis*  
*genitrix*: S. 167. 171.  
*parabolica*: S. 101.
- Ellipsoid s. Sphäroid.
- endlich  
Verhältnis zu unendlich: S. 242. 246. 298. 314 f.
- epicherema*: S. 582.
- Epizykloide: S. 440.
- evanescentia*: S. 64.
- Evolute: S. 31 f. 73 f. 73. 143 f. 338–340. 359. 518 f.  
539.
- Fläche: S. 339.  
Moment: S. 339.  
s. a. *evolutio*. Parabel.
- evolutio*  
*curvae, curvarum*: S. 31. 36. 143. 216. 221. 519.  
808.  
*cycloidalis*: S. 73.  
*figurarum*: S. 141. 143.  
*lineae, linearum*: S. 31. 223.  
*semicycloidis*: S. 74. 218.  
s. a. *actus. doctrina. figura*.
- Evolente: S. 31 f. 73 f. 73. 75. 141. 143 f. 337–339.  
359. 518 f. 523. 539.
- Fläche: S. 216. 224. 338 f. 359.  
Regel: S. 359.
- Quadraturmethode: S. 224.
- Rektifikation: S. 339.
- Satz (Huygens): S. 223.  
s. a. *figura evolutionalis. figura evolutionis*.  
Kreisevolvente. Parabel. Zykloide.
- Experiment, Experimente  
mathematische: S. 147. 290. 308.
- pneumatisches: S. 574.
- Exponentialfunktion s. Logarithmuskurve.
- Festungsbau: S. 548.
- Figur, geometrische  
Eigenschaft: N. 511\*.
- Konstruktion: S. 6.  
s. a. Dreieck. Dreiseit. Ellipse. *figura*. Körper,  
geometrischer. Kreis. Kreismöndchen. Kreis-  
polygon. Oval. Vieleck. Viereck. Vierseit.
- figura, figurae*  
*aequationis cognitae*: S. 17.  
*aequationis incognitae*: S. 17.  
*angulorum*: S. 497. 580–583. 622. 644. 701 f. 720.  
723. 798.  
*annularis*: S. 17. 117. 278.  
*apotomica*: S. 324 f. 330. 355.  
Definition: S. 324 f.
- applicatarum*: S. 105 f. 110. 131. 271.
- arcuum*: S. 271 f. 672. 704.
- areae inassignabilis*: S. 332.
- artificialis (seu quae non nisi per puncta de- scribi potest)*: S. 141.
- centrobaryca*: S. 94 f. 102. 104. 160. 162. 272.

- Definition: S. 94 f. 102.  
*chordarum*: S. 221 f. 271. 427.  
*cognatae*  
 Definition: S. 584.  
*commensurabiles*: S. 191. 592.  
*concava*: S. 302. 496. 614. 635. 719. 731. 733.  
*convexa*: S. 302 f. 496 f. 614. 635. 637. 719. 731.  
 733.  
*curvilinea*: S. 95. 105. 123. 139. 158. 323. 355.  
*differentialis*  
 Definition: S. 348.  
*differentiarum*: S. 330. 591.  
*dimetienda*: S. 139. 597.  
*divisa in particulas minimas*: S. 209.  
*eiusdem naturae*: S. 584.  
*epicyclica*: S. 440.  
*evolutionalis (id est evolutione descripta)*:  
 S. 144.  
*evolutionis*: S. 73–75.  
*ex revolutione orta*: S. 162.  
*falsa*: S. 424. 581.  
*geometrica*: S. 140. 300. 515. 582. 630. 657. 703.  
 815.  
*quadratrix*: S. 497.  
*geometrice descriptibilis*: S. 95.  
*harmonica*: S. 260. 270 f.  
 Definition: S. 260.  
*harmonicoeis*: S. 328.  
*heterogeneae*: S. 140. 435. 509. 511.  
*homogeneae*: S. 12. 19. 110. 348. 354. 519. 537.  
 634 f. 637. 639–641. 652. 699. 727. 754. 755.  
 767 f. 781. 783. 819.  
*imaginaria*: S. 424. 434.  
*inter se comparabiles*: S. 278.  
*inversa tangentium*: S. 474. 479.  
*inversae*: S. 788.  
*isometroi*: S. 720.  
*isoperimetrae*: S. 173.  
*isostatica*: S. 102–104.  
 Definition: S. 102 f.  
 Regel: S. 103.  
*logarithmica*: S. 298–303. 308. 325–327. 337.  
 347.  
*logarithmorum*: S. 581. 636. 702.
- minima*: S. 332.  
*mixtilinea*: S. 140. 191.  
 s. a. *mixtilineum*.  
*non geometrica*: S. 498.  
*non plana*: S. 99.  
*orthogonia*: S. 138 f. 144. 334. 705.  
 Definition: S. 138.  
*ovalis*: S. 539.  
*per aequationem invenibilis*: S. 140.  
*physica*: S. 815.  
*plana*: S. 8. 12 f. 15. 19. 94–96. 99. 117. 124. 133.  
 138 f. 179. 328 f. 348. 354 f. 635–637. 639. 641.  
 652. 817.  
*curvilinea*: S. 597.  
*proportionalium*: S. 398.  
*proportionum*: S. 308. 328.  
*quadrabilis*: S. 479. 483 f. 499. 513–515. 538. 597.  
 601 f. 611. 614. 634. 754. 805. 821.  
*quadranda*: S. 496 f. 630. 807.  
*quadratica*: S. 354–356.  
*quadratoquadrata (non imaginaria)*: S. 434.  
*quaes geometrice construi possunt*: S. 191.  
*quaes (non) ex compositione motuum fit*: S. 329.  
*quartae dimensionis*: S. 347.  
*radiorum*: S. 334.  
*rationum*: S. 581.  
*rectangula*  
 Definition: S. 138.  
*rectilinea*: S. 105.  
*resectarum*: S. 782. 792. 797.  
*repraesentans*: S. 222.  
*revolutione genita*: S. 60.  
*secantium*: S. 338. 465. 467. 470. 484. 491. 505.  
*complementi*: S. 448–451. 465. 579.  
*segmentorum*: N. 49\*. S. 490. 704. 719. 721. 723.  
 760. 764.  
*semicissoeidis*: S. 489 f.  
*semicycloidalis*: S. 74.  
*similis*: S. 275. 332. 359. 519. 703.  
*sinuum*: S. 16. 103. 108. 111 f. 176. 397. S. 476.  
 504. 597. 671.  
*sinuum versorum*: S. 620 f.  
*solida*: S. 5. 8 f. 12. 139. 165. 348. 570. 606. 635  
 bis 637. 817.  
*succenturiata*: S. 223.

- sygnota*: S. 720.  
*symmetra*: S. 490. 492.  
*syntomos*: N. 46\*. S. 703. 819.  
*tangentium*: S. 271. 399 f. 404–407. 427. 442. 449 f. 453. 455. 468. 474 f. 479. 483. 577.  
*tangentium falsorum*: S. 404.
- Fläche  
als Kompositum von unendlich vielen Trapezen: S. 109. 619. 651. 657.  
Berechnung s. Quadratur.  
Flächenteilung: N. 46\*. 50\*. S. 63. 93–95. 124. 139. 160. 211. 213. 277. 346. 366. 552. 701. 704. 767.
- fluxus*: S. 4–6.  
Folge: N. 152\*. 161\*. S. 63. 80. 96 f. 111. 115. 117 f. 120–122. 130 f. 140. 147. 195. 233–237. 298. 315. 318. 492. 505. 530. 542. 576. 614. 640. 663. 684. 691. 704 f. 734. 740. 781. 814. 817. 819.  
Bildungsgesetz: S. 241. 684. 740.  
Doppelfolge, konvergente: S. 542. 719.  
monoton abnehmende: S. 66. 82. 96. 143. 224. 238. 241. 261. 273 f. 279. 298. 311. 327. 381. 684.  
monoton wachsende: S. 73. 77. 97. 115. 117. 147. 216. 224. 238. 260. 262. 273 f. 279. 298. 311. 327 f. 381 f. 385. 505. 542. 684. 739.  
s. a. Differenzenfolge. Differenzenschema. Folge, spezielle. *progressio*. Quotientenfolge. Quotientenschema. Reihe. *series*.
- Folge, spezielle  
arithmetische: S. 51. 65. 73. 76. 80. 80. 147. 163. 233. 235. 237. 238–240. 247–249. 260 bis 262. 286 f. 289. 325. 328. 379. 394. 397. 537. 576. 591. 634. 645. 678. 684. 726. 731. 739.  
Quotientenschema: S. 289.  
Dreieckszahlen: S. 247 f. 322. 328.  
geometrische: S. 224. 261. 290. 298. 303. 310 f. 318–320. 325. 379. 814.  
Differenzenfolge: S. 297 f. 311.  
geometrischer bzw. physikalischer Größen: S. 63. 96 f. 111. 115. 117 f. 120. 140. 147. 238. 240 f. 244. 261 f. 264 f. 298. 303. 308. 310. 315. 318. 323–325. 355 f. 379. 394. 397. 488. 492. 505. 528. 542. 576. 691. 704. 734. 739 f.
- harmonische: S. 65 f. 260–264. 270 f. 287. 289. 308. 321–324. 327. 337. 343. 355. 398. 432. 493.  
Differenzenfolge: S. 322. 343.  
Differenzenschema: S. 270. 289.  
Pyramidalzahlen: S. 233. 322.  
Quadratwurzeln: S. 328 f.  
Quadratzahlen: S. 65. 76. 78–80. 233. 235. 237. 238. 247 f. 250. 322. 327–329.  
Differenzenfolge: S. 237. 238. 327 f.  
Differenzenschema: S. 235.  
reziproke Dreieckszahlen: S. 322.  
s. a. Reihe, spezielle.  
Forschungsprobleme  
offene: S. 303.  
*fractio*: S. 71. 128. 130. 261. 265. 275. 422. 493 f. 569. 649 f. 672. 691. 712. 722. 733. 740. 785.  
*infinite parva*: S. 494.  
Frankreich: S. 208.  
*frustum*: S. 167.  
*fulcrum*: S. 102 f. 131. 145 f. 150. 153–155. 159. 162. 213. 228–230. 233. 260. 275–277. 281.  
*functio*: N. 40\*. 44\*. 51<sub>3</sub>\*. S. 584. 584. 722. 754.  
*functionem*  
*facere*: S. 500. 504. 656. 664 f. 672.  
*obtinere*: S. 671.  
*fusus*  
*parabolicus*: S. 61. 108. 210.  
*sinuum*: S. 108.  
*generator*, *genitor*, *genitrix* s. *circulus*. *ellipsis*.  
*quadrans*. *semicirculus*.  
*genesis*: S. 9 f. 14 f. 17 f.  
*figurae*, *figurarum*: S. 5 f.  
*hemisphaerii*: S. 15.  
*hyperboles*: S. 17.  
*quantitatis*: S. 6.  
*geometra*: S. 4. 12. 31.  
*geometria*  
*indivisibilium*: S. 135. 140. 147. 236. 278. 290. 316. 569.  
*locorum*: S. 519.  
*mechanica*: S. 582.  
*pura*: S. 351 f.  
*quadratrix*: S. 569.  
*statica*: S. 703.  
*universa*: S. 58.

- Geometrie: S. 122. 131. 135. 351 f. 436. 614. 633. 692. 701. 702. 717.  
 (Apollonius): S. 594. 597.  
 (Archimedes): S. 594. 597.  
 (Descartes): S. 594.  
 drei Abstufungen: S. 594.  
 Entwicklung: N. 36\*.  
 (Euklid): S. 594.  
 Grundbegriffe: S. 607.  
 Methode: S. 595.  
 geometrische Örter: S. 519.  
 praktische: N. 513\*.  
 Probleme: S. 316.  
 Sätze: S. 352.  
 Vervollkommnung: S. 594. 596.  
 Ziele: N. 36\*.  
 s. a. *geometria*.
- Gerade  
 Definition: S. 5.  
 Gleichung: S. 586. 678.  
 s. a. *linea recta. recta*.  
 Gleichgewichtsbetrachtungen s. Statik.
- Gleichung  
 algebraische: S. 70.  
 Eliminierung von irrationalen Termen: S. 490. 588. 604 f. 625. 635. 639. 650. 650. 733 f. 799.  
 identische: S. 757.  
 Koeffizientenvergleich: S. 122. 713. 716 f.  
 Konstruktion: S. 608.  
 mit Doppelwurzeln: S. 587. 590 f. 713. 715–717. 823 f.  
 Reduzierung des Grades: S. 350. 352. 497.  
 Methode (de Witt): S. 741. 744 f.  
 Umformung: S. 85.  
 unendlichen Grades: S. 141.  
 unlösbare: S. 630.  
 s. a. *aequatio*. Algebra. Kurve.
- goniometria*: S. 430.
- Größe, Größen  
 endliche: S. 265. 314. 737. 797.  
 irrationale: S. 490. 588. 604 f. 625. 635. 639. 650. 691. 701. 733 f. 799.  
 kommensurabile: S. 191.  
 kontinuierliche: S. 5. 93.
- rationale: S. 691. 738.  
 unendlich kleine: S. 313. 316 f. 692.  
 unendlich große: S. 314. 737.  
 s. a. *magnitudo. numerus. quantitas*. Wurzel. Zahl.
- Halbkugel s. *hemisphaera*. Kugel.  
*harmonia*: S. 308. 631. 634. 645. 760.  
*admiranda*: S. 701.  
*elegans*: S. 653.  
*mirabilis*: S. 631.  
*praeclara*: S. 640.  
*pulcherrima, non inelegans*: S. 637.  
*helix*: S. 17. 216 f. 223.  
*circularis*: S. 217. 221. 223.  
*cycloidalis*: S. 217. 222.  
*semicycloidalis*: S. 218.  
*hemisphaera, hemisphaerium*: S. 10–12. 15. 18–21. 59 f. 62 f. 86. 94 f. 107. 167–170. 187. 323. 348. 397.  
*hemisphaeroedes*: S. 59. 167.  
*compressum*: S. 211.  
*latum*: S. 211.  
*heterogenea*: S. 140. 221. 347.  
*hexagonum*: S. 92. 167. 346. 379.  
 homolog s. *latus*.  
*horologium*: S. 30.  
*oscillationis*: S. 145.
- Hydraulik  
 Methode (Archimedes): S. 703.
- Hyperbel: N. 4\*. 22\*. 25\*. 44\*. 45\*. S. 5–7. 15. 17 f. 46. 50. 99. 106–108. 139. 158. 172. 211. 231 f. 252. 259. 271. 278. 304. 326. 329. 337 f. 340. 342. 355 f. 360. 360. 363. 367. 389. 492. 566. 570–573. 574. 584. 599. 615 f. 632. 644. 653. 664. 664. 679. 688–690. 725. 726. 740 f. 746. 751. 794. 819. 823. Asymptote: S. 50. 271. 325. 337. 340. 342 f. 355. 391 f. 395. 397. 399. 403. 493.
- Bogen  
 Bogenelement: S. 58.  
 Schwerpunkt: S. 337.
- Brennpunkt: S. 58. 543.
- Dreiseit: S. 337.
- Evolute: S. 808.
- Extremwerte: S. 397. 401. 491. 571. 688–690.
- figura segmentorum*: S. 804.

- Fläche: N. 22\*. S. 340–342. 355. 432–435. 445 f. 455. 467–469. 471. 476. 478. 481. 483. 493. 502. 504. 508 f. 529. 544. 581. 622. 687 f. 702. 741 f. 759. 761. 767 f. 822.
- Moment: S. 367. 385. 396. 399. 403. 407 f. 443. 445–447. 491. 493. 509. 766 f. 794.
- Schwerpunkt: S. 278. 337. 340. 355.
- unbegrenzte: S. 493.
- gleichseitige: S. 571.
- Gleichung: S. 367. 424. 424. 491. 550. 571. 600. 646. 651. 676. 678. 689. 695 f. 726 f. 744. 788. 794.
- Konstruktion: S. 17. 57 f. 360.
- näherungsweise durch Polygonzug: S. 58.
- Regel: S. 360.
- (Wren): S. 574.
- Nutzen für Dioptrik: S. 58.
- Ordinate: S. 58. 367. 400. 591. 683 f. 701. 821.
- Differenz: S. 18. 343. 347. 683 f. 687. 689. 697. 756 f. 793. 795.
- Moment: S. 571.
- Quadratur: N. 4\*. 44\*. 45\*. S. 99. 106–108. 158. 172. 211. 231 f. 252. 259. 277. 304. 326. 337 f. 340. 397–399. 401–408. 417. 432. 432. 434–436. 439. 447. 448. 455. 457. 458. 459. 479. 481. 491. 504. 509. 514. 529. 539. 545. 549. 571. 574. 581. 595 f. 599. 601. 616. 622. 643. 670. 672 f. 686 f. 691 f. 742. 780. 786 f. 791. 793. 796. 800. 802. 822. 824.
- (Brouncker): S. 596.
- Definition: S. 581.
- (Gregory): S. 259.
- (Mercator): S. 50 f. 595.
- näherungsweise: S. 58.
- (Saint-Vincent): S. 549. 622. 703.
- (Sarasa): S. 622.
- Zusammenhang mit Konchoidenquadratur: S. 448. 479. 481.
- Zusammenhang mit Kreisquadratur: N. 25\*. 34\*. 40\*. 42\*. 44\*. 45\*. S. 232. 439. 447 f. 508. 514. 771.
- Zusammenhang mit Parabelrektifikation: S. 172. 231 f. 252. 539. 574. 703. 770 f.
- Rektifikation: S. 58. 106–108. 232. 337. 770 f.
- Zusammenhang mit Hyperbelquadratur: S. 770.
- Zusammenhang mit Parabelrektifikation: S. 232.
- resecta*: N. 47\*. S. 792. 799.
- Rollkurve: S. 519.
- Segment: S. 342.
- Sektor: S. 259 f.
- Subnormale: S. 584. 756 f.
- Subtangente: S. 616. 650–652. 679. 689. 800.
- Tangentenrechnung: S. 694. 695. 800. 805.
- Torus: S. 277 f.
- Zweiteilung: N. 19\*.
- Zylinder: S. 366. 389. 391. 395. 401–408. 433 bis 436. 445–449. 453–455. 457. 460. 600–602. 766 f. 780.
- Satz: S. 402 f.
- Zylinderhuf: S. 325. 385.
- Satz (Saint-Vincent): S. 304.
- s. a. Hyperboloid. Kegelschnitt. Konoid.
- Hyperbel, höhere: N. 19\*. 37\*. 38\*. 392\*. S. 432. 490. 492. 505. 514. 569. 574. 574. 581. 596. 632. 678 f. 683.
- Fläche: S. 432. 616. 650. 654. 742.
- Moment: S. 601–603.
- Gleichung: N. 19\*.
- Regel: S. 649.
- kubische: S. 366. 644. 646 f.
- Gleichung: S. 366. 602. 646 f.
- Moment der Fläche: S. 366. 602.
- Quadratur: S. 793.
- Zylinder: S. 367.
- Ordinate: N. 19\*.
- Differenz: S. 683 f. 687.
- quadratische: S. 367. 600–602. 644. 646. 648. 650. 650. 693 f. 699. 741. 745. 750. 786. 794 f. 794. 799. 805.
- Gleichung: S. 367. 600 f. 646. 651. 655. 693. 741. 745.
- Moment der Fläche: S. 600 f.
- Quadratur: S. 601. 602. 693. 786. 794.
- Tangentenrechnung: S. 699. 805.
- Zylinder: S. 367.
- Quadratur: N. 19\*. 37\*. 38\*. 392\*. S. 432. 574. 632. 642. 742. 805.

Subtangente	<i>seu punctum</i> : S. 57.
Differenz: S. 665.	
Tafel: S. 645–647. 649.	Indivisible: N. 4*. S. 135. 140. 147. 236. 265. 278. 290. 316. 521 f. 527. 530 f. 539. 542. 569. 605. 607. 610. 820.
Tangentenrechnung: S. 700.	Definition: S. 265.
Zylinder: S. 367. 432. 601.	s. a. <i>indivibile. minimum</i> . Quadraturmethode.
s. a. <i>hyperbola cubica. hyperbola quadratica. hyperboloeis</i> .	Induktion: S. 308.
<i>hyperbola</i> , <i>hyperbole</i> , <i>hyperbolica</i> : N. 4*. 22*. S. 5 bis 7. 15. 17 f. 50. 99. 106–108. 139. 158. 172. 211. 231 f. 252. 259. 271. 278. 304. 326. 329. 337 f. 340. 355 f. 360. 363. 389. 421 f. 432. 490. 492. 505. 514. 569. 574. 574. 581. 596. 597. 632. 644–646. 678 f. 683.	<i>infinite parvum</i> : S. 265. 317. 491.
<i>circularis</i> : S. 703. 808.	<i>infinitesima</i> : S. 264. 398. 432. 493 f. 497. 607. 657. 663. 791.
<i>communis</i> : S. 599. 616. 646. 650 f. 653.	Infinitesimale: S. 32. 73. 73. 135. 156. 212. 215. 221. 233. 247. 262. 264 f. 285 f. 298 f. 301 f. 316 bis 318. 330. 339. 356. 359. 362. 381. 392. 398. 432. 441. 493 f. 497. 527 f. 532–534. 536. 568. 597. 607. 657. 663. 706. 710. 711. 738. 740. 755. 791. 811. 824.
<i>cubica</i> : S. 693. 805. 822.	<i>infinities</i> : S. 298.
<i>falsa</i> : S. 581–583. 622. 644. 702.	<i>infinitae</i> : S. 135. 233. 262.
s. a. Sekans.	<i>infinite parva</i> : S. 263. 317.
<i>imaginaria</i> : S. 424.	<i>infinities infinitae</i> : S. 135.
<i>quadratica</i> : S. 648.	<i>maior</i> : S. 103. 263.
<i>vera</i> : S. 581. 702.	<i>minor</i> : S. 216. 263. 318.
<i>hyperboloeis</i> : N. 19*. S. 327. 422.	<i>infinitum</i> : S. 66. 83. 125. 242. 249. 265. 298. 314 f. 492. 493. 494. 542. 543. 576. 580. 582. 601. 610. 616. 634. 644. 676. 685. 689. 740. 814.
<i>apotomica</i> : S. 325.	<i>infinituplum</i> : S. 314.
<i>cubica</i> : N. 19*.	s. a. <i>subinfinityplum</i> .
<i>cubico-cubica</i> : S. 646. 649. 651.	<i>inquisitio pulcherrima</i> : S. 122.
<i>quadratica</i> : S. 355. 644. 646. 650 f.	Instrument
<i>quadrabilis</i> : S. 579.	geometrisches: S. 57.
<i>reciproca</i> : S. 649.	zum Schleifen optischer Gläser: S. 58.
<i>simplex</i> : S. 574.	zur Flächenteilung: S. 817–819.
<i>surdesolida seu quadrato-cubica</i> : S. 646. 649 f.	zur Kurvenkonstruktion (Descartes): S. 746.
Hyperboloid: S. 597.	zur Verhältnisteilung: S. 703.
Oberfläche: S. 108. 337.	zur Winkelteilung: S. 701. 703.
Volumen: S. 340. 343.	<i>instrumentum</i>
(Wren): S. 574.	<i>analyticum</i> : S. 57.
Beweis (Wallis): S. 574.	<i>meum</i> : S. 546.
s. a. Konoid.	<i>proportionum</i> : S. 819.
<i>hypotenusa orthogonii</i> : S. 144.	Integration s. Quadratur. Rektifikation. Tangentenmethode, inverse.
<i>inassignabilia</i> : N. 27*. S. 314–316. 797.	<i>intellectus humanus</i> : S. 595.
<i>inclinata</i> s. <i>hypotenusa orthogonii</i> .	<i>intersectio</i> : S. 117. 124. 336. 351. 410. 514. 663. 719 bis 722. 724. 785.
Indexschreibweise: S. 685.	<i>inventio theorematum</i> : S. 307 f.
<i>indivibile</i> : S. 57. 265. 527. 530 f. 539. 542. 569. 605. 607. 820.	
<i>commune</i> : S. 607.	
<i>repraesentans</i> : S. 610.	

- inventum universalissimum*: S. 691.  
*isoparallela*: S. 271. 300. 323.  
*corporis*: S. 199.  
Italien: S. 208.  
Kegel: N. 4\*. S. 5–7. 9 f. 12. 15. 17 f. 20. 59 f. 62. 95. 105. 107. 167. 227. 230 f. 281. 329. 570.  
Keil: S. 228. 230.  
Konstruktion: S. 57. 59.  
Oberfläche: S. 5. 9 f. 18. 58. 167. 251.  
Schwerpunkt: S. 107.  
Stumpf: S. 167.  
Volumen: S. 59 f. 107.  
Kegelschnitt: S. 5. 18. 162. 172.  
Quadratur: S. 251.  
Rektifikation: S. 252.  
s. a. *sectio conica*.  
Kegelschnitt-Linsen: S. 57. 58.  
Körper, geometrischer s. *corpus*. Hyperboloid. Kegel. Konoid. Kugel. Paraboloid. Parallelepiped. Prisma. Rotationskörper. *solidum*. Sphäroid. Torus. Zylinder. Zylinderhuf.  
Körperteilung: S. 162. 366.  
Kombination: S. 307.  
Kombinatorik: S. 596 f.  
Regel: S. 436.  
Komplanation s. Rektifikation.  
Konchoide: N. 22\*. 24\*. 26\*. S. 271. 360. 474. 479. 481. 484. 493. 514. 577 f. 585. 644. 701.  
Asymptote: S. 403. 493. 644.  
Fläche: S. 401. 439. 454. 468 f. 472–474. 479. 481.  
Moment: S. 399. 403. 430. 446 f.  
Pol: S. 415.  
Quadratur: S. 396. 401 f. 404 f. 434. 442. 455. 457 bis 459. 577 f.  
Beweis (Gregory): S. 405.  
Zusammenhang mit Hyperbelquadratur: S. 448. 479. 481.  
Zusammenhang mit Kreisquadratur: S. 402. 514.  
*retorta*: S. 271.  
Rotationskörper: S. 399. 403. 427.  
Satz, Sätze: S. 417.  
(Gregory): S. 402. 417.  
Tangente: S. 415.  
Zylinder: S. 396. 400–402. 404. 406. 443.  
s. a. *conchoeis. figura tangentium*.  
Kongruenz: S. 818.  
Definition: S. 5.  
Konoid: S. 17 f. 59 f. 107 f. 210. 229–231. 233. 251 bis 253. 271. 278. 336 f. 326. 329. 391. 427. 472. 537. 574. 597. 634. 636.  
Regel zu Oberfläche: S. 252.  
s. a. *conoeides*.  
Konstruktion  
geometrische: S. 95. 141. 191. 359. 498. 581. 627. 670–672. 702. 720.  
Methode: S. 49. 144. 223. 722. 817. 819.  
näherungsweise: S. 58. 141. 672. 721.  
s. a. *constructio. construere*. Gleichung. Kurve. *unitas constructionis*.  
Kontingenzwinkel: S. 679.  
Koordinatentransformation  
Regel: S. 519.  
Kosekans s. Sekans.  
Kosinus s. Sinus.  
Kotangens s. Tangens.  
Kreis: N. 9\*. 11\*. 12\*. 14\*. 17\*. 21\*. 22\*. 23\*. 26\*. 27\*. 32\*. 33\*. 42\*. 46\*. S. 5 f. 8. 14. 17 f. 21. 30. 57 f. 62 f. 74. 77. 90. 92. 139–142. 144. 146–150. 154. 159 f. 221 f. 225. 227 f. 230 f. 252 f. 261. 271 f. 275 f. 282. 323. 326. 329. 424. 502. 510. 530. 584. 589. 594. 622. 664. 691. 703. 715 f. 754. 781.  
Beziehung zur Hyperbel: S. 571.  
Dreieck, charakteristisches: S. 520.  
Dreiseit: S. 205. 344. 399. 401 f. 404–406. 408. 467. 481. 759.  
Moment: S. 467.  
Extremwerte: S. 571.  
Fläche: S. 473. 478. 736. 742.  
Moment: S. 95. 442. 552.  
Schwerpunkt: S. 52. 95.  
s. a. Kreisquadratur. Kreissegment. Kreissektor.  
Gleichung: S. 422. 424. 571. 652. 690. 695. 726 f. 731. 758. 788.  
Konstruktion: S. 8.  
Ordinate: N. 26\*. 46\*. S. 142. 146. 169. 324. 345. 465. 467–482. 484. 487. 492. 494. 502 f. 522. 526. 528. 546 f. 550. 564–567. 569. 577. 579.

- 582 f. 591. 679. 692 f. 695 f. 700 f. 721. 723. 734  
bis 737. 757. 769. 781. 812.  
Differenz: S. 169. 324. 494. 578. 697. 757 f.  
Moment: S. 567.  
s. a. Sinus.  
Problem  
Bestimmung der zugehörigen Parabel: S. 360.  
statische Zweiteilung eines beliebigen Flächen-  
stückes: S. 552.  
Rektifikation: S. 141. 211. 232. 252. 294. 550.  
672. 703.  
*resecta*: S. 735. 767. 781 f. 796–798.  
Rollkurve s. Zykloide.  
Subnormale: S. 584. 758.  
Tangente: S. 96 f. 190. 217. 271–273. 274–276.  
282. 286. 326. 333–335. 387. 410. 413 f. 417.  
576. 620.  
Abstände zu gegebenem Kurvenpunkt:  
S. 164 f. 174–176. 183. 190. 291 f. 386.  
s. a. Tangens. *tangens*.  
Tangentenrechnung: S. 690. 695–697. 712.  
Zone: S. 333.  
s. a. Sekans. Sinus. Tangens. Zylinder.  
Kreisbogen: S. 97. 106. 108. 138. 141. 143 f. 165.  
168. 171. 182. 184. 186. 192–194. 203. 205 f. 211  
bis 214. 217 f. 222. 227. 230. 232. 253. 272. 275 f.  
282. 286. 290. 326. 335. 345. 381. 397. 399. 492.  
622. 746. 810.  
Moment: S. 440. 442. 467–469. 472–475. 479.  
481. 484. 620.  
Schwerpunkt: S. 161. 161. 182. 227. 272. 275 f.  
294.  
Satz (Guldin): S. 272.  
s. a. Kreisumfang.  
Kreisevolvente: S. 141. 143.  
Kreismöndchen, Hippokratische  
Quadratur: S. 542.  
Kreispolygon: S. 92. 167. 171. 176. 186 f. 191 f. 218.  
225–227. 261. 346. 810.  
Sätze (Gregory): S. 92.  
Kreisquadratur: N. 33\*. 42\*. S. 99. 103. 105–108.  
172. 177. 187. 191 f. 198. 203. 232 f. 252. 304.  
338. 340. 402. 404 f. 407. 447. 455–460. 464. 503.  
509. 513. 521. 754. 780–783. 787. 791 f.
- arithmetische: S. 430. 490. 595 f. 691.  
*figura resectarum*: S. 782. 797.  
*figura segmentorum*: S. 490–494. 592 f. 723. 731  
bis 741. 767–769. 780–783. 790–792. 796 f.  
Approximation der Fläche: S. 492–494. 737  
bis 739.  
Differenzen: S. 754.  
Moment der Fläche: S. 490 f. 754. 768 f. 791.  
Reihenentwicklung: S. 749–752.  
Tangente: S. 764 f.  
geometrische: S. 141. 691.  
Konstruktion: S. 192.  
Quadratrix: S. 583.  
Satz (Archimedes): S. 165. 189. 191 f. 334.  
Zusammenhang mit Ellipsenquadratur: S. 439.  
Zusammenhang mit Hyperbelquadratur: N. 25\*.  
34\*. 40\*. 42\*. 44\*. 45\*. S. 439. 447 f. 508. 514.  
771.  
Zusammenhang mit Konchoidenquadratur:  
S. 514.  
Zusammenhang mit Parabelquadratur: S. 439.  
Zusammenhang mit Parabelrektifikation: S. 771.  
Kreisreihe  
rationale: S. 430. 490. 492–494. 566. 582. 596 f.  
Kreissegment: N. 32\*. S. 99. 112. 139. 149 f. 154 f.  
176 f. 183. 186. 191–194. 198. 202 f. 205–207.  
211. 213 f. 228. 253. 271–274. 275 f. 281. 286.  
326. 335. 344–346. 379 f. 404. 439 f. 444 f. 460.  
468 f. 474. 478. 486. 490. 492. 498. 522. 574.  
576 f. 576. 582. 596. 620–622. 673. 734. 736.  
738. 740. 769. 797 f.  
Halbkreis s. Kreissektor.  
Halbsegment: S. 107. 139. 152–155. 152. 159.  
182. 194. 196. 211. 213. 380 f. 426. 429. 445.  
552–556. 559. 569. 620.  
Moment: N. 32\*. S. 567. 569. 569.  
Satz: S. 326.  
Schwerpunkt: S. 552.  
Zylinder: S. 99. 183. 199 f. 202 f. 206 f. 272 f. 274.  
276. 281. 379 f.  
Kreissehne: N. 11\*. 21\*. S. 58. 77. 86. 165. 203.  
217 f. 222. 227. 252. 291. 425–428. 430–432. 434.  
438 f. 441. 443. 459 f. 464. 486 f. 520. 522. 524.  
527 f. 534. 555. 562. 576. 619. 727. 782. 810 f.  
Differenzen: S. 82. 147.

- Moment: S. 426 f. 428. 430. 441.  
 Zylinderhuf: S. 165.  
 Kreissektor: S. 8. 95. 141. 176 f. 183 f. 186. 191 f. 201. 213. 259. 272–277. 281 f. 285 f. 334. 468 bis 476. 478. 487. 555. 578. 622. 673. 798.  
 Fläche: S. 469. 622.  
 Halbkreis: S. 15–17. 62 f. 86. 97. 100. 103 f. 106 f. 111 f. 139. 142 f. 146–148. 150. 154. 165. 167 f. 176 f. 189. 209. 212. 218. 230. 253. 282. 344 bis 346. 379. 381–383. 399. 402. 410. 431. 434. 444. 459. 486. 520. 574–577. 622. 672. 721. 724. 734. 740.  
*ductus*: S. 383. 426.  
 Moment der Fläche: S. 439.  
 Quadrant: S. 107.  
 Schwerpunkt der Fläche: S. 100.  
 Schwerpunkt des Bogens: S. 210.  
 Konstruktion: S. 8.  
 Moment: S. 274 f.  
 Oktant  
   Zylinder des Halbsegments: S. 153.  
 Quadrant: N. 23\*. S. 12. 14 f. 18. 20. 90. 111 f. 148. 164 f. 169–171. 177. 187 f. 209 f. 212. 231. 260. 293. 344–346. 379. 399. 401 f. 404. 406. 408. 428 f. 434. 439. 444 f. 448–451. 456. 459. 539. 552 f. 567. 568 f. 578. 580. 622. 672. 696. 720. 723. 735 f. 797. 823.  
 Moment: S. 552. 569. 569.  
 Oberfläche des Keils des Halbquadranten: S. 273.  
 Zylinder: S. 152 f. 155. 188. 204. 276. 281. 400. 402 f. 439.  
 Schwerpunkt: S. 272. 276. 282.  
 Satz (Guldin): S. 272.  
 Segment: S. 153. 275.  
 Satz: S. 286.  
 Kreisumfang: N. 122\*. S. 5. 7 f. 15. 74. 77. 90. 97. 99. 101. 105 f. 108. 112. 147. 149. 165. 167 f. 171 bis 173. 175 f. 203. 209 f. 213. 216. 218 f. 225. 227. 230–232. 253. 275. 291. 293 f. 326. 329. 344. 379. 486. 522. 527. 533. 550. 728. 734 f. 737. 810.  
 Konstruktion: S. 8.  
 Moment: S. 95.  
 Kugel: S. 5 f. 10. 17. 58. 59. 106. 167. 173. 183.  
 Definition: S. 5.  
 Halbkugel: S. 10–12. 15. 18–21. 59 f. 62 f. 86. 94 f. 107. 167–170. 187. 323. 348. 397. 620.  
 Komplanationsmethode (Fabri): S. 170.  
 Konstruktion: S. 15.  
 Oberfläche: S. 21. 62. 94. 99. 167–170. 210. 293. 620.  
 Quadrant: S. 21. 107. 169 f.  
 Sätze (Fabri): S. 18 f.  
 Schwerpunkt der Oberfläche: S. 59. 62 f. 107.  
 Volumen: S. 59. 99.  
   s. a. *hemisphaera*.  
 Oberfläche: S. 59.  
 Schwerpunkt: S. 59.  
   s. a. *sphaera*.  
 Kurve: S. 6 f. 12. 70. 95. 105. 108. 117. 123. 139. 158. 160. 186. 209. 223. 323. 355. 510. 518 f. 530. 539. 549. 580. 583. 657. 664. 715. 795.  
 algebraische: S. 17. 36. 95. 140 f. 191. 256. 300. 497. 515. 582. 630. 657. 701. 703.  
 Bogen: S. 133. 140 f.  
 Moment: S. 271. 273. 334 f. 339. 360. 418. 440 bis 442. 447. 467–469. 472–475. 479. 481. 484. 500. 503 f. 508. 510 f. 519. 521–523. 537. 620.  
 Näherung durch Polygonzug: S. 58. 657.  
   s. a. Rektifikation.  
 Brennpunkt: S. 519.  
 Definition: S. 5.  
 Extremwerte: S. 75. 96. 136. 156. 221. 241. 362. 650. 679 f. 688–691. 713. 718.  
 Satz (Sluse): S. 91. 91.  
 Fläche  
   Moment: S. 277. 290. 335. 347. 427. 430. 433. 490. 552. 593. 634 f. 637. 767. 779–781. 786 f. 791. 824.  
 Zerlegung in Trapeze: S. 16. 58. 109. 619. 651. 657.  
   s. a. Quadratur.  
 Gleichung: S. 16–18. 70 f. 140 f. 191–194. 199. 256. 300. 367. 584 f. 606. 622. 657. 664 f. 707. 819.  
 höhere: S. 701.  
 Konstruktion: S. 5–7. 223. 498. 539. 582. 594. 627. 701. 722. 785. 815.

Methode: S. 529.	Lehre s. <i>doctrina</i> . Reihe, Reihenlehre.
Krümmungsverhalten: S. 733.	<i>lemma pulcherrimum</i> : S. 512.
Wendepunkt: S. 733.	<i>lex progressionis</i> : S. 241.
Ordinate: S. 13. 598. 602.	<i>linea</i>
Differenz: S. 660. 667. 678. 689. 704–708. 710. 712. 764. 800. 821.	<i>assignabilis</i> : S. 491. 567. 665 f. 671. 676. <i>curva</i> : S. 6 f. 12. 108. 117. 160. 186. 209. 223. 510. 518 f. 530. 549. 580. 583. 657. 715. 795.
Moment der Differenzen: S. 308. 428. 436. 445. 458. 463. 705.	<i>cycloidalis</i> : S. 345.
Regel: S. 598.	<i>duorum, trium punctorum</i> : S. 263.
quadrierbare: S. 479. 483 f. 499. 513–515. 538. 597. 601 f. 611. 614. 634. 754. 795. 805. 821.	<i>epicyclica</i> : S. 440.
rektilizierbare: S. 515. 530. 539.	<i>evolutione descripta</i> : S. 31. 223. 359.
Satz über Schnittsegmente: S. 99.	<i>finita</i> : S. 665 f.
Sehne: S. 505.	<i>homogenea</i> : S. 795.
transzendent: S. 141. 227. 498. 672. 720 f.	<i>imaginaria</i> : S. 298.
s. a. <i>curva. figura</i> . Kurve, spezielle. <i>linea</i> . Normale. Schwerpunkt. Sekante. Subnormale. Subtangente. Tangente.	<i>inassignabilis</i> : S. 299. 314 f. 666. 671.
Kurve, spezielle s. Bertetsche Kurve. Ellipse. Epizykloide. Hyperbel. Hyperbel, höhere. Kegelschnitt. Konchoide. Kreis. Kreisevolvente. Logarithmus. Oval. Parabel. Parabel, höhere. Quadratrix. Schraubenlinie. Sekans. Sinus. Spirale. Tangens. Zissoide. Zyklide.	<i>infinite minor puncto</i> : S. 298.
<i>latitudo infinite parva</i> : S. 73. 169. 568. 651. 738.	<i>infinite minor recta</i> : S. 298.
<i>latus, semilatus</i>	<i>infinite parva</i> : S. 74. 339.
<i>assignabile</i> : S. 597.	<i>intersectionis communis</i> : S. 720.
<i>erectum</i> : S. 139. 144.	<i>mechanica</i> : S. 672.
s. a. <i>axis</i> .	<i>motus</i>
<i>homologum</i> : S. 63. 310. 349. 410. 413. 735.	Definition: S. 6.
<i>horizontale</i> : S. 139. 144.	<i>non geometrica</i> : S. 227.
s. a. <i>basis</i> .	<i>quadrabilis</i> : S. 795.
<i>inassignabile</i> : S. 315. 663.	<i>recta</i> : S. 5–7. 36. 97. 186. 340. 343.
<i>infinite parvum</i> : S. 597. 619. 651 f.	<i>semicycloidalis</i> : S. 73 f.
<i>minimum</i> : S. 218. 220 f.	<i>sinuum</i> : S. 16. 21.
<i>orthogonium</i> : S. 144 f. 465. 710.	<i>uniuers puncti</i> : S. 263.
s. a. <i>axis. basis</i> .	s. a. <i>curva. figura</i> .
<i>rectum</i> : S. 32. 50. 158. 506. 508. 519. 536–538. 574. 584 f. 587. 589. 606. 608. 623. 627. 634. 652. 659. 690. 694. 726. 755. 759. 773. 778. 784. 814.	<i>locorum</i> : S. 656.
Definition: S. 608.	<i>parabolicus</i> : S. 192. 784.
<i>transversum</i> : S. 50. 506–508. 572. 584 f. 587. 589. 690. 694. 726. 759. 773.	<i>planus</i> : S. 718.
	<i>solidus</i> : S. 192. 718 f. 720.
	<i>logarithmus</i> : S. 33. 49 f. 301 f. 304. 308. 326–328. 546 f. 548 f. 581. 622. 636. 670. 672. 702. 720.
	<i>denarii</i> : S. 547.
	<i>logarithmorum</i> : S. 765.
	Logarithmus: S. 33. 49 f. 298–304. 308–319. 325 bis 328. 337. 347. 546 f. 548 f. 581. 622. 636. 670. 672. 702. 720. 735. 765.
	dekadischer: S. 547.

Differenz: S. 33. 49.	<i>rectae</i> : S. 58.
Extremwerte: S. 298–302. 308–310. 313–318. 327. 347.	<i>seu punctum</i> : S. 85. 96. 688.
Fläche: S. 327. 347.	<i>mirabile</i> : S. 199. 435. 520. 631. 678f.
Moment: S. 347.	s. a. <i>res</i> .
Schwerpunkt: S. 303.	<i>miraculum continuui seu infiniti</i> : S. 83.
Konstruktion: S. 326.	Mittel
geometrische: S. 581. 670. 672. 702. 720.	geometrisches: S. 92.
Methode (Mercator): S. 49.	harmonisches: S. 92.
Ordinate: S. 327.	<i>mixtilineum</i> : S. 61f. 346.
Differenz: S. 298–303. 308.	s. a. <i>figura</i> .
Moment der Differenzen: S. 308.	<i>moles numeri</i> : S. 49.
Problemstellung (Mersenne): S. 51. 51. 549.	Moment: N. 19*. S. 115. 119f. 231. 271–277. 274. 290f. 308. 334–340. 347f. 351. 353f. 357. 360. 370–372. 372. 374f. 374. 383. 385. 389. 396. 398f. 401–405. 407f. 418. 428. 433. 441. 500. 510f. 514. 519. 551. 634f. 779. 780–783. 786f. 824.
Quadratur: S. 298–303. 308f. 337.	Regel: S. 103. 115. 119. 245.
Tafel: S. 229. 546f. 765.	Sätze: S. 120. 126.
Tangente: S. 303	(Pascal): S. 119f. 123f. 126.
s. a. <i>figura logarithmica. figura proportionalium.</i> <i>figura proportionum. logarithmus</i> .	s. a. <i>figura isostatica. momentum. Quadratur-</i> <i>methode. Schwerpunkt</i> .
<i>lunula</i> : S. 191.	<i>momentum</i>
<i>hippocratica</i> : S. 542.	<i>gravitatis</i> : S. 37.
<i>machina</i> : S. 30.	<i>oscillationis</i> : S. 37.
<i>magnitudo</i>	<i>motor</i> : S. 810.
<i>assignabilis</i> : S. 622.	<i>motus</i>
<i>inassignabilis</i> : S. 313.	<i>aequalis</i> : S. 7f. 17.
<i>infinite parva</i> : S. 692.	<i>circularis</i> : S. 8.
Maxima s. Kurve, Extremwerte.	<i>compositus</i> : S. 329.
<i>mechanica</i> : S. 256. 701.	<i>continuus</i> : S. 95. 630.
<i>mensura</i> : S. 49 f. 131. 211. 234. 338. 398. 702f. 718. 736. 740. 782.	<i>obliquus</i> : S. 7. 9.
<i>mesolabum</i> : S. 141. 497. 550.	<i>projectorum</i> : S. 815.
Methode s. Algebra, Beweismethode. Beweis.	<i>rectus</i> : S. 6f. 9. 14. 89.
Bogenteilung. Evolvente, Quadraturmethode.	Multiplikation
Geometrie. Hydraulik. Konstruktion. Normale.	fortgesetzte: S. 324.
Problem, Lösungsmethoden. Quadraturme-	geometrischer Größen: S. 300.
thode. Rektifikation. Schwerpunkt, Berech-	s. a. <i>ductio. ductus</i> .
nungsmethode. Tangentenmethode, inverse.	mit Größen < 1: S. 275.
Tangentenmethoden. Wurzelziehen.	<i>multitudo</i> : S. 607.
Minima s. Kurve, Extremwerte.	<i>mysteria (abditissima essentiae rerum)</i> : S. 315.
<i>minima</i>	Näherung: S. 58. 176. 255. 430. 494. 546. 582. 595f. 686f. 691f. 717. 720f. 740f. 769. 804–807.
<i>curvae</i> : S. 221.	<i>natura infiniti</i> : S. 249. 644.
<i>figurae</i> : S. 221.	
<i>minimis minima</i> : S. 221.	
<i>minimum</i>	
<i>hyperbolicum</i> : S. 58.	

- norma*: S. 415. 417 f. 420. 816.  
*Normale*: S. 509–514. 518 f. 543. 585 f. 585. 598.  
   622. 662. 666 f. 712–718. 823.  
*Normalenmethode*: S. 63.  
   s. a. Tangentenmethoden.  
*Null*: S. 105. 121. 126–129. 245. 318.  
*nummerus*  
   *affirmatus*: S. 49.  
   *arithmeticae progressionis*: S. 147.  
   *cubicus, cubus*: S. 632–634. 648.  
   *finitus*: S. 242. 262. 265. 316. 493. 660. 737.  
   *fractus*: S. 611. 625. 627.  
   *harmonicus*: S. 327.  
   *impar*: S. 238. 625.  
   *infinities infinitus*: S. 135. 233. 262 f. 317.  
   *infinitus*: S. 82. 245. 262. 265. 607. 659 f. 737 f.  
   740.  
   *integer*: S. 611. 625. 627.  
   *logarithmicus*: S. 765.  
   *naturalis*: S. 133–135. 236. 241. 247. 249 f. 259.  
   273 f. 290. 323. 327. 546. 633 f. 765. 812.  
   *par*: S. 625.  
   *progressionis arithmeticæ*: S. 80. 328.  
   *progressionis geometricæ*: S. 290. 310. 318.  
   *progressionis harmonicae*: S. 323.  
   *pyramidalis*: S. 133 f. 236. 632. 634.  
   *quadrato-quadraticus, quadrato-quadratus*:  
   S. 633.  
   *quadratus*: S. 80. 134. 137. 146 f. 294–296. 327.  
   632 f. 648.  
   *rationalis*: S. 430. 490. 492. 566. 582. 596. 691 f.  
   734. 738. 740.  
   *surdus*: S. 294. 611. 625. 627.  
   *triangularis*: S. 133–135. 235 f. 246 f. 249 f. 632.  
   634. 789.
- Oberfläche s. *superficies*.  
*observatio*  
   *memorabilis*: S. 684.  
   *mirabilis*: S. 127. 656.  
   *principalis*: S. 637.  
   *utilis*: S. 579.  
*octans*: S. 148. 152–155. 346.  
   s. a. *triangulum*.
- Örter, geometrische: S. 140 f. 192. 218. 296. 504.  
   509. 519. 525. 541. 543. 550. 584. 586 f. 589.  
   594. 599. 644. 656. 663 f. 674. 677 f. 683. 694  
   bis 696. 700. 718–720. 724. 741. 744–746. 779.  
   784 f. 819 f. 824.  
   s. a. *locus*.  
*officium facere*: S. 496.  
*Optik*: S. 57. 703. 815.  
   s. a. Instrument. Kegelschnitt-Linsen.  
*orthogonium*: S. 144 f. 465.  
   *convexum*: N. 20\*.  
   Schwerpunkt: S. 371.  
   *planum*: S. 145.  
   *solidum*: S. 139.  
   s. a. *figura. latus. planum. triangulum. trilinum*.  
*oscillatio*: S. 30 f. 37. 96. 145. 209.  
*Oval*: S. 622.  
   Quadrant: S. 539.  
*Parabel*: N. 391\*. S. 5–7. 11–15. 18. 20. 31 f. 36. 58.  
   60–65. 89 f. 95. 101. 105. 148. 157 f. 172 f. 192  
   bis 194. 223. 231. 233. 237. 238. 240. 245 f. 271.  
   290. 293. 325. 333. 337. 348. 355–357. 359 f. 363.  
   377. 381–384. 426–430. 439. 479. 458. 492. 498.  
   519–522. 527–529. 536 f. 541. 550. 572. 574. 592.  
   600–604. 610 f. 613. 648. 650. 659 f. 662. 664 f.  
   671. 675 f. 679. 688–691. 693–695. 703. 725. 726.  
   744. 746. 755 f. 762. 763. 771. 779. 784. 796. 805.  
   820 f.  
*Bogen*: S. 61 f. 95. 105 f. 107 f. 172. 211. 229–232.  
   252. 336. 536. 622. 703.  
*Bogenelement*: S. 704 f. 704.  
*Moment*: S. 353. 537.  
*Schwerpunkt*: S. 105. 107 f. 230 f. 252. 333. 342.  
   574.  
*Dreiseit*: S. 10 f. 13. 20. 216. 233. 237. 238. 324.  
   327. 336. 355–357. 479–481. 626. 772.  
*Schwerpunkt*: S. 333. 352–354.  
*ductus*: S. 383. 391. 426.  
*Eigenschaft*: S. 36.  
*Evolute*  
   Satz (Huygens): S. 31 f.  
*Evolente*: S. 143.  
*Extremwerte*: S. 216. 233. 238. 356 f. 676. 688 f.  
*figura sinuum*: S. 671.

- Fläche: S. 231. 251.  
 Moment: S. 383. 426 f. 430. 514.  
 Schwerpunkt: S. 60 f. 231. 233. 251. 290 f. 336. 352–354. 356. 430.  
 Gleichung: S. 192. 572. 610. 624–626. 628. 632. 694.  
 Keil: S. 231.  
 Konstruktion: S. 5–7. 193. 360.  
 als Evolente: S. 31 f.  
 Ordinate: S. 13. 64. 90. 193 f. 233. 237. 238. 240. 245. 292. 323 f. 327. 348. 357. 363. 377. 381 f. 428 f. 458. 479. 521. 528. 537. 602 f. 676. 688. 701. 744. 762. 820.  
 Differenz: S. 251. 327. 674–676. 680. 689. 755 f. 771 f.  
 Problem  
 Bestimmung des zugehörigen Kreises: S. 360.  
 Quadratur: N. 39<sub>1</sub>\*. S. 58. 107. 172. 237. 245. 432. 691. 796.  
 Zusammenhang mit Kreisquadratur: S. 439.  
 Rektifikation: S. 95. 105–108. 172. 231 f. 252. 439. 538.  
 Zusammenhang mit Hyperbelquadratur: S. 539. 574. 703. 770 f.  
 Zusammenhang mit Kreisquadratur: S. 771.  
 Rollkurve: S. 144. 519.  
 Rotationskörper s. Paraboloid.  
 Sätze  
 (Archimedes): S. 336 f.  
 (Torricelli): S. 336 f.  
 Sehne: S. 251.  
 Subtangente: S. 610. 622 f. 659–663. 675. 688 f. 693.  
 Differenz: S. 665.  
 Tangente: S. 157 f. 325. 536.  
 Abstände zu gegebenem Kurvenpunkt: S. 64 bis 68. 157 f.  
 Tangentenrechnung: S. 659 f. 688. 693. 695. 805.  
 Torus: S. 277 f. 574.  
 Quadratur: S. 277 f.  
 Zylinder: S. 229–231. 325. 357. 601.  
 Oberfläche: S. 229 f.  
 Volumen: S. 231.  
 Zylinderrhuf: S. 229–231. 290. 325. 330.
- Oberfläche: S. 229 f.  
 Sätze (Saint-Vincent): S. 325. 329 f. 329.  
 Schwerpunkt der Oberfläche: S. 333.  
 s. a. *parabola*. *quasi parabola*.  
 Parabel, höhere: N. 37\*. 38\*. S. 13. 31. 105. 158 f. 278. 325. 337. 348. 355. 367. 422. 487. 505. 513. 519. 531. 574. 622–642. 644–650. 665. 678 f. 700. 805. 821.  
 Bogen: S. 105.  
 Schwerpunkt: S. 105. 333.  
 Dreiseit: S. 637 f. 640.  
 einfache: S. 574. 604. 606. 624. 632. 637. 647.  
 Extremwerte: S. 641.  
 fast einfache: S. 638.  
 Fläche  
 Moment: S. 600. 604–606. 634. 636.  
 Schwerpunkt: S. 634. 636 f.  
 Gleichung: S. 606. 608.  
 Regel: S. 649.  
 kubische: S. 325. 333. 604. 624. 629. 633. 637 f. 647. 649.  
 Gleichung: S. 599 f. 604. 624. 626. 628. 632. 647.  
 Moment der Fläche: S. 600. 637 f.  
 Ordinate: S. 599. 762.  
 Quadratur: S. 600. 604.  
 Tangentenrechnung: S. 700.  
 Zylinder: S. 603.  
 Normale: S. 602. 621.  
 Quadratur: N. 37\*. 38\*. 39<sub>1</sub>\*. S. 10 f. 105. 487. 574. 805. 821.  
 Beweis (Cavalieri): S. 11.  
 Methode: S. 604. 640.  
 Sätze: S. 638–641.  
 Rektifikation: S. 105. 158 f. 337.  
 Rotationskörper s. Paraboloid.  
 semikubische (Heuraetsche): S. 278. 603. 603. 624. 636.  
 Gleichung: S. 604. 624. 626. 628. 633. 636. 648 f.  
 Moment der Fläche: S. 604 f. 636.  
 Oberfläche des Torus: S. 278.  
 Quadratur: S. 605. 633.  
 Subnormale: S. 762.  
 Subtangente: S. 592. 622 f. 625–627. 630 f. 634.

- Differenz: S. 665.  
 Tafel: S. 609. 623–625. 627–629. 644.  
 Tangentenrechnung: S. 610. 677.  
 völlig einfache: S. 638.  
 zusammengesetzte: S. 603 f. 606. 608. 633.  
 Zylinder: S. 367.  
 s. a. *parabola. paraboloeis.*
- parabola*  
*circularis*: S. 458.  
*communis*: S. 610 f. 623. 624. 629. 631. 638. 648.  
 650.  
*convoluta*: S. 574.  
*cubica*: S. 325. 599. 603. 603. 633. 637.  
*composita*: S. 633.  
*cubico-cubica quadrato-quadratiformis*: S. 635.  
*quadratica*: S. 333. 624. 626. 632 f. 648.  
*quadrato-quadratica*: S. 633.  
*cubiformis*: S. 633.  
*quadratiformis*: S. 633.  
*simplex*: S. 633.  
*quadrato-cubica*: S. 603.  
*simplex*: S. 13. 325.
- paraboloeis*  
*composita*: S. 604. 606. 608. 633.  
*cubica*: S. 604. 624. 629. 633. 637 f. 647. 649.  
*quadratiformis*: S. 624.  
*cubico-cubica*: S. 624 f. 629. 635. 638.  
*quadratica*: S. 604. 629. 633.  
*pene simplex*: S. 638.  
*plana*: S. 606.  
*plane simplex*: S. 638  
*quadrato-quadratica*: S. 624 f. 629. 633. 636–638.  
 645. 649 f.  
*simplex*: S. 574. 604. 606. 624. 632. 637 f. 647.  
*surdesolida*: S. 624 f. 629. 639 f.
- Paraboloid: S. 12. 17 f. 59 f. 107 f. 210. 229–231.  
 233. 251. 336 f. 352 f. 356 f. 574. 634. 636.  
 Oberfläche: S. 59. 107 f. 229–231. 251. 337. 537.  
 574.  
 Satz (Gregory): S. 325.  
 Schwerpunkt: S. 59. 233.  
 Spindel: S. 60 f. 108. 210. 336.  
 Volumen: S. 231.  
 s. a. *clepsydra parabolica. conoideos.*
- paradoxum*: S. 180. 262. 317. 434.  
*Parallelepiped*: S. 637. 746.  
 Konstruktion: S. 7.  
*Parallelogramm*: S. 7.  
*paralogismus*: S. 170. 173. 179. 284. 316.  
*parameter*: S. 519. 604. 606. 608. 779.  
 s. a. *latus rectum.*
- pars, partes*  
*commensurabiles*: S. 128.  
*finita*: S. 494. 645.  
*geometrice designabiles*: S. 691.  
*inassignabilis*: S. 299. 308. 310. 434. 469. 513.  
*incommensurabiles*: S. 128.  
*indefinitae*: S. 358 f.  
*infinita*: S. 645.  
*infinite parva*: S. 619. 657.  
*infinitesima*: S. 356. 607.  
*irrationales*: S. 701.  
*minima*: S. 128. 143. 216. 221. 227. 233. 280.  
 285. 515.  
*minimies minimae*: S. 216.  
*minores assignabilibus*: S. 179.  
*qualibet recta data minores*: S. 251.
- particula minima*: S. 209.
- Pendelbewegung  
 Satz (Huygens): S. 37.  
 s. a. Schwingungsmittelpunkt.
- Pendeluhr: S. 28–30. 30. 145.
- pendulum*: S. 30. 37.
- pentagonum*: S. 548. 691.
- perfectio geometriae*: S. 596.
- peripheria similis*: S. 332.
- pes*  
*horarius*: S. 30.  
*Parisinus*: S. 30.
- planisphaerium nauticum*: S. 338.
- plano-planum*: S. 137.
- planum*  
*centrobarycum*: S. 95.  
*comprimens*: S. 169.  
*ellipseos*: S. 228.  
*homogeneum*: S. 639.  
*hyperboliforme*: S. 385.  
*orthogonium*: S. 145 f.  
*polygonum*: S. 167.

Pneumatik: S. 105.	<i>problema, problemata</i>
<i>polyedra</i> : S. 63.	<i>ad superficiem</i> : S. 720.
<i>polygonum</i> : S. 63. 167. 176. 218. 225–227. 543. 651. 681. 807.	<i>altioris gradus</i> : S. 141.
<i>circulare</i> : S. 176. 226 f.	<i>admirabile</i> : S. 817.
<i>ellipticum</i> : S. 226 f.	<i>definitum</i> : S. 363.
<i>infinitangulum</i> : S. 810.	<i>lineare</i> : S. 721.
<i>irregularē</i> : S. 191. 619. 651.	<i>maximum</i> : S. 692.
<i>laterum infinitorum</i> : S. 63.	<i>planum</i> : S. 340. 352. 542. 594.
<i>regulare</i> : S. 63. 92. 166. 191. 261.	<i>solidum</i> : S. 192. 542.
s. a. <i>corpus. peripheria</i> .	<i>superficiarium</i> : S. 721.
<i>portio</i>	<i>producta</i> : S. 586. 586. 621–623. 625–627. 630 f. 634. 650–652. 657. 663. 666. 669. 674. 680. 689. 693. 706–708. 712. 800. 802. 804 f. 822.
<i>finita</i> : S. 645.	<i>productum</i>
<i>inassignabilis</i> : S. 502.	<i>homogeneum</i> : S. 52–54.
<i>infinita</i> : S. 644 f.	Definition (Ricci): S. 53.
<i>infinite parva</i> : S. 181. 502. 513. 576. 619.	<i>simile</i> : S. 52–54.
<i>minima</i> : S. 215. 226. 502.	Definition (Ricci): S. 52.
<i>portiuncula</i> : S. 659.	Satz (Ricci): S. 53 f.
<i>principium certum</i> : S. 204. 204.	<i>progressio</i>
Prisma: S. 7 f. 11 f. 139. 145 f. 169. 236. 278. 356 f. 381 f. 429. 445. 447. 449. 635. 702 f. 746.	<i>arithmetica</i> : S. 80. 147. 261. 325. 328. 379. 394. 397. 537. 576. 591. 634. 645. 678. 684. 726. 731. 739.
Konstruktion: S. 7 f.	<i>geometrica</i> : S. 261. 290. 303. 310 f. 318. 325. 379. 494.
Oberfläche: S. 330.	<i>harmonica</i> : S. 261. 308. 323 f. 355. 432. 493. 762.
Volumen: S. 330.	<i>hyperboliformis</i> : S. 432.
s. a. <i>prisma</i> .	<i>quadrabilis</i> : S. 614.
<i>prisma</i>	<i>subdupla</i> : S. 261. 318.
<i>aequiponderans</i> : S. 702.	<i>surdorum</i> : S. 151.
<i>fulcri</i> : S. 276.	<i>proprio</i> , <i>propotiones</i>
<i>homogeneum</i> : S. 330.	<i>arithmetica</i> : S. 73. 487. 811.
<i>solidum</i> : S. 169.	<i>heterogeneorum</i> : S. 221.
<i>triangulare</i> : S. 381.	<i>proportional</i>
Problem, Probleme	<i>arithmetisch</i> : S. 260. 262. 280. 287. 304. 307 f. 487. 498. 574. 581. 702. 720. 811.
bestimmtes: S. 626.	<i>geometrisch</i> : S. 261. 298. 581.
geometrisches: N. 512*. S. 316.	<i>harmonisch</i> : S. 260 f. 270 f. 287.
Klassen: S. 594.	<i>logarithmisch</i> : S. 298.
höheren Grades: S. 141.	<i>Proportionale</i>
lösbares: S. 192. 594 f. 597.	<i>mittlere</i> : S. 14. 89 f. 155. 157. 166. 170–172. 188. 195. 259. 273. 276. 298–300. 303. 318. 347. 389. 391. 441. 447 f. 453. 458. 461. 478. 497. 507. 582. 596. 598. 702. 746. 769. 784. 823.
gelöstes (Descartes): S. 307 f.	
Lösungsmethoden: S. 306–308. 351.	
unbestimmtes: S. 342. 362.	
unlösbares: S. 594 f. 597.	
s. a. Dreieck. Forschungsprobleme. Geometrie. Kreis. Logarithmus, Problemstellung. Parallel. <i>problema</i> . Tangentenmethode, inverse. Zahlentheorie. Zykloide, Problemstellung.	

- vierte: S. 455.
- propositio*
- admiranda*: S. 597.
  - fundamentalis*: S. 123 f.
  - incerta*: S. 52.
  - memorabilis*: S. 96. 417.
  - nostra*: S. 345.
  - subtilissima*: S. 104.
  - universalissima*: S. 104. 334.
- provolutio*: S. 77.
- punctum*
- aequilibrii*: S. 113. 115–117. 119. 122–126. 131 bis 133. 137. 162. 238 f. 241. 244.
  - concursus*: S. 117. 343.
  - contactus*: S. 96. 100. 143. 145. 175. 441. 502. 512. 619 f. 644. 811.
  - divisionis*: S. 115 f. 136. 220. 227. 238. 244. 310. 568. 576. 619. 737. 818.
  - intersectionis*: S. 117. 410. 663. 720.
  - seu infinitesima linea*: S. 494.
  - seu figura areae inassignabilis*: S. 332.
  - seu linea inassignabilis*: S. 299. 314 f.
  - seu nihilum*: S. 85.
  - seu nullius considerationis*: S. 82.
  - seu quadratillum*: S. 242. 263.
  - seu quantitas inassignabilis*: S. 313.
  - seu rectangulum sub lateribus inassignabilibus*: S. 315.
  - suspensionis*: S. 93. 119.
  - s. a. *minimum*.
- Punkte, geometrische
- Vergleich mit Zahlen in der Arithmetik: S. 660.
  - s. a. *punctum*.
- pyramis*: S. 10–12. 135. 236. 246. 356. 374. 460. 507. 691.
- quadrans genitor*: S. 399. 401.
- Quadrat
- Konstruktion: S. 7.
- quadratillum*
- infinite parvum*: S. 262.
  - infinitesimum*: S. 381.
- Quadratrix (Dinostratus): S. 17. 498.
- Quadratrix (Stammfunktion): S. 497 f. 569. 583. 712. 719.
- s. a. *figura geometrica*. Kreisquadratur.
- Quadratur: S. 122. 191. 277. 308. 323.
- analytisch-synthetische: S. 614.
  - arithmetische: S. 595–597. 691 f.
  - Definition: S. 597. 691.
  - geometrische: S. 691 f.
  - näherungsweise: S. 691 f.
  - Definition: S. 691.
  - Regel: S. 513. 638.
  - Satz, Sätze: S. 323. 821.
  - Zusammenhang mit Reihensummation: S. 805.
  - s. a. *quadratura*. Quadraturmethode. *tetragonismus*.
- quadratura*
- absoluta*: S. 442. 496.
  - arithmetica*: S. 595–597. 691 f.
  - curvae*: S. 106. 172.
  - geometrica*: S. 691.
  - mechanica*: S. 691.
  - seu dimensio arcus*: S. 522.
- Quadraturmethode: S. 183. 354. 499 f. 515. 542 f. 597. 610. 614. 621. 641. 691 f. 795.
- ein- und umbeschriebene Polygone: S. 542.
  - Indivisibilienmethode: N. 4\*. S. 135. 140. 265. 278. 530 f. 539. 542. 820.
  - (Cavalieri): S. 4. 11.
  - Näherungsmethode: S. 323. 807.
  - Schwerpunktmethode: N. 9\*. 10<sub>1</sub>\*. 17\*. 19\*.
  - 48\*. S. 59–64.
  - Regel: S. 325.
- Transformation: S. 495–497. 720.
- Transformationsklassen (Fabri): S. 7–17. 89.
  - s. a. Dreieck, charakteristisches. Transmutationssatz.
- Zusammenhang mit Differenzenmethode:
- N. 40\*. S. 323–328.
- quadrilaterum aequilaterum*: S. 413.
- quantitas, quantitates*
- affecta*: S. 284.
  - assignabilis*: S. 797.
  - commensurabiles*: S. 191.
  - continua*: S. 5. 93.
  - finita*: S. 265. 314. 737.
  - genetrix, genitrix*: S. 6. 10 f.

- harmonice proportionales*: S. 261.  
*imaginaria*: S. 93.  
*inassignabilis*: S. 313. 316 f.  
*infinita*: S. 314. 737.  
*infinite parva*: S. 317.  
*intelligibilis*: S. 6.  
*minor quavis data*: S. 263.  
*quadrabilis*: S. 451.  
*rationalis*: S. 738.  
*sensibilis*: S. 265.  
*quantum*: S. 275.  
*quasi parabola*: S. 329.  
*quasi triangulum*: S. 329.  
Quotientenfolge: S. 320.  
Quotientenschema: S. 289.
- radix*  
*falsa*: S. 424.  
*surda*: S. 146. 557. 595. 614. 633.  
*surdesolida*: S. 635.
- rarefactio*: S. 105.
- ratio*  
*admirabilis (demonstrandi quadraturam circuli)*: S. 727.  
*arithmetica*: S. 260. 571. 684.  
*composita*: S. 36. 60. 106. 115. 216. 231. 318. 340. 354. 357.  
*finita*: S. 265. 318.  
*humana*: S. 308.  
*inaudita hactenus*: S. 57.  
*infinita*: S. 265. 298.  
*infinite parva*: S. 298. 318.  
*inversa*: S. 146.  
*pura*: S. 607.  
*recta*: S. 298.  
*subinfinityula*: S. 299.  
*vera ac praeclara (summae inveniendae)*: S. 250.
- ratiuncula*: S. 48. 298. 327.  
Definition: S. 298.  
*minima*: S. 298.
- Raute s. Rhombus.
- Rechteck  
Konstruktion: S. 7.
- Moment: S. 371 f. 374 f. 556. 558. 569. 635. 637. 824.  
s. a. *rectangulum*.
- recta*  
*assignabilis*: S. 513. 619.  
*infinite parva*: S. 298. 651. 657. 660. 810.  
*inassignabilis*: S. 318.  
*librationis*: S. 275 f.  
s. a. *linea recta*.
- rectangulum*  
*isoparallelum*: S. 492. 705. 759.  
*planum*: S. 746.  
*solidum*: S. 300. 746.
- reducta*: S. 584. 586. 589. 657. 663 f. 666 f. 707. 710. 722. 762. 799.
- reductio geometrica*: S. 271.
- Reihe  
alternierende: S. 717.  
endliche: S. 633. 717.  
Reihendarstellung einer Oberfläche: S. 607.  
Reihenlehre: S. 147. 719.  
Unvollkommenheit: S. 596.
- Reihenmultiplikation: S. 244. 250. 286.
- Summation: S. 80 f. 86 f. 151. 235 f. 246. 248–251. 259. 261. 287. 298–300. 304. 310–314. 318. 323. 327. 347. 400. 422.
- Regel: S. 80 f. 603.  
Satz, Sätze: S. 120–122. 186. 189.  
Zusammenhang mit Kurvenquadratur: S. 805.
- summierbare: S. 64. 356. 530 f. 614.
- Umqordnung: S. 249 f.
- unendliche: S. 186. 259. 356. 422. 430. 490. 492. 542. 546. 566. 596 f. 607. 614. 633. 691 f. 717. 734. 738. 740. 805.
- s. a. Differenzenfolge. Folge. *progressio. series. summa*.
- Reihe, spezielle  
arithmetische: S. 163. 236. 249–251. 259. 546. 717.
- Dreieckszahlen: S. 235 f. 246. 249 f. 287. 632.
- Fakultäten, reziproke: S. 676.
- geometrische: S. 261. 310 f. 318. 546.
- gerade Zahlen: S. 259.
- harmonische: S. 50. 260 f. 264–267. 287. 327. 337 f.
- Kubikwurzeln: S. 634.

- Kubikzahlen: S. 250 f.  
 logarithmische: S. 51.  
 natürliche Zahlen: S. 250.  
 Potenzen, höhere: S. 633.  
 Pyramidalzahlen: S. 632.  
 Quadratwurzeln: S. 151. 253–255. 258 f. 634.  
     Näherungsmethode für Summation: S. 254 f.  
 Quadratzahlen: S. 80 f. 235 f. 246. 248 f. 251. 259.  
     304. 327.  
 Wurzeln, höhere: S. 633 f.  

$$\sum_{k=2}^n k(k-1), \sum_{k=3}^n k(k-2) \text{ usw.: S. 248.}$$

$$\sum_{k=1}^n \frac{n-k+1}{k}: S. 267. 287.$$
 s. a. Folge, spezielle.  
 Reihenentwicklung  
     durch fortgesetzte Division: S. 50 f. 422 f. 493.  
     595.  
 Rektifikation: S. 106. 172. 227 f. 333 f. 337. 347. 511.  
     514. 515. 519. 522. 530. 539. 595. 620. 720 f.  
 Methode: S. 221. 338. 509. 511.  
     (Heuraet): S. 595. 795.  
     s. a. Quadraturmethode.  
*repraesentare*: S. 102. 127. 162. 222. 245. 275. 316.  
     691. 737.  
*repraesentatio optica*: S. 815.  
*res*  
     *admirabilis*: S. 426.  
     *memorabilis*: S. 699.  
     *mira*: S. 597.  
*rescissa*: S. 707 f. 785. 797.  
*resecta*: S. 767.  
     *a spatio hyperbolico*: S. 355.  
     *circuli*: S. 782. 796–798.  
     *hyperbolae*: N. 47\*. S. 792. 799.  
*resolutio aequationum*: S. 546. 692.  
*retorta*: S. 211–213. 271. 344–346.  
     Definition: S. 211.  
*revolutio*: S. 59 f. 162. 167. 171. 187. 209. 230 f. 251.  
     275. 277 f. 303. 325. 328 f. 335 f. 347 f. 352–357.  
     398 f. 403. 427. 509. 514. 552. 597. 634. 636. 702.  
     782. 812.  
     *rhomboeides*: S. 7. 346.  
     Rhombus: S. 7. 412.  
     Rollkurve: N. 29\*. S. 143 f. 539. 782.  
     Quadratur  
         Regel: S. 519.  
         s. a. Ellipse. Hyperbel. Parabel. *trochoeis*. Zyklide.  
*rota*: S. 17. 30. 519.  
     *horologii*: S. 30.  
*ratio*: S. 277. 333.  
     *super axem*: S. 138.  
     *super basin*: S. 138.  
 Rotationskörper: S. 162. 171. 187. 209. 230 f. 251.  
     275. 278. 303. 325. 328 f. 333. 335 f. 347 f. 352  
     bis 357. 398 f. 403. 427. 514. 597. 634. 636. 702.  
     812.  
     Oberfläche: S. 231. 509.  
     Regel: S. 597.  
     Satz (Cavalieri): S. 60.  
     s. a. Hyperboloid. Kegel. Konoid. Kugel. Paraboloid. *revolutio*. *ratio*. Sphäroid. Torus. Zylinder.  
*sagitta*: S. 259 f. 386. 439. 452. 465.  
 Satz, Sätze  
     Erfindung: S. 307.  
     s. a. *lemma*. *propositio*. *theorema*.  
 Schraubenlinie: S. 583.  
 Schweden: S. 549.  
 Schwerpunkt: N. 9\*. 17\*. S. 6. 37. 52. 59–64. 115  
     bis 117. 119. 122–126. 131–133. 137 f. 146. 156.  
     160. 162. 179. 182. 204. 209 f. 227. 230–233.  
     238 f. 241. 244. 251–253. 272 f. 275 f. 278. 282.  
     290 f. 293 f. 303. 308. 323. 325 f. 366. 370–373.  
     375. 403. 430. 433. 488. 514. 519. 552. 574. 600 f.  
     605. 634 f. 636 f. 702. 720. 767. 779.  
 Berechnungsmethode: S. 132. 209. 239.  
 Definition: S. 93.  
     (Pascal): S. 132 f.  
 Regel: S. 244.  
 Satz, Sätze: S. 104. 308. 325.  
     (Guldin): S. 59–64. 106 f. 160. 340. 340.  
     (Huygens): S. 97. 209.  
     s. a. *centrobaryca*. *centrum aequilibrii*. *centrum gravitatis*. *punctum aequilibrii*. Quadraturmethode.

- Schwingungsmittelpunkt  
 Sätze (Huygens): S. 37. 96.  
*scutella (nostra)*: S. 162.  
*secans falsa*: S. 426–428. 464. 522–524.  
 Sechseck s. *hexagonum*.  
*sectio*  
*angulorum*: S. 113. 702.  
*universalis*: S. 141. 175. 227. 430. 439. 447. 497. 508. 582. 595 f. 673.  
*circuli*: S. 227.  
*conica*: S. 18. 172.  
*cylindricorum*: S. 99.  
*ellipseos*: S. 227.  
*rationis*: S. 702.  
*semisolidi*: S. 146.  
*ungulae*: S. 146.  
 s. a. Teilung.  
 Segment  
 s. Kreissegment. *segmentum*.  
*segmentum*  
*commensurabile*: S. 191. 205.  
 Sekans: N. 22\*. 26\*. 27\*. S. 259 f. 276. 338. 360. 389 f. 414. 502. 514. 522–524. 528. 566. 578–582. 622. 735. 823. 580–583. 622. 644. 701 f. 720. 723. 798.  
 Asymptote: S. 389.  
 Differenzen  
 Moment: S. 408.  
 Fläche: S. 259. 338. 396. 465. 467. 469. 471–474. 481. 484. 489. 502. 523. 582.  
 Moment: S. 389. 403. 428. 448. 450 f. 459. 461 f. 472. 485. 491. 524. 579. 583.  
 Quadratur: S. 259. 396. 465. 467. 469. 471–474. 481. 484. 489. 502. 523. 582.  
 (Gregory): S. 338.  
 Tangente: S. 798.  
 s. a. *figura angulorum*. *secans falsa*.  
 Sekante: S. 223. 233. 495. 657. 663.  
 Satz: S. 495.  
 Sektor: S. 334.  
 s. a. Hyperbel. Kreissektor.  
*semicirculus*  
*generator*: S. 167. 212.  
*series*
- arithmetica*: S. 546.  
*sive finita sive infinita*: S. 717.  
*arithmeticae infinitorum*: S. 356.  
*arithmetice proportionales*: S. 286.  
*arithmetico-synnotos*: S. 546.  
*continue crescens*: S. 298. 311.  
*continue decrescens*: S. 298. 311.  
*convergens*: S. 542. 719.  
*differentiarum*: S. 261. 311. 318. 689. 771. 793.  
*finita*: S. 494. 632 f.  
*geometrica*: S. 310 f. 318.  
*finita infinitave*: S. 546.  
*geometrice proportionalium*: S. 298.  
*harmonica*: S. 261 f. 264. 337.  
*homogenea*: S. 794.  
*infinita*: S. 430. 490. 492. 528. 566. 594. 596 f. 614. 632 f. 691. 734. 738. 740. 805.  
*summabilis*: S. 542.  
*mirabilis*: S. 678.  
*perpendicularis descendens*: S. 290.  
*progressionis geometricae*: S. 311. 318.  
*quadrabilis*: S. 488.  
*radicum*: S. 259.  
*replicata*: S. 676.  
*potestatum*: S. 634.  
*subdupla*: S. 318.  
*transversa descendens*: S. 290.  
*triangularis*: S. 113. 130. 323.  
 s. a. *progressio*.  
 Sinus: N. 12\*. S. 14–16. 19. 86. 89. 102. 110. 112. 123. 123. 131. 139. 143 f. 149 f. 152–154. 159. 167–170. 182. 210. 213. 221 f. 253. 273. 276. 292. 323 f. 331. 334–336. 339. 346. 359 f. 360. 377. 380–383. 383. 385 f. 389 f. 391–393. 396 f. 399–405. 407 f. 414. 425 f. 428–430. 435 f. 439. 443. 448. 450. 452. 455. 457–462. 464. 467–481. 484 f. 487. 555. 565–567. 581–583. 597. 620 f. 663. 671. 692. 696. 759. 796. 798.  
 Definition: S. 123.  
 Extremwerte: S. 152. 169. 197. 470.  
 Fläche: N. 12\*. S. 112. 149 f. 152 f. 155. 159. 210 bis 214. 222. 228 f. 334–336. 339. 377. 379 f. 399 f. 402. 439. 444 f. 467 f. 471–477. 479. 481. 484. 566. 583. 620. 736. 781.  
 Konstruktion: S. 671.

- Moment: S. 386. 428. 447. 452. 461. 464. 472. 472. 565. 582 f. 700.
- Quadratur: N. 12\*. S. 86. 112. 149–156. 159. 198 f. 206. 210–214. 222. 228 f. 259. 334–336. 339. 377. 379. 380. 399 f. 402. 439. 444 f. 467 f. 471–479. 481. 484. 566. 583. 620. 622. 736. 781.
- Sätze (Pascal): S. 112. 183–186. 183. 186 f. 189. 201–204.
- Rotationskörper
- Oberfläche: S. 108.
- Satz (Fabri): S. 89. 89. 91. 458. 461.
- Zylinder: S. 407.
- s. a. Kreis, Ordinate. *sinus*.
- sinus*
- complementi*: S. 259. 360. 385. 395–397. 408. 435 f. 439. 443. 448. 450. 452. 455. 457–462. 464. 467–481. 484 f. 487. 504 f. 565–567. 582 f. 620. 663. 696.
  - inversus*: S. 398.
  - rectus*: N. 12\*. S. 107. 113. 144. 149. 152–155. 210 bis 212. 214. 222. 228. 395. 555. 582. 620. 692. 696.
  - totus*: S. 14. 19. 89. 154 f. 154. 184. 190. 197. 199–202. 207. 292.
  - truncatus*: S. 198. 205.
  - versus*: N. 12\*. S. 86. 107. 112 f. 140. 144. 148 f. 152–156. 154. 212 f. 228 f. 259. 360. 377. 379. 382–385. 383. 389 f. 392. 425 f. 428–430. 439. 460 f. 468. 474. 581. 620 f. 692. 696. 759. 796. 798.
  - s. a. *figura sinuum*. *linea sinuum*. *sagitta*.
- solidum*
- annulare cycloidis*: S. 278.
  - centrobarycum*: S. 233.
  - conchoeidis*: S. 399. 403.
  - cycloideale*: S. 59.
  - cylindricum*: S. 18.
  - hyperbolae*, *hyperbolicum*, *spatii hyperbolici*: S. 340–343. 340. 403. 432.
  - hyperboleiforme*: S. 385.
  - parabolicum*: S. 20. 352.
  - parabolico-circulare*: S. 383.
  - paraboleidis*: S. 605 f. 639.
- semihyperbolae*: S. 356.
- trilinei*: S. 352 f.
- ungulae*: S. 347.
- s. a. *figura. orthogonium. prisma. rectangulum. trilineum. ungula*.
- spatia incommensurabilia*: S. 216.
- spatium*
- compositum ex rectis*: S. 140.
  - curvilineum*: S. 652 f.
  - exiguum*: S. 179.
  - infinitum*: S. 246. 575. 644 f.
  - intelligibile*: S. 6.
  - physicum*: S. 6.
  - quadrabile*: S. 511. 515.
  - sensibile*: S. 6.
- speculatio*
- elegans et intacta*: S. 143.
  - profundissima*: S. 169.
- sphaera*: S. 5 f. 10. 17. 58. 59. 106. 167. 173. 183.
- s. a. *hemisphaera*.
- sphaerica*: S. 10. 138.
- sphaeroeides*, *sphaeroeis*: S. 99. 106. 166 f. 170–173. 329. 338. 503 f.
- compressum*: S. 106. 106. 211.
  - latum*: S. 106. 106. 167. 172. 211.
  - longum*: S. 107. 167.
  - oblongum*: S. 106. 165 f. 211.
  - s. a. *hemisphaeroeides*.
- Sphäroid: S. 59. 211. 597.
- Oberfläche: N. 11\*. S. 99. 106 f. 211. 329. 338.
  - (Fabri): S. 167. 170.
  - (Huygens): S. 165 f. 170–172. 211.
  - (Regnault): S. 167. 170–173.
- Volumen: S. 230.
- s. a. *hemisphaeroeides*. *sphaeroeides*.
- Spindel s. *fusus*. Paraboloid.
- Spirale: S. 17. 216–218. 221–223.
- Fläche: S. 216–218. 222 f.
  - Kreisspirale (Archimedische): S. 217. 221. 223. 574 f.
  - Quadratur (Archimedes): S. 217.
- Quadraturmethode: S. 223.
- Zykloidenspirale: S. 217 f. 222 f.
- Quadraturmethode: S. 222.
  - s. a. *helix*.

- spiritus humanus*: S. 574.  
 Statik: S. 701–703.  
 Gleichgewichtsbetrachtungen: S. 491. 702 f.  
 s. a. *centrobaryca*. Moment. Quadraturmethode.  
 Schwerpunkt.
- status centrobaricus (figurae)*: S. 94.  
*subinfinituplum*: S. 299. 314. 318.  
 Subnormale: S. 584. 586. 589. 598. 600. 602. 657.  
 663 f. 666–671. 677. 688. 707 f. 710. 712. 722.  
 757.  
 Regel: S. 598.  
 s. a. Ellipse. Hyperbel. Kreis. Parabel. *reducta*.
- Subtangente: N. 6\*. S. 586. 586. 598. 600. 602.  
 621 f. 657. 663. 677 f. 677. 689. 692 f. 706–708.  
 712. 757 f. 800. 804 f. 822 f.  
 Regel: S. 598.  
 Summation: S. 621.  
 s. a. Ellipse. Hyperbel. Kreis. Parabel. Parabel,  
 höhere. *producta*. Tangentenmethoden.
- summa*  
*infinita*: S. 422.  
*prope vera*: S. 254.  
*pyramidalis*: S. 112. 134. 137. 142. 156. 187. 190.  
 199. 322. 604.  
*rectangularis*: S. 132.  
*rectilinea*: S. 207.  
*simplex*: S. 112. 123 f. 126. 130. 132 f. 141 f. 160.  
 185. 186 f. 190. 199. 245. 287. 339. 359.  
*summarum*: S. 86. 120. 131. 133. 136 f. 141. 185.  
 248.  
*symbola*: S. 183. 190.  
 seu *commensurabilis*: S. 196.  
*triangularis*: N. 10<sub>1</sub>\*. S. 112 f. 159 f. 185 f. 187.  
 189 f. 196 f. 199–201. 203. 221. 233. 236. 244 f.  
 247. 287. 322 f. 325. 329. 334. 339. 343. 347.  
 398. 519.  
*triangulo-triangularis*: S. 604.  
 s. a. Quadratur. Reihe, Summation.
- Summation s. Reihe. Reihe, spezielle. Subtangente.  
*superficies*  
*centrobaryca*: S. 96. 209.  
*commutabilis*: S. 510.  
*curva*: S. 5. 7. 9. 93. 99. 108. 124. 145 f. 160. 171.  
 228 f. 275. 278. 325. 333. 509 f. 521. 530. 722.
- curvilinea truncata quadrabilis*: S. 514.  
*plana*: S. 5. 93. 95. 509.  
*qualibet data minor*: S. 135.  
*supersolidum*: S. 606.  
*symbolisare*: S. 211.  
 s. a. *summa symbola*.  
*synthesis*: S. 488.  
*synthetice*: S. 614.  
*tabula*: S. 226. 284. 611. 631. 633 f. 637. 687. 691.  
 702. 704. 737. 814.  
*cyclica*: S. 546.  
*hyperbolica*: S. 546.  
*hyperboleidum*: S. 646. 649.  
*inversa*: S. 546.  
*Leibnitiana*: S. 546.  
*logarithmorum*: S. 547.  
*paraboloeidum*: S. 623–625. 627–629. 644.  
*pro logarithmicis logarithmorum*: S. 765.  
*sinuum*: S. 176. 546.  
*versorum*: S. 176. 229.
- Tafeln  
 trigonometrische: S. 176. 229. 546.  
 s. a. Hyperbel, höhere. Logarithmus. Parabel,  
 höhere. *tabula*.
- Tangens: N. 22\*. 26\*. 27\*. S. 271. 360. 384. 386  
 bis 390. 414. 417. 523. 565 f. 576. 735.  
 Fläche: S. 396. 400. 403. 406. 427. 442. 443. 467  
 bis 469. 471–475. 479. 481–484. 486–489. 503 f.  
 523. 576.  
 Moment: S. 403. 407 f. 428. 430. 437–439. 444  
 bis 448. 450. 455 f. 460–462. 464. 565 f.  
 Satz (Pell): S. 394 f.  
 Zylinder: S. 401 f. 404–408.  
 s. a. *tangens*.
- tangens*  
*canonicus*: S. 735.  
*falsa, falsus*: S. 400. 404. 427 f. 444 f. 460. 463.  
 522. 576 f. 735.
- Tangente: N. 41\*. S. 94. 96. 139–141. 145. 179. 230.  
 338. 362. 495–497. 509. 512 f. 518 f. 542 f. 546.  
 585 f. 585. 594. 598. 602. 657. 688.  
 Abstände zu gegebenem Kurvenpunkt: S. 63 f.  
 96 f. 140. 183. 271. 519.  
 Summation: S. 602.  
 unendliche: S. 600. 622.

- Tangentenmethode, inverse: N. 18\*. 40\*. 41\*. 44\*. S. 625 f. 630. 663 f.
- Problem
- Ordinate aus gegebener Normale bestimmen: S. 586. 657. 688.
  - Ordinate aus gegebener Subnormale bestimmen: S. 362 f. 586. 657. 666–671. 688. 710. 712.
  - Ordinate aus gegebener Subtangente bestimmen: S. 362 f. 586. 622 f. 625 f. 630. 657. 663 bis 666. 669. 674. 678. 680. 688. 706 f. 822 bis 825.
  - Ordinate aus gegebener Tangente bestimmen: N. 41\*. S. 546. 657. 688.
- Tangentenmethoden, Tangentenrechnung: N. 35\*. S. 70. 256. 363. 494. 625. 627. 656. 657–663. 671. 706.
- (Descartes): S. 363. 585–591. 585. 706. 712–718.
  - (Hudde): S. 585–591. 585. 706.
  - (Sluse): N. 6\*. S. 543. 592. 677 f. 677. 688. 693 bis 695. 698–700. 706. 706. 711 f. 758. 800. 802. 804 f.
  - (Wallis): S. 662.
- Technik
- s. a. Architektur. Instrument. *machina*. Optik. Pendeluhr. *rota*.
- Teilung: S. 5 f. 15. 17 f. 54. 98–101. 145 f. 166. 225. 227 f. 383.
- Zweiteilung: S. 63. 93–95. 124. 126 f. 139. 148. 160. 162. 182. 211. 213. 223. 277. 318. 336–338. 344. 346. 348. 353. 354. 360. 366. 370. 375. 413. 552. 767.
- s. a. Bogenteilung. Flächenteilung. Körperteilung. *sectio*. Verhältnisteilung. Winkelteilung.
- tetragonismus*: S. 191. 198. 203–205. 227. 231. 233. 251. 304. 326. 402 f. 407. 428. 436–438. 447. 487. 514. 726. 781. 783. 793. 797.
- arithmeticus*: S. 430.
  - mechanicus*: S. 741.
  - universalis*: S. 706.
- theorema*, *theoremata*
- divina*: S. 308.
  - elegans*: S. 286.
  - generale*, *generalia*: S. 120–122. 638.
- memorabile*, *memorabilia*: S. 85. 189. 271. 325. 402 f. 417. 821.
- meum*: S. 186. 189.
- mirum*: S. 326.
- nostrum*: S. 120. 126. 734.
- notabile*, *notabilia*: S. 92. 99.
- praeclarum*, *praeclara*: S. 352. 734.
- pulcherrimum*: S. 97.
- universalissimum*: S. 227 f. 323.
- Torus: S. 18. 277–279. 290. 354. 552.
- s. a. *annularia*. *annulus*. *figura annularis*. *solidum annulare*.
- Transformation: S. 129. 334. 380. 822.
- s. a. Koordinatentransformation. Quadraturmethode.
- transitus*
- obliquus*: S. 4.
  - rectus*: S. 4.
- transmutatio figurarum*: S. 165.
- Transmutationssatz: S. 271. 358. 594. 597. 617 bis 620. 734–736.
- Trapez
- Moment: S. 552. 556.
  - s. a. Fläche.
- triangulum*, *triangula*
- aequiangulum*: S. 385.
  - aequilaterum*: S. 214. 385.
  - characteristicum*: N. 28\*. 29\*. S. 417. 497. 538 f. 542 f. 562. 597. 610. 692 f. 706. 708. 710. 822.
  - inassignabile*: S. 502.
- generans*, *generatrix*: S. 107. 570.
  - infinite parvum*: S. 73.
- isosceles*: S. 572.
- orthogonium*: S. 85. 227 f. 260. 324. 463. 512. 526. 597.
  - quolibet dato minus*: S. 179.
- rectangulum*: S. 57. 90. 196. 251. 387. 393. 396. 417. 437. 441. 512. 562. 564. 651. 728. 735.
- rectilineum*: S. 227. 437. 506.
- scalenum*: S. 73 f.
- semiquadratum*: S. 236.
- similia*: N. 26\*. S. 16. 157. 349. 377. 382. 384 f. 387. 393. 396 f. 399. 407. 410. 413 f. 417 f. 465 bis 486. 497. 499. 502–504. 506. 512 f. 518. 520 bis 523. 526. 528. 531–533. 537. 542. 555–557.

562. 576. 597. 602. 610. 613. 621. 651 f. 657.  
 665. 667–669. 710. 728. 735. 810 f. 813. 816.  
 819. 822.  
 s. a. *quasi triangulum*.  
*trigonometria inassignabilium*: S. 465.  
*trigonum*: S. 92. 691.  
*triligne*: S. 210.  
*trilinearis*  
 parabolica: S. 13. 20.  
*trilineum*  
 cubicum: S. 338.  
 mixtum: S. 346.  
 planum: S. 124. 139.  
 quadraticum: S. 338.  
 quadratoquadraticum: S. 353.  
*rectangulum*: S. 136. 138.  
*solidum*: S. 138 f.  
*trochlea*: S. 30.  
*trochoeis*: S. 143 f. 518 f. 524. 530. 532–535. 539.  
 782.  
 parabolica: S. 144. 519.  
 Trochoide s. Rollkurve. *trochoeis*. Zykloide.  
 unendlich: S. 66. 82 f. 125. 135. 141. 233. 236. 242.  
 245 f. 249. 262 f. 265. 284. 298. 314–317. 492.  
 493. 494. 531. 542. 543. 575 f. 580. 582. 601. 607.  
 610. 616. 634. 644 f. 659 f. 676. 685. 689. 737 f.  
 740. 814.  
 Eigenschaft: S. 249. 644.  
 Regel: S. 236.  
 s. a. Arithmetik. endlich. Größe. *infinitum*.  
 Reihe. Tangente. Zahl.  
 unendlich klein: S. 73 f. 169. 179. 181. 251. 262 f.  
 265. 298 f. 308. 310. 313–318. 332. 339. 356.  
 359. 381. 396. 434. 469. 491. 494. 502. 510. 513.  
 521 f. 527 f. 533–535. 543. 568. 576. 597. 607.  
 619. 651 f. 657. 659 f. 666. 671. 692. 738. 766.  
 810.  
 s. a. Bruch. Größe.  
*ungula*: S. 138 f. 145 f. 162 f. 165. 209. 229–231.  
 270 f. 304. 325 f. 329 f. 329. 333. 335. 347 f. 355.  
 385. 432.  
*uninomium*: S. 595.  
*unitas*: S. 49–51. 53. 111. 127. 129 f. 134 f. 212.  
 215. 221. 233. 238. 240 f. 247 f. 255. 262. 265 f.  
 275. 285 f. 290. 298 f. 301–304. 310. 315–318.  
 327. 329 f. 339. 359. 392. 398. 532. 535. 590.  
 607. 625. 627. 635. 686 f. 710. 712. 722. 732.  
 740. 771. 811.  
*constructionis*: S. 359. 362. 527 f. 533 f. 663. 706.  
 710. 738. 755. 824.  
*in constructione*: S. 316 f. 441. 607.  
*infinite parva*: S. 317.  
*seu recta inassignabilis*: S. 318.  
*universalia*: S. 325.  
*velocitas*: S. 4.  
*ventilatio*: S. 181.  
 Verhältnis  
 endliches: S. 265. 318.  
 umgekehrtes: S. 146.  
 unendlich großes: S. 265. 298.  
 unendlich kleines: S. 298 f. 318.  
 Verhältnisrechnung  
 Beweis (Nonancourt): S. 549.  
 zusammengesetztes: S. 36. 60. 106. 115. 216. 231.  
 318. 340. 354. 357.  
 s. a. proportional. Proportionale. *ratio*. *ratiuncula*.  
 Verhältnisteilung: S. 702.  
 Versiera (Zykloidoide) s. Kreisquadratur, *figura segmentorum*.  
 Vieleck s. *hexagonum*. Kreispolygon. *pentagonum*.  
*polygonum*.  
 Viereck s. Parallelogramm. Quadrat. Rechteck.  
 Rhombus. Trapez.  
 Vierseite  
 Fläche: S. 470.  
 infinitesimales: S. 568.  
 Moment: S. 559. 569.  
 Zylinder: S. 461. 478.  
*vires humanae*: S. 702.  
 Vorzeichen: S. 49. 71. 269. 421. 553. 633.  
 Doppel- und Mehrfachvorzeichen: S. 551. 695.  
 769.  
 Winkelteilung: S. 113. 141. 175. 227. 430. 439. 447.  
 497. 508. 582. 595 f. 673. 701–703.  
 Würfel  
 Konstruktion: S. 7.  
 Wurzel

- Addition: S. 147. 151. 151. 253 f. 258 f. 304.  
 imaginäre: S. 424. 716.  
 irrationale: S. 146. 151. 371. 557. 595. 614. 633.  
 reelle: S. 716. 823.  
 s. a. Gleichung mit Doppelwurzeln. *radix*.  
 Wurzelziehen: S. 68 f. 151. 294 f. 324. 342. 497. 547.  
 582. 625. 634. 670. 769.  
 Methode: S. 69. 769.
- Zahl, Zahlen:  
 Absolutbetrag: S. 49.  
 endliche: S. 262. 660. 737.  
 figurierte: S. 133 f.  
 Dreieckszahl: S. 133 f. 235 f. 246 f. 249 f. 632.  
 634. 789.  
 Pyramidalzahl: S. 133 f. 236. 246. 632. 634.  
 ganze: S. 611. 625. 627. 630 f.  
 gerade: S. 49. 625.  
 imaginäre: S. 424. 424.  
 irrationale: S. 146. 151. 294. 371. 611 f. 625. 627.  
 692.  
 natürliche: S. 133–135. 236. 241. 247 f. 249–251.  
 259. 273 f. 285. 290. 323. 327. 546. 633 f. 765.  
 812.  
 positive: S. 49.  
 Primzahl: S. 49.  
 Quadratzahl: S. 77. 80. 134. 137. 146 f. 246–248.  
 294–296. 304. 632 f. 648.  
 rationale: S. 430. 490. 492. 566. 582. 596. 611.  
 631. 691 f. 734. 738. 740.  
 unendliche: S. 245–247. 262. 265. 280. 315. 607.  
 659 f. 737 f. 740.  
 ungerade: S. 238. 290. 625.  
 s. a. Null. *numerus*. Wurzel.
- Zahlentheorie  
 Problem  
 zwei Quadrate finden, deren Differenz ein gegebenes Quadrat ist: S. 294–297.
- Zissoide: S. 439. 489–492. 575–577. 644. 719. 734  
 bis 736.  
 Asymptote: S. 644.  
 Fläche: S. 577. 736.  
 Moment: S. 490–492. 577.  
 Quadratur: S. 575–577. 719.  
 (Huygens): S. 575.
- (Wallis): S. 575.  
 Zyklide: N. 7\*. 9\*. 10\*. 14\*. 15\*. 17\*. 29\*. S. 17.  
 30 f. 35. 38–41. 40. 271. 278. 397. 440. 539. 541 f.  
 574. 583. 597. 620. 657. 718. 736.  
 Austauschbarkeit von Höhe und Grundlinie:  
 S. 523.  
 Bogen: S. 95. 105. 137. 160. 211. 335.  
 Moment: S. 520–523.  
 Schwerpunkt: S. 95. 105. 137.  
 Dreieck, charakteristisches: S. 520 f. 562.  
 Dreiseit: S. 223.  
 Eigenschaft: S. 221.  
 Evolvente: N. 151\*. S. 73–77. 215–218. 222 f. 523.  
 Satz (Huygens): S. 73 f. 77.  
 Extremwerte: S. 77.  
 Fläche: S. 211–213. 344–346.  
 Schwerpunkt: S. 137.  
 Geschichte: S. 208.  
 Konstruktion: S. 143. 213–218. 222.  
 Normale: S. 520 f. 524. 532.  
 Problemstellung (Pascal): S. 137 f.  
 Quadratur: S. 105 f. 137. 158. 211–213. 344. 346.  
 524.  
 (Descartes): S. 595.  
 (Huygens): S. 213.  
 (Roberval): S. 595.  
 Rektifikation: S. 95. 160. 211. 335. 521–524. 528.  
 Methode: S. 528.  
*retorta*: S. 211–213. 271. 344–346. 672.  
 Fläche: S. 211. 344. 346.  
 Rotationskörper: S. 108. 137.  
 Oberfläche: S. 108.  
 Schwerpunkt der Oberfläche des Halbkörpers:  
 S. 138.  
 Schwerpunkt des Halbkörpers: S. 137.  
 Torus: S. 278.  
 Volumen: S. 137.  
 Segment: S. 211. 344–346.  
 Fläche: S. 344–346. 446. 574.  
 Sekante: S. 160.  
 Spirale: S. 217 f. 222.  
 Tangente: S. 73–75. 143 f. 223. 520. 522 f.  
 verkürzte: S. 360.  
 verlängerte: S. 360.  
 Zweiteilung: S. 160.

s. a. <i>cycloëis</i> . Epizykloide. <i>figura chordarum</i> .	Schwerpunkt: S. 59 f.
Zylinder: S. 6 f. 9 f. 12. 14 f. 18. 20. 59–61. 95. 98–101. 148 f. 152–155. 165. 167. 177. 181. 183. 188. 196. 199 f. 202–204. 206 f. 222. 225–231. 251. 271–273. 274. 276. 278. 281. 325. 329. 336 f. 340 f. 352–355. 357. 379–381. 389. 391. 395. 398. 400–404. 417. 426. 444.	Zylinderhuf: S. 100 f. 138 f. 145 f. 162. 165. 209. 229 bis 231. 270 f. 304. 325 f. 329 f. 329. 333. 335. 347 f. 355. 385.
einbeschriebener Doppelkegel: S. 59 f.	Definition: S. 145. 145.
größter einbeschriebener Kegel: S. 59 f.	Grundfläche: S. 330. 347.
Konstruktion: S. 7. 9. 59.	Komplanation: S. 229.
Oberfläche: S. 7. 9 f. 16. 18. 59 f. 95. 97. 99. 102. 148 f. 159. 167. 173. 184. 198. 209 f. 220 f. 228 bis 230. 273. 325 f. 329. 333. 335.	Kubatur: S. 229. 304. 325.
Konstruktion: S. 7.	Oberfläche: S. 145 f. 160. 209 f. 229 f. 325. 335.
Quadrant: S. 14. 16.	(Huygens): S. 145.
Satz (Fabri): S. 18.	(Pascal): S. 145 f.
Schnitte	Regel: S. 330.
Satz: S. 227 f.	Satz, Sätze
Schnittkurve: S. 228.	(Huygens): S. 96. 98. 100 f. 145 f. 209.
s. a. Zylinderhuf.	(Pascal): S. 96. 209.
	(Saint-Vincent): S. 229.
	Schwerpunkt: S. 146. 209. 325. 333. 347.
	Volumen: S. 146. 209. 229. 231. 270. 304. 347.
	(Pascal): S. 146.
	s. a. <i>cuneus. ungula</i> .

## HANDSCHRIFTENVERZEICHNIS

### FUNDSTELLEN

Verzeichnet sind hier die im vorliegenden Band edierten Hand- und Druckschriften, geordnet nach Fundorten und Signaturen.

HANNOVER, *Niedersächsische Landesbibliothek*

LH 35	II 1	Bl. 89–90	N. 42 <sub>1</sub>	LH 35	II 1	Bl. 321–322	N. 47
		Bl. 93–94	N. 49			Bl. 323–324	N. 22
		Bl. 95–96	N. 39		V 6	Bl. 12–13	N. 45
		Bl. 135–136	N. 38		VIII 2	Bl. 5	N. 18
		Bl. 138–139	N. 39		VIII 3	Bl. 1–8	N. 40
		Bl. 140	N. 39		VIII 30	Bl. 107–108	N. 50
		Bl. 141–143	N. 23			Bl. 150	N. 6
		Bl. 194	N. 33		XII 1	Bl. 13	N. 4
		Bl. 201–204	N. 9			Bl. 38	N. 19
		Bl. 229–232	N. 26			Bl. 180–181	N. 41
		Bl. 239	N. 37			Bl. 266–267	N. 30
		Bl. 242–245	N. 27		XII 2	Bl. 69	N. 24
		Bl. 250–251	N. 39			Bl. 113	N. 8
		Bl. 252–253	N. 16 <sub>1</sub>			Bl. 125–126	N. 7
		Bl. 254–255	N. 31			Bl. 129–130	N. 5
			N. 32			Bl. 159–160	N. 48
		Bl. 256	N. 36			Bl. 161–162	N. 42 <sub>2</sub>
		Bl. 261–262	N. 17		XIII 1	Bl. 353–354	N. 29
		Bl. 263–264	N. 34			Bl. 359–360	N. 28
		Bl. 265–266	N. 35			Bl. 379–380	N. 25
		Bl. 267–268	N. 20		XIII 3	Bl. 243	N. 46
			N. 21			Bl. 250–251	N. 28 <sub>1</sub>
		Bl. 284	N. 43				N. 28 <sub>2</sub>
			N. 44				N. 28 <sub>3</sub>
		Bl. 285–290	N. 12		XIV 2	Bl. 70–71	N. 11
			N. 13		XV 1	Bl. 18–23	N. 10
		Bl. 293–296	N. 15	Leibn. Marg.	7,1		N. 1
		Bl. 297–298	N. 16 <sub>2</sub>	Leibn. Marg.	70		N. 2
		Bl. 299–300	N. 16 <sub>3</sub>	Ms IV 377			N. 3
		Bl. 301–304	N. 16 <sub>4</sub>				
		Bl. 312–313	N. 17				
		Bl. 314	N. 14				

## Cc-2-KONKORDANZ

Verzeichnet sind hier die Nummern der im *Catalogue critique* 2 erfassten Stücke mit Angabe der ihnen entsprechenden Stücke des vorliegenden Bandes. Die ersten vier hier aufgeführten Stücke werden im *Catalogue critique* 2 nicht erfasst. Steht hinter einer Cc-2-Nr.: tlw., so heißt dies, dass mindestens ein Teil des bezeichneten Stücks in diesem Band nicht abgedruckt ist.

Cc 2 Nr.	N.	Cc 2 Nr.	N.	Cc 2 Nr.	N.	Cc 2 Nr.	N.
—	1	549	29	608	44	639	5
—	3	550 A, B	20	609	7	641	30
—	25	551	21	610	7	642	19
—	46	552	36	611	7	692	39
500	8	555 B	39	612	34	693	37
542A, B	2	555 C, D	23	613	35	695	22
544	10	559	49	614	44	696	27
545A	14	560	47	616	6	697	26
545B	17	561 tlw.	42 <sub>2</sub>	617	12	817	4
546	16 <sub>1</sub>		48	618	13	883	31
547	15	564	9	619	11		32
	16 <sub>2</sub>	575	40	620	33	905	18
	16 <sub>3</sub>	607	51 <sub>1</sub>	625	41	1112	50
	16 <sub>4</sub>		51 <sub>2</sub>	635 A, B	39	1233 A tlw.	42 <sub>1</sub>
	17		51 <sub>3</sub>	636	24	1237	45
548	28	608	43	638	38	1238	45

Die Entsprechung von Stücknummer und Cc-2-Nummer ist in der Überlieferung des jeweiligen Stücks vermerkt.

#### ERWÄHNT LEIBNIZ-HANDSCHRIFTEN

In dem vorliegenden Band wird lediglich auf zwei nicht edierte, inhaltlich zusammengehörige Handschriften Bezug genommen. Es sind dies (nach Cc2-Nummern und Handschriftensignaturen geordnet):

Cc 2, Nr.	LH, Nr.		S.
563	35 II 1	Bl. 240–241	<i>725. 762.</i>
1233 A	35 II 1	Bl. 87–92	<i>725. 762. 763. 796.</i>

## SIGLEN, ABKÜRZUNGEN, ZEICHEN

### 1. SIGLEN UND EDITORISCHE ZEICHEN

<i>L</i>	Leibniz, eigenhändig
<i>LiH</i>	Leibniz' eigenhändige Bemerkungen in einem Handexemplar
[ ]	in der Datierung: verschlossenes Datum, im Text: Ergänzungen und Eingriffe des Herausgebers (ursprüngliche Form im Variantenapparat).
( )	Vereinzelt gebraucht Leibniz selbst eckige Klammern (Hinweise darauf im Erläuterungssapparat).
(–)	Konjektur schwer lesbarer oder durch Beschädigung des Textzeugen ausgefallener Wörter bzw. Wortteile.
<i>Kursivierung</i>	nicht entziffertes bzw. durch Beschädigung ausgefallenes Wort; die Anzahl der Striche entspricht der Anzahl der vermuteten Wörter.
<i>S p e r r u n g</i>	Zitate, Buchtitel, Text in anderer als der Grundsprache des betreffenden Stückes.
	Hervorhebungen durch Leibniz
	Umrahmungen durch Leibniz zur Hervorhebung eines Terms oder zur Ausgliederung eines Textabschnittes aus dem Textzusammenhang
	Umrahmungen durch Leibniz zur Kennzeichnung wegfällender Terme

### 2. ABKÜRZUNGEN (allgemein)

a. a. O.	am angegebenen Ort	Erl.	Erläuterung
Aufl.	Auflage	ersch.	erschienen
Ausg.	Ausgabe	gedr.	gedruckt
Bd(e)	Band (Bände)	gestr.	gestrichen
Bl.	Blatt	ggf.	gegebenenfalls
Bog.	Bogen	Hrsg. (hrsg.)	Herausgeber (herausgegeben)
bzw.	beziehungsweise	Hs.	Handschrift
ca	circa	im Allg.	im Allgemeinen
CJR	Corpus Juris Reconcinnatum (vgl. <i>LSB</i> VI, 2 S. XXI f.)	Jh.	Jahrhundert
Ders.	Derselbe	LH	HANNOVER, <i>Niedersächs.</i> <i>Landesbibl.</i> Leibniz-Hand- schriften
ebd.	ebenda	Marg.	Marginalie(n)
erg.	ergänzt		

Ms.	Manuskript	Tl(e)	Teil(e)
N., Nr.	Nummer	tlw.	teilweise
Nachdr.	Nachdruck	u. a.	und andere, unter anderem
NB.	nota bene	u. d. T.	unter dem Titel
r°	recto	Übers.	Übersetzung
S.	Seite	u. ö.	und öfter
s.	siehe	usf.	und so fort
s. a.	siehe auch	v.	von, vor
s. o.	siehe oben	vgl.	vergleiche
Sp.	Spalte	v°	verso
s. u.	siehe unten	Z.	Zeile
SV.	Schriftenverzeichnis	zus.	zusammen
s.v.a.	siehe vor allem	§	destilletur, distilletur

## 3. ABKÜRZUNGEN (Schriften)

- Cc 2 *Catalogue critique des manuscrits de Leibniz. Fascicule II (Mars 1672 – Novembre 1676).* Hrsg. A. Rivaud u. a. Poitiers 1914–1924.
- DGS *Geometria, a Renato Descartes anno 1637 gallice edita . . . in latinam linguam versa et commentariis illustrata opera atque studio Francisci a Schooten.* 2. Aufl. 2 Tle. Amsterdam 1659–1661 (= SV. N. 16,2).
- DO DESCARTES, R., *Oeuvres.* Hrsg. Ch. Adam u. P. Tannery. 12 Bde. Paris 1879–1910; 2. Aufl. ebd. 1964–1972.
- GO GALILEI, G., *Opere.* Edizione Nazionale. 20 Bde. Florenz 1890–1909; Nachdr. ebd. 1929–1939 u. ö.
- HO HUYGENS, Chr., *Oeuvres complètes.* Hrsg. D. Bierens de Haan, J. Bosscha u. a. 22 Bde. Den Haag 1888–1950.
- LBG *Der Briefwechsel von Gottfried Wilhelm Leibniz mit Mathematikern.* Hrsg. C. I. Gerhardt. Berlin 1899.
- LMG *Leibnizens mathematische Schriften.* Hrsg. C. I. Gerhardt. 7 Bde. Berlin, Halle 1849–1863; Nachdr.: Hildesheim 1962 u. 1971.
- LSB LEIBNIZ, G. W., *Sämtliche Schriften und Briefe.* Hrsg. von der Göttinger und der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften, Berlin — Im Erscheinen.
- MCW MERSENNE, M., *Correspondance.* Hrsg. C. de Waard u. a. 16 Bde. Paris 1931–1986.
- OC OLDENBURG, H., *The Correspondence.* Hrsg. A. R. Hall u. M. Boas Hall. 13 Bde. Madison [usw.] 1965–1986.
- PO PASCAL, Bl., *Œuvres.* Hrsg. P. Bourroux u. a. 14 Bde. Paris 1904–1914; Nachdr.: Vaduz 1965.
- TO TORRICELLI, E., *Opere.* Hrsg. G. Loria u. G. Vassura. 4 Bde (5 Tle). Faenza 1919–1944.
- WO WALLIS, J., *Opera mathematica.* 3 Bde. Oxford 1693–1699 [Marg.]; Nachdr.: Hildesheim 1972.

## 4. MATHEMATISCHE ZEICHEN

Im Folgenden werden die heute ungebräuchlichen Bezeichnungen erklärt, soweit sie nicht unmittelbar aus dem Kontext folgen bzw. im einzelnen erklärt sind. Bei einigen Zeichen sind zusätzlich die Autoren angegeben, von denen Leibniz sie wahrscheinlich kennengelernt hat. Für weitere Einzelheiten vgl. die Einleitung S. XXIX–XXXI.

Zahlreiche Beispiele und eine tabellarische Übersicht von Leibniz' mathematischen Bezeichnungsweisen gibt F. CAJORI, *Leibniz the master builder of mathematical notation* (in: *Isis* 7 (1925) S. 420–429) bzw. F. CAJORI, *A history of mathematical notation*, Bd. 2 S. 189–196 (La Salle, Ill. 1929 u. ö.).

$\hat{\cdot}$	Multiplikation	$a - c \propto b - d$	arithmetische Proportion
$\times$	Überkreuzmultiplikation	$\nabla MFB ::$	
$\div$	Division	$\nabla^{lo} MAL$	ähnlich
$ $	Kürzung eines Bruches	$\bullet$	Platzhalter Vorzeichen
$\sqrt[2]{\cdot}$	Kürzung durch 2	$\bullet$	Platzhalter Term
$f$	facit	$ $	Zusammenfassung
$a \cup b$	Summe (Kolumnen)	$x \dots$	laufende Variable
$a$	Differenz (Kolumnen)	$\varphi$	laufende Variable mit
$\square$	Quadrat	$\vartheta$	oberer Grenze $x$
$x^\beta$	allgemeine (reelle) Potenz	$a$	obere Grenze
$\sqrt{\cdot}, Rq$	Quadratwurzel	23	Substitution
$Rq, Rqq \dots$	iterierte Quadratwurzel	$y$	Funktionswert an der Stelle
$\sqrt[3]{\cdot}, \sqrt[4]{\cdot}, \dots$	Kubikwurzel	$x + dx$	
$\sqrt[n]{\cdot}, \sqrt@{n}$	n-te Wurzel	$DX$	alle DX
$\sqcap$	gleich	$\mathbb{X}$	alle x
aequ.	gleich	$a$	alle a
$\propto$	gleich	Ozanam:	
$\sqsupset$	größer als	$\infty$	gleich
$\sqsubset$	kleiner als	$a, b :: c, d$	Proportion
$a : b :: c : d$	geometrische Proportion		